

VEREIN FÜR PILZKUNDE BASEL

Pilze der Jahre 2006/2007/2010/2011/2012/2013

Das nachfolgende Dokument beinhaltet die Jahresarbeit des Vereins für Pilz-kunde Basel der Jahre 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013.
Die gefundenen Pilze wurden jede Woche bestimmt, einige illustriert, dokumentiert und im Internet hochgeladen. Der Text auf der ersten, linken Seite wiederholt sich deswegen wöchentlich.

PILZE 2006

Idee und Realisation: Kurt Minder

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils am Bestimmungsabend am Montag aufliegen. Es wird sich um solche handeln, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich werden wir auch Mikroaufnahmen einflechten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der «VAPKO Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane».

Dasyscyphus niveus
Schneeweisses Haarbecherchen

Pilze der Woche 14

Auricularia auricula-judae *Judasohr*

Standort:	Meistens findet man diesen Pilz an Holunder, aber auch an anderen Laubbäumen.
Fruchtkörper:	Die rotbraunen Fruchtkörper sind Muschelförmig, lappig und rückseitig am Substrat angewachsen. Die Oberseite ist flaumig (Huthaare). Das Hymenophor ist runzlig-aderig, Farbe wie Oberseite.
Mikromerkmale:	Er gehört zu der Sektion mit längsseptierten Basidien und langen Epibasidien. Die Sporen sind alantoid und 18 x 8 µm gross. Die Hutdeckschicht besteht aus hyalinen, langen und dichtbesetzten Haaren. Septen mit Schnallen.

Sclerotinia tuberosa *Anemonenbecherling*

Standort:	Zwischen Buschwindröschen aus einem Sklerotium entspringend.
Fruchtkörper:	kugelig bis flach schüsselförmig, bis 3 cm gross und gestielt, haselnussbraun, rötlichbraun.
Mikromerkmale:	Sporen 12–17, 6– 9 µm

Tubaria hiemlis *Winter-Trompetenschnitzling*

Standort:	Häufig an Holzstückchen.
Fruchtkörper:	Hut rotbraun, hygrophan, Rand gerieft, 1 – 3 cm. Lamellen breit angewachsen, Schneiden heller als die Flächen. Stiel 1,5 – 4 cm.
Mikromerkmale:	Sporen 8–10 / 4–5 µm ohne Keimporus, Cheilozystiden meist kopfig. Huthaut aus liegenden Hyphen. Schnallen vorhanden.

Auricularia auricula-judae *Judasohr*

Sclerotinia tuberosa *Anemonenbecherling*

Tubaria hiemlis *Winter-Trompetenschnitzling*

Tubaria hiemlis Cheilozystiden

Pilz-Fundliste der Woche 14

Crepidotus
luteolus
(Lamb.) Sac.
Blassgelbes Stummelfüsschen

Flammulina
velutipes
(Curtis.: Fr.) Singer
Samtfussrübling

Lentinus
adhaerens
(Alb. et Schw.: Fr.) Fr.
Harziger Sägeblättling

Melanoleuca
stridula
(Fr.) Sing. ss. Kühn.
Wegrand-Weichritterling

Tubaria
hiemalis
Romagn. ex Bon
Winter-Trompetenschnitzling

Antrodia
xantha
(Fr. Fr.) Ryv.
Gelbliche Braunfäuletramete

Daedaleopsis
tricolor
(Pers.) Bond. & Sing.
Purpurrote Tramete

Datronia
mollis
(Sommerf.: Fr.) Donk
Weicher Resupinatporling

Oxyporus
populinus
(Schum.: Fr.) Donk
Treppenförmiger Scharfporling

Perenniporia
fraxinea
(Bull. ex Fr.) Ryv.
Eschenbaumschwamm

Phanerochaete
tuberculata
(Kst.) Pm.
Milchweisser Zystidenrindenpilz

Schizopora
paradoxa
(Schrad.: Fr.) Donk
Veränderlicher Spaltporling

Steccherium
ochraceum
(Pers. ap. Gmel.: Fr.) S.F. Gray
Ockerrötlichr Resupinatstacheling

Auricularia
auricula-judae
(Bull. ex St. Am.) Wettst.
Judasohr

Exidia
truncata
Fr.
Stoppeliger Drüsling

Tremella
foliacea
(Pers. S.F. Gray) Pers.
Rotbrauner Zitterling

Exidiopsis
grisea
(Pers.) Boud. & Maire
Graue Gallertkruste

Bisporella
subpallida
(Rhem) Dennis
Blassgelbes Reisigbecherchen

Daldinia
concentrica
(Bolt. ex Fr.) Ces. & de Not.
Kohliger Kugelpilz

Dasyscyphus
niveus
(Hedw. ex Fr.) Sacc.
Schneeweisses Haarbecherchen

Tapesia
fusca
(Pers. ex Mérat) Fuck.
Dunkelgraues Filzbecherchen

Sclerotinia
tuberosa
Hedwig ex Fr.) Fuck.
Anemonenbecherling

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils am Bestimmungsabend am Montag aufliegen. Es wird sich um solche handeln, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich werden wir auch Mikroaufnahmen einflechten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der «VAPKO Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane».

Bjerkandera adusta *Rauchgrauer Porling*

Das rauchgraue Hymenophor, das auf Druck schwärzt und das monomitische Hyphensystem unterscheidet ihn von den Trametes. Im Moment ist er überall an Laubholz zu finden.

Pilze der Woche 15

Polyporus ciliatus *Maiporling*

Standort:	An morschem Holz von Laubbäumen, im Frühling.
Fruchtkörper:	Der Hut ist zwischen 3 und 8 cm gross. Die Hutfarbe erstreckt sicht von oliv- bis grau-braun. Der Hutrand ist filzig. Der Stiel ist schuppig.
Mikromerkmale:	Sporen zylindrisch 6 x 2 µm, hyalin. Dimitisches Hyphensystem. Generative Hyphen dünnwandig mit Schnallen, Skeletthyphen dickwandig.
Bemerkungen:	Er ist dem Winterporling sehr ähnlich, hat jedoch kleinere Poren und der Stiel ist schuppig.

Coprinus silvaticus *Rauhsporiger Tintling*

Standort:	auf moderndem, vergrabenem Holz
Fruchtkörper:	walzenförmig, Velum nicht sichtbar, radial furchig, ockerbraun hygrophan.
Mikromerkmale:	Sporen 12–7 µm dickwandig, warzig; Cheilo-, Caulo- und Pielozystiden vorhanden. Huthaut aus rundlichen Zellen.
Bemerkungen:	das büschelige Erscheinen und die Farbe erinnert an einen Glimmertintling, dieser hat jedoch in der Regel ein deutliches Velum. Die Mikromerkmale weisen jedoch deutlich auf die oben erwähnte Art hin.

Crepidotus cesatii

Kugelsporiges Stummelfüsschen

Standort:	an totem Holz von Laubbäumen.
Fruchtkörper:	Hut um 10 mm, weiss bis cremeweisslich. Lamellen jung weiss, später ockerlich.
Mikromerkmale:	Sporen warzig, rundlich 7–9 / 6–7 µm , Cheilozystiden unregelmässig zylindrisch oder verzweigt (Alter).
Bemerkungen:	er unterscheidet sich von C. applanatus durch nicht ganz so runde Sporen und die nicht keuligen Zystiden.

Polyporus ciliatus *Maiporling*

Coprinus silvaticus *Rauhsporiger Tintling*





oben links: Cheilozystiden
oben rechts: Chaulozystiden
unten links: Sporen

Crepidotus cesatii *Kugelsporiges Stummelfüsschen*

Crepidotus cesatii *Kugelsporiges Stummelfüsschen*

Pilz-Fundliste der Woche 15

Athelia
decipiens
(v. Höhn. & Litsch.) Erikson

Cylindrobasidium
evolvens
(Fr.: Fr.) Jül.
Ablösender Rindenpilz

Crepidotus
cesatii
(Rabh.) Saccardo
Kugelsporiges Stummelfüsschen

Coprinus
silvaticus
Peck
Rauhsporiger Tintling

Dacrymyces
stillatus
Nees: Fr.
Zerfliessende Gallertträne

Gyromitra
ancilis
(Pers.: Fries) Kreisel
Scheibenlorchel

Lentinus
adhaerens
(Alb. et Schw.: Fr.) Fr.
Harziger Sägeblättling

Meruliopsis
corium
(Fr.) Ginns
Lederartiger Fältling

Peniophora
limitata
(Fr.) Cooke
Eschenzystidenrindenpilz

Peniophora
incarnata
(Pers.: Fr.) Karst.
Fleischfarbiger Borstenrindenpilz

Polyporus
brumalis
Pers.: Fr.
Winterporling

Polyporus
ciliatus
Fr.
Bewimperter Porling

Pycnoporellus
fulgens
(Fr.) Donk
Leuchtender Weichporling



Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils am Bestimmungsabend am Montag aufliegen. Es wird sich um solche handeln, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich werden wir auch Mikroaufnahmen einflechten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der «VAPKO Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane».

Morchella esculenta *Speisemorchel*

Pilze der Woche 16

Psathyrella marcescibilis *Grauweisser Faserling*

Standort:	An Flussufern, in mit Holz vermengter Erde.
Fruchtkörper:	Der Hut ist konvex bis stumpf konisch. Der Hutrand ist jung behangen, nicht eingerollt.
Mikromerkmale:	Sporen 12 x 7 µm, mit Keimporus. Ohne Pleurozystiden. Die Hutdeckschicht besteht aus dünnen, langen Hyphen, darunter kurze, dickere Hyphen.
Bemerkungen:	Er gehört in die Gruppe der Psathyrellen ohne Pleurozystiden mit behangenem Hutrand. Die Huthaut, siehe Mikroaufnahme, ist für diese Art etwas speziel.

Sarcoscypha coccinea
Zinnoberroter Prachstbecherling

Standort:	Auf Laubholzästen, besonders Erle, Weide, an feuchten Standorten.
Fruchtkörper:	10 – 50 mm gross, pokal- bis schüsselförmig.
Mikromerkmale:	Sporen 29 - 39 x 10 - 11 µm. Asci 8-sporig, Paraphysen dünn, der rotkörnige Inhalt verfärbt sich mit Jod grün.
Bemerkungen:	Diese farblich attraktive Art ist wohl kaum zu verwechseln, obwohl man heute diesen Becherling an anderem Sub–strat neu beurteilt.

Pycnoporus cinnabarinus *Zinnoberrote Tramete*

Standort:	an totem Holz von Laubbäumen, meistens Kirschbaum.
Fruchtkörper:	Hut um 20 - 100 mm, orange-rot.
Mikromerkmale:	Sporen 5 x 2 µm. Hyphensystem trimitisch mit Schnallen.
Bemerkungen:	die Farbe, das trimitischen Hyphensystem und der Standort, hauptsächlich an am bodenliegenden Kirschbaumästen, kennzeichen diese Pilz gut. Verwechslungen währen möglich mit *Pycnoporellus fulgens*, der jedoch an Weisstannen fruktifiziert.

Psathyrella marcescibilis *Grauweisser Faserling*

Sarcoscypha coccinea *Zinnoberroter Prachstbecherling*

Pycnoporus cinnabarinus *Zinnoberrote Tramete*



Huthaut von Psathyrella marcescibilis



Porenbild von Pycnoporus cinnabarinus

Hyphensystem von Pycnoporus cinnabarinus



Pilz-Fundliste der Woche 16

Coprinus
disseminatus
(Pers.: Fr.) S.F.Gray
Gesäter Tintling

Coprinus
micaceus
(Bull.: Fr.) Fr.
Glimmertintling

Corticum
roseum
Per.: Fr.
Rosafarbener Prachtrindenpilz

Disciotis
venosa
(Pers.) Boud.
Morchelbecherling

Ischnoderma
benzoinum
(Wahl.: Fr.) Karst.
Schwarzgebänderter Harzporling

Lepista
nuda
(Bull.: Fr.) Cooke
Violetter Rötelritterling

Mitrophora
semilibera
(DC ex Fr.) Lev.
Käppchen-Morchel

Morchella
esculenta
Pers. Ex St. Amans
Speisemorchel

Phanerochaete
sordida
(Karst.) Eriks. & Ryv.
Cremefarbener Zystidenrindenpilz

Polyporus
ciliatus
Fr.
Bewimperter Porling

Polyporus
mori
Pollini: Fr.
Wabenporling

Psathyrella
marcescibilis
(Britz.) Sg.
Grauweisser Faserling

Psathyrella
spadiceogrisea
(Schäff.) Fr. Maire
Dungbewohnender Faserling

Sarcoscypha
coccinea
Fr.) Lamb.
Zinnoberroter Prachtsbecherling

Sclerotinia
tuberosa
Hedwig ex Fr.) Fuck.
Anemonenbecherling

Strobilurus
esculentus
(Wulf.: Fr) Sg.
Fichtenzapfenrübling



Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils am Bestimmungsabend am Montag aufliegen. Es wird sich um solche handeln, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich werden wir auch Mikroaufnahmen einflechten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der «VAPKO Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane».

Mitrophora semilibera *Käppchenmorchel*

Pilze der Woche 17

Discina perlata *Grösster Scheibling*

Standort: Auf riesigen Haufen von Häcksel (Lothar) in grossen Mengen.
Fruchtkörper: unterschiedlich gross, tellerförmig mit runzliger Oberseite und manchmal aufgebogenem Hutrand.
Mikromerkmale: Sporen 24 - 30 x 13 - 14 µm ohne Anhängsel.
Bemerkungen: Dieser Pilz fällt auf durch die runzlige Hutoberfläche, das Vorkommen auf Holz, die neg. Jodreaktion, den Sporen mit Öltropfen und den beiden Anhängseln.

Cheilymenia fimicola *Gemeiner Mistborstling*

Standort: Auf Kuhdung.
Fruchtkörper: 1 - 2 mm gross, zuerst fast geschlossen, dann sich öffnend.
Mikromerkmale: Sporen 15 x 9 µm. Asci 8-sporig, Paraphysen z.T. gegabelt und etwas kopfig. Haare braun bis 3fach septiert und an der Basis gegabelt.
Bemerkungen: Diese Kollektion unterscheidet sich von der Literatur durch etwas kleinere Fruchtkörper, kleinere Sporen und gegabelten Paraphysen, auch die Farbe ist etwas intensiver rot.

Marasmius androsaceus *Rosshaarschwindling*

Bemerkung: Das Vorkommen, hauptsächlich auf Nadelstreu, der dünne, schwarze und im Verhältnis zum Hut lange Stil kennzeichnen ihn gut.

Coprinus auricomus *Braunhaariger Tintling*

Standort: auf in Erde vergrabenem Holz, Wegrand
Fruchtkörper: Hut 15 – 40 mm, jung walzenförmig, dann glockig werdend.
Mikromerkmale: Sporen 13 x 9 µm, 4-sporig, Keimporus zentral. Cheilo und Pleurozystiden sowie braune, dickwandige Huthaare.
Bemerkungen: Er ist wohl der einzige Tintling mit Setae in der Huthaut. Weiter Pilze mit Setae und ähnlichem Habitus sind in der Gattung Psathyrella zu finden.

Discina perlata *Scheibenlorchel*

Cheilymenia fimicola *Gemeiner Mistborstling*

Marasmius androsaceus *Rosshaarschwindling*

Coprinus auricomus *Braunhaariger Tintling*



Haare von Cheilymenia fimicola

Asci und Paraphysen von Cheilymenia fimicola



Coprinus auricomus
links: Cheilozystiden
Mitte: Sporen
rechts: Huthaare



Pilz-Fundliste der Woche 17

Cheilymenia
fimicola
(de Not. & Baglietto) Dennis
Gemeiner Mistborstling

Conocybe
sienophylla
(Berk. & Br.) Sing.
Ockerfarbiges Samthäubchen

Coprinus
auricomus
Pat.
Braunhaariger Tintling

Gyromitra
perlata
(Fr.) Fries
Scheibenlorchel

Exidia
truncata
Fr.
Stoppeliger Drüsling

Helvella
acetabulum
(L. ex St. Amans) O. Kuntze
Hochgerippter Becherling

Hypholoma
capnoides
(Fr.: Fr.) Kummer
Rauchblättriger Schwefelkopf

Hypholoma
fasciculare
(Huds.: Fr.) Kumm.
Grünblättriger Schwefelkopf

Hypholoma
lateritium
(Schäff.: Fr.) Kumm.
Ziegelroter Schwefelkopf

Marasmius
androsaceus
(L.: Fr.) Fr.
Rosshaarschwindling

Mitrophora
semilibera
(DC ex Fr.) Lev.
Käppchen-Morchel

Mycena
stipata
Maas Geester. & Schw.
Büscheliger Nitrat-Helmling



Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils am Bestimmungsabend am Montag aufliegen. Es wird sich um solche handeln, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich werden wir auch Mikroaufnahmen einflechten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der «VAPKO Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane».

Caloscypha fulgens *Leuchtender Prachtbecher*

Pilze der Woche 18

Mycena galericulata *Rosablättriger Helmling*

Standort:	An Strücken und Ästen.
Fruchtkörper:	20 bis 50 mm gross. Die Lamellen verfärben sich erst im Alter rosa.
Mikromerkmale:	Sporen 10 x 6 µm, Basidien 2-sporig, mit Schnallen.
Bemerkungen:	Dieser Pilz erscheint bei uns schon Ende April anfangs Mai und ist stets an Holz zu finden. Er hat keinen besonderen Geruch, vielleicht schwach rettichartig.

Peziza arvernensis *Buchenwaldbecherling*

Standort:	Laubwälder, auch auf holzigem Substrat und Brandstellen.
Fruchtkörper:	bis 150 mm gross, dünnfleischig und gebrechlich. Aussenseite fein keiig, mit angenehmem Geruch.
Mikromerkmale:	Sporen 16 x 8 µm. Asci 8-sporig, Paraphysen etwas kopfig. Sporen reif fein punktiert. Textura globulosa, mittlere Schicht aus dünnen, verwobenen Hyphen, Exipulum aus dünnen, z.T. nach aussen gerichteten Hyphen.
Bemerkungen:	Nach Lit. wird er an Brandstellen, Holz und am Boden aufgeführt. Er unterscheidet sich zu anderen Pezizas durch Sp.-Form, -Ornamentierung und -Grösse; der kopfigen Parahysen; der Textura.

Psathyrella spadiceogrisea *Dungbewohnender Faserling*

Standort:	auf Erde oder verrottetem Holz.
Fruchtkörper:	bis über 50 mm gross, in der Farbe variabel, im Alter fein gerieft.
Mikromerkmale:	Sporen 8 x 5 µm, mit kleinem Keimporus, mit Cheilo und Pleurozystiden.
Bemerkungen:	Wichtige Merkmale sind der sich nach Seife anfühlende, hygrophane Hut und die vielen Ballonzystiden an der Lamellenschneide.

Mycena galericulata *Rosablättriger Helmling*

Mycena galericulata, Cheilozystiden

Mycena galericulata, Auswüchse der Stielhauthyphen

Mycena galericulata
Zweisporige Basidie
und Sporen

Peziza arvernensis *Buchenwaldbecherling*

Peziza arvernensis
Asci mit fein warzigen Sporen

Peziza arvernensis
Querschnitt der Fruchtschicht



Psathyrella spadiceogrisea *Schmalblättriger Faserling*

Psathyrella spadiceogrisea: Cheilozystiden

Psathyrella spadiceogrisea: Sporen

Psathyrella spadiceogrisea: Huthaut

Pilz-Fundliste der Woche 18

Agaricus
bitorquis
(Quélet) Sacc.
Trottoir-Champignon

Agrocybe
semiorbicularis
(Bull.: St. Am.) Fay.
Halbkugeliger Ackerling

Calocybe
cambosa
(Fr.) Donk
Mairitterling

Caloscypha
fulgens
(Pers.) Boud.
Leuchtender Prachtbecher

Mycena
galericulata
(Scop.: Fr.) Gray
Rosablättriger Helmling

Mycena
filopes
(Bull. Fr.) Kumm.
Zerbrechlicher Fadenhelmling

Mycena
renati
Quel.
Gelbstieliger Nitrat-Helmling

Peziza
arvernensis
Boud.
Buchenwaldbecherling

Pluteus
exiguus
(Pat.) Sacc.
Kleinster Dachpilz

Polyporus
ciliatus
Fr.
Bewimperter Porling

Polyporus
squamosus
Huds.: Fr.
Schuppiger Porling

Psathyrella
spadiceogrisea
(Schäff.) Fr. Maire
Dungbewohnender Faserling

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils am Bestimmungsabend am Montag aufliegen. Es wird sich um solche handeln, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich werden wir auch Mikroaufnahmen einflechten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der «VAPKO Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane».

Fundliste

Calocybe gambosa *Maipilz*

Pilze der Woche 19

Hydropus subalpinus *Buchenwald Wasserfuss*

Standort: An Holzstückchen.
Fruchtkörper: bis über 3 cm gross.
Mikromerkmale: Sporen 9 x 4 µm, alantoid, mit auffallend grossen Zystiden.
Bemerkungen: Dieser Pilz erscheint bei uns schon Ende April, macht dann eine Pause und erscheint nochmals im Spätherbst. Auffallende Merkmale sind der crèmgelbe Hut und die weissen, sehr zähen Lämellen sowie die wurzelnde Stielbasis.

Mycena vitilis *Zäher Fadenhelmling*

Standort: Auf vergrabenem Holz von Laubbäumen.
Fruchtkörper: bis 20 mm gross.
Mikromerkmale: Sporen 10 x 6 µm, tropfenförmig, Cheilozystiden mit fingerigen Auswüchsen, sowohl Hut- wie auch Stielhyphen mit Auswüchsen. Keine Schnallen gesehen.
Bemerkungen: In der Farbe variabel, der Stiel ist im Verhältnis zum Hut sehr lang und dünn. Er gehört in die Sektion Fragilipedes und hat tropfenförmige Sporen.

Mycena abramsii *Voreilender Helmling*

Standort: auf vergrabenem Holz.
Fruchtkörper: um 20 mm.
Mikromerkmale: Sporen 10 x 5 µm, zylindrich, Cheilozystiden mit verlängertem Schnabel (variabel), Hyphen-Auswüchse am Stiel, wie auch in der Hutdeckschicht, mit Schnallen.
Bemerkungen: Ein Helmling mit schwachem Rettichgeruch, einem bereiften Hut und Wasserausscheidung am Stiel. (Fragilipedes).

Mycena stipata *Viersporiger Nitrat-Helmling*

Standort: an Holz.
Fruchtkörper: um 20 mm.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 5 µm, breitelliptisch bis fast zylindrisch, Cheilozystiden lanzettlich, Hyphen-Auswüchse am Stiel, wie auch in der Hutdeckschicht, mit Schnallen.
Bemerkungen: Das Vorkommen an Holz, der ausgeprägte Geruch nach Chlor kennzeichnen diesen Pilz gut. (Sektion Fragilipedes).

Hydropus subalpinus *Buchenwald Wasserfuss*

Hydropus subalpinus:
links: Cheiloystiden
oben: Caulozystiden





Hydropus subalpinus:
links: Pielozystiden
oben: Sporen

Mycena vitilis *Zäher Fadenhelmling*

Mycena vitilis: Cheilozystiden

Mycena vitilis: Auswüchse der Stielhyphen mit Schnalle

Mycena vitilis: Basidien und Sporen

Mycena abramsii *Voreilender Helmling*



Mycena abramsii
Cheilozystiden und Sporen



Mycena abramsii
Hutdeckschicht und Tramahyphen



Mycena stipata *Büscheliger Nitrathelmling*

Mycena stipata
links oben: Cheilozystiden
links unten: Basidien und Sporen
oben: Auswüchse der Stielhyphen

Hemimycena pithya *Schmalsporiger Scheinhelmling*

Standort: Im Nadelstreu
Fruchtkörper: bis 3 mm gross (Kollektion).
Mikromerkmale: Sporen 9 x 2,5 µm, kommaförmig
Bemerkungen: Ein sehr kleines Pilzchen mit fadenförmigen, langen Stiel. Wächst im Nadelstreu schon im Frühling. In der Literatur gibt es unterschiedliche Auffassungen: mit Zystiden, ohne Zystiden.

Pilz-Fundliste der Woche 19

Caloscypha
fulgens
(Pers.) Boud.
Leuchtender Prachtbecher

Gymnopus
dryophylla
(Bull.: Fr.) Kumm.
Waldfreund-Rübling

Helvella
queletii
Bres.
Rippenstielige Becherlorchel

Hemymycena
bithya
(Fr.) Dörfelt
Schmalsporiger Scheinhelmling

Hydropus
subalpinus
(v.Höhnel) Singer
Buchenwald-Wasserfuss

Hypholoma
fasciculare
(Huds.:Fr.) Kumm.
Grünblättriger Schwefelkopf

Inocybe
rimosa
(Bull.:Fr:) Kummer
Kegeliger Risspilz

Kuehneromyces
mutabilis
(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.
Gemeines Stockschwämmchen

Laetiporus
sulphureus
(Fr.) Murr.
Schwefelporling

Mycena
vitilis
(Fr.) Quél.
Zäher Fadenhelmling

Mycena
abramsii
(Murr.) Murr.
Voreilender Helmling

Mycena
stipata
Maas Geester.& Schw.
Büscheliger Nitrat-Helmling

Mycena
abramsii
(Murr.) Murr.
Voreilender Helmling

Panaeolus
papilionaceus
(Bull.: Fr.) Quél.
Behangener Düngerling

Peziza
varia
(Hedw.) Fr.
Riesenbecherling

Pluteus
cervinus
(Schäff.) P. Kumm.
Rehbrauner Dachpilz

Psathyrella
candolleana
(Fr.: Fr.) Maire
Behangener Faserling

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils am Bestimmungsabend am Montag aufliegen. Es wird sich um solche handeln, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich werden wir auch Mikroaufnahmen einflechten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der «VAPKO Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane».

Fundliste

Helvella lacunosa *Grubenlorchel*

Pilze der Woche 20

Cortinarius vernus *Frühlingswasserkopf*

Standort: Nadelwald (Kollektion auf Moos).
Fruchtkörper: um 30 mm gross.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 5.5 µm, breitelliptisch, stark warzig.
Bemerkungen: Einer der ersten Cortinarien aus der Untergattung Telamonia. Gute Merkmale sind der in der Mitte dunkel gefärbte Hut, der rot angehauchte Stiel und die rundlichen Sporen.

Helvella queletii *Rippenstielige Becherlorchel*

Standort: In einer Parkanlage.
Fruchtkörper: um 30 mm hoch und breit.
Mikromerkmale: Sporen 16 x 11 µm, mit Öltropfen.
Bemerkungen: Der dunkle, schalen bis becherförmige Hut mit heller Unterseite und einem Stiel mit runden Rippen.

Clitocybe fragrans *Dufttrichterling*

Standort: Im Nadelwald auf Nadelstreu.
Fruchtkörper: um 30 mm.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 4 µm, tropfenförmig.
Bemerkungen: Diesen Trichterling mit beige-grauem Hut, den nicht ganz weissen Lamellen und dem Anisgeruch findet man vom Spätherbst über milde Winter und wie diese Kollektion zeigt auch im Frühling.

Hygrocybe conica *Kegeliger Saftling*

Standort: auf vermoostem Rasen.
Fruchtkörper: 30 mm breit und 60 mmm hoch.
Mikromerkmale: Sporen 10 x 6 µm
Bemerkungen: Er gehört zu denjenigen Saftlingen, die auf Druck und im Alter schwärzen. Die Sporenform variiert innerhalb der Kollektion von breitelliptisch bis fast zylindrisch.

Cortinarius vernus *Frühlings-Wasserkopf*

Helvella queletii *Rippenstielige Lorchel*

Clitocybe fragrans *Langstieliger Dufttrichterling*

Hygrocybe conica *Kegeliger Saftling*

Calocybe carnea *Fleischrosa-Schönkopf*

Standort: Im Grasland
Fruchtkörper: um 30 mm
Mikromerkmale: Sporen 6 x 3 µm.
Bemerkungen: Ein Schönkopf mit Rüblingscharakter, einem schwach rosa-violett getöntem Hut und den schmalen Sporen mit etwas abgebogenem Appendix. Mit siderophiler Granulation.

Cortinarius vernus, Sporen

Hygrocybe conica, Sporen

Helvella lacunosa
Paraphysen
und Asci

Hygrocybe conica, Basidien

Pilz-Fundliste der Woche 20

Boletus
erythropus
(Fr.: Fr.) Pers.
Schusterpilz

Calocybe
carnea
(Bull.: Fr.) Kühn.: Donk
Fleischrosa-Schönkopf

Caloscypha
fulgens
(Pers.) Boud.
Leuchtender Prachtbecher

Clitocybe
fragrans
(With.) Kumm.
Dufttrichterling

Conocybe
ambigua
Kühn. ex Watl.
Verwechselbares Samthäubchen

Cortinarius
vernus
Lind. & Melot
Frühlings-Wasserkopf

Daldinia
concentrica
(Bolt. ex Fr.) Ces. & de Not.
Kohliger Kugelpilz

Gymnopus
dryophylla
(Bull.: Fr.) Kumm.
Waldfreund-Rübling

Gyromitra
esculenta
(Pers.) Fries
Frühjahrslorchel

Helvella
lacunosa
Afz. Ex Fr.
Grubenlorchel

Helvella
queletii
Bres.
Rippenstielige Becherlorchel

Hygrocybe
conica
(Scopp.: Fr.) Kumm.
Kegeliger Saftling

Kuehneromyces
mutabilis
(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.
Gemeines Stockschwämmchen

Marasmius
prasiosmus
Fr.
Grosser Knoblauchschwindling

Melanoleuca
cognata
(Fr.) Konr. et Maubl.
Frühlings-Weichritterling

Mycena
pura
(Pers.: Fr.) Kumm.
Rettich-Helmling

Mycena
stipata
Maas Geester.& Schw.
Büscheliger Nitrat-Helmling

Mycena
abramsii
(Murr.) Murr.
Voreilender Helmling

Mycena
renati
Quel.
Gelbstieliger Nitrat-Helmling

Peziza
arvernensis
Boud.
Buchenwaldbecherling

Pluteus
cervinus
(Schäff.) P. Kumm.
Rehbrauner Dachpilz

Polyporus
squamosus
Huds.: Fr.
Schuppiger Porling

Sarcosphaera
crassa
(Santi ex Steudel.) Pouz.
Kronenbecherling

Tremella
mesenterica
Retz. ex Hook.
Goldgelber Zitterling

Xylaria
hypoxylon
(L. ex Hooker) Grev.
Geweihförmige Holzkeule

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils am Bestimmungsabend am Montag aufliegen. Es wird sich um solche handeln, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich werden wir auch Mikroaufnahmen einflechten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der «VAPKO Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane».

Fundliste

Pluteus cervinus *Hirschbrauner Dachpilz*

Pilze der Woche 21

Psathyrella olympiana *Weissflockiger Faserling*

Standort: auf Häcksel
Fruchtkörper: um 30 mm gross.
Mikromerkmale: Sporen 9 x 5 µm, zylindrisch, mit kleinem Keimporus, Zahlreiche birnenförmige Zellen an der Lamellenschneide, Cheilo- und Pleurozystiden nicht zahlreich.
Bemerkungen: Der Hut ist jung mit Velumresten besetzt, die zylindrischen Sporen sind z.T. verbogen. (in Lit. keine solche Sporenformen festgestellt)

Inocybe assimilata *Rundknolliger Risspilz*

Standort: Nadelwald.
Fruchtkörper: um 20 mm.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 5 µm, mit nicht ausgeprägten Höckern.
Bemerkungen: Eher ein kleiner Risspilz mit radialfaserigem Hut, der im Zentrum weiss vom Velum überhaucht ist. Mikromerkmale sind die schwach höckerigen Sp. und die Hyphenenden im oberen Stieldrittel, eingeschnürt, z.T. mehrfach septiert.

Lycoperdon perlatum *Flaschenstäubling*

Standort: auf Häcksel.
Fruchtkörper: Durchschnittliche Fruchtkörper 15 mm breit und 25 mm hoch.
Mikromerkmale: Sporen 4 µm, rund, fein warzig.
Bemerkungen: Er ist in Kopf- und Stielteil gegliedert, der Kopfteil ist mit kleinen Warzen besetzt, die nach dem Abfallen eine netzartige Zeichnung hinterlassen.

Boletus erythropus *Flockenstieliger Hexenröhrling*

Standort: Nadelwald.
Fruchtkörper: 120 mm breit und ebenso hoch.
Mikromerkmale: Sporen 15 x 5 µm
Bemerkungen: Er gehört zu denjenigen Hexenröhrlingen ohne Netz, unterscheidet sich jedoch zu B. queletii durch einen flockigschuppigen Stiel. Weiter Rotporer ohne Netz findet man in unserer Gegend kaum.

Psathyrella olympiana *Weissflockiger Faserling*

Psathyrella olympiana
Zystide

Psathyrella olympiana, Lamellenschneide

Psathyrella olympiana, Sporen

Inocybe assimilata *Rundknolliger Risspilz*

Inocybe assimilata, Hyphenenden der Stielbekleidung



Inocybe assimilata, Sporen

Lycoperdon perlatum *Flaschen-Stäubling*

Boletus erythropus *Flockenstieliger Hexenröhrling*

Pilz-Fundliste der Woche 21

Bolbitius
vitellinus
(Pers.: Fr.) Fr.
Gold-Mistpilz

Boletus
erythropus
(Fr.: Fr.) . Pers.
Varietät vom Schuster

Crepidotus
mollis
(Schäff.L Fr.) Staude
Gallertfleischiges Stummelfüsschen

Entoloma
vernum
Lundell
Frühlings-Rötling

Gymnopus
acervata
(Fr.: Fr.) Kumm.
Rotstieliger Büschelrübling

Inocybe
assimilata
(Britz.) Sacc.
Rundknolliger Risspilz

Laetiporus
sulphureus
(Fr.) Murr.
Schwefelporling

Lycoperdon
perlatum
Pers.: Pers.
Flaschen-Stäubling

Marasmius
oreades
(Bolton.: Fr.) Fr.
Nelkenschwindling

Mycena
abramsii
(Murr.) Murr.
Voreilender Helmling

Pluteus
chrysophaeus
(Schäff.: Fr.) Quél.
Gelbbrauner Dachpilz

Pluteus
romelli
(Britz.) Sacc.
Gelbstieliger Dachpilz

Psathyrella
olympiana
Smith
Weissflockiger Faserling

Sarcosphaera
crassa
(Santi ex Steudel.) Pouz.
Kronenbecherling

Stropharia
rugosoannulata
Farl. ex Murr.
Rotbrauner Riesentäuschling

Tarzetta
catinus
(Holmsk. ex Fr.) Korf & J.K. Rogers, ss.
Dennis
Tigelförmiger Kelchbecherling



Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils am Bestimmungsabend am Montag aufliegen. Es wird sich um solche handeln, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich werden wir auch Mikroaufnahmen einflechten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane».

Fundliste

Ganoderma adspersum *Wulstiger Lackporling,*

an Weisstanne, Sporenpulver rotbraun, keine Insekten-Gallen, dies sind die Unterschiede zum G. applanatum.

Pilze der Woche 22

Russula cyanoxantha *Violettgrüner Frauentäubling*

Standort: Laubwald.
Fruchtkörper: bis über 100 mm gross.
Mikromerkmale: Sporen 6 x 7 µm, isoliert-warzig.
Bemerkungen: Der Frauentäubling ist ein Weisssporer. Die wichtigsten Makromerkmale neben der Farbe, die variiren kann, sind die speckig-fettigen und elastischen Lamellen und die weisse Sporenfarbe

Marasmiellus ramealis *Ästchenschwindling*

Standort: an Zweigen und Ästen.
Fruchtkörper: kleine Fruchtkörper, 5 bis 15 mm gross.
Mikromerkmale: Sporen 9 x 3 µm, Cheilozystiden keulenförmig mit kleinen Auswüchsen. Septen mit Schnallen.
Bemerkungen: Gegenüber den Marasmius-Arten lebt diese Art bei Wasseraufnahme nicht mehr auf. Er trägt auch kein Kollar um den Stiel.

Crepidotus mollis *Gallertfleischiges Stummelfüsschen*

Standort: an Laubholz
Fruchtkörper: bis 50 mm.
Mikromerkmale: Sporen 6,5 x 4,5 µm, nicht warzig.
Bemerkungen: Die gelatinöse, gummiartige und abziehbare Huthaut sowie die Grösse, lassen ihn von anderen Crepidotus-Arten gut unterscheiden.

Psilocybe coprophila *Mistliebender Kahlkopf*

Standort: in mit Erde vermengtem Mist.
Fruchtkörper: 10 bis 20 mm
Mikromerkmale: Sporen 14 x 7 µm, dickwandig, mit Keimporus.
Bemerkungen: Er gehört zu denjenigen Kahlköpfen, die auf Druck nicht blauen und grosse, dickwandige Sporen haben. Er unterscheidet sich zu dem nächstverwandten, P. merdaria, durch keine Ringzone.

Russula cyanoxantha *Violettgrüner Frauentäubling*

Russula cyanoxantha



Russula cyanoxantha
Huthaut

Russula cyanoxantha



Russula cyanoxantha
Sporen, isoliert warzig, jedoch z.T. mit schwachen Verbindungen

Marasmiellus ramealis Ästchenschwindling

Crepidotus mollis *Gallertfleischiges Stummelfüsschen*

Psilocybe coprophila *Mistliebender Kahlkopf*

Psilocybe coprophila

Pilz-Fundliste der Woche 22

Boletus
luridus
Schäff.: Fr.
Netzstieliger Hexenröhrling

Boletus
aestivalis
(Paul.) Fr.
Sommersteinpilz

Crepidotus
mollis
(Schäff.L Fr.) Staude
Gallertfleischiges Stummelfüsschen

Ganoderma
adspersum
(Schulz.) Donk
Wulstiger Lackporling

Inocybe
rimosa
(Bull.: Fr:) Kummer
Kegeliger Risspilz

Marasmiellus
ramealis
(Bull.: Fr.) Sing.
Ästchenschwindling

Mycena
pelianthina
(Fr.: Fr.) Quél.
Schwarzgezähnelter Helmling

Panaeolus
foenisecii
(Per.: Fr.) Schr.
Heudüngerling

Pluteus
petasatus
(Fr.) Gill
Seidiger Dachpilz

Polyporus
mori
Pollini: Fr.
Wabenporling

Psathyrella
sacchariolens
Enderle
Süssriechender Faserling

Psilocybe
coprophila
(Bull.: Fr.) Kumm.
Mist-Kahlkopf

Scutellinia
scutellata
(L. ex St. Amans) Lambotte
Holz-Schildborstling



Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils am Bestimmungsabend am Montag aufliegen. Es wird sich um solche handeln, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich werden wir auch Mikroaufnahmen einflechten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise sind auf dieser HP zu finden. (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze).

Fundliste

Amanita rubescens (Perlpilz) unterscheidet sich von den anderen Knollenblätterarten durch das Röten unter der Huthaut und an den Frasstellen.

Pilze der Woche 23

Cortinarius junghuhnii *Samtiger Wasserkopf*

Standort: Nadelwald.
Fruchtkörper: 25 mm gross.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 5 µm, schwach warzig.
Bemerkungen: Sein Doppelgänger ist C. acutus, vom er sich durch kleineren Q-Wert der Sporen und durch zylindrische Cheilozystiden unterscheidet. C. acutus ist meistens spitz gebuckelt.

Tarzette cattinus *Napfbecherling*

Standort: am Wegrand auf Erdboden.
Fruchtkörper: bis 30 mm gross.
Mikromerkmale: Sporen 22 x 12 µm, Paraphysen z.T. kurz nach der Basis gegabelt. Melzer negativ.
Bemerkungen: Der Q-Wert ist gegenüber T. cupularis etwas grösser, was ihn hauptsächlich von ihm unterscheidet. Andere Autoren sind allerdings gegenteiliger Meinung.

Gloeophyllum trabeum *Balkenblättling*

Standort: an sehr morschem Struck eines Nadelbaumes.
Fruchtkörper: bis 80 mm.
Mikromerkmale: Sporen 9 x 3 µm, schmal-elliptisch, hyalin, ohne Öltropfen.
Bemerkungen: Der Balkenblättling ist dimisch, die generativen Hyphen haben Schnallen und sind hyalin, die Skeletthyphen sind braun, Zystiden vorhanden. Gegenüber G. odoratum ist er geruchlos. Der teilweise helle Hutrand ist auch ein guter hinweis.

Pluteus salicinus *Grauer Dachpilz*

Standort: an Holz von Laubbäumen.
Fruchtkörper: bis 50 mm
Mikromerkmale: Sporen 9 x 5 µm.
Bemerkungen: unter den Dachpilzen gehört er zu denjenigen mit Schnallen an den Hyphen, hauptsächlich in der HDS. Die Hyphen der HDS sind schlank und kaum aufgerichtet. Er hat hackenförmige Pleurozystiden und ballonförmige Cheilozystiden.

Cortinarius junghuhnii *Samtiger Wasserkopf*

Cortinarius junghuhnii
Cheilocystiden

Amanita rubescens: Cheilozystiden

Cortinarius junghuhnii
Sporen

Amanita rubescens: Sporen

Tarzetta catinus *Napfbecherling*

Tarzetta catinus
Asci, Paraphysen, Sporen

Gloeophyllum trabeum *Balken-Blättling*

Pluteus salicinus Grauer Dachpilz

Pluteus salicinus
Pleurozystiden und Sporen

Pilz-Fundliste der Woche 23

Amanita
rubescens
(Pers.: Fr.) Gray
Perlpilz

Boletus
edulis
Bull.: Fr.
Steinpilz

Coprinus
disseminatus
(Pers.: Fr.) S.F Gray
Gesäter Tintling

Cortinarius
junghuhnii
Fr. ss. Lge. Mos.
Breitsporiger Samt-Wasserkopf

Gloeophyllum
trabeum
(Pers.: Fr.) Murr.
Balken-Blättling

Hypholoma
fasciculare
(Huds.: Fr.) Kumm.
Grünblättriger Schwefelkopf

Leccinum
scabrum
(Bull.: Fr.) Gray
Birkenpilz

Mycena
pura
(Pers.: Fr.) Kumm.
Rettich-Helmling

Pluteus
salicinus
(Pers.: Fr.) Kumm.
Grauer Dachpilz

Russula
grisea
Fr.
Grauvioletter Reiftäubling

Xerocomus
chrysenteron
(Bull.) Quel.
Rotfuss-Röhrling

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils am Bestimmungsabend am Montag aufliegen. Es wird sich um solche handeln, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich werden wir auch Mikroaufnahmen einflechten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAP-KO Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise sind auf dieser HP zu finden. (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze).

Fundliste

Paxillus atrotomentosus *(Samtfusskrempling)*

Pilze der Woche 24

Russula grisea *Grauvioletter Reiftäubling*

Standort: Laubwald.
Fruchtkörper: um 70 mm.
Mikromerkmale: Sporen 7 x 6 µm, isoliert warzig, z.T. netzig, Spp. hellgelb.
Bemerkungen: Innerhalb der Grisea-Gruppe unterscheidet sich R. grisea durch die schlanken, z.T. verzweigten, weit septierten Huthaare. Makroskopisch ähnlich dem Frauentäubling, jedoch mit brüchigen Lamellen. Die Frasstellen auf ddm Hut röten im Alter.

Gymnopus fusipes *Spindeliger Blasssporrübling*

Standort: bei Eiche.
Fruchtkörper: um 40 mm.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 4 µm
Bemerkungen: er unterscheidet sich von anderen Rüblingen durch das büschelige Vorkommen bei Eichenstrünken und dem spindelig-wurzelnden Stiel.

Phaeolus schweinitzii *Kiefern-Braunporlig*

Standort: hauptsächlich bei Kiefern.
Fruchtkörper: bis bis 300 mm.
Mikromerkmale: Sporen 7 x 4 µm, zystiden vorhanden, ohne Schnallen.
Bemerkungen: junge Exemplare haben einen schwefelgelben Hutrand. Die Poren sind grün-gelb und labyrinthisch, sie verfärben sich auf Druck braun.

Polyporus tuberaster *Sklerotien-Stielporling*

Standort: Nadelwald, im Boden eingesenkt (manchmal mit einem Sklerotium verbunden).
Fruchtkörper: 80 mm und grösser.
Mikromerkmale: Sporen 13 x 5 µm. Hyphensystem dimitisch, mit schnallen.
Bemerkungen: meistens findet man P. tuberaster bei uns ohne Sklerotium. Ein makroskopisches Merkmal sind die ausgefransten Porenmündungen.

Russula grisea *Grauvioletter Reiftäubling*

Gymnopus fusipes *Spindeliger Blasssporrübling*

Phaeolus schweinitzii *Kiefern-Braunporlig*

Polyporus tuberaster *Sklerotien-Stielporling*

Russula grisea:
Huthaut mit Haare und Dermatocystiden

Russula grisea:
Sporen

Phaeolus schweinitzii
Zystiden, z.T. mit intracellulärem Pigment

Phaeolus schweinitzii
Sporen



Pilz-Fundliste der Woche 24

Skeletocutis
carneogrisea
David
Fleischgrauer Knorpelporling

Polyporus
tuberaster
(Jacq.: Pers.) Fr.
Sklerotien-Porling

Phaeolus
schweinitzii
(Fr.) Pat.
Kiefernbraunporling

Cantharellus
cibarius var. pallidus
Schulz.
Blasser Pfifferling

Russula
cyanoxantha
(Schäff.) Fr.
Frauentäubling

Russula
cyanoxantha fo. pelteraui
R. Maire.: Singer
Grüner Frauenentäubling

Russula
grisea
Fr.
Grauvioletter Reiftäubling

Paxillus
atrotomentosus
(Batsch.: Fr.) Fr.
Samtfuss-Krempling

Boletus
calopus
Pers.: Fr.
Schönfuss-Röhrling

Amanita
excelsa
(Fr.) Bertillon
Grauer Wulstling

Xerula
radicata
(Relhan.: Fr.) Dörfelt
Wurzel-Schleimrübling



Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils am Bestimmungsabend am Montag aufliegen. Es wird sich um solche handeln, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich werden wir auch Mikroaufnahmen einflechten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise sind auf dieser HP zu finden. (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze).

Fundliste

Inocybe erubescens *(Ziegelroter Risspilz)*

Innerhalb der Sektion Rimosa ist er der einzige mit roten Tönen am ganzen Fruchtkörper (altersbedingt).

Pilze der Woche 25

Boletus luridus *Netzstieliger Hexenröhrling*

Standort:	Mischwald.
Fruchtkörper:	um 100 mm.
Mikromerkmale:	Sporen 13 x 6 µm.
Bemerkungen:	Innerhalb der Röhrlinge mit roter Röhrenmündung ist er der einzige mit einer roten Linie am Röhrenboden.

Delicatula integrella *Genabelter Schleierhelmling*

Standort:	an morschen Strünken.
Fruchtkörper:	um10 mm.
Mikromerkmale:	Sporen 8 x 4 µm.
Bemerkungen:	er unterscheidet sich von der Gattung Hemimycena durch amyloide Sporen und durch die leistenartigen, weitstehenden Lamellen.

Porphyrellus porphyrosporus *Porphyrröhrling*

Standort:	im Nadelwald.
Fruchtkörper:	bis über 120 mm.
Mikromerkmale:	Sporen 15 x 6 µm, Zystiden vorhanden.
Bemerkungen:	durch die düstere Erscheinung ist er gut abtrennbar zu anderen Röhrlingen.

Leucocoprinus birnbaumii *Gelber Faltenschirmling*

Standort:	Blumentopf.
Fruchtkörper:	um 30 mm.
Mikromerkmale:	Sporen nach Lit. 8,4-14,6 x 6-9.2 µm mit Keimporus, dickwandig, mit Cheilo-Zystiden.
Bemerkungen:	er ist ein Weisssporer, der durch seine Farbe und sein Standort kaum zu verwechseln ist.

Boletus luridus *Netzstieliger Hexenröhrling*

Delicatula integrella *Genabelter Schleierhelmling*

Porphyrellus porphyrosporus *Porphyrröhrling*

Leucocoprinus birnbaumii Gelber Faltenschirmling



Delicatula integrella:
Sporen

Inocybe erubescens:
Cheilozystiden

Inocybe erubescens:
Sporen

Pilz-Fundliste der Woche 25

Calocera
viscosa
(Pers.: Fr.) Fr.
Klebriger Hörnling

Gymnopus
fusipes
(Bull.: Fr.) Quél.
Spindeliger Rübling

Marasmius
rotula
(Scop.: Fr.) Fr.
Halsbandschwindling

Megacollybia
platyphylla
(Pers.: Fr.)Kotl. et Pouz.
Breitblattrübling

Mitrula
paludosa
Fr.
Sumpfhaubenpilz

Mycena
vitilis
(Fr.) Quél.
Zäher Fadenhelmling

Mycena
speirea
(Fr.: Fr.) Gill.
Bogenblättriger Helmling

Mycena
acicula
(Schäff.: Fr.) Kumm.
Orangeroter Helmling

Psathyrella
spadicea
(Schäff.) Sing.
Schockoladenbrauner Faserling

Rickenella
fibula
(Bull.: Fr.) Raith.
Orangegelber Heftelnabeling

Scleroderma
bovista
Fr.
Rotbräunlicher Kartoffelbovist



Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils am Bestimmungsabend am Montag aufliegen. Es wird sich um solche handeln, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich werden wir auch Mikroaufnahmen einflechten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise sind auf dieser HP zu finden. (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze).

Fundliste

Leccinum carpini *Hainbuchen-Rauhstielröhrling*

Er ist ein Begleiter der Hainbuche. Auffalend ist die rundzellige Huthaut, die bei keinem anderen Rauhfuss so betont ist.

Pilze der Woche 26

Scutellinia asperior

Standort: Wegrand auf Erde.
Fruchtkörper: um 5 mm.
Mikromerkmale: Sporen 18 µm.
Bemerkungen: Bemerkenswert sind die runden, fast spitzstacheligen Sporen.

Russula vesca *Speisetäubling*

Standort: Mischwald.
Fruchtkörper: um100 mm.
Mikromerkmale: Sporen 7 x 6 µm, fast isoliert warzig.
Bemerkungen: er ist ein Weissporer und unterscheidet sich vom Frauentäubling durch nicht speckige Lamellen und durch die Crins in der Huthaut.

Helvella elastica *Elastische Lorchel*

Standort: Wegrand auf Erde.
Fruchtkörper: um 20 mm.
Mikromerkmale: Sporen 17 x 10 µm mit grossem Tropfen.
Bemerkungen: durch das helle Hymenium unterscheidet er sich zu anderen Glattstiellorcheln.

Helvella macropus *Langfuss-Lorchel*

Standort: Wegrand auf Erde.
Fruchtkörper: um 20 mm.
Mikromerkmale: Sporen 22 x 12 µm.
Bemerkungen: er unterscheidet sich zu anderen Langfüsslern durch die Farbe, durch die körnig-keiige Aussenseite des Hymeniums und durch die spezielle Form der Sporen.

Conocybe lactea *Milchweisses Samthäubchen*

Standort: auf Rasen.
Fruchtkörper: um 12 mm hoch.
Mikromerkmale: Sporen14 x 8 µm mit lecythiformen Cheilozystiden.
Bemerkungen: Wegen seinem weisslichen, kegeligen Hut mit grossem Kontrast zur Lamellenfarbe sowie das Vorkommen auf frisch gemähtem Rasen, ist er wohl mit anderen Samthäubchen kaum zu verwechseln.

Scutellinia asperior

Russula vesca *Speisetäubling*

Helvella elastica *Elastische Lorchel*

Helvella macropus *Langfuss-Lorchel*

Conocybe lactea *Milchweisses Samthäubchen*

Conocybe lactea:
Sporen

Conocybe lactea:
Cheilocystiden



Scutellinia asperior:
Haare

Scutellinia asperior:
Sporen

He:lvella elastica:
Sporen und Paraphysen

Leccinum carpini:
Huthau

Helvella macropus:
Sporen, Asci, Paraphyse

Pilz-Fundliste der Woche 26

Agaricus
augustus
Fr.
Braunschuppiger Riesen-Egerling

Amanita
eliae
Quél.
Kammrandiger Wulstling

Amanita
rubescens
(Pers.: Fr.) Gray
Perlpilz

Amanita
eliae
Quél.
Kammrandiger Wulstling

Amanita
excelsa
(Fr.) Bertillon
Grauer Wulstling

Boletus
calopus
Pers.: Fr.
Schönfuss-Röhrling

Boletus
luridus
Schäff.: Fr.
Netzstieliger Hexenröhrling

Boletus
aestivalis
(Paulet) Fries
Sommer-Steinpilz

Conocybe
lactea
(Lange) Métrod
Milchweisses Samthäubchen

Delicatula
integrella
(Pers.: Fr.) Fayod
Weisser Adernabeling

Dentropolyporus
umbellatus
(Pers.: Fr.) Jül.
Eichhase

Helvella
macropus
(Pers.: Fries) Karsten
Langfuss-Lorchel

Helvella
elastica
(Bull. ex St. Aman) Boud.
Elastische Lorchel

Lactarius
piperatus
(L. Fr.) Gray
Pfeffermilchling

Leccinum
carpini
(Schulz.) Mos. ex Reid
Hainbuchen-Rauhfuss

Marasmius
rotula
(Scop.: Fr.) Fr.
Halsbandschwindling

Mycena
abramsii
(Murr.) Murr.
Voreilender Helmling

Phallus
impudicus
L.: Fries
Stinkmorchel

Pluteus
atromarginatus
(Sing.) Kühn.
Schwarzschneidiger Dachpilz

Pluteus
salicinus
(Pers.: Fr.) Kumm.
Grauer Dachpilz

Ramaria
flava
(Schäff.: Fr.) Quél.
Schwefelgebe Koralle

Ramaria
rubella
(Schäff.: Krombh.) Peter.
Rotbraune Koralle

Rickenella
fibula
(Bull.: Fr.) Raith.
Orangegelber Heftelnabeling

Russula
cyanoxantha
(Schäff.) Fr.
Frauentäubling

Russula
cyanoxantha fo. pelteraui
R. Maire.: Singer
Grüner Frauentäubling

Russula
velutipes
Velenovsky
Rosa-Täubling

Russula
melliolens
Quél.
Honigtäubling

Russula
romellii
Maire
Weissstieliger Ledertäubling

Russula
grisea
Fr.
Grauvioletter Reiftäubling

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils am Bestimmungsabend am Montag aufliegen. Es wird sich um solche handeln, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich werden wir auch Mikroaufnahmen einflechten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise sind auf dieser HP zu finden. (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze).

Fundliste

Tylopilus felleus *Gallenröhrling*

Weitmaschiges Netz am Stiel, rosa verfärbende Röhrenmündungen vorallem im Alter und der bittere Geschmack, kennzeichnen diesen Pilz.

Pilze der Woche 27

Ramaria rubella *Rotbraune Koralle*

Standort: morsches Holz.
Fruchtkörper: bis 10 cm hoch.
Mikromerkmale: Sporen 6-9,5 x 4-5,5 µm, breit-ellipsisch, warzig.
Bemerkungen: die Rhizomorphen verfärben sich mit KOH rosa.

Russula delica *Gemeiner Weisstäubling*

Standort: Mischwald.
Fruchtkörper: um10 cm.
Mikromerkmale: Sporen 9 x 8 µm, warzig-netzig.
Bemerkungen: er ist ein Weisssporer und unterscheidet sich zu R. chloroides durch kürzeren Stiel und vorallem durch weiter auseinanderstehenden Lamellen.

Clitocybe costata *Kerbrandiger Trichterling*

Standort: Nadelwald.
Fruchtkörper: um 40 mm.
Mikromerkmale: Sporen 6 x 4, weiss.
Bemerkungen: er ist nahe verwandt mit C. gibba, der jedoch meistens eine gebuckelte Hutmitte und nicht gekerbten Hutrand hat. C. costata hat, im Gegensatz zu C. gibba, aufgelagertes Pigment an den Hyphen der Hutdeckschicht.

Russula nigricans *Dickblättriger Schwärztäubling*

Standort: Mischwald.
Fruchtkörper: bis über 10 cm.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 7 µm, isoliert warzig.
Bemerkungen: das Fleisch rötet zuerst, dann wird es schwarz. Von anderen Schwärztäublingen unterscheidet er sich durch dicke und entfernt stehende Lamellen.

Russula velutipes *Grosser Rosa-Täubling*

Standort: Laub- und Mischwald.
Fruchtkörper: um 7 cm.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 6,5 µm etwas gratig verbunden. Spp. schwach gelb.
Bemerkungen: Er gehört zu den Täublingen mit mattem, rosafarbenem Hut, ist mild, hat keine Pielozystiden, dafür inkrustierte Primordialhyphen und ist ziemlich weichfleischig.

Ramaria rubella *Rotbraune Koralle*

Russula delica *Gemeiner Weisstäubling*

Clitocybe costata *Kerbrandiger Trichterling*



Russula nigricans *Dickblättriger Schwärztäubling*

Russula velutipes *Grosser Rosa-Täubling*



Russula delica:
Sporen

Clitocybe costata:
Hyphen der Hutdeckschicht

Pilz-Fundliste der Woche 27

Amanita
excelsa
(Fr.) Bertillon
Grauer Wulstling

Amanita
rubescens
(Pers.: Fr.) Gray
Perlpilz

Boletus
luridus
Schäff.: Fr.
Netzstieliger Hexenröhrling

Boletus
calopus
Pers.: Fr.
Schönfuss-Röhrling

Clitocybe
costata
Kühn. & Romagn.
Kerbrandiger Trichterling

Lactarius
piperatus
(L. Fr.) Gray
Pfeffermilchling

Ramaria
rubella
(Schäff.: Krombh.) Peter.
Rotbraune Koralle

Russula
aurea
Pers.
Goldtäubling

Russula
velutipes
Velenovsky
Rosa-Täubling

Russula
nigricans
(Bull.) Fr.
Dickblättriger Schwärztäubling

Russula
delica
Fr.
Gemeinder Weisstäubling

Tylopilus
felleus
(Bull.: Fr.) Karst.
Gallenröhrling

Xerocomus
subtomentosus
(L.: Fr.) Quél.
Ziegenlippe

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils am Bestimmungsabend am Montag aufliegen. Es wird sich um solche handeln, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich werden wir auch Mikroaufnahmen einflechten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise sind auf dieser HP zu finden. (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze).

Fundliste

Lactarius piperatus *Pfeffermilchling*

Er unterscheidet sich zu anderen weissen Milchlingen durch nicht grünverfärbende Milch und nicht flaumigen Hut und Stiel. Die Milch ist sehr scharf.

Pilze der Woche 28

Amanita ceciliae *Riesen-Streifling*

Standort: Nadelwald.
Fruchtkörper: bis über 10 cm.
Mikromerkmale: Sporen 11 µm, rund.
Bemerkungen: die mehrfachbescheidete Stiel und das stark flockige Hutvelum unterscheidet ihn von ähnlichen Streiflingen. Gegenüber A. submembranacea hat er mehr olive Farbtöne.

Marasmius bulliardii *Käsepilzchen*

Standort: Nadelstreu.
Fruchtkörper: um 4 mm.
Mikromerkmale: Sporen 7 x 3,5 µm.
Bemerkungen: das Vorkommen auf Fichtennadeln, die Grösse und die geringere Anzahl Lamellen unterscheidet ihn vom Astschwindling, dessen HDS nicht aus birnenförmigen Zellen besteht. Einige Autoren bezeichen die Laubwaldform M. bulliardii und die Nadelwaldform M. wettsteinii.

Russula melliolens *Honig-Täubling*

Standort: Laubwald, gerne bei Eichen.
Fruchtkörper: bis über 10 cm.
Mikromerkmale: Sporen um 8 µm, niederwarzig-netzig, rund.
Bemerkungen: Dieser, in der Farbe ziemlich variierende Art, kennzeichnet sich durch das bräunen am Stielgrund und durch den Honiggeruch an der Stielbasis, besonders getrocknet. Mikroskopisch fallen die kettenartigen Pielozystiden der HDS und die netzigen, runden Sp. besonder auf. Sein Doppelgänger R. viscida hat keinen Honiggeruch.

Russula virescens *Grüngefelderter Täubling*

Standort: Laub und Mischwald.
Fruchtkörper: bis über 10 cm.
Mikromerkmale: Sporen 7 x 6 µm, warzig und mit Graten verbunden, weiss.
Bemerkungen: der grün gefelderte Hut ist das Hauptmerkmal dieses Täublings. Mikroskopisch fällt er durch eine sehr dünne HDS und ohne Pielozystiden auf.

Amanita ceciliae *Riesen-Streifling*

Marasmius bulliardii Käsepilzchen

Russula melliolens *Honig-Täubling*

Russula virescens *Grüngefelderter Täubling*

Dieser Röhrling bedarf wohl keiner weiteren Erklärung, ist er doch durch sein markantes Aussehen unter den Röhrlingen nicht zu verwechseln.

Strobilomyces strobilaceus *Strubelkopfröhrling*

Pilz-Fundliste der Woche 28

Amanita
submembranacea
(Bon) Gröger
Grauhäutiger Scheidenstreifling

Amanita
rubescens
(Pers.: Fr.) Gray
Perlpilz

Amanita
junquillea
Quélet
Narzissengelber Wulstling

Amanita
excelsa
(Fr.) Bertillon
Grauer Wulstling

Boletus
fechtneri
Velen.
Silber-Röhrling

Lactarius
acerrimus
Britz.
Queradriger Milchling

Marasmius
bulliardii
Quél.
Nadelstreu-Käsepilzchen

Phaeolus
schweinitzii
(Fr.) Pat.
Kiefernbraunporling

Russula
albonigra
(Krombh.) Fr.
Mentoltäubling

Russula
heterophylla
(Fr.) Fr.
Grüner Speisetäubling

Russula
aurea
Pers.
Goldtäubling

Russula
virescens
(Schäff.:,Pers.:) Fr.
Gefeldeter Grüntäubling

Russula
vesca
Fr.
Fleischroter Speisetäubling

Russula
melliolens
Quél.
Honigtäubling

Strobilomyces
strobilaceus
(Scop.: Fr.) Berk.
Strubelkopfröhrling

Tylopilus
felleus
(Bull.: Fr.) Karst.
Gallenröhrling

Xerocomus
subtomentosus
(L.: Fr.) Quél.
Ziegenlippe

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils am Bestimmungsabend am Montag aufliegen. Es wird sich um solche handeln, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Gelegentlich werden wir auch Mikroaufnahmen einflechten. Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise sind auf dieser HP zu finden. (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze).

Fundliste



Xerula radicata
Schleimiger Wurzelrübling

Er zeichnet sich aus durch den in feuchtem Zustand stark schleimigen, runzligen Hut, den weissen, elastischen Lamellen und vorallem den langen und stark wurzelnden Stiel.

Pilze der Woche 29

Boletus appendiculatus *Bronzeröhrling*

Standort: Nadelwald.
Fruchtkörper: bis über 15 cm.
Mikromerkmale: Sporen 13 x 5 µm.
Bemerkungen: Gegenüber dem Steinpilz, B. edulis, hat er von Jugend an gelbe Röhrenmündungen. Sein Geschmack ist mild, der Stiel hat ein feines Netz.

Russula foetens *Stink-Täubling*

Standort: Nadelwald.
Fruchtkörper: um 10 cm.
Mikromerkmale: Sporen 9 x 8 µm, isoliert-warzig.
Bemerkungen: Der Stinktäubling erkennt man hauptsächlich am unangenehmen Geruch und der nicht punktierten Lammellenschneide. Die var. subfoetens hat kleinere Sporen und eine chromgelbe Reaktion mit KOH 10% an der Stielbasis.

Russula olivacea *Rotstieliger Ledertäubling*

Standort: Mischwald.
Fruchtkörper: bis über 15 cm.
Mikromerkmale: Sporen um 11 x 10 µm, isoliert warzig.
Bemerkungen: dieser Täubling erkennt man durch das in der Regel süsse Rot des Stieles, die sehr gebrechlichen gelben bis ockerfarbenen Lamellen und das nicht Vorhandensein von Pielozystiden. Er gehört zu den milden Täublingen.

Pluteus atromarginatus *Schwarzschneidiger Dachpilz*

Standort: an Holz.
Fruchtkörper: um 7 cm.
Mikromerkmale: Sporen 7 x 5 µm.
Bemerkungen: die dunklen Lamellenschneiden trennen ihn gut zu anderen Dachpilzen.

Scleroderma areolatum *Getupfter Leopardenfell-Hartbovist*

Standort: auf Erde.
Fruchtkörper: um 25 mm.
Mikromerkmale: Sporen 12 µm, rund, stachelig ohne Netz.
Bemerkungen: Die Kartoffelboviste trennen sich von den Stäublingen durch doppelt so grosse Sporen, die Glebe ist schwarz oder braun. S. areolatum ist verhältnismässig weich.

Boletus appendiculatus *Bronzeröhrling*

Russula foetens *Stink-Täubling*

Russula olivacea *Rotstieliger Ledertäubling*

Pluteus atromarginatus *Schwarzschneidiger Dachpilz*

Scleroderma areolatum *Getupfter Leopardenfell-Hartbovist*



Pilz-Fundliste der Woche 29

Amanita
rubescens
(Pers.: Fr.) Gray
Perlpilz

Boletus
erythropus
(Fr.: Fr.) Pers.
Schusterpilz

Boletus
appendiculatus
Schaeff.
Anhängsel-Röhrling

Gymnopus
fusipes
(Bull.: Fr.) Quél.
Spindeliger Rübling

Hydnum
repandum
L.: Fr.
Semmel-Stoppelpilz

Leccinum
crocipodium
(Let.) Watl.
Gelbporiger Raufuss

Paxillus
atrotomentosus
(Batsch.: Fr.) Fr.
Samtfuss-Krempling

Phaeolus
schweinitzii
(Fr.) Pat.
Kiefernbraunporling

Russula
heterophylla
(Fr.) Fr.
Grüner Speisetäubling

Russula
graveolens
Romell
Fleisschvioletter Heringstäubling

Russula
delica
Fr.
Gemeinder Weisstäubling

Russula
acrifolia
Romagn.
Scharfblättriger Schwärztäubling

Russula
cyanoxantha fo. pelteraui
R. Maire.: Singer
Grüner Frauentäubling

Russula
virescens
(Schäff.: Pers.:) Fr.
Gefeldeter Grüntäubling

Russula
lepida
Fr.
Harter Zinnobertäubling

Russula
foetens
(Pers.: Fr.) Fr.
Stinktäubling

Russula
vesca
Fr.
Fleischroter Speisetäubling

Scleroderma
areolatum
Ehrenb.
Gefelderter Kartoffelbovist

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils am Bestimmungsabend am Montag aufliegen. Es wird sich um solche handeln, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich werden wir auch Mikroaufnahmen einflechten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise sind auf dieser HP zu finden. (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze).

Fundliste

Leccinum nigrescens *Schwärzeder Rauhfuss*

Er ist bei uns der einzige Rauhfuss mit gelbem Hymenophor, der im Fleisch zuerst röted und dann fast schwarz wird.

Pilze der Woche 30

Lenzites betulina *Birkenblättling*

Standort: Laubholz.
Fruchtkörper: 20 bis 90 mm.
Mikromerkmale: Sporen 5 x 2,5 µm, hyalin.
Bemerkungen: die Zonierung der Hutoberfläche ist ähnlich wie bei einem Schmetterlingsporling, hingegen hat er eine lamellige Fruchtschicht. Alte Fruchtkörper sind meistens mit Algen bedeckt.

Boletus radicans *Wurzelnder Bitterröhrling*

Standort: Unter Laubbäumen.
Fruchtkörper: um 12 cm.
Mikromerkmale: Sporen 12 x 6 µm.
Bemerkungen: er hat, ähnlich wie auch B. satanas, keine Rottöne auf dem Hut, auch der unangenehme Geruch ist diesem ähnlich. Der Geschmack ist bitter. Die Huthaut überragt die Fruchtschicht und der Stiel hat meistens keine Rottöne.

Psathyrella conopilus *Huthaarfaserling*

Standort: im Gras in Verbindung mit Holz.
Fruchtkörper: bis über 25 mm, Hut jung rotbraun.
Mikromerkmale: Sporen 14 x 7µm, mit Keimporus, fas zylindrich.
Bemerkungen: Dieser Zärtling findet man öfters im Gras, wo er sich nach dessen Höhe längenmässig anpasst. Sein spezielles Mikromerkmal sind die vielen braunen Huthauthaare.

Pluteus petasatus *Schuppenstieliger Dachpilz*

Standort: an Holz.
Fruchtkörper: bis über 18 cm.
Mikromerkmale: Sporen 7 x 5 µm, rosa.
Bemerkungen: er ist einer der grössten Dachpilze mit heller Hut-Farbe, einer schuppigen Hutmitte und etwas schuppigen Stiel. Er hat auch Hakenzystiden wie P. cervinus, aber nicht einen Geruch nach alten Kartoffeln.

Lenzites betulina *Birkenblättling*

Boletus radicans *Wurzelnder Bitterröhrling*

Psathyrella conopilus *Huthaarfaserling*

Haare in der Huthaut

Pluteus petasatus *Schuppenstieliger Dachpilz*

Pluteus petasatus *Schuppenstieliger Dachpilz*

Pilz-Fundliste der Woche 30

Boletus
radicans
Pers.: Fr.
Bitter-Röhrling

Leccinum
crocipodium
(Let.) Watl.
Gelbporiger Raufuss

Lenzites
betulina
(L. ex Fr.) Fr.
Birkenblättling

Pluteus
petasatus
(Fr.) Gill
Seidiger Dachpilz

Psathyrella
conopilus
(Fr.: Fr.) Pears. & Dennis
Huthaarfaserling

Steccherium
ochraceum
(Pers.ap.Gmel.: Fr.) S.F. Gray
Ockerrötlichr Resupinatstacheling

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils am Bestimmungsabend am Montag aufliegen. Es wird sich um solche handeln, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich werden wir auch Mikroaufnahmen einflechten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) sind auf dieser HP zu finden.

Fundliste Leucocoprinus denudatus

Clitopilus prunulus *Mehlräsling*

Ein weichfleischiger, weisser Pilz von 30 bis 80 mm mit beige-gelben bis beige-rosa gefärbten Lamellen (Spp. rosa) und einem angenehmen, starken Mehlgeruch.

Pilze der Woche 32

Russula rosea *Harter Zinnober-Täubling*

Standort: Mischwald.
Fruchtkörper: bis 90 mm.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 6 µm, hellgelb, aderig verbunden.
Bemerkungen: ein hartfleischiger, roter Täubling mit meistens rosa angehauchtem Stiel. HDS mit Pielozystiden und z.T. mehrfachseptierten, dickwandigen Haaren, etwas bitter.

Gymnopus confluens *Knopfstiel-Blasssporrübling*

Standort: auf Blättern oder Nadelstreu.
Fruchtkörper: um um 25 mm.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 3,5 µm.
Bemerkungen: ein büscheliger Rübling mit oben erweitertem Stiel, der sich knopfartig leicht vom Hut trennen lässt. Der Stiel ist zäh und mit vielen Haaren versehen (Lupe).

Bondarzewia mesenterica *Gemeiner Bergporling*

Standort: auf Holz von Weisstanne
Fruchtkörper: bis 70 mm.
Mikromerkmale: Sporen 9 µm, warzig, hyalin.
Bemerkungen: Obwohl er Bergporling heisst, findet man ihn doch auch bei uns (500 m). Sein dimitisches, schnallenloses Hyphensystem und die warzigen Sporen (bei uns bei Porlingen selten) kennzeichen ihn gut.

Hohenbuehelia myxotricha *Behaarter Muscheling*

Standort: an morschem Holz.
Fruchtkörper: bis über 18 mm.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 4 µm, hellgrème.
Bemerkungen: Ein weisser, seitlich angewachsener Pilz mit huptsächlich gegen die Anwachsstelle striegelig-filzigen Hut. Sein Hauptmerkmal sind die unterschiedlichen Zystiden (siehe Fotoskizze).

Russula rosea *Harter Zinnober-Täubling*

Gymnopus confluens *Knopfstiel-Blasssporrübling*

Bondarzewia mesenterica *Gemeiner Bergporling*

Warzige Sporen von
Bondarzewia mesenterica

Hohenbuehelia myxotricha *Behaarter Muscheling*

Cheilozystiden

Metuloide, inkrustierte Cheilozystiden

Pilz-Fundliste der Woche 32

Boletus
calopus
Pers.: Fr.
Schönfuss-Röhrling

Bondarzewia
montana
(Quél.) Singer
Bergporling

Calocera
viscosa
(Pers.: Fr.) Fr.
Klebriger Hörnling

Clitopilus
prunulus
(Scop.: Fr.) Kumm.
Mehlräsling

Gymnopus
confluens
(Pers.: Fr.) Kumm.
Knopfstieliger Rübling

Hohenbuhelia
myxotricha
Lév.) Sing.
Behaarter Muscheling

Hydnum
repandum
L.: Fr.
Semmel-Stoppelpilz

Lactarius
glaucescens
Crossl.
Grünender Pfeffermilchling

Lactarius
volemus
(Fr.) Fr.
Brättling

Marasmiellus
ramealis
(Bull.: Fr.) Sing.
Ästchenschwindlng

Marasmius
bulliardi
Quél.
Nadelstreu-Käsepilzchen

Marasmius
torquescens
Quél.
Ledergelber Schwindling

Mycena
stipata
Maas Geester.& Schw.
Büscheliger Nitrat-Helmling

Mycena
capillaripes
Peck
Haarstieliger Helmling

Pluteus
hispidulus
(Fr.: Fr.) Gill.
Haariger Dachpilz

Pluteus
leonius
(Schäff.: Fr.) Kumm.
Löwengelber Dachpilz

Russula
cyanoxantha
(Schäff.) Fr.
Frauentäubling

Russula
virescens
(Schäff.: Pers.:) Fr.
Gefeldeter Grüntäubling

Russula
lepida
Fr.
Harter Zinnobertäubling

Russula
viscida
Kudrna
Lederstieltäubling

Russula
olivacea
(Schäf.) Fr.
Rotstieliger Ledertäubling

Scleroderma
citrinum
Pers.
Dickschaliger Kartoffelbovist

Simocybe
centunculus
(Fr.: Fr.) Karst.
Kleinsporiger Olivschnitzling

Tremiscus
helveloides
(DC: Pers.) Donk
Roter Gallerttrichterling

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils am Bestimmungsabend am Montag aufliegen. Es wird sich um solche handeln, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich werden wir auch Mikroaufnahmen einflechten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) sind auf dieser HP zu finden.

Fundliste

Pluteus romelli *Gelbstieliger Dachpilz*

Ein Dachpilz mit rundlichen Zellen in der HDS (hymeniform), einem gelben Stiel. P. chrysophaeus hat einen weissen oder nur schwach gelblichen Stiel.

Pilze der Woche 34

Boletus satanas *Satansröhrling*

Standort: Laubwald.
Fruchtkörper: bis über 20 cm.
Mikromerkmale: Sporen 12 x 5 µm.
Bemerkungen: ein Dickbauchröhrling mit roter Röhrenmündung, ohne Rottöne auf dem Hut, mit feinnetzigem Stiel und himbeerroter Zone und einem säuerlichen, unangenehmen Geruch.

Boletus fechtneri *Silber-Röhrling*

Standort: Laubwald.
Fruchtkörper: bis 15 cm.
Mikromerkmale: Sporen 12 x 5 µm.
Bemerkungen: er gehört zu den Röhrlingen mit schon jung gelber Röhrenmündung und netzigem Stiel mit einer Rotzone. Der Hut ist silbergrau und lässt bei zunehmendem Alter warme Farbtöne zu. Der Geruch ist angenehm.

Entoloma sinuatum *Riesen-Rötling*

Standort: Laubwald.
Fruchtkörper: bis über 12 cm.
Mikromerkmale: Sporen 9 x 7 µm, 5-eckig.
Bemerkungen: er ist bei uns der grösste Rötling und hat auch einen verhältnismässig dicken Stiel. Die Hutoberfläche gleicht etwas einer Nebelkappe, die Lamellen sind jedoch ausgebuchtet angewachesen, lange sehr hell und haben einen orangen Stich auf der Lamellenschneide.

Agarigus bitorquis *Trottoir-Champignon*

Standort: Weg- und Strassenränder.
Fruchtkörper: bis über 10 cm.
Mikromerkmale: Sporen 6 x 5 µm.
Bemerkungen: er gehört zu den Egerlingen mit nach unten abziebarem Ring, einer volvaähnlichen Stielbasis und angenhemen Geruch.

Boletus satanas *Satansröhrling*

Boletus fechtneri *Silber-Röhrling*

Entoloma sinuatum *Riesen-Rötling*

Agarigus bitorquis *Trottoir-Champignon*

Pilz-Fundliste der Woche 34

Agaricus
silvicola
(Vittad.) Sacc.
Dünnfleischiger Anis-Egerling

Agaricus
bitorquis
(Quélet) Sacc.
Trottoir-Champignon

Agaricus
xanthoderma
Genev.
Karbol-Egerling

Agaricus
benesii
(Pil.) Sing
Rötender Riesn-Egerling

Agrocybe
erebia
(Fr.) Kühn.
Leberbrauner Ackerling

Amanita
verna
(Bull.: Fr.) Lamarck.
Weisser Knollenblätterpilz

Amanita
pantherina
(DC.: Fr.) Krombh.
Pantherpilz

Boletus
regius
Krombh.
Königs-Röhrling

Boletus
luridus
Schäff.: Fr.
Netzstieliger Hexenröhrling

Boletus
erythropus
(Fr.: Fr.) Pers.
Schusterpilz

Boletus
calopus
Pers.: Fr.
Schönfuss-Röhrling

Boletus
radicans
Pers.: Fr.
Bitter-Röhrling

Boletus
depilatus
Redeuilh
Gefleckthütiger Röhrling

Boletus
fechtneri
Velen.
Silber-Röhrling

Boletus
aereus
Bull.: Fr.
Schwarzhütiger Steinpilz

Boletus
satanas
Lenz
Satansröhrling

Calocybe
ionides
(Bull.: Fr.) Kühn. ex Donk
Veilchenblauer Schönkopf

Chalciporus
piperatus
(Bull.: Fr.) Bat.
Pfeffer-Röhrling

Clitocybe
odora
Lge.
Anistrichterling

Clitopilus
prunulus
(Scop.: Fr.) Kumm.
Mehlräsling

Crepidotus
applanatus
(Pers.) Kumm.
Gerieftes Stummelfüsschen

Crepidotus
lundellii
Pil.
Unansehnliches Stummelfüsschen

Cystolepiota
seminuda
(Lasch.) Bon
Weisser Mehlschirmling

Cystolepiota
bucknallii
(Berk. & Br.)
Stinkender Mehlschirmling

Echinoderma
sinopicum
(Rom.) Bon
Ziegelrötlicher Stachelschirmling

Echinoderma
eriophorum
(Peck) Bon
Langes Stachelschirmling

Echinoderma
boertmannii
(Knuds.) Bon
Boertsmann Stachelschirmling

Entoloma
nitidum
Quél.
Stahlblauer Rötling

Entoloma
sinuatum
(Bull.: Pers.: Fr.) Kumm.
Riesen-Rötling

Entoloma
inusiastum
Noord.: Enderle & Lammers
Blotzheimer Rötling

Entoloma
rhodopolium
(Fr.: Fr.) Kummer
Niedergedrückter Rötling

Geastrum
striatum
DC.
Kragen-Erdstern

Gyroporus
castaneus
(Bull.: Fr.)
Hasen-Röhrling

Hebeloma
anthracophilum
Mr.
Kohlen-Fälbling

Hohenbuhelia
myxotricha
Lév.) Sing.
Behaarter Muscheling

Inocybe
rimosa
(Bull.:Fr:) Kummer
Kegeliger Risspilz

Lactarius
turpis
(Weinm.) Fr.
Olivbrauner Milchling

Lactarius
scrobiculatus
(Scop.: Fr.) Fr.
Grubiger Fichtenmilchling

Lactarius
circellatus
Fr.
Gebänderter Hainbuchenmilchling

Leccinum
variicolor
Walting
Verschiedenfarbiger Rauhfuss

Leccinum
carpini
(Schulz.) Mos. ex Reid
Hainbuchen-Rauhfuss

Lentinellus
flabelliformis
(Bolt.: Fr.) Ito.
Fächerförmiger Zähling

Lepiota
cristata
(Bolton.: Fr.) Kummer
Stink-Schirmling

Limacella
roseofloccosa
Hora
Rosa-Schleimschirmling

Macrolepiota
rhacodes var. hortensis
(Vittad.) Singer
Safranschirmling

Marasmiellus
candidus
(Bolt.: Fr.) Sing.
Schneeweisser Zwergschwindling

Mycena
speirea
(Fr.: Fr.) Gill.
Bogenblättriger Helmling

Pholiota
gummosa
(Lasch.: Fr.) Sing.
Strohblasser Schüppling

Pholiota
lucifera
(Lasch) Quél.
Fettiger Schüppling

Pholiota
tuberculosa
(Schäff.: Fr.)
Rötender Schüppling



Pilz-Fundliste der Woche 34

Pluteus
romelli
(Britz.) Sacc.
Gelbstieliger Dachpilz

Pluteus
salicinus
(Pers.: Fr.) Kumm.
Grauer Dachpilz

Pluteus
cinereofuscus
Lge.
Graubrauner Dachpilz

Pluteus
mammifer
Romagn.
Zitzen-Dachpilz

Pluteus
pallescens
P.D. Ort.
Blassstieliger Dachpilz

Pluteus
roseipes
v. Höhn.
Sosastieliger Dachpilz

Porphyrellus
porphyrosporus
Fr.) Gilbert
Düsterer Röhrling
Russula
pseudointegra
Arn. & Gor.
Ockerblättriger Zinnobertäubling

Russula
turci
Bres.
Jodoformtäubling

Russula
farinipes
Romell in Britz.
Mehlstieltäubling

Russula
integra
(L.:) Fr. ss. Mre.
Braunroter Ledertäubling

Russula
puellaris
Fr.
Milder Wachstäubling

Russula
adulterina
Fr. ss. Rom.
Scharfer Brauntäubling

Simocybe
centunculus
(Fr.: Fr.) Karst.
Kleinsporiger Olivschnitzling

Suillus
grevillei
(Klotzsch: Fr.) Sing.
Goldröhrling

Suillus
granulatus
(L.: Fr.) Rouss.
Körnchenröhrling
Telephora
penicillata
Pers.: Fr.
Pinsel-Warzenpilz

Xerocomus
subtomentosus var. ferrugineus
(L.: Fr.) Quél.
Ziegenlippe (Varietät)

Xerocomus
chrysenteron
(Bull.) Quel.
Rotfuss-Röhrling

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils am Bestimmungsabend am Montag aufliegen. Es wird sich um solche handeln, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich werden wir auch Mikroaufnahmen einflechten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) sind auf dieser HP zu finden.

Fundliste

Russula atropurpurea *Purpurschwarzer Täubling*

Die rote, glänzige Hutfarbe mit der dunklen Mitte, das etwas schärfliche Fleisch und die weissen, netzigen Sporen, die Dermatozystiden, kennzeichnen diesen in Eichen-/Buchenwälder wachsende Täubling.

Pilze der Woche 35

Cystolepiota seminuda *Behangener Mehlschirmling*

Standort: Nadelstreu.
Fruchtkörper: bis 15 mm.
Mikromerkmale: Sporen 4 x 2,5 µm.
Bemerkungen: ein weisses Pilzchen mit etwas gelb getönter Hutmitte und einem behangenen Hutrand. Die runden Huthautzellen verleihen ihm ein mehliges Aussehen.

Amanita meirei *Meires Streifling*

Standort: Laubwald.
Fruchtkörper: bis 11 cm.
Mikromerkmale: Sporen 11 x 8,5 µm.
Bemerkungen: dieser Streifling unterscheidet sich von A. vaginata durch nicht runde Sporen.

Amanita gemmata *Narzissengelber Wulstling*

Standort: Laub- und Nadelwald.
Fruchtkörper: bis über 7 cm.
Mikromerkmale: Sporen 10 x 8 µm.
Bemerkungen: ein Wulstling mit in der Regel warmen Gelbtönen auf dem Hut, der mit lockeren Velumflocken überstreut ist, einem vergänglichen Ring und einer schwach gegürtelten Basisknolle.

Oudemansiella mucida *Beringter Schleimrübling*

Standort: Meistens an Buchenholz.
Fruchtkörper: bis über 7 cm.
Mikromerkmale: Sporen rundlich, dickwandig um 17 µm.
Bemerkungen: er ist der einzige in der Gattung. Der Hut ist mit einer abziehbaren Schleimschicht überzogen. Der Stiel hat einen Ring. Der Pilz enthält Mucidin, aus dem wirksam Hautpilze bekämpft werden.

Sparassis brevipes *Breitblättrige Glucke*

Standort: Bei Eiche und Weisstanne.
Fruchtkörper: kann über 40 cm gross werden.
Mikromerkmale: Sporen 5 x 4 µm, Septen teilweise mit Schnallen.
Bemerkungen: Er ist der Doppelgänger der S. crispa, welche bei Föhren erscheint. Die nicht blumenkohlartigen Äste unterscheiden ihn von S. crispa.

Cystolepiota seminuda *Behangener Mehlschirmling*

Amanita meirei *Meires Streifling*

Amanita gemmata *Narzissengelber Wulstling*

Oudemansiella mucida *Beringter Schleimrübling*

Sparassis brevipes *Breitblättrige Glucke*

Pilz-Fundliste der Woche 35

Agaricus
augustus
Fr.
Braunschuppiger Riesenegerl.

Amanita
junquillea
Quélet
Narzissengelber Wulstling

Amanita
mairei
Foley
Silbergrauer Scheidenstreif-
ling

Amanita
pantherina
(DC.: Fr.) Krombh.
Pantherpilz

Amanita
rubescens
(Pers.: Fr.) Gray
Perlpilz

Amanita
muscaria
(L.) Hook.
Fliegenpilz

Amanita
ceciliae
(Berk. & Broome)Bas.
Riesenstreifling

Artomyces
pyxidatus
(Pers.: Fr.) Jül.
Becherkoralle

Boletus
rhodoxantus
(Kromb.) Kall.
Blasshütiger Purpurröhrling

Boletus
radicans
Pers.: Fr.
Bitter-Röhrling

Boletus
pseudoregius
Huber ex Est.
Blauender Königsröhrling

Boletus
aereus
Bull.: Fr.
Schwarzhütiger Steinpilz

Boletus
depilatus
Redeuilh
Gefleckthütiger Röhrling

Bondarzewia
mesenterica
(Schäffer) Kreisel
Gemeinder Bergporling

Calocera
viscosa
(Pers.: Fr.) Fr.
Klebriger Hörnling

Clitocybe
phaeophthalma
(Pers.) Kp.
Ranziger Trichterling

Clitocybe
gibba
(Pers.) Kumm.
Ockerbrauner Trichterling

Clitocybula
abundans
(Peck) Sing.
Üppiger Faserrübling

Cortinarius
trivialis
Lge.
Natterstieliger Schleimfuss

Cortinarius
purpurascens
Fr.
Purpurfleckender Klumpfuss

Craterellus
cornucopioides
Pers.
Totentrompete

Entoloma
sinuatum
(Bull.: Pers.: Fr.) Kumm.
Riesen-Rötling

Entoloma
griseoluridum
(Kühn. ex Noord.
Olivgrauer Rötling

Geastrum
sessile
(Sow.) Pouz.
Gewimperter Erdstern

Geastrum
rufescens
Pers.
Rotbrauner Erdstern

Geastrum
quadrifidum
Pers. ex Pers.
Kleiner Neststern

Gymnopus
confluens
(Pers.: Fr.) Kumm.
Knopfstieliger Rübling

Gyroporus
castaneus
(Bull.: Fr.)
Hasen-Röhrling

Hygrophorus
erubescens
(Fr.: Fr.) Fr.
Rasiger Purpurschneckling

Inocybe
rimosa
(Bull.:Fr:) Kummer
Kegeliger Risspilz

Inocybe
geophylla
(Sow.: Fr.) Kumm.
Erdblättriger Risspilz

Inocybe
asterospora
Quél.
Sternsporiger Risspilz

Kuehneromyces
mutabilis
(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.
Gemeines Stockschwämm-
chen

Laccaria
amethystea
(Bull.) Murill
Violetter Lacktrichterling

Lactarius
zonarius
(Bulliard) Fr.
Echter Zonenmilchling

Lactarius
subumbonatus
Lindgren
Schwachnabeliger Milchling

Lactarius
pterosporus
Romagnesi
Flügelsporiger Milchling

Lactarius
pallidus
(Pers.: Fr.) Fr.
Falber Milchling

Lactarius
fulvissimus
Rom. i. Kühn. & Rom.
Orangefuchsiger Milchling

Lactarius
evosmus
Kühn. & Rom.
Blasser Zonenmilchling

Pilz-Fundliste der Woche 35

Lactarius
acris
(Bolt.: Fr.) Gray
Rosaanlaufender Milchling

Leccinum
quercinum
Pilát ex Pilát
Eichen-Rotkappe

Lentinus
torulosus
(Pers.: Fr. Lloyd
Laubholz-Knäueling

Leucopaxillus
candidus
Singer
Kleiner Riesen-Krempentrich-
terling

Limacella
roseofloccosa
Hora
Rosa-Schleimschirmling

Macrolepiota
rhacodes
(Vittad.) Singer
Safranschirmling

Marasmius
wynnei
Berk. & Br.
Violetlicher Schwindling

Marasmius
oreades
(Bolton.: Fr.) Fr.
Nelkenschwindling

Mycena
crocata
(Schrad.: Fr.) Kumm.
Safranmilchender Helmling

Mycena
amicta
(Fr.: Fr.) Quélet
Geschmückter Helmling

Oudemansiella
mucida
(Schrad. ex Fr.) v.H.
Beringter Schleimrübling

Peziza
badia
Pers. Ex Mérat
Kastanienbrauner Becherling

Pluteus
salicinus
(Pers.: Fr.) Kumm.
Grauer Dachpilz

Pluteus
phlebophorus
(Ditmar.: Fr.) Kumm.
Runzeliger Dachpilz

Pluteus
ephebeus
(Fr.: Fr.) Gill.
Graufilziger Dachpilz

Russula
atropurpurea
(Krombh.) Britz.
Pupurschwarzer Täubling

Russula
viscida
Kudrna
Lederstieltäubling

Russula
sanguinea
(Bull. ex St. Am.) Fr.
Blutroter Täubling

Russula
pectinatoides
Peck
Krazender Kammtäubling

Russula
olivacea
(Schäf.) Fr.
Rotstieliger Ledertäubling

Russula
nigricans
(Bull.) Fr.
Dickblättriger Schwärztäub-
ling

Russula
lepida
Fr.
Harter Zinnobertäubling

Russula
farinipes
Romell in Britz.
Mehlstieltäubling

Russula
delica
Fr.
Gemeinder Weisstäubling

Russula
cyanoxantha
(Schäff.) Fr.
Frauentäubling

Russula
aurea
Pers.
Goldtäubling

Sparassis
laminosa
Fr.
Breitblättrige Glucke

Stropharia
caerulea
Kreisel
Blauer Träuschling

Suillus
viscidus
(L.) Rouss.
Grauer Lärchenröhrling

Suillus
granulatus
(L.: Fr.) Rouss.
Körnchenröhrling

Xerocomus
spadiceus
(Fr.) Quél.
Braunhütiger Filzröhrling

Xerocomus
armeniacus
(Quél.) Quél.
Aprikosenfarbiger Filzröhrlin

Xerula
melanotricha
Dörfelt
Weisstannen-Wurzelrübling

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils am Bestimmungsabend am Montag aufliegen. Es wird sich um solche handeln, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich werden wir auch Mikroaufnahmen einflechten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) sind auf dieser HP zu finden.

Fundliste

Lentinus tigrinus *Getiegerter Zähling*

Gattung: Zähe, zentral oder lateral gestielte Frkp. von 2-10 cm. L.-Schn. grob gesägt. Holzbewohner. Sp. nicht arnyloid. L.-Tr. jung regulär, erst alt irregulär u. dann Sub-Hym. deutlich. Typisch für diese Art ist der getiegert-schuppige Hut.

Pilze der Woche 36

Hohenbuhelia geogenia *Erd-Muscheling*

Standort: auf Erde.
Fruchtkörper: bis über 10 cm. gross
Mikromerkmale: Sporen 7 x 4 µm.
Bemerkungen: ein halbtrichteriger Pilz mit starkem Mehlgeruch und dickwandigen, grossen, apikal teilw. inkrustierten Pleurozystiden.

Artomyces pycidatus *Verzweigte Becherkoralle*

Standort: morsches Laubholz.
Fruchtkörper: bis 13 cm hoch.
Mikromerkmale: Sporen 5 x 2,5 µm, feinwarzig.
Bemerkungen: er hat Ölhyphen. Ein weiteres Merkmal sind die becherförmig endenden Äste.

Hygrocybe obrussea *Schnürsporiger Saftling*

Standort: Wald und Wiesland.
Fruchtkörper: bis 6 cm.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 5 µm, teilweise eingeschnürt und zylindrisch.
Bemerkungen: Ein Pilz mit Geruch nach Lactarius quietus. Hut und Stiel feucht klebrig. Lamellen etwas ausgebuchtet angewachsen.

Lactarius fulvissimus *Orangefuchsiger Milchling*

Standort: Laub- und Mischwald.
Fruchtkörper: bis 7 cm.
Mikromerkmale: Sporen 9 x 7 µm. Die Rippen sind nur wenig netzig-verb.
Bemerkungen: auffallend ist der nach Aussen heller werdende und im Alter verblassende Hut.

Calocybe chrysenteron *Dottergelber Schönkopf*

Standort: Laub- und Nadelwald.
Fruchtkörper: kann über 4 cm gross werden.
Mikromerkmale: Sporen 5,5 x 3 µm, Septen mit Schnallen.
Bemerkungen: Es ist vorallem ein eher kleiner, in allen Teilen leuchtend gelber Pilz. Die Sp. sind sehr klein.

Hohenbuhelia geogenia *Erd-Muscheling*

Artomyces pycidatus *Verzweigte Becherkoralle*

Hygrocybe obrussea *Schnürsporiger Saftling*

Lactarius fulvissimus *Orangefuchsiger Milchling*

Calocybe chrysenteron *Dottergelber Schönkopf*

Pilz-Fundliste der Woche 36

Agaricus
augustus
Fr.
Braunschuppiger Riesenegerling

Agaricus
silvaticus
Schäff.: Fr.
Echter Wald-Champignon

Albatrellus
cristatus
(Schäff.: Fr.) Kotl. & Pouz.
Grüner Kammporling

Amanita
pantherina
(DC.: Fr.) Krombh.
Pantherpilz

Amanita
phalloides
(Fr.) Link
Grüner Knollenblätterpilz

Amanita
excelsa
(Fr.) Bertillon
Grauer Wulstling

Boletus
aereus
Bull.: Fr.
Schwarzhütiger Steinpilz

Boletus
erythropus
(Fr.: Fr.) Pers.
Schusterpilz

Boletus
pulverlulentus
Opat.
Schwarzblauender Röhrling

Boletus
rhodoxantus
(Kromb.) Kall.
Blasshütiger Purpurröhrling

Boletus
queletii
Schulzer
Glattstieliger Hexenröhrling

Callistosporium
luteoolivaceum
(Berk. et Curtis) Singer
Gelbblättriger Scheinrübling

Clathrus
ruber
Micheli ex Pers.
Roter Gitterling

Clitocybe
gibba
(Pers.) Kumm.
Ockerbrauner Trichterling

Clitocybe
odora
(Bull.) Kumm.
Grüner Anstrichterling

Cortinarius
humicola
(Quél.) R. Maire
Sparriger Rauhkopf

Cortinarius
nemorensis
(Fr.) Lge.
Verfärbender Schleimkopf

Cortinarius
purpurascens
Fr.
Purpurfleckender Klumpfuss

Cortinarius
venetus
(Fr.). Fr.
Grüner Buchenw.-Rauhkopf

Cortinarius
caerulescens
(Schäff.) Fr.
Blauer Klumpfuss

Cortinarius
multiformis
Fr.
Sägeblättriger Klumpfuss

Cortinarius
torvus
(Bull.: Fr.) Fr.
Wohlriechender Gürtelfuss

Cortinarius
infractus
(Pers.: Fr.) Fr.
Bitterer Schleimfuss

Cortinarius
anserinus
(Vel.) Hry.
Buchen-Klumpfuss

Cortinarius
pseudosulphureus
Hry. ex Ort.
Grünlings-Klumpfuss

Craterellus
cornucopioides
Pers.
Totentrompete

Entoloma
rhodopolium
(Fr.: Fr.) Kummer
Niedergedrückter Rötling

Entoloma
sinuatum
(Bull.: Pers.: Fr.) Kumm.
Riesen-Rötling

Geastrum
rufescens
Pers.
Rotbrauner Erdstern

Gleoporus
dichrous
(Fr.) Bres.
Zweifarbiger Gallertporling

Gymnopus
maculata
(Alb. et Schw. Fr.)
Gefleckter Rübling

Gymnopus
impudica
(Fr.) Sing.
Unverschämter Rübling

Gymnopus
butyracea
(Bull.: Fr.) P. Kumm.
Butterrübling

Hebeloma
album
Peck ss. Bruchet
Weisser Fälbling

Hebeloma
sinapizans
(Paul.: Fr.) Gill.
Rettich-Fälbling

Hohenbuhelia
geogenia
(DC.: Fr.) Sing.
Trichterförmiger Muscheling

Hohenbuhelia
geogenia
(DC.: Fr.) Sing.
Trichterförmiger Muscheling

Hohenbuhelia
petaloides
(Bull.: Fr.) Quél.
Erd-Muscheling

Hydnum
repandum
L.: Fr.
Semmel-Stoppelpilz

Inocybe
adequata
(Britz.) Sacc.
Weinrötlicher Rissp ilz

Pilz-Fundliste der Woche 36

Inocybe
fraudans
(Britz.) Sacc.
Birnen-Risspilz

Inocybe
maculata
Boud.
Gefleckter Risspilz

Lactarius
fuliginosus
(Fr.) Fr. (non ss. Bon)
Russfarbener Milchling

Lactarius
pallidus
(Pers.: Fr.) Fr.
Falber Milchling

Lactarius
fluens
Boud.
Braunfleckender Milchling

Lactarius
deterrimus
Gröger
Fichtenreizker

Lactarius
romagnesii
Bon
Kerbrandiger Korallenmilch-
ling

Lactarius
luridus
(Pers.: Fr.) Gray
Gewöhnlicher Violettm.

Lactarius
pterosporus
Romagnesi
Flügelsporiger Milchling

Lactarius
subumbonatus
Lindgren
Schwachnabeliger Milchling

Lactarius
semisanguifluus
Helm & Lecl.
Spangrün-weinroter Kiefern-
reizker

Lactarius
acerrimus
Britz.
Queradriger Milchling

Lactarius
fulvissimus
Rom. i. Kühn. & Rom.
Orangefuchsiger Milchling

Lactarius
rubrocinctus
Fr.
Rotgegürtelter Runzelm.

Leccinum
carpini
(Schulz.) Mos. ex Reid
Hainbuchen-Rauhfuss

Lentinellus
cochleatus
(Pers.: Fr.) Karst.
Äniszähling

Lepiota
felina
(Pers.: Fr.) Karst.
Katzen-Schirmling

Leucoagaricus
leucothites
(Vitt.) Was.
Rosablättriger Egerlings-
schirmling

Lycoperdon
echinatum
Pers.: Pers.
Igel-Stäubling

Lyophyllum
loricatum
(Fr.) Kühn.
Gepanzerter Rasling

Lyophyllum
paelochroum
Clmç.
Lemfarbener Schwärzling

Marasmius
oreades
(Bolton.: Fr.) Fr.
Nelkenschwindling

Mycena
pelianthina
(Fr.: Fr.) Quél.
Schwarzgezähnelter Helmling

Mycena
pura
(Pers.: Fr.) Kumm.
Rettich-Helmling

Mycena
rosea
(Bull.) Gramberg
Rosa-Rettichhelmling

Oudemansiella
mucida
(Schrad. ex Fr.) v.H.
Beringter Schleimrübling

Oudemansiella
mucida
(Schrad. ex Fr.) v.H.
Beringter Schleimrübling

Pholiota
flammans
(Fr.:) Kummer
Feuerschüppling

Pluteus
cervinus
(Schäff.) P. Kumm.
Rehbrauner Dachpilz

Pluteus
podospileus
Sacc. & Cub. in Sacc.
Flockenstieliger Dachpilz

Pulveropoletus
lignicola
(Kall.) Pilát
Nadelholz-Röhrling

Ramaria
flava
(Schäff.: Fr.) Quél.
Schwefelgebe Koralle

Ramaria
botrytis
(Pers.: Fr.) Ricken
Hahnenkamm

Rozites
caperatus
(Pers.: Fr.) P. Karst.
Zigeunerpilz

Russula
olivacea
(Schäf.) Fr.
Rotstieliger Ledertäubling

Russula
cyanoxantha
(Schäff.) Fr.
Frauentäubling

Russula
pectinata
(Bull.: St. Am.) Fr.
Stinkender Kammtäubling

Russula
amoeolens
Romagn.
Brauner Camemberttäubling

Russula
exalbicans
(Pers.) Melz. & Zvara
Verblassender Täubling

Russula
densifolia
Gill.
Dichtblättriger Schwärztäub-
ling



Russula
foetens
(Pers.: Fr.) Fr.
Stinktäubling

Russula
luteotacta
Rea
Gelbfleckender Täubling

Russula
mairei
Singer
Buchen-Speitäubling

Russula
nigricans
(Bull.) Fr.
Dickblättriger Schwärztäub-
ling

Russula
aurea
Pers.
Goldtäubling

Russula
amoenicolor
Rom.
Brätlings-Täubling

Sarcodon
imbricatus
(L. ex Fr.) Karst.
Habichtspilz

Strobilomyces
strobilaceus
(Scop.: Fr.) Berk.
Strubelkopfröhrling

Suillus
placidus
(Bonord.) Singer
Elfenbein-Röhrling

Suillus
viscidus
(L.) Rouss.
Grauer Lärchenröhrling

Telephora
palmata
Scop.: Fr.
Stinkender Warzenpilz

Tricholoma
sejunctum
(Sow.: Fr.) Quél.
Grüngelber Ritterling

Tricholoma
ustale
(Fr.: Fr.) Kumm.
Brandiger Ritterling

Tricholoma
tigrinum
Kumm.
Tiger-Ritterling

Tricholoma
terreum
(Schäff.: Fr.) Kumm.
Erd-Ritterling

Vascellum
pratense
Pers.: Pers.) Kreisel
Wiesen-Stäubling

Xerocomus
chrysenteron
(Bull.) Quel.
Rotfuss-Röhrling

Xerocomus
subtomentosus
(L.: Fr.) Quél.
Ziegenlippe

Xerula
melanotricha
Dörfelt
Weisstannen-Wurzelrübling

Xerula
radicata
(Relhan.: Fr.) Dörfelt
Wurzel-Schleimrübling



Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils am Bestimmungsabend am Montag aufliegen. Es wird sich um solche handeln, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich werden wir auch Mikroaufnahmen einflechten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) sind auf dieser HP zu finden.

Fundliste

Ramaria botrytis *Hahnenkamm Koralle*

Die äussersten Enden der verzweigungen sind rosa-weinrot und kontrastieren gut mit dem weissen Stiel. Die Sporen sind längsrippig und die Hyphen-Septen haben Schnallen. Funde aus Nädelwälder könnte evtl. eine andere Art sein.

Pilze der Woche 37

Cortinarius bulliardii *Feuerfüssiger Gürtelfuss*

Standort: Mischwald.
Fruchtkörper: bis 80 cm. gross
Mikromerkmale: Sporen 8 x 5 µm, warzig.
Bemerkungen: Ein Gürtelfuss, der durch die rote Stielbasis gut erkenntlich ist.

Cortinarius melanotus *Braunnetziger Raukopf*

Standort: Laubmischwälder.
Fruchtkörper: bis 5 cm.
Mikromerkmale: Sporen 7 x 5 µm, fein warzig.
Bemerkungen: er zeichnet sich aus durch den Geruch nach Petersilien.

Cortinarius caerulescens *Blaufleischiger Klumpfuss*

Standort: Laubwald.
Fruchtkörper: bis 8 cm.
Mikromerkmale: Sporen 10 x 6 µm, nicht zitronenförmig.
Bemerkungen: er zeichnet sich aus durch die im jungen Stadum satt blauen Farben, die schnell zu ocker oder milchkaffebraun ausblassen. C. cyaneus hat zitronenförmige Sporen.

Grifola frondosa *Gemeiner Klapperschwamm*

Standort: an der Basis von lebenden Laubbäumen.
Fruchtkörper: er kann bis zu einem halben Meter gross werden.
Mikromerkmale: Sporen 6 x 4,5 µm.
Bemerkungen: er könnte mit dem Eichhasen verwechselt werden, dieser hat jedoch nicht fächerförmige Einzelhütchen.

Clathrus ruber *Roter Gitterling*

Standort: Parkanlagen.
Fruchtkörper: bis 30 mm hoch.
Mikromerkmale: Sporen 5 x 2 µm, Basidien 6 - 8-sporig.
Bemerkungen: er ist wohl durch Farbe und Form unverkennbar.

Cortinarius bulliardii *Feuerfüssiger Gürtelfuss*

Cortinarius melanotus *Braunnetziger Raukopf*

Cortinarius caerulescens *Blaufleischiger Klumpfuss*

Grifola frondosa Gemeiner Klapperschwamm

Clathrus ruber *Roter Gitterling*

Pilz-Fundliste der Woche 37

Albatrellus
ovinus
(Schäff.: Fr.) Kotl. & Pouz.
Schafporling

Aleuria
aurantia
(Fr.) Fuckel
Gemeiner Orangebecherling

Amanita
ceciliae
(Berk. & Broome)Bas.
Riesenstreifling

Amanita
junquillea
Quélet
Narzissengelber Wulstling

Amanita
citrina
(Schäff.) Pers.
Gelber Knollenblätterpilz

Amanita
muscaria
(L.) Hook.
Fliegenpilz

Armillaria
mellea
(Val.: Fr.) Kummer
Honiggelber Hallimasch

Boletus
fechtneri
Velen.
Silber-Röhrling

Boletus
calopus
Pers.: Fr.
Schönfuss-Röhrling

Boletus
erythropus
(Fr.: Fr.) Pers.
Schusterpilz

Bondarzewia
montana
(Quél.) Singer
Bergporling

Clitocybe
odora
(Bull. Fr.) Kumm.
Anistrichterling

Clitocybe
odora
(Bull.) Kumm.
Grüner Anstrichterling

Clitocybe
geotropa
(DC. & Lam) Quél.
Mönchskopf

Clitopilus
prunulus
(Scop.: Fr.) Kumm.
Mehlräsling

Coltricia
perennis
(L.: Fr.) Murrill
Brauner Dauerporling

Cortinarius
anserinus
(Vel.) Hry.
Buchen-Klumpfuss

Cortinarius
hinnuloides
Hry.
Rehfarbenähnlicher Gürtelf.

Cortinarius
hinnuleus
(Sow.) Fr.
Erdigriechender Gürtelfuss

Cortinarius
violaceus
(L.:Fr.) Fr.
Dunkelvioletter Schleierling

Cortinarius
variecolor
(Pers.: Fr.) Fr.
Erdigriechender Schleimkopf

Cortinarius
glaucopus
(Schäff.: Fr.)
Reihiger Klumpfuss

Cortinarius
amurceus (subtortus)
(Pers.: Fr.) Fr.
Ockergelber Schleimkopf

Cortinarius
camphoratus
(Fr.) Fr.
Bocks-Dickfuss

Cortinarius
torvus
(Bull.: Fr.) Fr.
Wohlriechender Gürtelfuss

Cortinarius
hinnuloides
Hry.
Rehfarbenähnlicher Gürtelf.

Cortinarius
infractus
(Pers.: Fr.) Fr.
Bitterer Schleimfuss

Cortinarius
melanotus
Kalchbr.
Braunnetziger Rauhkopf

Craterellus
cornucopioides
Pers.
Totentrompete

Echinoderma
asperum
(Pers.) Bon
Spitzschuppiger Schirmling

Entoloma
sinuatum
(Bull.: Pers.: Fr.) Kumm.
Riesen-Rötling

Gymnopus
fusipes
(Bull.: Fr.) Quél.
Spindeliger Rübling

Gymnopus
confluens
(Pers.: Fr.) Kumm.
Knopfstieliger Rübling

Gymnopus
butyracea
(Bull.: Fr.) P. Kumm.
Butterrübling

Gymnopus
maculata
(Alb. et Schw. Fr.)
Gefleckter Rübling

Hemymycena
cucullata
(Pers.: Fr.) Sing.
Gipsweisser Scheinhelmling

Hygrophorus
eburneus
(Bull.: Fr.) Fr.
Elfenbein-Schneckling

Hygrophorus
erubescens
(Fr.: Fr.) Fr.
Rasiger Purpurschneckling

Inocybe
fraudans
(Britz.) Sacc.
Birnen-Risspilz

Inocybe
geophylla
(Sow.: Fr.) Kumm.
Erdblättriger Risspilz

Pilz-Fundliste der Woche 37

Inocybe
maculata
Boud.
Gefleckter Risspilz

Inocybe
rimosa
(Bull.:Fr:) Kummer
Kegeliger Risspilz

Inocybe
phaeodisca
Kühn.
Braunscheibiger Risspilz

Inocybe
bongardii
(Weinmann) Quél.
Duftender Risspilz

Inocybe
corydalina
Quél.
Grünbuckliger Risspilz

Inocybe
adequata
(Britz.) Sacc.
Weinrötlicher Risspilz

Laccaria
amethystea
(Bull.) Murill
Violetter Lacktrichterling

Lactarius
blennius
(Fr.: Fr.) Fr.
Graugrüner Milchling

Lactarius
fulvissimus
Rom. i. Kühn. & Rom.
Orangefuchsiger Milchling

Lactarius
pallidus
(Pers.: Fr.) Fr.
Falber Milchling

Lactarius
quietus
(Fr.) Fr.
Eichenmilchling

Lactarius
romagnesii
Bon
Kerbrandiger Korallenmilchl.

Lactarius
vellerus
(Fr.) Fr.
Wolliger Milchling

Lactarius
subdulcis
(Bull.: Fr.) Gray
Süsslicher Buchenmilchling

Lactarius
mitissimus
(Fr.: Fr.)
Milder Milchling

Lactarius
albocarneus
Britz.
Klebriger Milchling

Lactarius
picinus
Fr.
Pechschwarzer Milchling

Lactarius
pyrogalus
(Bull.: Fr.) Fr.
Scharfer Hasel-Milchling

Leccinum
carpini
(Schulz.) Mos. ex Reid
Hainbuchen-Rauhfuss

Lentinus
torulosus
(Pers.: Fr. Lloyd
Laubholz-Knäueling

Lepiota
felina
(Pers.: Fr.) Karst.
Katzen-Schirmling

Lepista
nuda
(Bull.: Fr.) Cooke
Violetter Rötelritterling

Limacella
guttata
(Fr.) Konr. et Maubl.
Getropfter Schleimschirmling

Lyophyllum
loricatum
(Fr.) Kühn.
Gepanzerter Rasling

Lyophyllum
fumosum
(Pers.: Fr.) Ort.
Hellbrauner Büschelrasling

Mycena
crocata
(Schrad.: Fr.) Kumm.
Safranmilchender Helmling

Mycena
galericulata
(Scop.:Fr.) Gray
Rosablättriger Helmling

Mycena
inclinata
(Fr.) Quél.
Buntstieliger Helmling

Mycena
epipterygia
(Scop.: Fr.) Gray
Dehnbarer Helmling

Mycena
zephirus
(Fr.: Fr.) Kumm.
Rostfleckiger Helmling

Paxillus
atrotomentosus
(Batsch.: Fr.) Fr.
Samtfuss-Krempling

Pholiota
alnicola
(Fr.) Sing.
Erlen-Schüppling

Pholiota
spumosa
(Fr.) Sing.
Nadel-Schüppling

Pluteus
romelli
(Britz.) Sacc.
Gelbstieliger Dachpilz

Polyporus
ciliatus
Fr.
Bewimperter Porling

Porphyrellus
porphyrosporus
Fr.) Gilbert
Düsterer Röhrling

Psathyrella
cotonea
(Quél.) Kon. & Maub.
Schwefelfüssiger Faserling

Ramaria
largentii
Marr & Stuntz
Largen´s Berg-Koralle

Ramaria
rubella
(Schäff.: Krombh.) Peter.
Rotbraune Koralle

Ramaria
flavescens
(Schäff.) Peters.
Gelbliche Koralle



Pilz-Fundliste der Woche 37

Russula
cyanoxantha fo. pelteraui
R. Maire.: Singer
Grüner Frauentäubling

Russula
integra
(L.:) Fr. ss. Mre.
Braunroter Ledertäubling

Russula
laurocerasi
Melzer
Mandeltäubling

Russula
lepida
Fr.
Harter Zinnobertäubling

Russula
ochroleuca
(Pers.: Fr.)
Ockertäubling

Russula
velutipes
Velenovsky
Rosa-Täubling

Russula
vesca
Fr.
Fleischroter Speisetäubling

Russula
violeipes
Quélet
Violettstieliger Brätlingstäubl.

Russula
atropurpurea
(Krombh.) Britz.
Pupurschwarzer Täubling

Russula
anthracina
Romagn.
Lachsblättriger Schwärztäubl.

Russula
decolorans
(Fr.) Fr.
Orangeroter Graustieltäubl.

Russula
integra
(L.:) Fr. ss. Mre.
Braunroter Ledertäubling

Russula
fellea
(Fr.: Fr.) Fr.
Gallentäubling

Russula
viscida
Kudrna
Lederstieltäubling

Russula
queletii
Fr. in Quél.
Stachelbeertäubling

Russula
illota
Romagn.
Morsetäubling

Russula
viscida
Kudrna
Lederstieltäubling

Russula
ochroleuca
(Pers.: Fr.)
Ockertäubling

Russula
farinipes
Romell in Britz.
Mehlstieltäubling

Russula
rubra
(Lmck. Fr.) Fr.
Scharfer Zinnobertäubling

Sarcodon
imbricatus
(L. ex Fr.) Karst.
Habichtspilz

Stereum
hirsutum
(Willd.: Fr.) S.F. Gray
Zottiger Schichtpilz

Strobilomyces
strobilaceus
(Scop.: Fr.) Berk.
Strubelkopfröhrling

Stropharia
caerulea
Kreisel
Blauer Träuschling

Tricholoma
bufonium
(Pers.: Fr.) Kumm.
Purpurbrauner Schwefel-Ritterling

Tricholoma
sciodes
(Secr.) Martin
Schärflicher Ritterling

Tricholoma
tigrinum
Kumm.
Tiger-Ritterling

Tricholoma
saponaceum
(Fr.) Kumm.
Seifen-Ritterling

Tricholoma
vaccinum
(Pers.: Fr.) Kumm.
Zottiger Ritterling

Tricholoma
inamoenum
(Fr.) Quél.
Lästiger Ritterling

Tricholomopsis
decora
(Fr.) Sing.
Olivgelber Holzritterling

Xerocomus
subtomentosus
(L.: Fr.) Quél.
Ziegenlippe

Xerocomus
badius
(Fr.) Kühn. ex Gilb.
Maronenröhrling

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils am Bestimmungsabend am Montag aufliegen. Es wird sich um solche handeln, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich werden wir auch Mikroaufnahmen einflechten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) sind auf dieser HP zu finden.

Fundliste

Cortinarius cyaneus *Cyan-Klumpfuss*

Er ist ein Vertreter des Laubwaldes und unterscheidet sich vom C. caerulescens hauptsächlich durch zitronenförmige Sporen und mehr radialfaserigen Hut.

Pilze der Woche 38

Hohenbuhelia auriscalpium *Späne Muscheling*

Standort: Laubholz.
Fruchtkörper: zungenförmig
Mikromerkmale: Sporen 5 x 3,5 µm.
Bemerkungen: Ein Muscheling ohne Pielozystiden und kleine Sporen. Die Farbe kann variieren.

Cortinarius rubicundulus *Weinrotstieliger Hautkopf*

Standort: Laubmischwälder.
Fruchtkörper: bis 8 cm.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 4 µm, fein warzig.
Bemerkungen: er ist einer der wenigen Cortinarien aus der Sektion Leprocybe mit nicht rundlichen Sporen.

Cortinarius praestans *Schleiereule*

Standort: Laubwald.
Fruchtkörper: bis über 20 cm.
Mikromerkmale: Sporen 17 x 9 µm, mandelförmig, stark warzig.
Bemerkungen: er ist einer der grössten Schleimköpfe und kann im jungen Zustand kaum verwechselt werden.

Cortinarius largus *Blasser Schleimkopf*

Standort: bei Laubbäumen.
Fruchtkörper: bis 10 cm.
Mikromerkmale: Sporen 10 x 5 µm, mandelförmig, schwach warzig.
Bemerkungen: er ist ein Vertreter aus der Sektion Variecolores mit gelber KOH-Reaktion auf dem Fleisch sowie blau-grüner mit Guaiak.

Hohenbuhelia auriscalpium *Späne Muscheling*

Cortinarius rubicundulus *Weinrotstieliger Hautkopf*

Cortinarius praestans *Schleiereule*

Cortinarius largus *Blasser Schleimkopf*

Pilz-Fundliste der Woche 38

Amanita
citrina
(Schäff.) Pers.
Gelber Knollenblätterpilz

Boletus
luridus
Schäff.: Fr.
Netzstieliger Hexenröhrling

Boletus
calopus
Pers.: Fr.
Schönfuss-Röhrling

Clavariadelphus
pistilaris
(Fr.) Donk
Herkuleskeule

Clitocybe
clavipes
(Pers.: Fr.) Kumm.
Keulenfuss-Trichterling

Cortinarius
bolaris
(Pers.: Fr.) Fr.
Rotschuppiger Rauhkopf

Cortinarius
violaceus
(L.:Fr.) Fr.
Dunkelvioletter Schleierling

Cortinarius
traganus
Fr.
Lila-Dickfuss

Cortinarius
hinnuleus
(Sow.) Fr.
Erdigriechender Gürtelfuss

Cortinarius
variecolor
(Pers.: Fr.) Fr.
Erdigriechender Schleimkopf

Cortinarius
nemorensis
(Fr.) Lge.
Verfärbender Schleimkopf

Cortinarius
rubicundulus
(Rea) Pears.
Rötlichfaseriger Rauhkopf

Cortinarius
ochrophyllus
Fr.
Ockerblättriger Seidenkopf

Cortinarius
deceptivus
Kauffman
Blütengeruch-Wasserkopf

Hebeloma
radicosm
(Bull.: Fr.) Rick.
Würzelnder Fälbling

Hebeloma
truncatum
(Fr.) Kumm.
Kakao-Fälbling

Hebeloma
senescens
(Batsch) Berk.
Bräunender Fälbling

Hebeloma
longicaudum
(Pers.: Fr.) Kumm.
Langstieliger Fälbling

Hemymycena
cucullata
(Pers.: Fr.) Sing.
Gipsweisser Scheinhelmling

Hohenbuhelia
auriscalpium
(Maire) Singer
Späne-Muscheling

Hohenbuhelia
geogenia
(DC.: Fr.) Sing.
Trichterförmiger Muscheling

Hygrophorus
pudorinus
(Fr.) Fr.
Orange-Schneckling

Inocybe
fuscidula
Vel.
Braunstreifiger Risspilz

Inocybe
fraudans
(Britz.) Sacc.
Birnen-Risspilz

Inocybe
bongardii
(Weinm.) Quél.
Duftender Risspilz

Lactarius
uvidus
(Fr.) Fr.
Klebrig-schl. Violettmilchling

Lactarius
pterosporus
Romagnesi
Flügelsporiger Milchling

Lyophyllum
connatum
(Schum.: Fr.) Sing.
Weisser Büschelrasling

Melanoleuca
polioleuca
(Fr.) Kühn. & Mre.
Schwarzw. Weichritterling

Pholiota
astragalina
(Fr.) Singer
Safranroter Schüppling

Russula
viscida
Kudrna
Lederstieltäubling

Russula
olivacea
(Schäf.) Fr.
Rotstieliger Ledertäubling

Russula
fellea
(Fr.: Fr.) Fr.
Gallentäubling

Russula
cavipes
Britz.
Weisstannentäubling

Russula
anthracina
Romagn.
Lachsblättriger Schwärzt.

Russula
pseudointegra
Arn. & Gor.
Ockerbl. Zinnobertäubling

Suillus
granulatus
(L.: Fr.) Rouss.
Körnchenröhrling

Tricholoma
luridum
(Schäff.: Fr.) Quél.
Graublättriger Ritterling

Tricholoma
squarrulosum
Bres.
Stielschuppiger Ritterling

Tricholomopsis
decora
(Fr.) Sing.
Olivgelber Holzritterling



Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils am Bestimmungsabend am Montag aufliegen. Es wird sich um solche handeln, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich werden wir auch Mikroaufnahmen einflechten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) sind auf dieser HP zu finden.

Fundliste

Cortinarius deceptivus *Blütengeruch Wasserkopf*

Ein Wasserkopf aus der Sektion mit Blauanteile am Stiel und etwas süsslichem Geruch. Die Sporen sind rundlich.

Pilze der Woche 39

Hericium coralloides *Tannen-Stachelbart*

Standort: Nadelholz.
Fruchtkörper: aus Basisstrunk korallenartige Verzweigungen.
Mikromerkmale: Sporen 6,5 x 5 µm.
Bemerkungen: Dieser Stachelbart zeichnet sich aus durch das Vorkommen an Tannen. Ähnliche Arten haben kleiner Sporen und wachsen auf Laubholz.

Helvella lacunosa *Grubenlorchel*

Standort: Laub- und Nadelwälder, an Wegränder.
Fruchtkörper: bis 7 cm hohe Fruchtkörper.
Mikromerkmale: Sporen 18 x 11 µm, mit Tropfen.
Bemerkungen: Im Gegensatz zu Helvella crispa ist der ganze Fruchtkörper dunkel gefärbt.

Nyctalis asterospora *Stäubender Zwitterling*

Standort: auf abgestorbenen Pilzen von Russula und Lactarius.
Fruchtkörper: um 20 mm.
Mikromerkmale: Sporen 4 x 2,5. Chlamydosporen 15 x 12 µm, grobwarzig.
Bemerkungen: aufgrund seines Vorkommens auf Täublingen sowie der bräunende Hut durch die Chlamydosporen ist er kaum verwechselbar.

Russula cavipes *Hohlstieliger Täubling*

Standort: bei Weisstannen.
Fruchtkörper: bis 6 cm.
Mikromerkmale: Sporen 9 x 7 µm, warzig und netzartig verbunden.
Bemerkungen: ein gebrechlicher, scharfer Täubling mit hohlem Stiel, der häufig bei Weisstannen zu finden ist.

Peziza succosa *Gelbmilchender Becherling*

Standort: lehmige Böden, Wegränder
Fruchtkörper: bis 6 cm.
Mikromerkmale: Sporen 19 x 10 µm, grobwarzig mit 2 Tropfen.
Bemerkungen: andere Peziza-Arten haben keine gilbende Milch.

Hericium coralloides *Tannen-Stachelbart*

Helvella lacunosa *Grubenlorchel*

Nyctalis asterospora *Stäubender Zwitterling*

Russula cavipes *Hohlstieliger Täubling*

Peziza succosa *Gelbmilchender Becherling*

Pilz-Fundliste der Woche 39

Agaricus
silvicola
(Vittad.) Sacc.
Dünnfleischiger Anis-Egerling

Albatrellus
ovinus
(Schäff.: Fr.) Kotl. & Pouz.
Schafporling

Amanita
mairei
Foley
Silbergr. Scheidenstreifling

Boletus
pulverlulentus
Opat.
Schwarzblauender Röhrling

Calocera
viscosa
(Pers.: Fr.) Fr.
Klebriger Hörnling

Cantharellus
tubaeformis
Fr.
Durchbohrter Leistling

Clavariadelphus
pistilaris
(Fr.) Donk
Herkuleskeule

Clavariadelphus
truncatus
(Quél.) Donk
Abgestutzte Herkuleskeule

Clavulina
cristata
(Holmskj.: Fr.) Schröt.
Kammförmige Koralle

Climacocystis
borealis
(Fr.) Kotl. & Pouz.
Nordischer Porling

Clitocybe
geotropa
(DC. & Lam) Quél.
Mönchskopf

Clitocybe
nebularis
(Batsch. Fries) Kummer
Nebelgrauer Trichterling

Clitocybe
phyllophila
(Pers.) Kumm.
Bleiweisser Trichterling

Clitopilus
prunulus
(Scop.: Fr.) Kumm.
Mehlräsling

Cortinarius
deceptivus
Kauffman
Blütengteruch-Wasserkopf

Cortinarius
largus
Fr.
Blasser Schleimkopf

Cortinarius
praestans
(Cord.) Gill.
Schleiereule

Cortinarius
olidus
Lge.
Gelbgegürtelter Schleimkopf

Cortinarius
torvus
(Bull.: Fr.) Fr.
Wohlriechender Gürtelfuss

Cortinarius
venetus
(Fr.). Fr.
Grüner Buchenwald-Rauhk.

Cortinarius
dibaphus
Fr.
Bunter Klumpfuss

Cortinarius
hinnuleus
(Sow.) Fr.
Erdigriechender Gürtelfuss

Cortinarius
variecolor
(Pers.: Fr.) Fr.
Erdigriechender Schleimkopf

Cortinarius
rubicundulus
(Rea) Pears.
Rötlichfaseriger Rauhkopf

Cortinarius
praestans
(Cord.) Gill.
Schleiereule

Cortinarius
melanotus
Kalchbr.
Braunnetziger Rauhkopf

Cortinarius
flexipes
(Pers.: Fr.) Fr.
Duftender Gürtelfuss

Craterellus
cornucopioides
Pers.
Totentrompete

Creolophus
cirrhatus
(Pers.: Fr.) Karst.
Dorniger Stachelbart

Creolophus
cirrhatus
(Pers.: Fr.) Karst.
Dorniger Stachelbart

Entoloma
rhodopolium
(Fr.: Fr.) Kummer
Niedergedrückter Rötling

Geastrum
sessile
(Sow.) Pouz.
Gewimperter Erdstern

Gloeophyllum
odoratum
(Wulf.: Fr.) Imyzeki
Fencheltramete

Gymnopus
confluens
(Pers.: Fr.) Kumm.
Knopfstieliger Rübling

Hebeloma
senescens
(Batsch) Berk.
Bräunender Fälbling

Hebeloma
sinapizans
(Paul.: Fr.) Gill.
Rettich-Fälbling

Hebeloma
radicosm
(Bull.: Fr.) Rick.
Würzelnder Fälbling

Hemymycena
cucullata
(Pers.: Fr.) Sing.
Gipsweisser Scheinhelmling

Hericium
coralloides
(Scop.: Fr.) Pers.
Tannenstachelbart

Heterobasidion
annosum
(Fr.) Bref.
Wurzelschwamm



Pilz-Fundliste der Woche 39

Hohenbuhelia
geogenia
(DC.: Fr.) Sing.
Trichterförmiger Muscheling

Hydnum
repandum
L.: Fr.
Semmel-Stoppelpilz

Hygrocybe
conica
(Scopp.: Fr.) Kumm.
Kegeliger Saftling

Hygrophorus
pudorinus
(Fr.) Fr.
Orange-Schneckling

Hygrophorus
eburneus
(Bull.: Fr.) Fr.
Elfenbein-Schneckling

Hypholoma
lateritium
(Schäff.: Fr.) Kumm.
Ziegelroter Schwefelkopf

Inocybe
asterospora
Quél.
Sternsporiger Risspilz

Inocybe
corydalina
Quél.
Grünbuckliger Risspilz

Inocybe
geophylla
(Sow.: Fr.) Kumm.
Erdblättriger Risspilz

Inocybe
phaeodisca
Kühn.
Braunscheibiger Risspilz

Kuehneromyces
mutabilis
(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.
Gem. Stockschwämmchen

Laccaria
amethystea
(Bull.) Murill
Violetter Lacktrichterling

Lactarius
vellerus
(Fr.) Fr.
Wolliger Milchling

Lactarius
quietus
(Fr.) Fr.
Eichenmilchling

Lactarius
scrobiculatus
(Scop.: Fr.) Fr.
Grubiger Fichtenmilchling

Lactarius
pyrogalus
(Bull.: Fr.) Fr.
Scharfer Hasel-Milchling

Lactarius
albocarneus
Britz.
Klebriger Milchling

Lactarius
camphoratus
(Bull.: Fr.) Fr.
Kamfermilchling

Lepiota
cristata
(Bolton.: Fr.) Kummer
Stink-Schirmling

Lycoperdon
pyriforme
Schäff.: Pers.
Birnen-Stäubling

Nyctalis
asterophora
Fr.
Stäubender Zwitterling

Nyctalis
parasitica
(Bull.: Fr.) Fr.
Beschleierter Zwitterling

Panellus
stypticus
(Bull.: Fr.) P.Karst.
Bitterer Muschelseitling

Paxillus
atrotomentosus
(Batsch.: Fr.) Fr.
Samtfuss-Krempling

Phallus
impudicus
L. ex Pers.
Stinkmorchel

Pholiota
astragalina
(Fr.) Singer
Safranroter Schüppling

Psathyrella
conopilus
(Fr.: Fr.) Pears. & Dennis
Huthaarfaserling

Pycnoporus
cinnabarinus
(Jacq.: Fr.) Karst.
Zinnoberrote Tramete

Ramaria
flava
(Schäff.: Fr.) Quél.
Schwefelgebe Koralle

Ramaria
stricta
(Pers.: Fr.) Quél. s. str.
Steife Koralle

Rhodocybe
gemina
(Fr.). Kuyp. & Noord.
Würziger Tellerling

Rhodocybe
nitellina
(Fr.) Sing.
Gelbfuchsiger Tellerling

Russula
cavipes
Britzelm.
Hohlstieliger-Täubling

Russula
cyanoxantha
(Schäff.) Fr.
Frauentäubling

Russula
delica
Fr.
Gemeinder Weisstäubling

Russula
viscida
Kudrna
Lederstieltäubling

Russula
melliolens
Quél.
Honigtäubling

Russula
fellea
(Fr.: Fr.) Fr.
Gallentäubling

Russula
velutipes
Velenovsky
Rosa-Täubling

Russula
laurocerasi
Melzer
Mandeltäubling



Pilz-Fundliste der Woche 39

Russula
nigricans
(Bull.) Fr.
Dickbl. Schwärztäubling

Russula
ochroleuca
(Pers.: Fr.)
Ockertäubling

Stereum
hirsutum
(Willd.: Fr.) S.F. Gray
Zottiger Schichtpilz

Strobilomyces
strobilaceus
(Scop.: Fr.) Berk.
Strubelkopfröhrling

Trametes
gibbosa
(Pers.: Fr.) Fr.
Buckel-Trametе

Tricholoma
basirubens
Bon
Rosafüssiger Ritterling

Tricholoma
atrosquamosum
(Chev.) Sacc.
Schwarzschuppiger Ritterling

Tricholoma
luridum
(Schäff.: Fr.) Quél.
Graublättriger Ritterling

Tricholoma
ustale
(Fr.: Fr.) Kumm.
Brandiger Ritterling

Tricholomopsis
rutilans
(Schaeff.: Fr.) Singer
Purpurfilziger Holzritterling

Tricholomopsis
decora
(Fr.) Sing.
Olivgelber Holzritterling

Xerula
pudens
(Pers.) Sing.
Braunhaariger Wurzelrübling

Xerula
radicata
(Relhan.: Fr.) Dörfelt
Wurzel-Schleimrübling

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils am Bestimmungsabend am Montag aufliegen. Es wird sich um solche handeln, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich werden wir auch Mikroaufnahmen einflechten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) sind auf dieser HP zu finden.

Fundliste

Nyctalis parasitica *Beschleierter Zwitterling*

Er wächst auf Pilzen der Familie Russulaceae und unterscheidet sich von N. asterospora hauptsächlich durch nicht warzigen Chlamydosporen.

Pilze der Woche 40

Scutiger pescaprae *Ziegenfuss-Porling*

Standort: Nadelwald.
Fruchtkörper: bis 12 cm.
Mikromerkmale: Sporen 10 x 7 µm.
Bemerkungen: Ein seltener, erdbewohnender Porling, der durch sein Aussehen kaum zu verwechseln ist.

Inocybe cinsinnata *Braunvioletter Risspilz*

Standort: Nadelwälder, an Wegränder.
Fruchtkörper: Hut bis 2 cm.
Mikromerkmale: Sporen 9 x 5 µm, glatt.
Bemerkungen: Ein faserschuppiger, kleiner Risspilz, mit im oberen Stielteil violettlicher Tönung. Die var. major ist grösser und hat kleine, ballonförmige, intracellulär pigmentierte Cheilocystiden.

Cortinarius anserinus *Buchen-Klumpfuss*

Standort: Laubwälder.
Fruchtkörper: um 9 cm.
Mikromerkmale: Sporen 10 x 6, zitronenförmig, stark warzig.
Bemerkungen: Die hauptsächlichsten Merkmale sind das Vorkommen im Buchenwald, die stark warzigen, zitronenförmigen Sporen und die bittere Huthaut.

Cortinarius camphoratus *Bocks-Dickfuss*

Standort: Nadelwälder.
Fruchtkörper: bis 9 cm.
Mikromerkmale: Sporen 10,5 x 6 µm, schwach warzig, mit Cheilozystiden.
Bemerkungen: in der Untergattung «Sericeocybe» zeichnet er sich aus durch den starken, unangenehmen Geruch und durch grosse Cheilozystiden.

Pholiota gummosa *Gummi-Schüppling*

Standort: Grasige Waldlichtungen.
Fruchtkörper: bis 5 cm.
Mikromerkmale: Sporen 6,5 x 3,5 µm, dickwandig.
Bemerkungen: er unterscheidet sich von Ph. gramminis durch weissliches Fleisch und klar dickwandigen Sporen, von Ph. lenta ohne deutliche Ixocutis.

Scutiger pescaprae *Ziegenfuss-Porling*

Inocybe cinsinnata *Braunvioletter Risspilz*

Cortinarius anserinus *Buchen-Klumpfuss*

Cortinarius camphoratus *Bocks-Dickfuss*

Pholiota gummosa *Gummi-Schüppling*

Pilz-Fundliste der Woche 40

Agaricus
langei
(Möll.) Möll.
Grosssp. Blutchampignon

Agaricus
augustus
Fr.
Braunsch. Riesenegerling

Albatrellus
pes-caprae
(Pers.) Pouz.
Ziegenfussporling

Albatrellus
confluens
(A. & S.: Fr.) Kotl. & Pouz.
Semmelporling

Albatrellus
ovinus
(Schäff.: Fr.) Kotl. & Pouz.
Schafporling

Amanita
crocea
(Quél. in Boud.) Sing.
Orangebrauner Scheidenstr.

Amanita
porphyria
Alb. & Schw.: Fr.
Porphyrbrauner Wulstling

Amanita
citrina
(Schäff.) Pers.
Gelber Knollenblätterpilz

Bierkandera
adusta
(Willd.: Fr.) Karst.
Angebrannter Rauchporling

Boletus
luridus
Schäff.: Fr.
Netzstieliger Hexenröhrling

Boletus
pinophilus
Pilat & Derm.
Kiefern-Steinpilz

Boletus
pulverlulentus
Opat.
Schwarzblauender Röhrling

Boletus
radicans
Pers.: Fr.
Bitter-Röhrling

Cantharellus
melanoxeros
Desm.
Gelbvioletter Pfifferling

Cantharellus
cibarius
Fr.
Eierschwamm

Cantharellus
tubaeformis
Fr.
Durchbohrter Leistling

Chalciporus
piperatus
(Bull.: Fr.) Bat.
Pfeffer-Röhrling

Chamaemyces
fracidus
(Fr.) Donk
Fleckender Schmierschirml.

Clavatia
utriformis
(Bull.:) Jaap
Hasenstäubling

Clitocybe
ditopus
(Fr.) Gill.
Mehltrichterling

Clitocybe
gibba
(Pers.) Kumm.
Ockerbrauner Trichterling

Clitocybe
clavipes
(Pers.) Kumm.
Keulenfuss-Trichterling

Cortinarius
alboviolacea
(Pers.: Fr.) Fr.
Weissvioletter Dickfuss

Cortinarius
camphoratus
(Fr.) Fr.
Bocks-Dickfuss

Cortinarius
semisanguineus
(Fr.)
Blutblättriger Hautkopf

Cortinarius
anserinus
(Vel.) Hry.
Buchen-Klumpfuss

Cortinarius
mussivus
(Fr.) Melot
Stinkender Schleimkopf

Cortinarius
spilomeus
(Fr.: Fr.) Fr.
Kupferschuppiger Dickfuss

Cortinarius
malicorius
Fr.
Orangerandiger Hautkopf

Cortinarius
flexipes
(Pers.: Fr.) Fr.
Duftender Gürtelfuss

Cortinarius
hinnuleus
(Sow.) Fr.
Erdigriechender Gürtelfuss

Cortinarius
betulinus
Favre
Schmächtiger Birken-Schleimf.

Cortinarius
traganus
Fr.
Lila-Dickfuss

Craterellus
cornucopioides
Pers.
Totentrompete

Cystoderma
carcharias
(Pers.) Fayod
Starkriechender Körnchensch.

Daedaleopsis
confragosa
(Bolt.: Fr.) Schröt. s. str.
Rötende Tramete

Entoloma
excentricum
Bres.

Marmorierter Rötling
Geastrum
triplex
Jungh.
Halskrausen-Erdstern

Gymnopus
confluens
(Pers.: Fr.) Kumm.
Knopfstieliger Rübling

Hebeloma
truncatum
(Fr.) Kumm.
Kakao-Fälbling



Pilz-Fundliste der Woche 40

Hebeloma
birrum
Fr. ss. Mos.
Spindelfüssiger Fälbling

Hohenbuhelia
cyphelliformis
(Berk.) Mill.
Schälchenförm. Muscheling

Hydnum
repandum
L.: Fr.
Semmel-Stoppelpilz

Hygrophorus
discoideus
(Pers.: Fr.) Fr.
Braunscheibiger Schneckling

Hygrophorus
eburneus
(Bull.: Fr.) Fr.
Elfenbein-Schneckling

Inocybe
phaeocomis
(Pers.) Kuyp.
Braunschopfiger Risspilz

Inocybe
cookei
Bres.
Knolliger Risspilz

Lactarius
aurantiacus
(Pers.: Fr.) Gray
Echter Orange-Milchling

Lactarius
fluens
Boud.
Braunfleckender Milchling

Lactarius
luridus
(Pers.: Fr.) Gray
Gewöhnlicher Violettm.

Lactarius
vellerus
(Fr.) Fr.
Wolliger Milchling

Lactarius
ligniotus
Fries in Lindb.
Mohrenkopf

Leccinum
crocipodium
(Let.) Watl.
Gelbporiger Raufuss

Leccinum
carpini
(Schulz.) Mos. ex Reid
Hainbuchen-Rauhfuss

Lentinus
adhaerens
(Alb. et Schw.: Fr.) Fr.
Harziger Sägeblättling

Leotia
lubrica
Pers.
Gemeines Gallertkäppchen

Leucopaxillus
gentianeus
(Quélet) Kotl.
Bitterer Krempenritterling

Lyophyllum
infumatum
(Bres.) Kühn.
Rautensporiger Schwärzling

Marasmius
wynnei
Berk. & Br.
Violetlicher Schwindling

Micromphale
foetidum
(Sow..: Fr.) Singer
Gemeinder Stinkschwindling

Mycena
polygramma
(Bull.: Fr.) Gray
Rillstieliger Helmling

Nyctalis
parasitica
(Bull.: Fr.) Fr.
Beschleierter Zwitterling

Pholiota
gummosa
(Lasch.: Fr.) Sing.
Strohblasser Schüppling

Pholiota
lucifera
(Lasch) Quél.
Fettiger Schüppling

Pholiota
squarrosa
(Pers.: Fr.) Kumm.
Sparriger Schüppling

Pseudohydnellum
gelatinosum
(Scop.: Fr.) Karst.
Zitterzahn

Ramaria
flava
(Schäff.: Fr.) Quél.
Schwefelgebe Koralle

Ramaria
botrytis
(Pers.: Fr.) Ricken
Hahnenkamm

Russula
ochroleuca
(Pers.: Fr.)
Ockertäubling

Russula
fellea
(Fr.: Fr.) Fr.
Gallentäubling

Russula
cavipes
Britz.
Weisstannentäubling

Russula
pulchella
Bors.
Verblassend. Birken-Täubling

Russula
raoultii
Quél.
Blassgeber Täubling

Sparassis
crispa
(Wulf. in Jacq.) Fr.
Krause Glucke

Suillus
placidus
(Bonord.) Singer
Elfenbein-Röhrling

Tapinella
panuoides
(Fr.: Fr.) Gilbert
Muschel-Krempling

Tricholoma
pseudonicticans
Bon
Blassfleischiger Fichtenritterl.

Tricholoma
sciodes
(Secr.) Martin
Schärflicher Ritterling

Tricholoma
lascivum
(Fr.) Gill. ss. Lge.
Unverschämter Ritterling



Tricholoma
saponaceum
(Fr.) Kumm.
Seifen-Ritterling

Pilz-Fundliste der Woche 40

Tricholoma
fulvum
(DC.: Fr.) Sacc.
Gelbblättriger Ritterling

Tricholoma
orirubens
Quél.
Rötender Ritterling

Tricholoma
psammopus
(Kalchbr.) Quél.
Lärchenritterling

Tricholoma
ustale
(Fr.: Fr.) Kumm.
Brandiger Ritterling

Tricholoma
vaccinum
(Pers.: Fr.) Kumm.
Zottiger Ritterling

Tricholomopsis
decora
(Fr.) Sing.
Olivgelber Holzritterling

Xerocomus
badius
(Fr.) Kühn. ex Gilb.
Maronenröhrling

Xylaria
polymorpha
(Pers. ex Mér.) Grev.
Vielgestaltige Holzkeule

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils am Bestimmungsabend am Montag aufliegen. Es wird sich um solche handeln, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich werden wir auch Mikroaufnahmen einflechten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) sind auf dieser HP zu finden.

Fundliste

Microphale foetidum *Gemeinder Stinkschwindling*

Er zeichnet sich aus durch den unangenehmen, stinkenden Geruch und unterscheidet sich durch den Standort an Strünken und liegenden Ästen gegenüber anderen Arten dieser Gattung. Neu figurieren die Arten der Gattung Microphale in der Gattung Marasmiellus und Gymnopus.

Pilze der Woche 41

Cathatelasma imperiale *Wurzel-Möhrling*

Standort: Nadelwald.
Fruchtkörper: bis 15 cm.
Mikromerkmale: Sporen 12 x 5 µm.
Bemerkungen: Ein Pilz, der nur montan zu finden ist. Der doppelte Ring und die weit herablaufenden Lamellen sowie die Grösse kennzeichen diesen Pilz gut. Sein Doppelgänger, C. ventricosum, ist heller (siehe Galerie auf dieser HP).

Lepista irina *Veilchenwurz-Rötelritterling*

Standort: Laub- und Nadelwälder.
Fruchtkörper: Hut bis 10 cm.
Mikromerkmale: Sporen 7 x 4 µm, fein warzig.
Bemerkungen: Die leicht ausgebuchteten Lamellen, der angenehme Geruch nach Veilchenwurz sowie die leicht abtrennbaren Lamellen (Gattungsmerkmal) kennzeichnen diesen Pilz.

Inocybe fibrosa *Weisser Risspilz*

Standort: Mischwald.
Fruchtkörper: um 6 cm.
Mikromerkmale: Sporen 9 x 6, höckerig (nicht stark ausgeprägt).
Bemerkungen: Dieser Risspilz weist eine kaum sichtbare Faserung des Hutes auf. Der Stiel ist bis ca. zur Hälfte überfasert (Caulozystiden). Der Geruch ist säuerlich.

Inocybe praetervisa *Zapfensporiger Risspilz*

Standort: Laub- und Nadelwälder.
Fruchtkörper: bis 8 cm.
Mikromerkmale: Sporen 10,5 x 8 µm, höckerig.
Bemerkungen: ein sehr heller Risspilz mit jung fast weissen Lamellen. Er unterscheidet sich von I. mixtilis durch nicht knollige Stielbasis und Caulozystiden nur im oberen Stielbereich. Der Geruch ist unbedeutend.

Lactarius aspideus *Blasser Violett-Milchling*

Standort: Laubbäume.
Fruchtkörper: bis 5 cm.
Mikromerkmale: Sporen 9 x 7 µm.
Bemerkungen: Ein heller, violettmilchender Milchling. Er unterscheidet sich von L. flavidus hauptsächlich durch milde bis bittere Milch.

Cathatelasma imperiale *Wurzel-Möhrling*

Lepista irina *Veilchenwurz-Rötelritterling*

Inocybe fibrosa *Weisser Risspilz*

Inocybe praetervisa *Zapfensporiger Risspilz*

Lactarius aspideus *Blasser Violett-Milchling*

Pilz-Fundliste der Woche 41

Agrocybe
erebia
(Fr.) Kühn.
Leberbrauner Ackerling

Albatrellus
subrubescens
Murrill
Rötender Schafeuter-Porling

Boletus
luridus
Schäff.: Fr.
Netzstieliger Hexenröhrling

Cantharellus
melanoxeros
Desm.
Gelbvioletter Pfifferling

Catathelasma
imperiale
(Fr.) Sing.
Wurzelmöhrling

Chamaemyces
fracidus
(Fr.) Donk
Fleckender Schmierschirml.

Clavulinopsis
fusiformis
(Sow.: Fr.) Corn.
Spindelförmige Wiesenkeule

Clavulinopsis
helvola
(Pers.: Fr.) Corn.
Goldgelbe Wiesenkeule

Clitocybe
metachroides
Harmaja
Striegeliger Trichterling

Clitocybe
phyllophila
(Pers.) Kumm.
Bleiweisser Trichterling

Clitocybe
nebularis
(Batsch. Fries) Kummer
Nebelgrauer Trichterling

Clitocybe
geotropa
(DC. & Lam) Quél.
Mönchskopf

Clitopilus
prunulus
(Scop.: Fr.) Kumm.
Mehlräsling

Coprinus
micaceus
(Bull.: Fr.) Fr.
Glimmertintling

Coprinus
lagopus
(Fr.) Fr.
Hasenpfote

Cortinarius
delibutus
Fr.
Violettblättriger Schleimfuss

Cortinarius
pseudocrassus
Joss. ex Orton
Trockener Gebirg.-Schleimk.

Cortinarius
cinnamomeus
Fr.
Zimt-Hautkopf

Cortinarius
lebretonii
Quélet
Farbiger Schleimfuss

Cortinarius
caninus
(Fr.: Fr.)
Rostfuchsiger Dickfuss

Cortinarius
nemorensis
(Fr.) Lge.
Verfärbender Schleimkopf

Cortinarius
impennis
Fr. ss. Mos.
Büscheliger Gürtelfuss

Cortinarius
praestans
(Cord.) Gill.
Schleiereule

Cortinarius
rubicundulus
(Rea) Pears.
Rötlichfaseriger Rauhkopf

Cortinarius
flexipes
(Pers.: Fr.) Fr.
Duftender Gürtelfuss

Cortinarius
tophaceus
Fr.
Buchen-Rauhfuss

Cortinarius
livido-ochraceus
(Berkeley) Berkeley
Langstieliger Schleimfuss

Cortinarius
cagei
Melot
Zweifarbiger Wasserkopf

Crepidotus
mollis
(Schäff.L Fr.) Staude
Gallertfleischiges Stummelf.

Entoloma
myrmecophilum
(Romag.) Mos.
Dunkelhütiger Rötling

Entoloma
serrulatum
(Fr.: Fr.) Hes.
Gesägtblättriger Rötling

Floccularia
straminea
(Kumm.) Pouz.
Schwefelgelber Schuppenritt.

Geastrum
fimbriatum
Fries
Gewimperter Erdstern

Gymnopus
confluens
(Pers.: Fr.) Kumm.
Knopfstieliger Rübling

Hebeloma
sinapizans
(Paul.: Fr.) Gill.
Rettich-Fälbling

Helvella
crispa
Fr.
Herbstlorchel

Helvella
macropus
(Per.: Fr.) Karsten
Langfuss-Lorchel

Hohenbuhelia
geogenia
(DC.: Fr.) Sing.
Trichterförmiger Muscheling

Hohenbuhelia
geogenia
(DC.: Fr.) Sing.
Trichterförmiger Muscheling

Humaria
hemisphaerica
(Weber: Fr.) Fuckel
Halbkugeliger Bolstenbecher

Pilz-Fundliste der Woche 41

Hypholoma
lateritium
(Schäff.: Fr.) Kumm.
Ziegelroter Schwefelkopf

Inocybe
fraudans
(Britz.) Sacc.
Birnen-Risspilz

Inocybe
fibrosa
(Sow.) Gill.
Grosser Faser-Risspilz

Inocybe
flocculosa
(Berk.) Sacc.
Flockiger Risspilz

Inocybe
fuscidula
Vel.
Braunstreifiger Risspilz

Inocybe
sindonia
(Fr.) Karst.
Wolligfädiger Risspilz

Inocybe
tenebrosa
Quélet
Schwarzfüssiger Risspilz

Inocybe
fraudans
(Britz.) Sacc.
Birnen-Risspilz

Inocybe
geophylla
(Sow.: Fr.) Kumm.
Erdblättriger Risspilz

Inocybe
whitei
(Berk .et Br.) Sacc.
Weissrosa Risspilz

Lactarius
aspideus
(Fr.: Fr.) Fr.
Blasser Violett-Milchling

Lactarius
quietus
(Fr.) Fr.
Eichenmilchling

Lactarius
blennius
(Fr.: Fr.) Fr.
Graugrüner Milchling

Lactarius
subumbonatus
Lindgren
Schwachnabeliger Milchling

Lepiota
ventriosospora
Reid
Gelbwolliger Schirmling

Lepista
irina
(Fr.) Big.
Veilchen-Rötelritterling

Lepista
glaucocana
(Bres.) Sing.
Blassblauer Rötelritterling

Marasmius
torquescens
Quél.
Ledergelber Schwindling

Marasmius
wynnei
Berk. & Br.
Violetlicher Schwindling

Mycena
pura
(Pers.: Fr.) Kumm.
Rettich-Helmling

Otidea
concinna
(Pers.: Fr.) Sacc.
Zitronengelber Öhrling

Otidea
cochleata
(L.: Fr.) Fuckel
Schnecken-Öhrling

Otidea
onotica
(Pers.: Fr.) Bonorden
Eselsohr

Panaeolus
semiovatus
(Sowerby.: Fr.) Quél.
Ring-Düngerling

Paxillus
filamentosus
Fr.
Erlen-Krempling

Phallus
impudicus
L. ex Pers.
Stinkmorchel

Psathyrella
conopilus
(Fr.: Fr.) Pears. & Dennis
Huthaarfaserling

Pycnoporus
cinnabarinus
(Jacq.: Fr.) Karst.
Zinnoberrote Tramete

Ramaria
flaccida
(Fr.) Bourd.
Flattrige Fichtenkoralle

Russula
firmula
Schäffer
Scharfer Glanz-Täubling

Stropharia
coronilla
(Bull.: Fr.) Quél.
Krönchenträuschling

Stropharia
caerulea
Kreisel
Blauer Träuschling

Suillus
granulatus
(L.: Fr.) Rouss.
Körnchenröhrling

Tricholoma
lascivum
(Fr.) Gill. ss. Lge.
Unverschämter Ritterling

Tricholoma
lascivum
(Fr.) Gill. ss. Lge.
Unverschämter Ritterling

Tricholoma
bufonium
(Pers.: Fr.) Kumm.
Purpurbrauner Schwefel-Rit-
terling

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils am Bestimmungsabend am Montag aufliegen. Es wird sich um solche handeln, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich werden wir auch Mikroaufnahmen einflechten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) sind auf dieser HP zu finden.

Fundliste

Coprinus picaceus

Specht-Tintling

Pilze der Woche 42

Hygrocybe punicea *Granatroter Saftling*

Standort: Wiese.
Fruchtkörper: bis 12 cm.
Mikromerkmale: Sporen 10 x 5 µm.
Bemerkungen: Nebst der Farbe ist seine Grösse das eindeutigste Unterscheidungsmerkmal zu anderen Saftlingen.

Cortinarius flavovirens *Gelbgrüner Klumpfuss*

Standort: Laubwälder.
Fruchtkörper: Hut bis 10 cm.
Mikromerkmale: Sporen 10 x 5,5 µm, mandelförmig, mittelmässig warzig.
Bemerkungen: Innerhalb der Sektion Orichalcei hat er keine rote, sondern eine bräunliche KOH-Reaktion. Er unterscheidet sich durch honig- bis apfelartigen Geruch nach Anschnitt, und der Geschmack ist stark mehlartig.

Cortinarius elegantissimus *Prächtiger Klumpfuss*

Standort: Laubwald.
Fruchtkörper: bis 11 cm.
Mikromerkmale: Sporen 13 x 9, zitronenförmig, stark warzig
Bemerkungen: Der «Prächtige Klumpfuss» zeichnet sich aus durch die grüngelbe Farbe des Hutes, die schliesslich von der Mitte ausgehend bei zunehmendem Alter rotbraun verfärbt. Die KOH-Reaktion ist dunkelrot.

Cortinarius alboviolaceus *Weissvioletter Dickfuss*

Standort: Laub- und Nadelwälder.
Fruchtkörper: bis 7 cm.
Mikromerkmale: Sporen 9 x 5,5 µm, schwach warzig.
Bemerkungen: Er unterscheidet sich von anderen Dickfüssen der Sektion Alboviolacei ohne besonderen Geruch, durch schwach ornamentierte und mit kleinem Q-Wert versehenen Sporen. Er hat keine echten Zystiden.

Inocybe margaritispora *Graubeigeblättriger Risspilz*

Standort: Laub- und Nadelwald.
Fruchtkörper: bis 5 cm.
Mikromerkmale: Sporen 9 x 7 µm, höckerig
Bemerkungen: Die im Alter stegartig aufbrechenden Hutschüppchen, die Caulozystiden über den ganzen Stiel sowie die dickbauchigen, metuloiden Zystiden zeichnen diesen Risspilz aus.

Hygrocybe punicea *Granatroter Saftling*

Cortinarius flavovirens Gelbgrüner Klumpfuss

Cortinarius elegantissimus *Prächtiger Klumpfuss*

Cortinarius alboviolaceus *Weissvioletter Dickfuss*

Inocybe margaritispora *Graubeigeblättriger Risspilz*

Pilz-Fundliste der Woche 42

Agaricus
silvicola
(Vittad.) Sacc.
Dünnfleischiger Anis-Egerling

Amanita
junquillea
Quélet
Narzissengelber Wulstling

Amanita
rubescens
(Pers.: Fr.) Gray
Perlpilz

Boletus
aestivalis
(Paul.) Fr.
Sommersteinpilz

Boletus
rhodoxantus
(Kromb.) Kall.
Blasshütiger Purpurröhrling

Calocybe
chrysenteron
(Bull.: Fr.) Sing.: Bon
Dottergelber Schönkopf

Cantharellus
melanoxeros
Desm.
Gelbvioletter Pfifferling

Catathelasma
imperiale
(Fr.) Sing.
Wurzelmöhrling

Clavariadelphus
pistilaris
(Fr.) Donk
Herkuleskeule

Clitocybe
nebularis
(Batsch. Fries) Kummer
Nebelgrauer Trichterling

Clitocybe
geotropa
(DC. & Lam) Quél.
Mönchskopf

Clitopilus
prunulus
(Scop.: Fr.) Kumm.
Mehlräsling

Coprinus
comatus
(Müll.: Fr.) Pers.
Schopf-Tintling

Cordyceps
militaris
(L. ex St. Amans) Link
Orangegelbe Puppenkernk.

Cortinarius
calochrous
Fr.
Amethystblättriger Klumpfuss

Cortinarius
olidus
Lge.
Gelbgegürtelter Schleimkopf

Cortinarius
flavovirens
Hry
Gelbgrüner Klumpfuss

Cortinarius
brunneofulvus
Fr.
Fuchsigbrauner Gürtelfuss

Cortinarius
infractus
(Pers.: Fr.) Fr.
Bitterer Schleimfuss

Cortinarius
olidus
Lge.
Gelbgegürtelter Schleimkopf

Cortinarius
anomalus
(Fr.: Fr.) Fr.
Braunvioletter Dickfuss

Cortinarius
elegantissimus
Hry.
Prächtiger Klumpfuss

Cortinarius
caerulescens
(Schäff.) Fr.
Blauer Klumpfuss

Cortinarius
vernus
Lind. & Melot
Frühlings-Wasserkopf

Cortinarius
anserinus
(Vel.) Hry.
Buchen-Klumpfuss

Cortinarius
cinnamomeus
Fr.
Zimt-Hautkopf

Cortinarius
multiformis
Fr.
Sägeblättriger Klumpfuss

Cortinarius
nemorensis
(Fr.) Lge.
Verfärbender Schleimkopf

Cortinarius
bivelus
(Fr.: Fr.) Fr.
Birken-Gürtelfuss

Cortinarius
spilomeus
(Fr.: Fr.) Fr.
Kupferschuppiger Dickfuss

Crepidotus
cesatii
(Rabh.) Saccardo
Kugelsporiges Stummelf.

Cystoderma
amiantinum
(Scop.: Fr.) Fayod
Amiant-Körnchenschirmling

Entoloma
dichroum
(Per.: Fr.) Kummer
Blaustieliger Zärtling

Gomphidius
roseus
(Schäff.: Fr.) Karsten
Rosaroter Schmierling

Gymnopus
erytropus
(Pers.: Fr.) Kumm.
Rotstieliger Rübling

Hebeloma
sinapizans
(Paul.: Fr.) Gill.
Rettich-Fälbling

Hebeloma
radicosum
(Bull.: Fr.) Rick.
Würzelnder Fälbling

Hebeloma
sinapizans
(Paul.: Fr.) Gill.
Rettich-Fälbling

Helvella
elastica
(Bull. ex St. Aman) Boud.
Elastische Lorchel

Helvella
crispa
Fr.
Herbstlorchel



Pilz-Fundliste der Woche 42

Helvella
elastica
(Bull. ex St. Aman) Boud.
Elastische Lorchel

Hygrocybe
punicea
(Fr.) Kumm.
Grösster Saftling

Hygrocybe
pratensis
(Pers.: Fr.) Donk.
Wiesen-Ellerling

Hygrocybe
virginea
(Wulfen: Fr.) Orton et Watling
Jungfern-Ellerling

Inocybe
fibrosa
(Sow.) Gill.
Grosser Faser-Risspilz

Inocybe
rimosa
(Bull.: r:) Kummer
Kegeliger Risspilz

Inocybe
margaritispora
(Bark. ap. Ck.) Sacc.
Graubeigeblättriger Risspilz

Inocybe
griseolilacina
Lge.
Grauvioletter Risspilz

Inocybe
pusio
Karst.
Radialrissiger Risspilz

Ischnoderma
benzoinum
(Wahl.: Fr.) Karst.
Schwarzgeb. Harzporling

Lactarius
blennius
(Fr.: Fr.) Fr.
Graugrüner Milchling

Lactarius
deliciosus
(L.): Fr.) Gray
Edelreizker

Lactarius
pterosporus
Romagnesi
Flügelsporiger Milchling

Lactarius
cremor
Fr.
Runzliger Zwergmilchling

Lactarius
deterrimus
Gröger
Fichtenreizker

Langermannia
gigantea
(Batsch: Pers.) Rostk.
Riesenbovist

Leccinum
scabrum
(Bull.: Fr.) Gray
Birkenpilz

Lepiota
felina
(Pers.: Fr.) Karst.
Katzen-Schirmling

Lepiota
fulvella
Rea
Fuchsbräunlicher Schirmling

Lepista
inversa
(Scop.: Fr.) Pat.
Fuchsiger Rötelritterling

Lepista
sortdida var. lilacea
(Quél.) Bon.
Lilabrauner Rötelritterling

Lycoperdon
perlatum
Pers.: Pers.
Flaschen-Stäubling

Lyophyllum
connatum
(Schum.: Fr.) Sing.
Weisser Büschelrasling

Macrolepiota
excoriata
Schäff.: Fr.) Wass.
Ackerschirmling

Macrolepiota
konradii
(Huijs. ex Orta.) Mos.
Sternsch. Riesenschirmling

Marasmius
oreades
(Bolton.: Fr.) Fr.
Nelkenschwindling

Marasmius
bulliardi
Quél.
Nadelstreu-Käsepilzchen

Marasmius
epiphyllus
(Pers.: Fr.) Fr.
Aderblättriger Schwindling

Mycena
galericulata
(Scop.:Fr.) Gray
Rosablättriger Helmling

Otidea
alutacea
(Pers.) Massee
Lederbrauner Öhrling

Panellus
stypticus
(Bull.: Fr.) P.Karst.
Bitterer Muschelseitling

Peziza
succuosa
Berk.
Gelbmilchender Becherling

Pholiota
graminis
(Quél.) Sing.
Gras-Schüppling

Pluteus
granulatus
Bres.
Verschiedenfarbiger Dachpilz

Psathyrella
piluliformis
(Bull.: Fr.) Ort.
Wässeriger Faserling

Psilocybe
semilanceata
(Fr.) Kumm.
Spitzkegeliger Kahlkopf

Russula
cyanoxantha
(Schäff.) Fr.
Frauentäubling

Russula
galochroa
(Fr.) Fr.
Elfenbeintäubling

Russula
atropurpurea
(Krombh.) Britz.
Pupurschwarzer Täubling

Russula
graveolens
Romell
Fleisschvioletter Heringst.



Pilz-Fundliste der Woche 42

Russula
mustelina
Fr.
Wieseltäubling

Stropharia
aeruginosa
(Curtis:) Fr./Quél.
Grünspansträuschling

Suillus
granulatus
(L.: Fr.) Rouss.
Körnchenröhrling

Suillus
bovinus
(L.: Fr.) Rouss.
Kuhröhrling

Telephora
palmata
Scop.: Fr.
Stinkender Warzenpilz

Tricholoma
sulfurescens
Bres.
Gelbweisser Ritterling

Tricholoma
imbricatum
(Fr.: Fr.) Kumm.
Feinschuppiger Ritterling

Tylopilus
felleus
(Bull.: Fr.) Karst.
Gallenröhrling

Tylospora
fibrillosa
(Burt) Donk
Faseriger Wurzelsporling

Volvariella
gloiocephala
(DC.: Fr.) Boek. & End.
Grosser Scheidling

Xerocomus
chrysenteron
(Bull.) Quel.
Rotfuss-Röhrling

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils am Bestimmungsabend am Montag aufliegen. Es wird sich um solche handeln, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich werden wir auch Mikroaufnahmen einflechten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) sind auf dieser HP zu finden.

Fundliste

Inocybe pusio *Radialrissiger Risspilz*

Ein Risspilz mit bläulichem Stiel, glatten Sporen und Caulozystiden im oberen Stieldrittel. Im Gegensatz zu I. amethystea ist der Stiel meistens in ganzer Länge bläulich überhaucht.

Pilze der Woche 43

Cortinarius saporatus *Breitknolliger Klumpfuss*

Standort:	Laubwald.
Fruchtkörper:	bis 12 cm.
Mikromerkmale:	Sporen 11 x 6,5 µm, zitronenförmig, stark warzig.
Bemerkungen:	Ein Schleierling mit Honiggeruch. Er unterscheidet sich von C. multiformis durch eine grosse Stielknolle, die am Rand mit einer ockerbraunen Velumzone geschmückt ist. Die Sp. von C. muliformis sind mandelförmig und schwach warzig.

Cortinarius turgidus *Tonweisser Dickfuss*

Standort:	Laubwälder.
Fruchtkörper:	Hut bis 10 cm.
Mikromerkmale:	Sporen 8,5 x 5,5 µm, mandelförmig, schwach warzig.
Bemerkungen:	z.T. ist die Stielbasis verjüngt, wurzelnd und der Stiel ist mit weissem Velum gestiefelt. Die schwachwarzigen Sporen, die zylindrischen Marginalzellen, sowie das Vorkommen im Laubwald trennen ihn von C. malachius.

Lepiota felina *Schwarzschuppiger Schirmling*

Standort:	Nadel- und Laubwald.
Fruchtkörper:	bis 4 cm.
Mikromerkmale:	Sporen 7 x 3,5 µm, oval, fast zylindrisch.
Bemerkungen:	Ein Schirmling mit dunkel- bis schwarzbrauner Hut-Kappe und dunklen Schüppchen, auch am Ring und unter demselbigen.

Macrolepiota mastoidea *Zitzen-Riesenschirmpilz*

Standort:	Laub- und Nadelwälder.
Fruchtkörper:	bis 15 cm.
Mikromerkmale:	Sporen 14 x 9 µm.
Bemerkungen:	Ein Riesenschirmling mit Kalotte, zizenförmige Hutmitte und feinen Schüppchen auf Hut und Stiel. Dichte, Farbe und Anordung der Schüppchen unterscheiden ihn von anderen Riesenschirmlingen (z.B. M. rickenii).

Hebeloma radicosum *Wurzelnder Marzipan-Fälbling*

Standort:	Laubwald.
Fruchtkörper:	bis 20 cm.
Mikromerkmale:	Sporen 10 x 6 µm, schwach warzig, Zystiden etwas kopfig.
Bemerkungen:	Ein Fälbling (neu Myxocybe radicosa) mit Ring und ausgeprägtem Marzipangeruch.

Cortinarius saporatus *Breitknolliger Klumpfuss*

Cortinarius turgidus *Tonweisser Dickfuss*

Lepiota felina *Schwarzschuppiger Schirmling*

Macrolepiota mastoidea *Zitzen-Riesenschirmpilz*

Hebeloma radicosum *Wurzelnder Marzipan-Fälbling*

Pilz-Fundliste der Woche 43

Calocybe
obscurissima
(Pears.) Mos.
Düsterer Schönkopf

Cantharellus
tubaeformis
Fr.
Durchbohrter Leistling

Cantharellus
auroa
(Batsch) Kuyp.
Duftender Gabeling,

Cantharellus
melanoxeros
Desm.
Gelbvioletter Pfifferling

Clavulina
cristata
(Holmskj.: Fr.) Schröt.
Kammförmige Koralle

Cortinarius
saporatus
Britzelmayr
Breitknolliger Klumpfuss

Cortinarius
rufoolivaceus
(Pers.: Fr.)
Violettroter Klumpfuss

Cortinarius
malachius
(Fr.) Fr.
Lederbrauner Dickfuss

Cortinarius
ochroleucus
(Schäff.: Fr.) Fr.
Trockener Schleimfuss

Cortinarius
crassus
(Fr.)
Trockener Schleimkopf

Craterellus
cinereus
Pers.: Fries ss. Kühner et Rom.
Gelblichgraue Trompete

Craterellus
cornucopioides
Pers.
Totentrompete

Creolophus
cirrhatus
(Pers.: Fr.) Karst.
Dorniger Stachelbart

Gymnopilus
penetrans
(Pers.: Fr.) Murrill
Geflecktblättriger Flämmling

Gymnopus
peronata
(Bolt.: Fr.) Kumm.
Brennender Rübling

Gyromitra
Infula
(Schäff. ex Pers.) Quél.
Bischofsmütze

Helvella
confusa
Harmaja
Kleine Becherlorchel

Helvella
macropus
(Per.: Fr.) Karsten
Langfuss-Lorchel

Hydnum
albidum
Peck
Weisser Stoppelpilz

Hygrophorus
russula
(Schäff.: Fr.) Quél.
Geflecktbl. Purpurschneckling

Inocybe
pusio
Karst.
Radialrissiger Risspilz

Leccinum
carpini
(Schulz.) Mos. ex Reid
Hainbuchen-Rauhfuss

Lepiota
felina
(Pers.: Fr.) Karst.
Katzen-Schirmling

Lepiota
castanea
Quél. (inkl. L. ign. Locq. ex Bon
Kastanienbrauner Schirmling

Lepista
glaucocana
(Bres.) Sing.
Blassblauer Rötelritterling

Macrolepiota
mastoidea
(Fr.) Sing.
Zitzenschirmling

Marasmius
cohaerens
(Pers.: Fr.) Fr.
Hornstieliger Schwindling

Otidea
concinna
(Pers.: Fr.) Sacc.
Zitronengelber Öhrling

Psathyrella
piluliformis
(Bull.: Fr.) Ort.
Wässeriger Faserling

Pulveropoletus
gentilis
(Quél.) Sing.
Goldporiger Röhrling

Pycnoporus
cinnabarinus
(Jacq.: Fr.) Karst.
Zinnoberrote Tramete

Tricholoma
lascivum
(Fr.) Gill. ss. Lge.
Unverschämter Ritterling

Tricholoma
columbetta
(Fr.) Kumm.
Seidiger Ritterling

Tricholoma
scalpturatum
(Fr.) Quél.
Gilbender Erd-Ritterlig

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils am Bestimmungsabend am Montag aufliegen. Es wird sich um solche handeln, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich werden wir auch Mikroaufnahmen einflechten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) sind auf dieser HP zu finden.

Fundliste

Cortinarius croceocaeruleus
Safranblauer Schleimfuss

Er ist ein Vertreter im Laubwald der Sektion Ochroleuci (bittere Schleimfüsse) und trennt sich von anderen dieser Sektion durch bläuliche mit ocker durchsetzte Hutfarbe und dem spindelförmigen, wurzelnden Stiel. (Photo etwas verblasstes Expl.).

Pilze der Woche 44

Geastrum triplex *Halskrausen-Erdstern*

Standort: Mischwald.
Fruchtkörper: bis 10 cm.
Mikromerkmale: Sporen 5 µm, rund, mit Warzen.
Bemerkungen: Der Kragen, der durch Aufspalten der Exoperidie entsteht, umschliesst die Endoperidie.

Agaricus silvaticus *Kleiner Wald-Egerling*

Standort: Nadelwald.
Fruchtkörper: Hut bis 8 cm.
Mikromerkmale: Sporen 5 x 3,5 µm.
Bemerkungen: Er gehört zu den rötenden Arten der Gattung ohne besonderen Geruch und ist kleiner als die verwandten Arten, auch die Sporen sind kleiner.

Echinoderma perplexum
Ringloser Stachelschirmling

Standort: Nadelwald.
Fruchtkörper: bis 8 cm.
Mikromerkmale: Sporen 5,5 x 2,5 µm.
Bemerkungen: Ein Nadelwaldbegleiter und Doppelgänger von *E. asperum*, jedoch ohne Ring.

Lentaria mucida *Schmierige Byssuskeule*

Standort: An morschem, durchnässten und mit Algen bewachsenem Holz.
Fruchtkörper: bis 10 mm hoch.
Mikromerkmale: Sporen 6 x 2,5 µm, Hyphen mit Schnallen.
Bemerkungen: Typisch für diese Art ist das Vorkommen auf morschem und mit Algen bewachsenem Holz.

Hypomyces ochraceus *(Pustelpilz)*

Standort: meist auf faulenden Pilzen, (Täublinge, Milchlinge).
Fruchtkörper: Perithezien 0,3 mm.
Mikromerkmale: Sporen 27-40 x 6-7 µm, fein warzig.
Bemerkungen: Stroma spinnwebig, weiss oder ocker. Perithezien gelb oder rötlich.

Geastrum triplex *Halskrausen-Erdstern*

Agaricus silvaticus *Kleiner Wald-Egerling*

Echinoderma perplexum *Ringloser Stachelschirmling*

Lentaria mucida *Schmierige Byssuskeule*

Hypomyces ochraceus *(Pustelpilz)*



Hypomyces ochraceus

Stroma mit Perithezien

Pilz-Fundliste der Woche 44

Agaricus
silvaticus
Schäff.: Fr.
Echter Wald-Champignon

Agaricus
augustus
Fr.
Braunsch. Riesenegerling

Boletus
erythropus
(Fr.: Fr.) Pers.
Schusterpilz

Chroogomphus
rutilus
(Schäff.: Fr.) Millller
Kupferroter Gelbfuss

Clitocybe
nebularis
(Batsch. Fries) Kummer
Nebelgrauer Trichterling

Clitocybe
ditopus
(Fr.) Gill.
Mehltrichterling

Clitopilus
prunulus
(Scop.: Fr.) Kumm.
Mehlräsling

Cortinarius
elegantissimus
Hry.
Prächtiger Klumpfuss

Cortinarius
croceocaeruleus
(Pers.: Fr.) Fr.
Safranblauer Schleimfuss

Cortinarius
turgidus
Fr.
Tonweisser Dickfuss

Cortinarius
sciophyllus
Fr.
Bläulichberifter Wasserkopf

Cortinarius
glaucopus
(Schäff.: Fr.)
Reihiger Klumpfuss

Craterellus
cornucopioides
Pers.
Totentrompete

Echinoderma
grangei
(Eyre) Kühn.
Grünspan-Schirmling

Echinoderma
asperum
(Pers.) Bon
Spitzschuppiger Schirmling

Echinoderma
perplexum
(Knudsen) Bon
Ringloser Stachelschirmling

Geastrum
triplex
Jungh.
Halskrausen-Erdstern

Gymnopus
peronata
(Bolt.: Fr.) Kumm.
Brennender Rübling

Hebeloma
truncatum
(Fr.) Kumm.
Kakao-Fälbling

Hebeloma
sordescens
Vesterholt
Schwarzknolliger Fälbling

Helvella
crispa
Fr.
Herbstlorchel

Hydnum
repandum
L.: Fr.
Semmel-Stoppelpilz

Hygrocybe
obrussea
(Fr.: Fr.) Wünsche
Schnürsporiger Saftling

Hygrophorus
russula
(Schäff.: Fr.) Quél.
Geflecktbl. Purpurschneckling

Hygrophorus
eburneus
(Bull.: Fr.) Fr.
Elfenbein-Schneckling

Hygrophorus
penarius
Fr.
Trockener Schneckling

Inocybe
cookei
Bres.
Knolliger Risspilz

Inocybe
dulcamara
(Albert. et Schw.: Pers. Kumm.
Bittersüsser Risspilz

Lactarius
blennius
(Fr.: Fr.) Fr.
Graugrüner Milchling

Lactarius
aspideus
(Fr.: Fr.) Fr.
Blasser Violett-Milchling

Lactarius
pallidus
(Pers.: Fr.) Fr.
Falber Milchling

Lepista
irina
(Fr.) Big.
Veilchen-Rötelritterling

Lepista
glaucocana
(Bres.) Sing.
Blassblauer Rötelritterling

Limacella
guttata
(Fr.) Konr. et Maubl.
Getropfter Schleimschirmling

Macrolepiota
mastoidea
(Fr.) Sing.
Zitzenschirmling

Marasmius
wynnei
Berk. & Br.
Violetlicher Schwindling

Mycena
crocata
(Schrad.: Fr.) Kumm.
Safranmilchender Helmling

Mycena
renati
Quel.
Gelbstieliger Nitrat-Helmling

Mycena
rosea
(Bull.) Gramberg
Rosa-Rettichhelmling

Mycena
pelianthina
(Fr.: Fr.) Quél.
Schwarzgezähnelter Helmling



Pilz-Fundliste der Woche 44

Otidea
alutacea
(Pers.) Massee
Lederbrauner Öhrling

Peziza
succuosa
Berk.
Gelbmilchender Becherling

Pseudocraterellus
sinuosus
(Fr.: Fr.) Reid.
Krauser Leistling

Russula
mairei
Singer
Buchen-Speitäubling

Russula
fellea
(Fr.: Fr.) Fr.
Gallentäubling

Russula
lepida
Fr.
Harter Zinnobertäubling

Tricholoma
ustale
(Fr.: Fr.) Kumm.
Brandiger Ritterling

Tricholoma
terreum
(Schäff.: Fr.) Kumm.
Erd-Ritterling

Tricholoma
sulfurescens
Bres.
Gelbweisser Ritterling

Tricholoma
scalpturatum
(Fr.) Quél.
Gilbender Erd-Ritterlig

Xylaria
polymorpha
(Pers. ex Mér.) Grev.
Vielgestaltige Holzkeule

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils am Bestimmungsabend am Montag aufliegen. Es wird sich um solche handeln, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich werden wir auch Mikroaufnahmen einflechten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) sind auf dieser HP zu finden.

Fundliste

Cortinarius obtusus *Jodoform Wasserkopf*

Eine Telamonia im Nadelwald, dessen Geruch an R. amethystina erinnert. Das weisse Velum (wird nicht von allen Autoren gleich bezeichnet) bekleidet den Stiel und jung auch den Hutrand. Er unterscheidet sich zu C. fasciatus durch etwas kleinere Sporen und den Geruch. Die Marginalzellen werden auch unterschiedlich interpretiert, bei diesem Pilz waren es zylindrische.

Pilze der Woche 45

Galerina marginata *Gift-Häubling*

Standort: Nadelholz.
Fruchtkörper: bis 25 mm.
Mikromerkmale: Sporen 9 x 6 µm, warzig, mit Plage, dextrionid.
Bemerkungen: Der weisslich überfaserte Stiel, der Geruch und in den meisten Fällen das nicht büschelige Vorkommen unterscheiden ihn vom Stockschwämmchen.

Galerina sideroides *Glimmerstieliger Häubling*

Standort: Auf Nadelholz.
Fruchtkörper: Hut bis 30 mm.
Mikromerkmale: Sporen 7 x 4 µm, kaum warzig, dextrionid. Zystiden kopfig.
Bemerkungen: Ein Häubling auf Holz mit speckig-fettigem Hut, ohne Ring. Weitere Unterscheidungsmerkmale zu anderen Häublingen sind die kaum warzigen Sporen.

Clitocybula lacerata *Fransiger Faserrübling*

Standort: Nadelholz
Fruchtkörper: bis 4 cm.
Mikromerkmale: Sporen 5,5 x 5 µm, rudlich, amyloid
Bemerkungen: Das Vorkommen auf Holz, der zähe Stiel und der radialfaserige Hut sind die wichtigsten Bestimmungsfaktoren.

Hygrophorus nemoreus *Hain-Schneckling*

Standort: In Laubwäldern.
Fruchtkörper: bis 10 cm.
Mikromerkmale: Sporen 7 x 4 µm.
Bemerkungen: Ein Schneckling im Laubwald (Eiche) mit trockenem Hut und etwas mehlig riechend. Sein nächster Verwandter ist C. arbustivus mit jung weissen Lamellen.

Lactarius blennius *Graugrüner Milchling*

Standort: Bauchenwälder.
Fruchtkörper: bis 80 mm.
Mikromerkmale: Sporen 7 x 5,5 µm, mit Rippen und Warzen.
Bemerkungen: Bei uns ein häufiger, scharfer, meistens grosser Milchling mit weisslichen Lamellen und weisser Milch, die beim Eintrocknen etwas grünt. Der ähnliche L. fluens wird neu als Varietät bezeichnet. Er unterscheidet sich hauptsächlich durch helleren Hutrand, Hut mehr trichterförmig und etwas dünnfleischiger.

Galerina marginata *Gift-Häubling*

Galerina sideroides *Glimmerstieliger Häubling*

Clitocybula lacerata *Fransiger Faserrübling*

Hygrophorus nemoreus *Hain-Schneckling*

Lactarius blennius *Graugrüner Milchling*

Pilz-Fundliste der Woche 45

Agaricus
silvaticus
Schäff.: Fr.
Echter Wald-Champignon

Agaricus
augustus
Fr.
Braunschuppiger Riesenegerl.

Amanita
rubescens
(Pers.: Fr.) Gray
Perlpilz

Amanita
vaginata
(Bull.) Vitt.
Grauer Scheidenstreifling

Amanita
rubescens
(Pers.: Fr.) Gray
Perlpilz

Armillaria
ostoyae
Romagn.
Dunkler Hallimasch

Boletus
erythropus
(Fr.: Fr.) Pers.
Schusterpilz

Chamaemyces
fracidus
(Fr.) Donk
Fleckender Schmierschirml.

Chroogomphus
rutilus
(Schäff.: Fr.) Milller
Kupferroter Gelbfuss

Clavaria
falcata
Pers.: Fr.
Weisses Spitzkeulchen

Clavariadelphus
truncatus
(Quél.) Donk
Abgestutzte Herkuleskeule

Clavulina
cristata
(Holmskj.: Fr.) Schröt.
Kammförmige Koralle

Clavulina
cinereus
(Bull.: Fr.) Schröt.
Graue Koralle

Clavulina
rugosa
(Bull.: Fr.) Schröt.
Runzlige Koralle

Clavulinopsis
helvola
(Pers.: Fr.) Corn.
Goldgelbe Wiesenkeule

Clitocybe
nebularis
(Batsch. Fries) Kummer
Nebelgrauer Trichterling

Clitocybe
ditopus
(Fr.) Gill.
Mehltrichterling

Clitocybe
cerussata
(Fries) P. Kummer
Ähnlich Waldfreund Trichterl.

Clitocybe
georgiana
Clem.
Moderigriechender Trichterl.

Clitocybe
nebularis
(Batsch. Fries) Kummer
Nebelgrauer Trichterling

Clitocybe
fragrans
(With.) Kumm.
Dufttrichterling

Clitocybe
geotropa
(DC. & Lam) Quél.
Mönchskopf

Clitocybula
lacerata
(Scopoli) Métrod
Fransiger Faserrübling

Clitopilus
prunulus
(Scop.: Fr.) Kumm.
Mehlräsling

Coprinus
atramentarius
(Bull.:Fr.) Fr.
Falten-Tintling

Cortinarius
elegantissimus
Hry.
Prächtiger Klumpfuss

Cortinarius
croceocaeruleus
(Pers.: Fr.) Fr.
Safranblauer Schleimfuss

Cortinarius
turgidus
Fr.
Tonweisser Dickfuss

Cortinarius
sciophyllus
Fr.
Bläulichberifter Wasserkopf

Cortinarius
glaucopus
(Schäff.: Fr.)
Reihiger Klumpfuss

Cortinarius
umbrinolens
Orton
Tiefdunkler Wasserkopf

Cortinarius
obtusus
(Fr.) Fr. non ss. Hry
Jodoform-Wasserkopf

Cortinarius
anomalus
(Fr.: Fr.) Fr.
Braunvioletter Dickfuss

Cortinarius
cagei
Melot
Zweifarbiger Wasserkopf

Cortinarius
hinnuleus
(Sow.) Fr.
Erdigriechender Gürtelfuss

Cortinarius
fulvoochrascens
Henry
Cyanblättriger Klumpfuss

Cortinarius
torvus
(Bull.: Fr.) Fr.
Wohlriechender Gürtelfuss

Cortinarius
violaceus
(L.:Fr.) Fr.
Dunkelvioletter Schleierling

Craterellus
cornucopioides
Pers.
Totentrompete

Echinoderma
grangei
(Eyre) Kühn.
Grünspan-Schirmling



Pilz-Fundliste der Woche 45

Echinoderma
asperum
(Pers.) Bon
Spitzschuppiger Schirmling

Echinoderma
pseudoasperulum aff.
Knudsen
Feinstacheliger Schirmling

Galerina
sideroides
(Fr.)Kühn.
Glimmerstieliger Häubling

Galerina
marginata
(Batsch) Kühn.
Gifthäubling

Geastrum
triplex
Jungh.
Halskrausen-Erdstern

Gymnopilus
penetrans
(Pers.: Fr.) Murrill
Geflecktblättriger Flämmling

Gymnopus
peronata
(Bolt.: Fr.) Kumm.
Brennender Rübling

Gymnopus
buthyracea var. asema
(Fr.: Fr.) Quél.
Horngrauer Butterrübling

Hebeloma
truncatum
(Fr.) Kumm.
Kakao-Fälbling

Hebeloma
sordescens
Vesterholt
Schwarzknolliger Fälbling

Hebeloma
anthracophilum
Mr.
Kohlen-Fälbling

Hebeloma
radicosum
(Bull.: Fr.) Rick.
Würzelnder Fälbling

Hellvella
elastica
Bulliard: Fr.
Elastische Lorchel

Helvella
crispa
Fr.
Herbstlorchel

Helvella
macropus
(Per.: Fr.) Karsten
Langfuss-Lorchel

Helvella
latispora
Boudier
Blassgraue Lorchel

Hydnum
repandum
L.: Fr.
Semmel-Stoppelpilz

Hygrocybe
obrussea
(Fr.: Fr.) Wünsche
Schnürsporiger Saftling

Hygrocybe
virginea
(Wulfen: Fr.) Orton et Watling
Jungfern-Ellerling

Hygrophorus
russula
(Schäff.: Fr.) Quél.
Geflecktblättriger Purpurschn.

Hygrophorus
eburneus
(Bull.: Fr.) Fr.
Elfenbein-Schneckling

Hygrophorus
penarius
Fr.
Trockener Schneckling

Hygrophorus
nemoreus
(Pers.: Fr.) Fr.
Hain-Schneckling

Hygrophorus
eburneus
(Bull.: Fr.) Fr.
Elfenbein-Schneckling

Hygrophorus
pudorinus
(Fr.) Fr.
Orange-Schneckling

Hygrophorus
pustulatus
(Fr.) Fr.
Schwarzpunktierter Schneckl.

Hypholoma
lateritium
(Schäff.: Fr.) Kumm.
Ziegelroter Schwefelkopf

Hypholoma
capnoides
(Fr.:Fr.) P. Kumm.
Rauchblättriger Schwefelkopf

Inocybe
cookei
Bres.
Knolliger Risspilz

Inocybe
dulcamara
(Albert. et Schw.: Pers. Kumm.
Bittersüsser Risspilz

Inocybe
assimilata
(Britz.) Sacc.
Rundknolliger Risspilz

Ischnoderma
benzoinum
(Wahl.: Fr.) Karst.
Schwarzgebänderter Harzporl.

Kuehneromyces
mutabilis
(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.
Gemeines Stockschw.

Lactarius
blennius
(Fr.: Fr.) Fr.
Graugrüner Milchling

Lactarius
aspideus
(Fr.: Fr.) Fr.
Blasser Violett-Milchling

Lactarius
pallidus
(Pers.: Fr.) Fr.
Falber Milchling

Lactarius
glyciosmus
(Fr.: Fr.) Fr.
Blasser Duftmilchling

Lactarius
pterosporus
Romagnesi
Flügelsporiger Milchling

Lactarius
pubescens
(Schrad.) Fries
Flaumiger Milchling

Lactarius
vellerus
(Fr.) Fr.
Wolliger Milchling

Pilz-Fundliste der Woche 45

Lentinus
adhaerens
(Alb. et Schw.: Fr.) Fr.
Harziger Sägeblättling

Lepiota
clypeolaria
(Bull.: Fr.) Kumm.
Wolliggestiefelter Schirmling

Lepista
irina
(Fr.) Big.
Veilchen-Rötelritterling

Lepista
glaucocana
(Bres.) Sing.
Blassblauer Rötelritterling

Lepista
nuda
(Bull.: Fr.) Cooke
Violetter Rötelritterling

Lepista
personata
(Fr.: Fr.) Cke.
Lilastiel-Rötelritterling

Limacella
guttata
(Fr.) Konr. et Maubl.
Getropfter Schleimschirmling

Lyophyllum
fumosum
(Pers.: Fr.) Ort.
Hellbrauner Büschelrasling

Lyophyllum
loricatum
(Fr.) Kühn.
Gepanzerter Rasling

Macrolepiota
mastoidea
(Fr.) Sing.
Zitzenschirmling

Macrolepiota
procera
(Scop.: Fr. Sg.
Parasol

Marasmius
wynnei
Berk. & Br.
Violetlicher Schwindling

Merulius
tremellosus
Fr.
Gallertfleischiger Fältling

Mycena
crocata
(Schrad.: Fr.) Kumm.
Safranmilchender Helmling

Mycena
renati
Quel.
Gelbstieliger Nitrat-Helmling

Mycena
rosea
(Bull.) Gramberg
Rosa-Rettichhelmling

Mycena
pelianthina
(Fr.: Fr.) Quél.
Schwarzgezähnelter Helmling

Mycena
zephirus
(Fr.: Fr.) Kumm.
Rostfleckiger Helmling

Mycena
flavoalba
(Fr.) Quél.
Zitronengelber Helmling

Naucoria
amerescens
(Quel.) Rom.
Bitterer Erlenschnitzling

Oligoporus
stipticus
(Pers.: Fr.) Gilb. & Ryv.
Bitterer Saftporling

Otidea
alutacea
(Pers.) Massee
Lederbrauner Öhrling

Peziza
succuosa
Berk.
Gelbmilchender Becherling

Pluteus
cervinus
(Schäff.) P. Kumm.
Rehbrauner Dachpilz

Pluteus
salicinus
(Pers.: Fr.) Kumm.
Grauer Dachpilz

Psathyrella
piluliformis
(Bull.: Fr.) Ort.
Wässeriger Faserling

Pseudocraterellus
sinuosus
(Fr.: Fr.) Reid.
Krauser Leistling

Pycnoporellus
fulgens
(Fr.) Donk
Leuchtender Weichporling

Russula
mairei
Singer
Buchen-Speitäubling

Russula
fellea
(Fr.: Fr.) Fr.
Gallentäubling

Russula
lepida
Fr.
Harter Zinnobertäubling

Russula
ochroleuca
(Pers.: Fr.)
Ockertäubling

Russula
velutipes
Velenovsky
Rosa-Täubling

Russula
atropurpurea
(Krombh.) Britz.
Pupurschwarzer Täubling

Stropharia
caerulea
Kreisel
Blauer Träuschling

Suillus
tridentinus
(Bresad.) Singer
Rostroter Lärchenröhrling

Tarzetta catinus
(Holmsk. ex Fr.) Korf & J.K. Rogers, ss. Dennis
Tigelförmiger Kelchbecherling

Tricholoma
ustale
(Fr.: Fr.) Kumm.
Brandiger Ritterling

Tricholoma
terreum
(Schäff.: Fr.) Kumm.
Erd-Ritterling

Tricholoma
sulfurescens
Bres.
Gelbweisser Ritterling

Pilz-Fundliste der Woche 45

Tricholoma
scalpturatum
(Fr.) Quél.
Gilbender Erd-Ritterlig

Tricholoma
fulvum
(DC.: Fr.) Sacc.
Gelbblättriger Ritterling

Tricholoma
bresadolanum (Belgien)
Clémençon
Bitterer Buchen-Ritterling

Tricholoma
bufonium
(Pers.: Fr.) Kumm.
Purpurbrauner Schwefel-Ritt.

Tricholoma
luridum
(Schäff.: Fr.) Quél.
Graublättriger Ritterling

Tricholoma
orirubens
Quél.
Rötender Ritterling

Tricholoma
tigrinum
Kumm.
Tiger-Ritterlin

Tricholoma
portensosum
(Fr.) Quél.
Schwarzfaseriger Ritterling

Tricholoma
sejunctum
(Sow.: Fr.) Quél.
Grüngelber Ritterling

Xerocomus
chrysenteron
(Bull.) Quel.
Rotfuss-Röhrling

Xylaria
polymorpha
(Pers. ex Mér.) Grev.
Vielgestaltige Holzkeule

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils am Bestimmungsabend am Montag aufliegen. Es wird sich um solche handeln, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich werden wir auch Mikroaufnahmen einflechten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) sind auf dieser HP zu finden.

Fundliste

Mycena polygramma *Rillstieliger Helmling*

Er ist ein Bewohner in Laub- und Nadelwälder, vorallem auf Strünken. Ein ziemlich grosser Helmling mit weissen oder grauen Lamellen (Alter), glatten, spindeligen oder bauchigen Zystiden, die Sporen messen 9 x 6 µm. Der Stiel ist nur manchmal rillig. Der Hut ist bis weit zur Mitte hin gerieft.

Pilze der Woche 46

Inocybe hirtella var. bisp. *Bittermandel-Risspilz*

Standort: Laubwald.
Fruchtkörper: bis 40 mm.
Mikromerkmale: Sporen 9 x 5,5, elliptisch.
Bemerkungen: Ein hellhütiger, nicht schuppiger Risspilz und über den ganzen Stiel mit Zystiden versehen. Hauptmerkmal sind die zweisporigen Basidien.

Hebeloma truncatum *Kakaofälbling*

Standort: Laub- und Nadelwald.
Fruchtkörper: Hut bis 70 mm.
Mikromerkmale: Sporen 9 x 5,5 µm, schwach warzig, ohne ablösbaren Perispor.
Bemerkungen: Er gehört nicht zu den Fälblingen, die auf den Lamellen braun flecken. Er hat auch keinen auffälligen Geruch. Die Farbe verdunkelt sich beim altern.

Tuber aestivum *Sommer-Trüffel*

Standort: Unterirdisch in Laubwälder.
Fruchtkörper: bis 10 cm.
Mikromerkmale: Sporen 25 bis 50 x 17 bis 37 µm. Asci 2 bis 5 sporig.
Bemerkungen: Nebst der grob warzigen, schwarzen Peridie sind die Sporen mit weitmaschigem Netz und die Venae externae die wichtigsten Erkennungsmerkmale. Unterscheidungsmerkmale sind die kleineren Sporen, basal ohne tiefe Grube sowie der angenehme, nicht zwiebelartige Geruch, wie ihn T. macrosporus hat.

Rhodocybe gemina *Würziger Tellerling*

Standort: Nadelwald.
Fruchtkörper: bis 10 cm.
Mikromerkmale: Sporen 6 x 4 µm, etwas uneben bis kantig.
Bemerkungen: Ein stattlicher, fleischiger Pilz mit schwach bis stark herablaufenden Lamellen und mit einem gewürzigen Geruch.

Psathyrella prona *Wegrand-Mürbling*

Standort: Inner- und ausserhalb von Wäldern, Wegränder.
Fruchtkörper: bis 20 mm.
Mikromerkmale: Sporen 12 x 6,5 µm, mit Porus.
Bemerkungen: Ein Mürbling, der farblich variiert (mehrere Varietäten). Ein gutes Merkmal ist die Kombination spindelige bis bauchige Cheilo- und Pleurozystiden und die fast zylindrischen Sporen.

Inocybe hirtella var. bisporum *Bittermandel-Risspilz*

Hebeloma truncatum *Kakaofälbling*

Tuber aestivum *Sommer-Trüffel*

Rhodocybe gemina *Würziger Tellerling*

Psathyrella prona *Wegrand-Mürbling*

Pilz-Fundliste der Woche 46

Agaricus
macrosporus
(Möll. & Schäff.) Pilát
Grosssporiger Anischampignion

Armillaria
mellea
(Val.: Fr.) Kummer
Honiggelber Hallimasch

Chroogomphus
rutilus
(Schäff.: Fr.) Millller
Kupferroter Gelbfuss

Clitocybe
nebularis
(Batsch. Fries) Kummer
Nebelgrauer Trichterling

Clitocybe
cerussata
(Fries) P. Kummer
Ähnlich Waldfreund Trichter.

Clitocybe
geotropa
(DC. & Lam) Quél.
Mönchskopf

Clitocybe
nebularis
(Batsch. Fries) Kummer
Nebelgrauer Trichterling

Clitopilus
prunulus
(Scop.: Fr.) Kumm.
Mehlräsling

Coltricia
perennis
(L.: Fr.) Murrill
Brauner Dauerporling

Cortinarius
saturninus
Fr.
Blaufleischiger Gürtelfuss

Cortinarius
dionysae
Hry.
Mehligriechender Klumpfuss

Echinoderma
asperum
(Pers.) Bon
Spitzschuppiger Schirmling

Galerina
marginata
(Batsch) Kühn.
Gifthäubling

Galerina
marginata
(Batsch) Kühn.
Gifthäubling

Gloeophyllum
abietinum
Fr. ex Fr.
Tannenblättling

Gloeophyllum
trabeum
(Pers.: Fr.) Murr.
Balken-Blättling

Gymnopilus
penetrans
(Pers.: Fr.) Murrill
Geflecktblättriger Flämmling

Gymnopus
confluens
(Pers.: Fr.) Kumm.
Knopfstieliger Rübling

Hebeloma
truncatum
(Fr.) Kumm.
Kakao-Fälbling

Hydropus
paradoxus ?
Moser
Drehstielwasserfuss

Hygrophorus
discoideus
(Pers.: Fr.) Fr.
Braunscheibiger Schneckling

Hygrophorus
eburneus
(Bull.: Fr.) Fr.
Elfenbein-Schneckling

Hygrophorus
pustulatus
(Fr.) Fr.
Schwarzpunktierter Schneckling

Hygrophorus
capreolarius
(Kalchbr.) Sacc.
Weinroter Schneckling

Hygrophorus
chrysodon
(Batsch.: Fr.) Fr
Goldzahn-Schneckling

Hygrophorus
unicolor
Grög.
Orangefalber Schneckling

Hygrophorus
discoideus
(Pers.: Fr.) Fr.
Braunscheibiger Schneckling

Hygrophorus
pudorinus
(Fr.) Fr.
Orange-Schneckling

Inocybe
hirtella var. bispora
Kuy.
Zweisporiger Bittermandel-Risspilz

Inocybe
geophylla
(Sow.: Fr.) Kumm.
Erdblättriger Risspilz

Laccaria
laccata
(Scop.: Fr.) Berk. & Br.
Rötlicher Lacktrichterling

Lactarius
blennius
(Fr.: Fr.) Fr.
Graugrüner Milchling

Lactarius
salmonicolor
Helm & Lecl.
Lachsreizker

Lactarius
scrobiculatus
(Scop.: Fr.) Fr.
Grubiger Fichtenmilchling

Lepista
nuda
(Bull.: Fr.) Cooke
Violetter Rötelritterling

Limacella
illinita
Fr.) Maire
Glänzender Schleimschirmling

Macrolepiota
mastoidea
(Fr.) Sing.
Zitzenschirmling

Marasmius
chordalis
Fr.
Rotfleckiger Schwindling

Mycena
polygramma
(Bull.: Fr.) Gray
Rillstieliger Helmling

Mycena
abramsii
(Murr.) Murr.
Voreilender Helmling



Pilz-Fundliste der Woche 46

Mycena
crocata
(Schrad.: Fr.) Kumm.
Safranmilchender Helmling

Panellus
stypticus
(Bull.: Fr.) P.Karst.
Bitterer Muschelseitling

Paxillus
involutus
(Batsch: Fr.) Fr.
Kahler Krempling

Pholiota
lucifera
(Lasch) Quél.
Fettiger Schüppling

Pholiota
adiposa
(Fr.) Kumm.
Schleimiger Schüppling

Plicatura
crispa
(Pers.: Fr.) Rea
Buchen-Aderzähling

Pluteus
cervinus
(Schäff.) P. Kumm.
Rehbrauner Dachpilz

Psathyrella
prona
(Fr.) Gill.
Gemeinder Wegzärtling

Rhodocybe
gemina
(Fr.). Kuyp. & Noord.
Würziger Tellerling

Russula
fellea
(Fr.: Fr.) Fr.
Gallentäubling

Russula
cavipes
Britz.
Weisstannentäubling

Russula
delica
Fr.
Gemeinder Weisstäubling

Strobilurus
tenacellus
(Pers.:Fr.) Sing.
Bitterer Nagelschwamm

Suillus
tridentinus
(Bresad.) Singer
Rostroter Lärchenröhrling

Tricholoma
album
(Schäff.: Fr.) Kumm.
Weisser Ritterling

Tricholoma
tigrinum
Kumm.
Tiger-Ritterling

Tricholoma
orirubens
Quél.
Rötender Ritterling

Tubaria
hiemalis
Romagn. ex Bon
Winter-Trompetenschnitzling

Xerula
radicata
(Relhan.: Fr.) Dörfelt
Wurzel-Schleimrübling

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils am Bestimmungsabend am Montag aufliegen. Es wird sich um solche handeln, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich werden wir auch Mikroaufnahmen einflechten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) sind auf dieser HP zu finden.

Fundliste

Bisporella citrina *Zitronengelbes Holzbecherchen*

An entrindeteten Ästen von Laubholz, FK bis 3 mm gross. Sporen 8-12 x 3,5 µm, reif einmal septiert. Melzer pos.

Pilze der Woche 47

Mycena crocata *Gelborangemilchender Helmling*

Standort: Laubwald.
Fruchtkörper: bis 20 mm.
Mikromerkmale: Sporen 10 x 6 µm.
Bemerkungen: Ein Helmling aus der Sektion Lactipedes mit oranger Milch, mit einem Stiel, der gegen die Basis zunehemend orange wird.

Hygrophorus unicolor *Orangefalber Schneckling*

Standort: In Buchenwälder.
Fruchtkörper: Hut bis 50 mm.
Mikromerkmale: Sporen 7 x 4 µm.
Bemerkungen: Ein Schne ckling mit schleimigem Hut und trockenem Stiel. Das Vorkommen meist spät im Jahr bei Buchen und die nur blass rötliche Hutmitte unterscheiden ihn von H. discoideus.

Hygrophorus pustulatus *Schwarzpunktierter Schneckling*

Standort: Nadelwälder.
Fruchtkörper: bis 35 mm.
Mikromerkmale: Sporen 9 x 5 µm.
Bemerkungen: Eher ein kleiner Schneckling in Nadelwälder. Die Punktierung am Stiel kann durch die Witterung verloren gehen.

Lyophyllum connatum *Weisser Rasling*

Standort: Laub- und Nadelwald, vielmals an Strassenränder.
Fruchtkörper: bis über 10 cm.
Mikromerkmale: Sporen 6 x 3,5 µm.
Bemerkungen: Das büschelige Erscheinen, die Farbe und der spezielle Geruch (parfümiert) kennzeichnen diesen Rasling gut.

Tricholoma terreum *Gemeiner Erdritterling*

Standort: Nadelwald meistens bei Föhren.
Fruchtkörper: bis 80 mm.
Mikromerkmale: Sporen 7 x 5,5 µm.
Bemerkungen: Ein geruchloser Trichterling mit faserigem bis leicht schuppigem Hut. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu T. gausapatum ist der etwas grössere Q-Wert der Sporen.

Mycena crocata *Gelborangemilchender Helmling*

Hygrophorus unicolor *Orangefalber Schneckling*

Hygrophorus pustulatus *Schwarzpunktierter Schneckling*

Lyophyllum connatum *Weisser Rasling*

Tricholoma terreum *Gemeiner Erdritterling*

Pilz-Fundliste der Woche 47

Bisporella
citrina
(Batsch ex Fr.) Korf & Carp.
Zitronengelbes Holzbecherch.

Clavulina
cinereus
(Bull.: Fr.) Schröt.
Graue Koralle

Clitocybe
nebularis
(Batsch. Fries) Kummer
Nebelgrauer Trichterling

Clitocybe
geotropa
(DC. & Lam) Quél.
Mönchskopf

Grandinia
granulosa
(Pers.: Fr.) Fr.
Rauher Zähnchenrindenpilz

Gymnopilus
penetrans
(Pers.: Fr.) Murrill
Geflecktblättriger Flämmling

Gymnopus
confluens
(Pers.: Fr.) Kumm.
Knopfstieliger Rübling

Hebeloma
truncatum
(Fr.) Kumm.
Kakao-Fälbling

Hygrophorus
eburneus
(Bull.: Fr.) Fr.
Elfenbein-Schneckling

Hygrophorus
pustulatus
(Fr.) Fr.
Schwarzpunktierter Schneckl.

Hygrophorus
unicolor
Grög.
Orangefalber Schneckling

Lyophyllum
connatum
(Schum.: Fr.) Sing.
Weisser Büschelrasling

Mycena
crocata
(Schrad.: Fr.) Kumm.
Safranmilchender Helmling

Tricholoma
terreum
(Schäff.: Fr.) Kumm.
Erd-Ritterling

Tubaria
hiemalis
Romagn. ex Bon
Winter-Trompetenschnitzling

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils am Bestimmungsabend am Montag aufliegen. Es wird sich um solche handeln, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich werden wir auch Mikroaufnahmen einflechten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) sind auf dieser HP zu finden.

Fundliste

Pulcherricium caeruleum *Blauer Rindenpilz*

Laubbäume. Sporen 8 x 5 µm, Septen mit Schnallen, monomitisch.

Pilze der Woche 48

Pseudoclitocybe cyathiformis *Kaffeebrauner Scheintrichterling*

Standort:	Wald, Wegränder.
Fruchtkörper:	bis 10 cm.
Mikromerkmale:	Sporen 10 x 7 µm, amyloid.
Bemerkungen:	Es sind hauptsächlich die grossen Fruchtkörper, die amyloiden Sporen und die Hyphen ohne Schnallen, die den Gabeltrichterling von den Trichterlingen unterscheidet.

Crepidotus luteolus *Blassgelbes Stummelfüsschen*

Standort:	An toten Stengeln von Pflanzen.
Fruchtkörper:	Hut bis 30 mm.
Mikromerkmale:	Sporen 8,5 x 5 µm, fein warzig.
Bemerkungen:	Er unterscheidet sich zu anderen Crepidoten durch das Vorkommen an toten Stengeln, den unterschiedlich gestalteten Zystiden (ähnlich C. variabilis), den schwachwarzigen, elliptischen Sporen, die etwas grösser sind als bei C. variabilis.

Inocybe asterospora *Sternsporiger Risspilz*

Standort:	Laubwald
Fruchtkörper:	bis 50 mm.
Mikromerkmale:	Sporen 11 x 8 µm, ausgeprägt höckerig.
Bemerkungen:	Der radialfaserige Hut, die weissknollige Steilbasis und die Chaulozystiden bis zur Stielbasis kennzeichnen diesen Risspilz.

Inocybe bongardii *Duftender Risspilz*

Standort:	Laubwald.
Fruchtkörper:	bis über 50 mm.
Mikromerkmale:	Sporen 13 x 7 µm, glatt.
Bemerkungen:	Hut radialfaserig bis schuppig, Fleisch etwas rötend, Geruch süsslich, Zystiden zylindrisch und dünnwandig, ohne Inkrustationen, nur Cheilozystiden.

Macrocystidia cucumis *Gemeiner Gurkenschnitzling*

Standort:	Laub- und Nadelwald.
Fruchtkörper:	bis 60 mm.
Mikromerkmale:	Sporen 8 x 4 µm.
Bemerkungen:	Der starker Fisch- bis Gurkengeruch kennzeichnen den Gurkenschnitzling gut.

Pseudoclitocybe cyathiformis *Kaffeebrauner Scheintrichterling*

Crepidotus luteolus *Blassgelbes Stummelfüsschen*

Inocybe asterospora *Sternsporiger Risspilz*

Inocybe bongardii *Duftender Risspilz*

Macrocystidia cucumis *Gemeiner Gurkenschnitzling*

Pilz-Fundliste der Woche 48

Ascocoryne
sarcoides
(Jacquin ex S.F. Fray) Groves & Wilson
Fleischroter Gallertbecher

Clitocybe
cerussata
(Fries) P. Kummer
Ähnlich Waldfreund Trichterl.

Clitocybe
fragrans
(With.) Kumm.
Dufttrichterling

Clitocybe
geotropa
(DC. & Lam) Quél.
Mönchskopf

Clitocybe
nebularis
(Batsch. Fries) Kummer
Nebelgrauer Trichterling

Conocybe
striipes
(Cooke) Lundell
Weissstielger Glockenschüppl.

Coprinus
micaceus
(Bull.: Fr.) Fr.
Glimmertintling

Crepidotus
mollis
(Schäff.L Fr.) Staude
Gallertfleischiges Stummelf.

Crepidotus
luteolus
(Lambotte) Sacc.
Blassgelbes Stummelfüsschen

Galerina
marginata
(Batsch) Kühn.
Gifthäubling

Hypholoma
lateritium
(Schäff.: Fr.) Kumm.
Ziegelroter Schwefelkopf

Hypholoma
fasciculare
(Huds.:Fr.) Kumm.
Grünblättriger Schwefelkopf

Inocybe
asterospora
Quél.
Sternsporiger Risspilz

Inocybe
bongardii
(Weinm.) Quél.
Duftender Risspilz

Laccaria
laccata
(Scop.: Fr.) Berk. & Br.
Rötlicher Lacktrichterling

Laccaria
amethystea
(Bull.) Murill
Violetter Lacktrichterling

Lactarius
subdulcis
(Per.: Fr.) Gray
Süsslicher Buchen-Milchling

Lepista
nuda
(Bull.: Fr.) Cooke
Violetter Rötelritterling

Lyophyllum
fumosum
(Pers.: Fr.) Ort.
Hellbrauner Büschelrasling

Macrocystidia
cucumis
(Pers.: Fr.) Joss.
Gurkenschnitzling

Mycena
galericulata
(Scop.:Fr.) Gray
Rosablättriger Helmling

Mycena
filopes
(Bull.:Fr.) Kumm.
Zerbrechlicher Fadenhelmling

Mycena
polygramma
(Bull.: Fr.) Gray
Rillstieliger Helmling

Panellus
mitis
(Pers.: Fr.) Sing.
Milder Muschelseitling

Polyporus
badius
(Pers.: Gray) v. Schw.
Kastanienbrauern Porling

Psathyrella
gracilis
(Fr.) Quél.
Rotschneidiger Faserling

Pseudoclitocybe
cyathiformis
(Bull.) Sin
Kaffebrauner Gabeltrichterl.

Pulcherricium
caeruleum
(Fr.) Parm.
Blauer Rindenpilz

Russula
nigricans
(Bull.) Fr.
Dickblättriger Schwärztäubl.

Strobilurus
esculentus
(Wulf.: Fr) Sg.
Fichtenzapfenrübling

Tricholoma
album
(Schäff.: Fr.) Kumm.
Weisser Ritterling

Tricholoma
scalpturatum
(Fr.) Quél.
Gilbender Erd-Ritterlig

Tubaria
hiemalis
Romagn. ex Bon
Winter-Trompetenschnitzling

Xerocomus
badius
(Fr.) Kühn. ex Gilb.
Maronenröhrling

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils am Bestimmungsabend am Montag aufliegen. Es wird sich um solche handeln, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich werden wir auch Mikroaufnahmen einflechten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) sind auf dieser HP zu finden.

Fundliste

Ascocoryne sarcoides *Fleischroter Gallertbecher.*

Auf faulendem Holz. Sporen 14 x 4,5 µm, septiert, Melzer pos. Die Sporen von A. cylichnium sind grösser und mehrmals septiert.

Pilze der Woche 49

Panellus mitis *Milder Zwergknäueling*

Standort: An totem Nadelholz.
Fruchtkörper: bis 30 mm.
Mikromerkmale: Sporen 6 x 1,2 µm, hyalin, allantoid.
Bemerkungen: Verwechslungen währen möglich mit Crepidotus-Arten, die aber braune, nicht allantoide Sporen haben.

Mycena filopes *Zerbrechlicher Fadenhelmling*

Standort: Laub- und Nadelwald.
Fruchtkörper: Hut bis 20 mm.
Mikromerkmale: Sporen 10 x 5 µm.
Bemerkungen: Er figuriert in der Sektion Filipedes mit warzigen Zystiden. Innerhalb der Sektion unterscheidet er sich durch Sporenform und vorallem durch Zweisporigkeit. Makroskopisch hat er einen im Verhältnis zum Hut langen, gebrechlichen Stiel.

Conocybe striipes *Weissstieliger Glockenschüppling*

Standort: Laub- und Nadelwald, Parks.
Fruchtkörper: bis 50 mm.
Mikromerkmale: Sporen 9 x 5 µm.
Bemerkungen: Habitusmässig gleicht er einem Mürbling, die Lamellen sind jedoch gelb-braun, was auf eine grössere Conocybe hinweist. Die Bestätigung für Conocybe ist die stark entwickelte Subkutis. Innerhalb der Gattung figuriert er in der Sektion Pholiotina ohne Ring mit weissem Stiel und knolliger Stielbasis sowie den Mikromerkmalen (siehe nächst Seite). Beim Austrocknen werden die Hüte heller und radial-rippig-runzlig. Der Name striipes wird mit pygmaeoaffins synomisiert, da sich die Merkmale überschneiden.

Psathyrella gracilis *Rotschneidiger Mürbling*

Standort: Laubwald.
Fruchtkörper: bis 25 mm.
Mikromerkmale: Sporen 10 x 6 µm, mit Keimporus.
Bemerkungen: Er gehört zu den wurzelnden Psathyrellen mit rot unterlegter Lamellenschneide. Die schlanken Zystiden und Hut ohne Velum trennen ihn von anderen Arten der Sektion.

Panellus mitis *Milder Zwergknäueling*

Mycena filopes *Zerbrechlicher Fadenhelmling*

Conocybe striipes *Weissstieliger Glockenschüppling*



Cheilozystiden

Caulocystiden

Conocybe striipes
Weissstieliger Glockenschüppling

Huthaut

Psathyrella gracilis *Rotschneidiger Mürbling*

Pilz-Fundliste der Woche 49

Armillaria
borealis
Marxm. & Korth.
Nordischer Hallimasch

Ascocoryne
sarcoides
(Jacquin ex S.F. Fray) Groves & Wilson
Fleischroter Gallertbecher

Clitocybe
nebularis
(Batsch. Fries) Kummer
Nebelgrauer Trichterling

Coprinus
picaceus
(Bull.: Fr.) Gray
Specht-Tintling

Coprinus
micaceus
(Bull.: Fr.) Fr.
Glimmertintling

Coprinus
atramentarius
(Bull.: Fr.) Fr.
Falten-Tintling

Crepidotus
luteolus
(Lambotte) Sacc.
Blassgelbes Stummelfüsschen

Entoloma
hebes
(Rom.) Trimb.
Schlankstieliger Rötling

Flammulina
velutipes
(Curtis.:Fr.) Singer
Samtfussrübling

Gymnopilus
penetrans
(Pers.: Fr.) Murrill
Geflecktblättriger Flämmling

Hebeloma
sinapizans
(Paul.: Fr.) Gill.
Rettich-Fälbling

Helvella
crispa
Fr.
Herbstlorchel

Inocybe
perbrevis
(Weinmann) Gillet
Fastwurzelnder Risspilz

Lepista
glaucocana
(Bres.) Sing.
Blassblauer Rötelritterling

Lepista
nuda
(Bull.: Fr.) Cooke
Violetter Rötelritterling

Leucopaxillus
compactus
(Fr.) Neuhf.
Dreifarbiger Krempentricht.

Macrocystidia
cucumis
(Pers.: Fr.) Joss.
Gurkenschnitzling

Mycena
galericulata
(Scop.:Fr.) Gray
Rosablättriger Helmling

Mycena
filopes
(Bull.:Fr.) Kumm.
Zerbrechlicher Fadenhelmling

Mycena
pura var. alba
(Pers.: Fr.) Kummer
Weisser Rettich-Helmling

Omphalina
pyxidata
(Bull.: Pers.) Quél.
Starkgeriefter Nabeling

Panellus
mitis
(Pers.: Fr.) Sing.
Milder Muschelseitling

Psathyrella
gracilis
(Fr.) Quél.
Rotschneidiger Faserling

Psathyrella
conopilus
(Fr.: Fr.) Pears. & Dennis
Huthaarfaserling

Tubaria
hiemalis
Romagn. ex Bon
Winter-Trompetenschnitzling

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils am Bestimmungsabend am Montag aufliegen. Es wird sich um solche handeln, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich werden wir auch Mikroaufnahmen einflechten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) sind auf dieser HP zu finden.

Fundliste

Pseudoclitocybe obbata
Blaugrauer Scheintrichterling

Sporen 9 x 6.5 µm. Zum Kaffeebraunen Trichterling beseht der Unterschied darin, dass P. obbata keinen netzigen Stiel hat und die Sporen etwas rundlicher sind . Die Gattung hat amyloide Sporen.

Pilze der Woche 50

Pholiota populnea *Pappel-Schüppling*

Standort: An totem, liegendem oder geschädigtem Holz von Pappeln.
Fruchtkörper: bis über 120 mm.
Mikromerkmale: Sporen 10 x 5 µm, gelbbraun mit Porus, dickwandig.
Bemerkungen: Der Pappel-Schüppling ist aufgrund seiner Grösse, dem kräftig schuppigen Hut und das Vorkommen auf Pappelholz kaum zu verkennen.

Pleurotus ostreatus *Austernseitling*

Standort: Hauptsächlich auf Laubholz.
Fruchtkörper: Hut bis 200 mm.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 3 µm, zylindrisch.
Bemerkungen: Bei uns findet man ihn oft an Pappeln in grossen Mengen dachziegelig übereinander. So kommt es vor, dass auf einer Seite der Austernseitling wächst und auf der andern die Trog'sche Tramete.

Hypholoma marginatum *Naterstieliger Schwefelkopf*

Standort: Morsches Nadelholz.
Fruchtkörper: bis 40 mm.
Mikromerkmale: Sporen 9 x 4,5 µm, mit Keimporus, dickwandig, purpurbraun.
Bemerkungen: Der Naterstelige Schwefelkopf hat einen im Verhältnis zum Hut langen, genaterten, längsfaserigen, zähen und dünnen Stiel. Er wächst an Nadelholz. Der Hut wird, vorallem im Alter, radialrissig.

Galerina laevis Gelblicher Rasen-Häubling

Standort: Gesellig zwischen Moosen und Gräser auf Rasen.
Fruchtkörper: bis 10 mm.
Mikromerkmale: Sporen 11 x 6 µm, fein warzig.
Bemerkungen: Dieser kleine Häubling fällt auf durch sein spezielles Vorkommen sowie die Mikromerkmale: überall kopfige Zystiden und schwach warzige Sporen.

Coriolopsis trogii *Blasse Borstentramete*

Standort: Hauptsächlich an Pappeln.
Fruchtkörper: Einzelhüte bis 100 mm.
Mikromerkmale: Sporen 10 x 3 µm, hyalin.
Bemerkungen: Wie der Name sagt, hat der Hut eine borstige Oberseite und rundlich-eckige, ausgefranste Poren, 1-2 pro mm. Weitere Mikromerkmale: Hyphensystem trimitisch, mit Schnallen , ohne Zystiden, einjährig.

Pholiota populnea *Pappel-Schüppling*

Pleurotus ostreatus *Austernseitling*

Hypholoma marginatum *Naterstieliger Schwefelkopf*

Galerina laevis Gelblicher Rasen-Häubling

Coriolopsis trogii *Blasse Borstentramete*

Pilz-Fundliste der Woche 50

Auricularia
mesenterica
Dicks.: Fr.
Gezonter Ohrlappenpilz

Auriculariopsis
ampla
(Lév.) Maire
Pappel-Becherrinden-
schwamm

Baeospora
myriadophylla
(Peck) Singer
Tausendblatt Amyloidspor-
rübling

Bierkandera
adusta
(Willd.: Fr.) Karst.
Angebrannter Rauchporling

Bjerkandera
fumosa
(Pers.: Fr.) Karst.
Graugelber Rauchporling

Calocybe
obscurissima
(Pears.) Mos.
Düsterer Schönkopf

Cantharellus
tubaeformis
Fr.
Durchbohrter Leistling

Clavulina
cinereus
(Bull.: Fr.) Schröt.
Graue Koralle

Clitocybe
fragrans
(With.) Kumm.
Dufttrichterling

Clitocybe
georgiana
Clem.
Moderigriechender Trichter-
ling

Clitocybe
cerussata
(Fries) P. Kummer
Ähnlich Waldfreund Trichterl.

Coprinus
atramentarius
(Bull.:Fr.) Fr.
Falten-Tintling

Coriolopsis
trogii
(Berk.) Doman.
Blasse Borstentramete

Cortinarius
cinnamomeus
Fr.
Zimt-Hautkopf

Crepidotus
luteolus
(Lambotte) Sacc.
Blassgelbes Stummelfüsschen

Crepidotus
subverrucisporus
Pil.
Rauhsporges Stummelfüss-
chen

Exidia
truncata
Fr.: Fr.
Becherförmiger Drüsling

Galerina
sideroides
(Fr.)Kühn.
Glimmerstieliger Häubling

Gymnopilus
penetrans
(Pers.: Fr.) Murrill
Geflecktblättriger Flämmling

Helvella
elastica
(Bull. ex St. Aman) Boud.
Elastische Lorchel

Hygrophorus
chrysodon
(Batsch.: Fr.) Fr
Goldzahn-Schneckling

Hypholoma
marginatum
(Pers.: Fr.) Schroet.
Geselliger Schwefelkopf

Hypholoma
lateritium
(Schäff.: Fr.) Kumm.
Ziegelroter Schwefelkopf

Hypholoma
fasciculare
(Huds.:Fr.) Kumm.
Grünblättriger Schwefelkopf

Inocybe
geophylla
(Sow.: Fr.) Kumm.
Erdblättriger Risspilz

Inocybe
phaeocomis
(Pers.) Kuyp.
Braunschopfiger Risspilz

Inocybe
glabripes
Ricken
Kleinsporiger Risspilz

Inocybe
dulcamara
(Albert. et Schw.: Pers. Kumm.
Bittersüsser Risspilz

Kuehneromyces
mutabilis
(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.
Gemeines Stockschwämm-
chen

Lacrymaria
lacrymabunda
(Bull.: Fr.) Pat.
Tränender Samumpilz

Lentinus
adhaerens
(Alb. et Schw.: Fr.) Fr.
Harziger Sägeblättling

Lenzites
warnieri
Dur. & Mont.
Pappelblättling

Leotia
lubrica
Pers.
Gemeines Gallertkäppchen

Lepista
sordida
(Fr.) Sing.
Fleischbrauner Rötelritterling

Lopharia
spadicea
(Pers.: Fr.) Boidin
Russbrauner Schichtpilz

Marasmius
androsaceus
(L.: Fr.) Fr.
Rosshaarschwindling

Meruliopsis
corium
(Fr.) Ginns
Lederartiger Fältling

Mycena
leptocephala
(Pers.: Fr.) Gill.
Grauer Nitrat-Helmling

Mycena
hiemalis
(Osbeck: Fr.) Quél.
Winter-Rindenhelmling

Mycena
filopes
(Bull.:Fr.) Kumm.
Zerbrechlicher Fadenhelmling

Pilz-Fundliste der Woche 50

Mycena
filopes
(Bull.:Fr.) Kumm.
Zerbrechlicher Fadenhelmling

Omphalina
pyxidata
(Bull.: Pers.) Quél.
Starkgeriefter Nabeling

Pholiota
populnea
(Pers.: Fr.) Kuyp. & Tjall.
Pappel-Schüppling

Pleurotus
ostreatus
(Jacquin: Fr.) Kummer
Austern-Seitling

Pluteus
romelli
(Britz.) Sacc.
Gelbstieliger Dachpilz

Pluteus
cervinus
(Schäff.) P. Kumm.
Rehbrauner Dachpilz

Pseudoclitocybe
obbata
(Fr.) Singer
Blaugrauer Scheintrichterling

Pseudohydnellum
gelatinosum
(Scop.: Fr.) Karst.
Zitterzahn

Russula
viscida
Kudrna
Lederstieltäubling

Russula
fellea
(Fr.: Fr.) Fr.
Gallentäubling

Sarcomixa
serotina
(Schrad.: Fr.) Karst.
Gelbstieliger Muschelseitling

Sarcoscypha
coccinea
Fr.) Lamb.
Zinnoberroter Prachtsbecher-
ling

Strobilurus
esculentus
(Wulf.: Fr) Sg.
Fichtenzapfenrübling

Telephora
palmata
Scop.: Fr.
Stinkender Warzenpilz

Tulostoma
brumale
Pers.: Pers.
Zizen-Stielbovist

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils am Bestimmungsabend am Montag aufliegen. Es wird sich um solche handeln, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich werden wir auch Mikroaufnahmen einflechten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) sind auf dieser HP zu finden.

Fundliste

Clavulia cinerea *Grauer Keulenpilz*

Sporen 9 x 8 µm, monomitisch, Septen mit Schnallen, 2-sporig. Er wächst in Laub- und Nadelwäldern auf Erdboden. Er unterscheidet sich von den nächst verwandten Arten durch die Grösse der Sporen und durch z.T. nicht dickere Hyphen nach den Septen.

Pilze der Woche 51

Hypholoma radicosum *Wurzelnder Schwefelkopf*

Standort: Auf morschem Nadelholz.
Fruchtkörper: bis über 50 mm.
Mikromerkmale: Sporen 6 x 4 µm, dickwandig, mit kleinem Keimporus.
Bemerkungen: Er ist ein eher grosser Schwefelkopf mit z.T. langem, wurzelnden und zur Basis hin etwas holzigen Stiel.

Galerina autumnalis *Überhäuteter Häubling*

Standort: An Nadelholz, einzel bis büschelig.
Fruchtkörper: Hut bis über 30 mm.
Mikromerkmale: Sporen 9 x 5 µm, warzig. Cheilozystiden bauchig mit langem Schnabel.
Bemerkungen: Er hat einen fettig, klebrigen Hut und eine ausgeprägte Manchette. Von G. sderoides unterscheidet er sich durch die warzigen Sporen und nicht kopfige Cheilozystiden. Von G. marginata durch den fettigen Hut.

Marasmius epiphyllus *Aderblättriger Schwindling*

Standort: Auf Blättern und Zweigen.
Fruchtkörper: bis 5 mm.
Mikromerkmale: Sporen 9 x 3 µm (sehr variierend), spindelig
Bemerkungen: Er gehört zu den kleinen, weissen Marasmien ohne warzige Huthauthyphen. Die Lamellen sind schwach entwickelt, furchig, z.T. verzweigt. Die Stielhyphen sind dextrionid.

Postia stiptica *Bitterer Saftporling*

Standort: An totem Nadelholz.
Fruchtkörper: bis 12 cm.
Mikromerkmale: Sporen 4 x 2 µm, hyalin. Hyphensystem monomitisch, z.T. dickwandig, mit Schnallen.
Bemerkungen: Die Poren sind rundlich bis labyrinthisch, 3-4 pro mm. Der Geschmack ist bitter.

Grandinia arguta *Spitzstacheliger Zähnchenrindenpilz*

Standort: An Laub- und Nadelholz.
Fruchtkörper: Stachelige Überzüge von mehreren Zentimetern.
Mikromerkmale: Sporen 5 x 4 µm, hyalin.
Bemerkungen: Hyphensystem monomitisch, mit Schnallen. Die Leptozystiden sind zylindrisch, kopfig, dieser manchmal amorph. Lagenozystiden pfrimenförmig mit inkrustiertem Ende.

Hypholoma radicosum *Wurzelnder Schwefelkopf*

Galerina autumnalis *Überhäuteter Häubling*

Marasmius epiphyllus *Aderblättriger Schwindling*

Postia stiptica *Bitterer Saftporling*

Grandinia arguta *Spitzstacheliger Zähnchenrindenpilz*

Pilz-Fundliste der Woche 51

Anthostomella
rubicola
(Speg.) Sacc.

Arrhenia
spathulata
(Fr.) Readh.
Gezonter Adermoosling

Auricularia
mesenterica
Dicks.: Fr.
Gezonter Ohrlappenpilz

Botryosphaeria
quercuum
(Schw.) Sacc.

Botryosphaeria
stevensii
Shoemaker

Chondrostereum
purpureum
(Pers.: Fr.) Pouzar
Violetter Schichtpilz

Clavulina
cinereus
(Bull.: Fr.) Schröt.
Graue Koralle

Clitopilus
hobsonii
(Berk. & Br.) Ort.
Seitlings-Mehlräsling

Cortinarius
muscigenus
Peck
Blaustiel-Schleimfuss

Cryptodiaporthe
populea
(Sacc.) Butin
Cucurbitaria
berberidis
(Pers.: St. Am.) Gray

Diaporthe
detrusa
(Fr.) Fckl.

Diatrype
stigma
(Hoffm.: Fr.) Fr.

Diatrypella
favacea
(Fr.) Sacc.

Didymosphaeria
oblitescens
(Berk. & Br.) Fckl.

Fenestella
fenestrata
(Berk. & Br.) Schröt.

Galerina
autumnalis
(Peck) Smith & Sing.
Überhäuteter Häubling

Galerina
sideroides
(Fr.) Kühn.
Glimmerstieliger Häubling

Gleoporus
dichrous
(Fr.) Bres.
Zweifarbiger Gallertporling

Grandinia
arcuta
(Burt.) Jül.
Spitzstacheliger Zähnchenrin-
denpilz

Gymnopilus
penetrans
(Pers.: Fr.) Murrill
Geflecktblättriger Flämmling

Gymnopus
buthyracea var. asema
(Fr.: Fr.) Quél.
Horngrauer Butterrübling

Heterobasidion
annosum
(Fr.) Bref.
Wurzelschwamm

Hyphoderma
praetermissum
(Karst.) Erik. & Strid.
Dünnfleischiger Rindenpilz

Hypholoma
lateritium
(Schäff.: Fr.) Kumm.
Ziegelroter Schwefelkopf

Hypholoma
radicosum
E. Lange
Wurzelnder Schwefelkopf

Hypholoma
capnoides
(Fr.: Fr.) P. Kumm.
Rauchblättriger Schwefelkopf

Hypholoma
lateritium
(Schäff.: Fr.) Kumm.

Ziegelroter Schwefelkopf
Hypoxylon
fuscum
(Pers.: Fr.) Fr.

Hypoxylon
rubiginosum
(Pers.: Fr.) Fr.

Hypoxylon
serpens
(Pers.: Fr.) Fr.

Hysterium
angustatum
Alb. & Schw. ex Mérat

Lasiosphaeria
hispida
(Tode) Fckl.

Lophiotrema
nucula
(Fr.: Fr.) Sacc.

Marasmius
epiphyllus
(Pers.: Fr.) Fr.
Aderblättriger Schwindling

Megalozystidium
lactescens
(Berkeley) Jülich
Milchende Gleozystidenrinde

Megalocystidum
luridum
(Bres.) Boid.
Fahlgelbe Gleocystidenrinde

Melanomma
pulvis-pyrius
(Pers.: Fr.) Fckl.

Meruliopsis
corium
(Fr.) Ginns
Lederartiger Fältling

Nectria
cinnabarina
(Tode) Fr.

Nectria
episphaeria
(Tod.) Fr.

Oligoporus
stipticus
(Pers.: Fr.) Gilb. & Ryv.
Bitterer Saftporling

Oxyporus
corticola
(Fr.) Ryv.
Rinden-Scharfporling

Panellus
mitis
(Pers.: Fr.) Sing.
Milder Muschelseitling



Paxillus
atrotomentosus
(Batsch.: Fr.) Fr.
Samtfuss-Krempling

Pilz-Fundliste der Woche 51

Peniophora
limitata
(Chaill.: Fr.) Cooke
Lilagrauer Borstenrindenpilz

Phanerochaete
velutina
(DC ex Pers.) P.Karst.
Samtigmatter Zystidenrin-
denschwamm

Phellinus
contiguus
(Pers.: Fr.) Pat.
Grosssporiger Feuer-
schwamm

Pholiota
lenta
(Pers.: Fr.) Singer
Tonweisser Schüppling

Plicaturopsis
crispa
(Pers.: Fr.) Rea
Buchen-Aderzähling

Polyporus
brumalis
Pers.: Fr.
Winterporling

Pseudoclitocybe
cyathiformis
(Bull.) Sing.
Kaffebrauner Gabeltrichter-
ling

Puccinia
pygmaea
(Rostpilz)

Puccinia
urticata var. urticae-hirtae
(Rostpilze)

Pulcherricium
caeruleum
(Fr.) Parm.
Blauer Rindenpilz

Scopuloides
rimosa
(Cke.) Jül. s. l.
Feinwarziger Zystidenrinden-
pilz

Sistotrema
raduloides
(P.Karst.) Donk

Sordaria
fimicola
(Rob.) Ces. & de Not.

Sordaria
lappae
Potepnia

Steccherium
ochraceum
(Pers.ap.Gmel.: Fr.) S.F. Gray
Ockerrötlichr Resupinatsta-
cheling

Stereum
ochraceo-flavum
(Schw.) Ellis 1878
Ästchen-Schichtpilz

Trechispora
farinacea
(Pers.ex Fr.) Liberta 1966
Mehliger Stachelsporrinden-
pilz

Tubaria
pseudoconspersa
Romagn.
Flockiger Trompetenschnitz-
ling (dunkle Form)
Valsa
sordida
Nitschke

Vuilleminia
comedens
(Nees: Fr.) Maire
Rindensprenger

Vuilleminia
cystidiata
(Parm. 1965)

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils am Bestimmungsabend am Montag aufliegen. Es wird sich um solche handeln, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich werden wir auch Mikroaufnahmen einflechten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) sind auf dieser HP zu finden.

Fundliste

Steccherinum fimbriatum
Gefranster Resupinatstacheling

Sporen 5 x 3 µm, hyalin, dimitisch, Septen mit Schnallen, mit Skeletozystiden. An Laub- und Nadelholz, meistens auf der Unterseite.

Pilze der Woche 52

Fometopsis pinicola *Rotrandiger Baumschwamm*

Standort:	Auf Nadel- und Laubholz.
Fruchtkörper:	bis über 150 mm.
Mikromerkmale:	Sporen 7 x 4 µm, hyalin. Hyphensystem drimitisch, hyalin, generative Hyphen mit Schnallen.
Bemerkungen:	Dieser häufige Pilz ist an der roten Zuwachszone des Hutrandes zu erkennen. Er unterscheidet sich vom selteren Fomes fomentarius durch kleinere Sporen, hyaline Skelethyphen und durch das Schmelzen bei Hitze der harzigen Hutkruste.

Trametes versicolor *Schmetterlings-Tramete*

Standort:	Hauptsächlich an Laubholz.
Fruchtkörper:	Hut bis über 70 mm.
Mikromerkmale:	Sporen 7 x 2 µm, Hyphensystem trimitisch, hylin, generative Hyphen mit Schnallen.
Bemerkungen:	Ein sehr häufiger Pilz, dessen Farbe des gezonten Hutes sehr unterschiedlich ist. Er hat, im Gegensatz zu T. multicolor, immer sehr dünne Fruchtkörper, auch an der Anwuchsstelle, die Hutoberfläche ist gegenüber T. hirsuta nicht haarig-filzig.

Trametes hirsuta *Striegelige Tramete*

Standort:	An Laubholz.
Fruchtkörper:	bis 100 mm.
Mikromerkmale:	Sporen 7 x 2 µm, hyalin. Hyphensystem drimitisch, generative Hyphen mit Schnallen, alles hyalin.
Bemerkungen:	Ebenfalls ein häufiger Pilz. Er unterscheidet sich hauptsächlich zu T. versicolor durch die haarig-filzige Hutoberfläche.

Daedaleopsis tricolor *Braunroter Blätterwirrling*

Standort:	Laubholz.
Fruchtkörper:	bis über 100 mm.
Mikromerkmale:	Sporen 8 x 2,5 µm, hyalin, allantoid. Hyphensystem trimitisch, hyalin, generative Hyphen mit Schnallen.
Bemerkungen:	Er ist ein Doppelgänger von D. confragosa und unterscheidet sich durch lamelliges Hymenophor.

Fometopsis pinicola *Rotrandiger Baumschwamm*

Trametes versicolor *Schmetterlings-Tramete*

Trametes hirsuta *Striegelige Tramete*

Daedaleopsis tricolor *Braunroter Blätterwirrling*

Pilz-Fundliste der Woche 52

Ascocoryne
sarcoides
(Jacquin ex S.F. Fray) Groves &
Wilson
Fleischroter Gallertbecher

Calocera
cornea
(Batsch.: Fr.) Fries
Eichenhörnling

Fometopsis
pinicola
(Fr.) Karst.
Rotbrauner Baumschwamm

Hypholoma
capnoides
(Fr.:Fr.) P. Kumm.
Rauchblättriger Schwefelkopf

Hypholoma
fasciculare
(Huds.:Fr.) Kumm.
Grünblättriger Schwefelkopf

Ischnoderma
benzoinum
(Wahl.: Fr.) Karst.
Schwarzgebänderter Harz-
porling

Lentinus
adhaerens
(Alb. et Schw.: Fr.) Fr.
Harziger Sägeblättling

Megacollybia
platyphylla
(Pers.: Fr.)Kotl. et Pouz.
Breitblattrübling

Merulius
tremellosus
Fr.
Gallertfleischiger Fältling

Mycena
rosea
(Bull.) Gramberg
Rosa-Rettichhelmling

Mycena
filopes
(Bull.: Fr.) Kumm.
Zerbrechlicher Fadenhelmling

Nectria
cinnabarina
(Tode ex Fr.) Fr.
Zinnoberroter Pustelpilz

Pseudoclitocybe
cyathiformis
(Bull.) Sing.
Kaffebrauner Gabeltrichter-
ling

Pycnoporus
cinnabarinus
(Jacq.: Fr.) Karst.
Zinnoberrote Tramete

Sarcomixa
serotina
(Schrad.: Fr.) Karst.
Gelbstieliger Muschelseitling

Scytinostroma
portentosum
(Berk. & Curt.) Donk
Riechender Lederrindenpilz

Steccherinum
ochraceum
(Pers.ap.Gmel.: Fr.) S.F. Gray
Ockerrötlichr Resupinatsta-
cheling

Steccherinum
fimbriatum
(Pers.: Fr.) Erik.
Gefranster Resupinatstache-
ling

Trametes
hirsuta
(Wulf.: Fr.) Pilát
Striegelige Tramete

Trametes
versicolor
(L.: Fr.) Pilát
Schmetterlings-Tramete

Tricholoma
terreum
(Schäff.: Fr.) Kumm.
Erd-Ritterling

Vesiculomyces
citrinus
(Pers.) Hagstr.
Zitronengelber Gloeozysti-
denpilz

Xerocomus
badius
(Fr.) Kühn. ex Gilb.
Maronenröhrling



VEREIN FÜR PILZKUNDE BASEL

Pilze der Jahre 2006/2007/2010/2011/2012/2013

Das nachfolgende Dokument beinhaltet die Jahresarbeit des Vereins für Pilz-kunde Basel der Jahre 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013
Die gefundenen Pilze wurden jede Woche bestimmt, einige illustriert, dokumentiert und im Internet hochgeladen. Der Text auf der ersten, linken Seite wiederholt sich deswegen wöchentlich.

PILZE 2007

Idee und Realisation: Kurt Minder

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich sind auch Mikroaufnahmen eingeflochten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

Vuilleminia comedens *Gemeiner Rindensprenger*

An Laubholz, Sporen 18 x 6 µm, hyalin, Hyphensystem monomitisch, mit Schnallen, Fleisch gelatinös, etwas schmierig-schlüpfrig.

Pilze der Woche 1

Stereum hirsutum *Striegeliger Schichtpilz*

Standort:	Laubholz.
Fruchtkörper:	Hut bis über 30 mm.
Mikromerkmale:	Sporen 7 x 2,5 µm, Hyphensystem dimitisch, generative Hyphen ohne Schnallen.
Bemerkungen:	Ein sehr häufiger Pilz, der fast bei jedem Pilzgang anzutreffen ist. Er unterscheidet sich von S. ochraceo-flavum durch die kräftigeren Farben, stark striegelig-filzigen Hut und hat eine schmale Anwuchsstelle.

Stereum subtomentosusm *Samtiger-Schichtpilz*

Standort:	An Laubholz.
Fruchtkörper:	bis 70 mm.
Mikromerkmale:	Sporen 6 x 2,5 µm, hyalin. Hyphensystem dimitisch, generative Hyphen ohne Schnallen.
Bemerkungen:	Die radiäre Zonierung des Hutes gleicht der Schmetterlingstramete. Das glatte Hymenophor weist jedoch schnell auf die Gattung Stereum hin. Die Anwuchsstelle ist gegenüber verwandten Arten schmal. Mikroskopisch unterscheidet er sich durch die teilweise verjüngte Spitze der dickwandigen Skeletthyphen.

Trichaptum abietinum *Violetter Lederporling*

Standort:	An Nadelholz.
Fruchtkörper:	bis 20 mm vom Substrat abstehend, hutbildend oder resupinat.
Mikromerkmale:	Sporen 8 x 3 µm, hyalin. Hyphensystem dimitisch, generative Hyphen mit Schnallen, hyalin. Die Zystiden haben manchmal einen Kristallschopf.
Bemerkungen:	Die Hutoberfläche ist striegelig-filzig. Das Hymenophor ist netzigporig. T. fusco-violaceum hat ein mehr zähnchenartiges Hymenophor.

Tremella mesenterica *Goldgelber Zitterling*

Standort:	Laubholz.
Fruchtkörper:	bis 50 mm.
Mikromerkmale:	Sporen 14 x 8 µm, hyalin. Mit kleinen Konidiensporen. Die Basidien sind längs septiert. Septen mit Schnallen.
Bemerkungen:	Man erkennt ihn durch die glänzigen, goldgeben und gallertigen, lappigen Fruchtkörper.

Stereum hirsutum *Striegeliger Schichtpilz*

Stereum subtomentosum *Samtiger-Schichtpilz*

Trichaptum abietinum *Violetter Lederporling*

Tremella mesenterica *Goldgelber Zitterling*

Pilz-Fundliste der Woche 1

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Ascocoryne	sarcoides	(Jacquin ex S.F. Fray) Groves & Wilson	Fleischroter Gallertbecher
Calocera	cornea	(Batsch.: Fr.) Fries	Eichenhörnling
Fometopsis	pinicola	(Fr.) Karst.	Rotbrauner Baumschwamm
Hypholoma	capnoides	(Fr.:Fr.) P. Kumm.	Rauchblättriger Schwefelkopf
Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
Ischnoderma	benzoinum	(Wahl.: Fr.) Karst.	Schwarzgebänderter Harzporling
Lentinus	adhaerens	(Alb. et Schw.: Fr.) Fr.	Harziger Sägeblättling
Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.)Kotl. et Pouz.	Breitblattrübling
Merulius	tremellosus	Fr.	Gallertfleischiger Fältling
Mycena	rosea	(Bull.) Gramberg	Rosa-Rettichhelmling
Mycena	filopes	(Bull.:Fr.) Kumm.	Zerbrechlicher Fadenhelmling
Nectria	cinnabarina	(Tode ex Fr.) Fr.	Zinnoberroter Pustelpilz
Pseudoclitocybe	cyathiformis	(Bull.) Sing.	Kaffebrauner Gabeltrichterling
Pycnoporus	cinnabarinus	(Jacq.: Fr.) Karst.	Zinnoberrote Tramete
Sarcomixa	serotina	(Schrad.: Fr.) Karst.	Gelbstieliger Muschelseitling
Scytinostroma	portentosum	(Berk. & Curt.) Donk	Riechender Lederrindenpilz
Steccherium	ochraceum	(Pers.ap.Gmel.: Fr.) S.F. Gray	Ockerrötlichr Resupinatstacheling
Steccherium	fimbriatum	(Pers.: Fr.) Erik.	Gefranster Resupinatstacheling
Stereum	gausapatum	(Fr.) Fr.	Eichen-Schichtpilz
Stereum	hirsutum	(Willd.: Fr.) S.F. Gray	Zottiger Schichtpilz
Trametes	hirsuta	(Wulf.: Fr.) Pilát	Striegelige Tramete
Trametes	versicolor	(L.: Fr.) Pilát	Schmetterlings-Tramete
Tremella	mesenterica	Retz. ex Hook.	Goldgelber Zitterling
Trichaptum	abietinum	(Fr.) Ryv.	Tannentramete
Tricholoma	terreum	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Erd-Ritterling
Vesiculomyces	citrinus	(Pers.) Hagstr.	Zitronengelber Gloeozystidenpilz
Vuilleminia	comedens	(Nees: Fr.) Maire	Rindensprenger
Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich sind auch Mikroaufnahmen eingeflochten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

Meruliopsis corium *Lederig-häutiger Fältling*

An der Unterseite von am Boden liegendem Laubholz, Sporen 6 x 3 µm, hyalin, Hyphensystem monomitisch, ohne Schnallen. Die Art bildet häutige Überzüge mit abstehenden Kanten. Hutoberseite faserig gezont.

Pilze der Woche 2

Auricularia mesenterica *Gezonter Ohrlappenpilz*

Standort:	Laubholz.
Fruchtkörper:	Überzüge von mehreren cm Ausdehnung.
Mikromerkmale:	Sporen 16 x 7 µm, Hyphensystem monomitisch, ohne Schnallen. Basidien mehrfach quer septiert, Epibasidien seitlich.
Bemerkungen:	Die Oberseite des Hutes ist konzentrisch gezont. Die Konsistenz ist elastisch, zäh, gallertig. Die Abbildung zeigt die Unterseite des Hutes.

Panellus stipticus *Eichen-Muschelseitling*

Standort:	Laubholz.
Fruchtkörper:	bis 40 mm.
Mikromerkmale:	Sporen 4 x 3 µm, hyalin. Septen mit Schnallen. Cheilozystiden schlank-keulig, teilweise an der Spitze amorph.
Bemerkungen:	Ein häufiger Pilz, der hauptsächlich an Eichen- und Buchenholz überall zu finden ist. Die etwas klebrigen Hüte sind farblich verschieden.

Steccherinum ochraceum *Ockerrötlicher Resupinatstacheling*

Standort:	An totem Holz von Laubbäumen.
Fruchtkörper:	Resupinat bis semipielat. Überzüge von mehreren cm Ausdehnung bildend.
Mikromerkmale:	Sporen 4 x 2,5 µm, hyalin. Hyphensystem dimitisch, generative Hyphen mit Schnallen. Skeletozystiden zylindrisch, apikal stark inkrustiert.
Bemerkungen:	Die Fruchtkörper können völlig resupinat sein. Semipielate Fruchtkörper weisen auf der Hutoberseite eine filzige und manchmal eine feine Zonierung auf. Die Stacheln haben eine Länge von 1 bis 2,5 mm.

Auricularia mesenterica *Gezonter Ohrlappenpilz*

Panellus stipticus *Eichen-Muschelseitling*

Steccherinum ochraceum *Ockerrötlicher Resupinatstacheling*

Pilz-Fundliste der Woche 2

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Ascocoryne	sarcoides	(Jacquin ex S.F. Fray) Groves & Wilson	Fleischroter Gallertbecher
Auricularia	mesenterica	Dicks.: Fr.	Gezonter Ohrlappenpilz
Baeospora	myosurus	(Fr.:) Sing.	Mäuseschwanz Amyloidsporrübling
Cantharellus	tubaeformis	Fr.	Durchbohrter Leistling
Clavulina	cinereus	(Bull.: Fr.) Schröt.	Graue Koralle
Cortinarius	sommerfeltii?	Høiland	Orangeblättriger Hautkopf
Cylindrobasidium	evolvens	(Fr.: Fr.) Jül.	Ablösender Rindenpilz
Cystoderma	amiantinum	(Scop.: Fr.) Fayod	Amiant-Körnchenschirmling
Exidia	glandulosa	Fr.	Hexenbutter
Hypholoma	lateritium	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf
Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
Lentinus	adhaerens	(Alb. et Schw.: Fr.) Fr.	Harziger Sägeblättling
Meruliopsis	corium	(Fr.) Ginns	Lederartiger Fältling
Ombrophila	pura	(Pers.: Fr.) Baral	Buchen-Gallertkreisling
Panellus	mitis	(Pers.: Fr.) Sing.	Milder Muschelseitling
Panellus	stypticus	(Bull.: Fr.) P.Karst.	Bitterer Muschelseitling
Phallus	impudicus	L. ex Pers.	Stinkmorchel
Plicaturopsis	crispa	(Pers.: Fr.) Rea	Buchen-Aderzähling
Pseudoclitocybe	cyathiformis	(Bull.) Sing.	Kaffebrauner Gabeltrichterling
Sarcomixa	serotina	(Schrad.: Fr.) Karst.	Gelbstieliger Muschelseitling
Schizophyllum	commune	Fr. ex Fr.	Spaltblättling
Steccherinum	ochraceum	(Pers.ap.Gmel.: Fr.) S.F. Gray	Ockerrötlichr Resupinatstacheling
Stereum	hirsutum	(Willd.: Fr.) S.F. Gray	Zottiger Schichtpilz
Strobilurus	esculentus	(Wulf.: Fr) Sg.	Fichtenzapfenrübling
Vuilleminia	comedens	(Nees: Fr.) Maire	Rindensprenger



Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich sind auch Mikroaufnahmen eingeflochten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

Phellinus ferruginosus *Rostbrauner Feuerschwamm*

An Laubholz. Sporen 5 x 3 µm, Hyphensystem dimitisch, ohne Schnallen. P. ferruginosus unterscheidet sich von P. ferruguineo-fuscus durch das Vorkommen an Laubholz, den kleineren Q-Wert der Sporen und die sehr langen, zahlreichen Setae im Mycelfilz.

Pilze der Woche 3/4

Ganoderma lucidum *Glänzender Lackporling*

Standort:	Laubholz.
Fruchtkörper:	Hut bis über 20 cm gross, gestielt, Contex weisslich, die Hut–kruste kann leicht eingedrückt werden. Poren jung weiss bis ockerlich.
Mikromerkmale:	Sporen 11 x 7 µm, braun, ornamentiert wie alle Arten der Gattung. Hyphensystem trimitisch, generatrive Hyphen mit Schnallen.
Bemerkungen:	Contex ist im Vergleich zu G. carnosum heller (G. carnosum wächst hauptsächlich auf Nadelholz, Weisstanne).

Inonotus dryophilus *Eichen-Schillerporling*

Standort:	Hauptsächlich an Eichenholz.
Fruchtkörper:	bis über 20 cm.
Mikromerkmale:	Sporen 8 x 6 µm, braun, dickwandig. Hyphensystem monomitisch, ohne Schnallen.
Bemerkungen:	Ein seltener Pilz. Nebst I. rheades ist er der einzige der Gattung ohne Setae. Man unterscheidet ihn zu I. rheades durch das Vorkommen an Eiche und durch den grossen Mycelkern.

Ganoderma lucidum *Glänzender Lackporling*

Inonotus dryophilus

Eichen-Schillerporling

Pilz-Fundliste der Woche 3/4

Gattung	Art	Autor	Art Deutsch
Coniochaeta	velutina	(Fuckel) Cooke	
Daldinia	concentrica	(Bolt. ex Fr.) Ces. & de Not.	Kohliger Kugelpilz
Ganoderma	lucidum	(Curt.: Fr.) Karst.	Glänzender Lackporling
Hypoxylon	fragiforme	(Pers. ex Fr.) Kickx	Rötliche Kohlenbeere
Hypoxylon	multiforme	(Fr.) Fr.	Vielgestaltige Kohlenbeere
Inonotus	dryophilus	(Berk.) Murrill	Eichen-Schillerporling
Merulius	tremellosus	Fr.	Gallertfleischiger Fältling
Phellinus	ferruginosus	(Schrad.: Fr.) Pat.	Rostbrauner Feuerschwamm



Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich sind auch Mikroaufnahmen eingeflochten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

Pilze der Woche 8

Ganoderma lipsiense *Flacher Lackporling*

Standort: An verschiedenem Laubholz.
Fruchtkörper: Hut bis über 40 cm gross, ungestielt, Contex braun.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 5 µm, braun, ornamentiert wie alle Arten der Gattung. Hyphensystem trimitisch, generatrive Hyphen mit Schnallen.
Bemerkungen: Ein sitzender Lackporling mit weisslichen Porenmündungen, die bei Berührung stark bräunen.



Ischnoderma benzoinum
Schwarzgebänderter Harzporling

Standort: Fichtenholz.
Fruchtkörper: bis über 20 cm.
Mikromerkmale: Sporen 6 x 2,5 µm, hyalin. Hyphensystem dimitisch, generative Hyphen mit Schnallen.
Bemerkungen: Andere Arten dieser Gattung haben anders geformte Sporen oder wachsen auf Laubholz.



Ganoderma lipsiense (applanatum) *Flacher Lackporling*

Ischnoderma benzoinum *Schwarzgebänderter Harzporling*

Phellinus igniarius

Falscher Zunderschwamm

Standort:	An Laubbäumen, hauptsächlich an Apfelbäumen.
Fruchtkörper:	bis über 300 mm.
Mikromerkmale:	Sporen 7 x 6 µm, hyalin. Setae vorhanden. Hyphensystem dimitisch. Generative Hyphen ohne Schnallen.
Bemerkungen:	Typisch ist der wulstige Hutrand und das Vorkommen an Apfelbäumen. *P. nigrigans* hat einen scharfen Hutrand und wächst an Birken, *T. trivialis* hat ebenfalls einen scharfen Hutrand und wächst hauptsächlich an Weiden und Erlen. Alle sind mikroskopisch identisch.

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich sind auch Mikroaufnahmen eingeflochten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.



Fomes fomentarius: Porenbild

Trametes cervina: Porenbild

Fomes fomentarius *Echter Zunderschwamm*

Standort:	Laubholz, vorallem Buchen.
Fruchtkörper:	Hut bis 30 cm gross, ungestielt, sitzend.
Mikromerkmale:	Sporen 8 x 5 µm, hyalin. Hyphensystem trimitisch, Skeletthyphen dickwandig, bräunlich, Generative Hyphen dünnwandig, hyalin, mit Schnallen.
Bemerkungen:	Eindeutige Unterschiede zu anderen Porlingen, z.B, *Fometopsis pinicola* sind die Sporengrösse und die bräunlichen Skeletthyphen. Beim Erhitzen der Hutkruste des F*ometopsis pinicola* schmelzt diese, bei *Fomes fomentarius* nicht.

Trametes cervina *Hirschfarbene Tramete*

Standort:	Laubbäume.
Fruchtkörper:	bis 9 cm lang und bis 3 cm Radius.
Mikromerkmale:	Sporen 5 x 2 µm, hyalin, etwas allantoid. Hyphensystem trimitisch, generative Hyphen mit Schnallen, Skelett- und Bindehyphen gelblich
Bemerkungen:	Es ist die einzige Tramete mit labyrinthischem Hymenophor. Sie hat auch, im Gegensatz zu anderen behaarten Trameten, weite Poren. Links im Bild: Stereum subtomentosum.

Trametes cervina: Skelett- und Bindehyphen



Trametes cervina: Sporen

Fomes fomentarius *Echter Zunderschwamm*

Trametes cervina *Hirschfarbene Tramete*

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich sind auch Mikroaufnahmen eingeflochten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.



Pilze der Woche 13

Sarcoscypha coccinea
Zinnoberroter Prachtsbecherling

Standort: Auf Erde, Moos, an feuchten Stellen. Winter – Frühling.
Fruchtkörper: Hut bis 80 mm gross.
Mikromerkmale: Sporen 35 x 11 µm, hyalin, fast zylindrisch.
Bemerkungen: Dieser, manchmal gestielte Becherling könnte höchstens mit *Aleuria aurantia* verwechselt werden. Dieser erscheint jedoch nicht im Frühling, hat kleinere, netzige Sporen, keinen Stiel und ist dünnfleischiger.

Sepultaria sumneriana *Eingesenkter Borstling*

Standort: Unter Zedern in die Erde eingesenkt. Frühling.
Fruchtkörper: Hut bis 70 mm gross.
Mikromerkmale: Sporen 32 x 14 µm, hyalin, mit zwei Tropfen. Haare braun, dickwandig.
Bemerkungen: Dieser sternförmig aufreissende Becherling mit brauner dicht mit Haaren besetzten Aussenseite wächst hauptsächlich unter Zedern, nach Lit. auch unter Eiben, in die Erde eingesenkt.

Mycena flos-niveum *Schneeblumenhelmling*

Standort: Nadelstreu, morsches Holz. Frühling.
Fruchtkörper: Hut bis 30 mm gross.
Mikromerkmale: Sporen 10 x 4 µm, zylindrisch, hyalin, mit Tropfen. Cheilozystiden mit grobwarzigen bis fingerförmigen Auswüchsen. Stiel und Hutdeckschicht (Ixokutis) mit Auswüchsen. Septen mit Schnallen.
Bemerkungen: Dieser Helmling bildet seine Fruchtkörper schon früh im Jahr, meistens nach der Schneeschmelze. Der auch im Frühling auftretende *M. maculata* steht ihm nahe, hat aber einen kleineren Q-Wert der Sporen.

Fotos von Dr. Bernard Gsell

Sarcoscypha coccinea *Zinnoberroter Prachtsbecherling*

Sepultaria sumneriana *Eingesenkter Borstling*

Mycena flos-niveum *Schneeblumenhelmling*

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich sind auch Mikroaufnahmen eingeflochten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.



Pilze der Woche 17

Cortinarius romagnesi *Früher Wasserkopf*

Hut:	5–15 mm, kegelig, gebuckelt, etwas uneben, dunkel- bis rotbraun, Rand heller.
Fleisch:	crèmegelblich, dünnfleischig.
Geruch:	unbedeutend.
Lamellen:	heller als der Hut, bogig am Stiel angewachsen, Lamellenschneide glatt, mit Lameletten.
Stiel:	bis 25 x 3 mm, längsfaserig, etwas heller als der Hut, gegen Basis dunkler werdend, mit kupfergelben Glanzstellen, Basis mit weissem Velumfilz, z.T. büschelig zusammengewachsen, verbogen, apikal jung fast weiss.
Velum:	am Hut und Stiel flüchtig, weiss.
Sporen:	9 x 5 µm, mittelmässig warzig.
Basidien:	bis 35 x 9 µm, mit Basalschnalle.
Zystiden:	blasig-keulig, unterschiedlich, bis 35 x 11 µm.
HDS:	bis 12 µm, braun intracellulär pigmentiert und aufgelagert inkrustiert, mit Schnallen.
Vorkommen:	auf Brandstelle, umgebungsbäume meist Eichen, 5. April 2007, Arlesheim, im Gstüd, 30 m von der Ermitagestrasse entfernt, auf Kalk, Südwesthang. Ca. 12 Exemplare, wobei einige sehr klein und dunkler waren.
Bemerkungen:	Ebenfalls im Frühling wachsende Telamonien haben andere ökologische Ansprüche und Mikromerkmale. (C. helobius Sp. mit abgebogenem Appendix, C. vernus mit kleinerem Q-Wert).

Pachyella violaceonigra *Violettschwarzer Dickbecherling*

Standort:	An Wegränder in Verbindung mit morschem Holz.
Fruchtkörper:	Hut bis 100 mm gross.
Mikromerkmale:	Sporen sehr unterschiedlich, unsere Kollektion 18 x 8 µm, mit zwei Tropfen, Melzer pos., Paraphysen an der Spitze z.T. mit inkrustationen.
Bemerkungen:	Bei diesem Ascomycet werden die Sporen unterschiedlich in der Grösse interpretiert. Früher wurde die Art bei den Pezizas aufgeführt, weil beide Melzer pos. sind. P. violaceonigra ist jedoch dickfleischig und runzlig. Die Erde haftet stark am Fruchtkörper.

Caloscypha fulgens *Leuchtender Prachtsbecher*

Standort:	Im Nadel- und Laubstreu, auf übermooster Erde. Frühling.
Fruchtkörper:	Hut bis 40 mm gross.
Mikromerkmale:	Sporen 6 µm, rund, ohne Tropfen, Melzer neg.
Bemerkungen:	Dieser kaum gestielte Becherling ist aufgrund seiner leuchtend gelben Farbe mit grünlichen Flecken auf Druck wohl kaum verkennbar.

Cortinarius romagnesii *Früher Wasserkopf*

Cortinarius romagnesii

Früher Wasserkopf

Sporen

Cortinarius romagnesii

Früher Wasserkopf

Marginalzellen



Cortinarius romagnesii

Früher Wasserkopf

Huthaut

Pachyella violaceonigra *Violettschwarzer Dickbecherling*

Pachyella violaceonigra

Violettschwarzer Dickbecherling

Paraphysen

Pachyella violaceonigra

Violettschwarzer Dickbecherling

Sporen

Caloscypha fulgens *Leuchtender Prachtsbecher*

Gattung	Art	Autor	Art Deutsch
Caloscypha	fulgens	(Pers.) Boud.	Leuchtender Prachtbecher
Cantharellus	tubaeformis	Fr.	Durchbohrter Leistling
Coprinus	disseminatus	(Pers.: Fr.) S.F.Gray	Gesäter Tintling
Cortinarius	polymorphus	Hry.	Vielgestaltiger Klumpfuss
Discina	perlata	(Fr.) Fries	Scheibenlorchel
Disciotis	venosa	(Pers.) Boud.	Morchelbecherling
Encoelia	furfuraceae	(Roth ex Pers.) Karst.	Knäueliger Haselbecher
Fometopsis	pinicola	(Fr.) Karst.	Rotbrauner Baumschwamm
Ganoderma	applanatum	(Pers.) Pat.	Flacher Lackporling
Ganoderma	lucidum	(Curt.: Fr.) Karst.	Glänzender Lackporling
Gyromitra	esculenta	(Pers.) Fries	Frühjahrslorchel
Gyromitra	melaleuca	(Bres.) Kreisel	Schwarzweisse Lorchel
Helvella	acetabulum	(L. ex St. Amans) O. Kuntze	Hochgerippter Becherling
Inocybe	queletii	Maire et Konr.	Weisstannen-Risspilz
Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
Lentinus	tigrinus	(Bull.: Fr.) Fr.	Getiegerter Sägeblättling
Lepista	nuda	(Bull.: Fr.) Cooke	Violetter Rötelritterling
Morchella	conica	Pers.	Spitzmorchel
Morchella	esculenta	Pers. Ex St. Amans	Speisemorchel
Pachyella	violaceonigra	(Rehm) Pfister	Violettschwarzer Dickbecherling
Polyporus	badius	(Pers.: Gray) v. Schw.	Kastanienbrauern Porling
Polyporus	squamosus	Huds.: Fr.	Schuppiger Porling
Pseudoplectania	nigrella	(Pers. Ex. Fr.) Fuck.	Ungestielter Schwarzborstling
Pycnoporus	cinnabarinus	(Jacq.: Fr.) Karst.	Zinnoberrote Tramete
Rustroemia	bulgarioides	(Rabenh.) Karst.	Fichtenzapfen-Becherling
Sarcoscypha	coccinea	Fr.) Lamb.	Zinnoberroter Prachtsbecherling
Sepultaria	arenosa	(Fuck.) Boud.	Kleinsporiger Sandborstling
Sepultaria	sumneriana	(Cke.) Mass.	Eingesenkter Borstling
Strobilurus	tenacellus	(Pers.:Fr.) Sing.	Bitterer Nagelschwamm
Trichaptum	abietinum	(Fr.) Ryv.	Tannentramete
Tricholoma	scalpturatum	(Fr.) Quél.	Gilbender Erd-Ritterlig
Xeromphalina	campanella	(Batsch.: Fr.)	Geselliger Glöckchennabeling



Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich sind auch Mikroaufnahmen eingeflochten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

Pilze der Woche 19/20

Protocrea farinosa *Mehliger Krustenpustelpilz*

Standort: An faulenden Porlingen
Fruchtkörper: Das Stroma bildet flächige Überzüge auf dem Substrat.
Mikromerkmale: Sporen 4 x 3 µm, unregelmässig rundlich, Melzer neg. Asci 16-sporig, uniseriat.
Bemerkungen: Der Pilz wurde auf einem faulenden Phellinus gefunden. Die Gattung *Protocrea* unterscheidet sich zur Gattung *Hypocrea* durch das mehlige Stroma, während sich die Gattung *Creopus* durch grüne Sporen zu den beiden erstgenannten unterscheidet.

Asci mit Sporen



Sporen

Protocrea farinosa *Mehliger Krustenpustelpilz*

Pilz-Fundliste der Woche 19/20

Gattung	Art	Autor	Art Deutsch
Agrocybe	praecox	(Pers: Fr.) Fayod.	Voreilender Ackerling
Antrodia	serialis	(Fr.) Donk	Reihige Tramete
Auricularia	auricula-judae	(Bull. ex St. Am.) Wettst.	Judasohr
Auricularia	mesenterica	Dicks.: Fr.	Gezonter Ohrlappenpilz
Calocybe	cambosa	(Fr.) Donk	Mairitterling
Daedalea	quercina	(L. ex Fr.)	Eichenwirrling
Daedaleopsis	tricolor	(Pers.) Bond. & Sing.	Purpurrote Tramete
Fuligo	septica		Schleimpilz
Gloeophyllum	odoratum	(Wulf.: Fr.) Imyzeki	Fencheltramete
Hymenochaeta	rubiginosa	(Dicks.: Fr.) Lév.	Rotbrauner Borstenscheibling
Inocybe	fuscidula	Vel.	Braunstreifiger Risspilz
Lycogala	epidendrum		Schleimpilz
Mycena	renati	Quélet	Gelbstieliger Nitrat-Helmling
Peziza	varia	(Hedw.) Fr.	Riesenbecherling
Polyporus	brumalis	Pers.: Fr.	Winterporling
Polyporus	ciliatus	Fr.	Bewimperter Porling
Polyporus	squamosus	Huds.: Fr.	Schuppiger Porling
Protocrea	farinosa	(Berk. & Br.) Petch	Mehliger Krustenpustelpilz
Psathyrella	candolleana	(Fr.: Fr.) Maire	Behangener Faserling



Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich sind auch Mikroaufnahmen eingeflochten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

Pilze der Woche 21

Simocybe centunculus *Kleinsporiger Olivschnitzling*

Standort:	An morschem Laubholz, ab Frühling.
Fruchtkörper:	Hut bis 20 mm gross.
Mikromerkmale:	Sporen 6,5 x 4 µm, ohne Keimporus, braun. Mit Pielo-, Cheilo- und Caulocystiden. Septen z.T. mit Schnallen.
Bemerkungen:	Es ist eine kleine, braune Art mit olivton und samtigem Hut, der von der Mitte her ausblasst. Auffallend ist das dünne Fleisch und die breiten Lamellen. Mikroskopisch fallen die kleinen, z.T. bohnenförmigen Sporen auf.



Simocybe centunculus *Kleinsporiger Olivschnitzling*

Cheilozystiden

Caulozystiden

Sporen

Pilz-Fundliste der Woche 21

Gattung	Art	Autor	Art Deutsch
Agrocybe	praecox	(Pers: Fr.) Fayod.	Voreilender Ackerling
Agrocybe	semiorbicularis	(Bull.: St. Am.) Fay.	Halbkugeliger Ackerling
Cudoniella	clavus	(A. & S. ex Fr.) Dennis	Wasserkreisling
Geastrum	quadrifidum	Pers. ex Pers.	Kleiner Neststern
Gymnopus	butyracea	(Bull.: Fr.) P. Kumm.	Butterrübling
Gymnopus	dryophylla	(Bull.: Fr.) Kumm.	Waldfreund-Rübling
Inocybe	erubescens	Blytt	Ziegelroter Risspilz
Mutinus	caninus	(Huds.: Pers.) Fr.	Hundsrute
Mycena	stipata	Maas Geester.& Schw.	Büscheliger Nitrat-Helmling
Peziza	micropus	Pers.	Kurzstieliger Holzbecherling
Phallus	impudicus	L. ex Pers.	Stinkmorchel
Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
Russula	romellii	Maire	Weissstieliger Ledertäubling
Russula	spec.		
Simocybe	centunculus	(Fr.: Fr.) Karst.	Kleinsporiger Olivschnitzling
Strobilurus	tenacellus	(Pers.:Fr.) Sing.	Bitterer Nagelschwamm



Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich sind auch Mikroaufnahmen eingeflochten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

Der Frühlingsbummel, organisiert von Markus Wilhelm, führte uns am Samstag, den 2. Juni in die Freiberge nach Le Cernil. Der interessante Rundgang durch die dortige Moorlandschaft war, trotz nicht ganz optimalem Wetter, ein bleibendes Erlebnis.

Besten Dank an Markus für die Organisation und die Bilder Dacrymyces variisporus und Mycena viridimarginata.



Pilze der Woche 23 Frühlingsbummel

Dacrymyces variisporus *Verschiedensporige Gallertträne*

Standort: An totem Holz von Kiefern. Frühling bis Herbst.
Fruchtkörper: Hut bis 10 mm gross.
Mikromerkmale: Sporen 17 x 6 µm, hyalin, etwas gebogen, mehrfach septiert, sehr unterschiedlich in der Grösse. Basidien gegabelt. Septen mit Schnallen.
Bemerkungen: Es ist ein Kiefernbegleiter mit gallertigem Fleisch. Hauptsächlichster Unterschied zu anderen Dacrymyces mit Schnallen ist vorallem die Sporengrösse.

Mycena viridimarginata *Grünschneidiger Helmling*

Standort: In Nadelwäldern auf morschem Holz. Ab Frühling.
Fruchtkörper: Hut bis 20 mm gross.
Mikromerkmale: Sporen 11 x 6 µm, hyalin, z.T. tropfenförmig. Cheilozystiden mit fingerigen Auswüchsen. Septen mit Schnallen.
Bemerkungen: Der braune Hut mit olivton, der nitröse Geruch, die dunklen Lamellenschneiden und der dunkle Hutrand sowie das Vorkommen an morschem Nadelholz sind die wichtigsten Bestimmungshinweise.

Entoloma pallescens *Verblassender Glöckling*

Standort: In Nadelwäldern. Ab Frühling.
Fruchtkörper: Hut bis 25 mm gross.
Mikromerkmale: Sporen 10 x 8 µm, rosa, heterodiametrisch. Keine Zystiden und Schnallen. Huthauthyphen nicht inkrustiert. In der HDS fallen die verstreuten, rundlichen Zellen auf. Basidien zwei- und viersporig.
Bemerkungen: Dieser Pilz wird in der Untergattung Nolanea Helmlingsartige) ohne Cheilozystiden und mit nicht inkrustiertem Pigment aufgeführt. Er steht nahe *E. cetratum*, der zweisporig ist und kleinere, hellere Fruchtkörper aufweist und ebenfalls schon ab Frühling erscheint.

Dacrymyces variisporus *Verschiedensporige Gallertträne*

Dacrymyces variisporus *Verschiedensporige Gallertträne*

Mycena viridimarginata *Grünschneidiger Helmling*

Entoloma pallescens *Verblassender Glöckling*

Pilze der Woche 23 Frühlingsbummel

Gattung	Art	Autor	Art Deutsch
Agrocybe	praecox	(Pers: Fr.) Fayod.	Voreilender Ackerling
Agrocybe	praecox	(Pers: Fr.) Fayod.	Voreilender Ackerling
Bierkandera	adusta	(Willd.: Fr.) Karst.	Angebrannter Rauchporling
Bolbitius	vitellinus	(Pers.: Fr.) Fr.	Gold-Mistpilz
Calocybe	cambosa	(Fr.) Donk	Mairitterling
Cytidiella	melzerii	Pouzar	*(wird noch durch Sezialisten Abgeklärt)*
Dacrymyces	variisporus	McNabb	Verschidensporige Gallertträne
Entoloma	cetratum	(Fr.: Fr.) Moser	Ockerblättriger Rötlin
Fometopsis	pinicola	(Fr.) Karst.	Rotbrauner Baumschwamm
Gloeophyllum	odoratum	(Wulf.: Fr.) Imyzeki	Fencheltramete
Ischnoderma	benzoinum	(Wahl.: Fr.) Karst.	Schwarzgebänderter Harzporling
Marasmius	oreades	(Bolton.: Fr.) Fr.	Nelkenschwindling
Micromphale	perforans	(Hoffm.: Fr.) Gray	Nadelschwindling
Mycena	pura	(Pers.: Fr.) Kumm.	Rettich-Helmling
Mycena	stipata	Maas Geester.& Schw.	Büscheliger Nitrat-Helmling
Mycena	viridimarginata	Karst.	Grünschneidiger Helmling
Phellinus	hartigii	(All. & Schn.) Bond.	Tannen-Feuerschwamm
Pholiota	highlandensis	(Peck) Hes & Sm.	Kohlenschüppling
Phytoconis	ericetorum	(Pers.: Fries) Redhead et Kuyper	Gefalteter Flechtennabeling
Russula	nauseosa	(Pers.) Fr..	Geriefter Weichtäubling
Xeromphalina	fellea	Mre. & Mal.	Bitterer Glöckchennabeling

Weitere Arten der Woche in unserem Floristikgebiet

Agrocybe	dura	(Bolt.) Sing.	Rasiger Ackerling
Gymnopus	dryophylla	(Bull.: Fr.) Kumm.	Waldfreund-Rübling
Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.)Kotl. et Pouz.	Breitblattrübling
Polyporus	squamosus	Huds.: Fr.	Schuppiger Porling
Polyporus	tuberaster	(Jacq.: Pers.) Fr.	Sklerotien-Porling
Russula	risigallina	(Batsch) Kuyp. & v. Vuu.	Wechselfarbiger Dottertäubling
Russula	grisea	Fr.	Grauvioletter Reiftäubling
Scutellinia	scutellata	(L. ex St. Amans) Lambotte	Holz-Schildborstling
Tarzetta	cupularis	(L. ex Fr.) Lambotte ss. Dennis	Napfförmiger Kelchbecherling

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich sind auch Mikroaufnahmen eingeflochten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.



Bolbitius vitellinus *Gold-Mistpilz*

Standort:	An Wegrändern, auf Komposthaufen, altem Mist. Frühling bis Herbst.
Fruchtkörper:	Hut bis 40 mm gross.
Mikromerkmale:	Sporen 12 x 7 µm, rotbraun, dickwandig mit Keimporus. Mit Cheilo- und Caulozystiden. HDS hymeniform.
Bemerkungen:	Dieser Mistpilz gehört in den Formenkreis mit rostroten Sporen bei Verwendung von KOH sowie gelbem Hut. Der ganze Pilz ist schmierig, besonders bei feuchter Witterung. Auffällig ist die rotbraune Sporenverfärbung in KOH. Die abgebildete Kollektion weicht von der meisten Literatur in folgenden Teilen ab: Hut heller als gewöhnlich und schon jung ausgebreitet, Sporenform z.T. bohnenförmig.

Bolbitius vitellinus *Gold-Mistpilz*

Gattung	Art	Autor	Art Deutsch
Bolbitius	vitellinus	(Pers.: Fr.) Fr.	Gold-Mistpilz
Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
Calocera	viscosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Klebriger Hörnling
Chalciporus	piperatus	(Bull.: Fr.) Bat.	Pfeffer-Röhrling
Cortinarius	bolaris	(Pers.: Fr.) Fr.	Rotschuppiger Rauhkopf
Gymnopus	dryophylla	(Bull.: Fr.) Kumm.	Waldfreund-Rübling
Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
Inocybe	nitiduscula	(Britz.) Sacc.	Früher Risspilz
Macrolepiota	mastoidea	(Fr.) Sing.	Zitzenschirmling
Macrolepiota	procera	(Scop.: Fr. Sg.	Parasol
Marasmiellus	ramealis	(Bull.: Fr.) Sing.	Ästchenschwindlng
Marasmius	oreades	(Bolton.: Fr.) Fr.	Nelkenschwindling
Marasmius	rotula	(Scop.: Fr.) Fr.	Halsbandschwindling
Mycena	abramsii	(Murr.) Murr.	Voreilender Helmling
Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
Pluteus	nanus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Zwerg-Dachpilz
Pluteus	leonius	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Löwengelber Dachpilz
Rickenella	fibula	(Bull.: Fr.) Raith.	Orangegelber Heftelnabeling
Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
Russula	heterophylla	(Fr.) Fr.	Grüner Speisetäubling
Russula	melliolens	Quél.	Honigtäubling
Russula	puellaris	Fr.	Milder Wachstäubling
Tarzetta	catinus	(Holmsk. ex Fr.) Korf & J.K. Rogers	Tigelförmiger Kelchbecherling
Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe
Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich sind auch Mikroaufnahmen eingeflochten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.



VEREIN FÜR PILZKUNDE BASEL

Pilze der Woche 25

Psathyrella bipellis *Purpur-Mürbling*

Standort: Auf humusreichen Böden, vermischt mit Holzresten.
Fruchtkörper: Hut bis 40 mm gross.
Mikromerkmale: Sporen 12 x 7 µm, schwarz, mit Keimporus. Cheilozystiden z.T. apikal mit feinen Tröpfchen. HDS mit rundlichen Zellen.
Bemerkungen: Diese Art fällt auf durch das büschelige Auftreten z.T. in grossen Mengen auf Holzresten, durch das Verfärben des dunkelbraunen, hygrophanen Hutes zu weinbraun und die Tröpfchen der Zystiden an der Spitze.

Inocybe godeyi *Rötender Risspilz*

Standort: In Laubwäldern.
Fruchtkörper: Hut bis 50 mm gross.
Mikromerkmale: Sporen 10 x 7 µm, braun, dickwandig. Cheilo- und Pleurozystiden apikal inkrustiert, dickwandig, Caulozystiden bis zur Stielbasis.
Bemerkungen: Ein Risspilz, der sich durch die Rotverfärbung des Hutes und Stieles sowie die stark knollige Stielbasis, gut bestimmen lässt. Weitere rötende Arten sind: *I. erubescens,* mit dünnwandigen Cheilozystiden und *I. whitei,* schwächer rötend und ohne stark knollige Stielbasis.

Psathyrella bipellis, Cheilozystiden

Psathyrella bipellis (Quélet) Smith Purpur-Mürbling

Inocybe godeyi Gill. *Rötender Risspilz*

Inocybe godeyi, Cheilozystiden

Inocybe godeyi, Sporen

Pilze der Woche 25

Gattung	Art	Autor	Art Deutsch
Agrocybe	dura	(Bolt.) Sing.	Rasiger Ackerling
Agrocybe	semiorbicularis	(Bull.: St. Am.) Fay.	Halbkugeliger Ackerling
Amanita	ceciliae	Berkeley et Broome) Bas	Riesen-Streifling
Amanita	fulva	(Schäffer) Fr.	Rotbrauner Scheidenstreifling
Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
Amanita	ceciliae	(Berk. & Broome)Bas.	Riesenstreifling
Bierkandera	adusta	(Willd.: Fr.) Karst.	Angebrannter Rauchporling
Boletus	luridus	Schäff.: Fr.	Netzstieliger Hexenröhrling
Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
Clitocybe	costata	Kühn. & Romagn.	Kerbrandiger Trichterling
Conocybe	lactea	(Lge.) Métr.	Milchweisses Samthäubchen
Cortinarius	semisanguineus	(Fr.)	Blutblättriger Hautkopf
Cystolepiota	seminuda	(Lasch.) Bon	Weisser Mehlschirmling
Gloeophyllum	abietinum	Fr. ex Fr.	Tannenblättling
Gymnopus	fusipes	(Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling
Heterobasidion	annosum	(Fr.) Bref.	Wurzelschwamm
Inocybe	godeyi	Gill.	Rötender Risspilz
Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
Marasmiellus	ramealis	(Bull.: Fr.) Sing.	Ästchenschwindlng
Marasmius	rotula	(Scop.: Fr.) Fr.	Halsbandschwindling
Marasmius	androsaceus	(L.: Fr.) Fr.	Rosshaarschwindling
Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.)Kotl. et Pouz.	Breitblattrübling
Panaeolus	foeniseccii	(Per.: Fr.) Schr.	Heudüngerling
Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
Peziza	varia	(Hedw.) Fr.	Riesenbecherling
Phaeocollybia	lugubris	(Fr.) Heim	Gemeiner Wurzelschnitzling
Pholiota	tuberculosa	(Schäff.: Fr.)	Rötender Schüppling
Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
Pluteus	leonius	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Löwengelber Dachpilz
Pluteus	nanus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Zwerg-Dachpilz
Pluteus	salicinus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Grauer Dachpilz
Protocrea	farinosa	(Berk. & Br.) Petch	Mehliger Krustenpustelpilz



Gattung	Art	Autor	Art Deutsch
Psathyrella	bipellis	(Quélet) Smith	Purpur-Mürbling
Russula	aurea	Pers.	Goldtäubling
Russula	carpini	Gir. & Hein.	Hainbuchentäubling
Russula	cyanoxantha fo. pelter.	R. Maire.: Singer	Grüner Frauentäubling
Russula	integra	(L.:) Fr. ss. Mre.	Braunroter Ledertäubling
Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
Russula	grisea	Fr.	Grauvioletter Reiftäubling
Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
Russula	puellaris	Fr.	Milder Wachstäubling
Russula	raoultii	Quél.	Blassgeber Täubling
Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
Simocybe	centunculus	(Fr.: Fr.) Karst.	Kleinsporiger Olivschnitzling
Tapinella	panuoides	(Fr.: Fr.) Gilbert	Muschel-Krempling
Tremiscus	helveloides	(DC: Pers.) Donk	Roter Gallerttrichterling

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich sind auch Mikroaufnahmen eingeflochten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.



Pilze der Woche 26

Russula raoultii *Blassgeber Täubling*

Standort: In Laub- und Nadelwäldern.
Fruchtkörper: Hut bis 50 mm gross.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 6,5 µm, weiss, warzig-verbunden, mit Dermatozystiden.
Bemerkungen: Ein scharfer Täubling mit blasser Gelb-Tönung auf dem Hut und weissen Sporen. Ein ähnlicher, ebenfalls scharfer Täubling ist *R. solaris,* mit isolierten Sporen und warmem Gelb auf dem Hut.

Cortinarius rubicundulus *Rötlichfaseriger Rauhkopf*

Standort: Laub- und Nadelbäume.
Fruchtkörper: Hut bis 70 mm gross.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 4 µm, braun, schwach warzig.
Bemerkungen: *C. rubicundulus* ist ähnlich *C. bolaris*, beide haben einen schuppigen Hut, wobei *C. rubicundulus* etwas grösser und nur schwach schuppig ist, das Fleisch verfärbt sich beim Aufschnitt gelb. Die Sporen sind bei *C. rubicundulus* nicht rundlich.

Cortinarius bolaris *Rotschuppiger Rauhkopf*

Standort: Laubbäume.
Fruchtkörper: Hut bis 50 mm gross.
Mikromerkmale: Sporen 7 x 5,5 µm, braun, schwach warzig.
Bemerkungen: Im Gegensatz zu *C. rubicundulus* verfärbt sich das Fleisch von *C. bolaris* beim Anschnitt orangegelb, die Sporen sind rundlich, die Schuppen grösser und der Stiel ist auch schuppig.

Russula raoultii *Blassgeber Täubling*

Cortinarius rubicundulus
Rötlichfaseriger Rauhkopf

Cortinarius bolaris
Rotschuppiger Rauhkopf

Cortinarius bolaris *Rotschuppiger Rauhkopf*

Gattung	Art	Autor	Art Deutsch
Agrocybe	semiorbicularis	(Bull.: St. Am.) Fay.	Halbkugeliger Ackerling
Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
Boletus	luridus	Schäff.: Fr.	Netzstieliger Hexenröhrling
Bovista	limosa	Rostr.	Strand-Bovist
Bulgaria	inquinans	(Prs.:) Fries	Gemeiner Schmutzbecherling
Clitocybe	gibba	(Pers.) Kumm.	Ockerbrauner Trichterling
Cortinarius	bolaris	(Pers.: Fr.) Fr.	Rotschuppiger Rauhkopf
Cortinarius	renidens	Fr.	Quitten-Wasserkopf
Cortinarius	rubicundulus	(Rea) Pears.	Rötlichfaseriger Rauhkopf
Cystolepiota	seminuda	(Lasch) Bon	Behangener Mehlschirmling
Entoloma	phaeocyathus	Noordeloos	Becher-Nabeling
Hapalopilus	rutilans	(Pers.: Fr.) Karst.	Zimtfarbener Weichporling
Inocybe	rimosa	(Bull.: Fr:) Kummer	Kegeliger Risspilz
Lactarius	cremor	Fr.	Runzliger Zwergmilchling
Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
Lactarius	volemus	(Fr.: Fr.) Fr.	Brätling
Leccinum	carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuss
Lepiota	lilacea	Bres.	Lila-Schirmling
Peziza	succuosa	Berk.	Gelbmilchender Becherling
Pseudocraterellus	sinuosus	(Fr.: Fr.) Reid.	Krauser Leistling
Russula	aurea	Pers.	Goldtäubling
Russula	grisea	Fr.	Grauvioletter Reiftäubling
Russula	heterophylla	(Fr.) Fr.	Grüner Speisetäubling
Russula	raoultii	Quél.	Blassgeber Täubling
Russula	solaris	Ferd. et Winge	Sonnentäubling
Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
Russula	amoeolens	Romagn.	Brauner Camemberttäubling
Stropharia	coronilla	(Bull.: Fr.) Quél.	Krönchenträuschling
Stropharia	rugosoannulata	Farl. ex Murr.	Rotbrauner Riesenträuschling
Telephora	palmata	Scop.: Fr.	Stinkender Warzenpilz
Telephora	penicillata	Pers.: Fr.	Pinsel-Warzenpilz

Gattung	Art	Autor	Art Deutsch
Vascellum	pratense	Pers.: Pers.) Kreisel	Wiesen-Stäubling
Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe
Xerocomus	communis	(Bulliard) Bon	Eichen-Filzröhrling

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich sind auch Mikroaufnahmen eingeflochten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.



VEREIN FÜR PILZKUNDE BASEL

Pilze der Woche 27

Entoloma phaeocyatus *Becher-Nabeling*

Standort: Trockenrasen auf Kalk, Weg auf fester Erde.
Fruchtkörper: Hut bis 15 mm gross.
Mikromerkmale: 8,5 x 7,5 µm, rotbraun, rundlich mit schwach ausgebildeten 5-6 Ecken. Nur Cheilozystiden, diese schwer sichtbar, an Lamelletten kaum zu sehen, kleiner und schmaler als die Basidien. ca. 20 x 10 µm meist keulig-spindelig, seltener etwas kopfig (Schneide nicht steril). HDS liegende Hyphen mit Tendenz zu einem Trichoderm (Schüppchen), Zellen sehr lang, bis 100 µm und bis 30 µm breit, Pigment vakuolär und inkrustiert, braun.
Bemerkungen: Dieser Rötling gehört in die Sektion Undati mit nabelingsartigem Fruchtkörper. Innerhalb der Sektion gehört er zu denjenigen braunen Arten mit stark herablaufenden Lamellen, faserig bis flockig-schuppigem Hut, septierten Cheilozystiden, isodiametrischen Sporen und einer HDS mit inkrustierten Hyphen mit Neigung zu einem Trichoderm. (Siehe Detailbeschreibung von Markus Wilhelm).

Simocybe (Ramicola) sumtuosa *Üppiger Olivschnitzling*

Standort: Morsches Laubholz, Rinde.
Fruchtkörper: Hut bis 40 mm gross.
Mikromerkmale: Sporen 8,5 x 5 µm, braun, bohnenförmig. HDS ein Trichoderm durch Pileocystiden, Hypen mit Schnallen, mit Cheilo und Caulozystiden.
Bemerkungen: Dieser Schnitzling gehört zudenjenigen Arten mit zentralem Stiel und Vorkommen auf Laubholz. Die Sporen und die Fruchtkörper sind grösser als bei C. centuculus.

Entoloma phaeocyatus *Becher-Nabeling*

Entoloma phaeocyatus
Becher-Nabeling



Cheilozystiden in Kongo

Fundnotizen

Datum: 25. Juni 2007 | Gattung: Entoloma | Art: Entoloma phaeocyathus, Noord.

Fundort	Zinnköpfle, Elsass
Ökologie	Trockenrasen auf Kalk, im Weg auf fester Erde Grössere Anzahl, gesellig, weit verteilt
Hutmasse	1-1,5 cm, nabelingsartig mit z.T. sehr tiefem Nabel
Oberfläche	Silbrig schimmernd aber mit viel Schübchen, anliegend und nur in der Mitte aufstehend, ungerieft, nicht richtig hygrophan, sondern einfach ausblassend, am Rand manchmal mit einer oder 2 konzentrischen Zonen, Rand sehr kurz überstehend
Farbe	Dunkelbraun, alt etwas heller glänzend, durchgefärbt. *Korn. & Wanscher* 5F5-8: russ-, tabak-, kaffeebraun, umbra
Lamellen	Entfernt, zwischen jeder durchgehenden 4-6 z.T. sehr kurze Lamelletten. Weit herablaufend, dünn und schmal. Farbe braun, nur alt etwas rötlich
Lamellen-Schn.	Glatt, gleichfarben
Stielmasse	1-2 cm x 1-2 mm, zylindrisch
Stiel-Oberfläche	Glatt, längsfaserig, leicht glänzend, dem Hut ähnlich, etwas heller braun
Fleisch	Dünn, weisslich-braun, Geruch null, Geschmack etwas fade, erdig
Spp.-Farbe	Rotbraun, 7E7: braun
Sporenform	Fast globos mit schwach ausgebildeten 5-6 Ecken, oft fast rund
Sporenmasse	7,5-9,7 x 7,2-8,2 µm
Hymenium	Regulär
Basidien	4-sporig, 30-35 x 10-13 µm, ohne Schnalle
Zystiden	Nur Cheilozystiden, diese schwer sichtbar, an Lamelletten kaum zu sehen, kleiner und schmaler als die Basidien, ca. 20 x 10 µm, meist keulig-spindelig, seltener etwas kopfig. Lamellenschneide nicht steril
HDS-Aufbau	Liegende Hyphen mit Tendenz zu einem Trichoderm (Schüppchen), Zellen sehr lang, bis 100 µm und breit bis 30 µm
Pigment der HDS	Vakuolär und inkrustiert, braun
Stielbekleidung	Ohne bes. Merkmale.
Bemerkungen:	Die Art dürfte richtig bestimmt sein. Ein heikler Punkt sind die Zystiden, die wohl nur mit einiger Übung gesehen werden, aber es sind eindeutig keine Basidiolen, wie man bei einigen sog. Zystiden oft vermuten kann. Nicht alle Abb. zeigen derart genabelte Exemplare wie mein Fund.

Literatur: Noord. Fung. Europei / Enderle, Fl. Ulm / Div. Schlüssel

Fundmeldung, Fotos, Fundbeschreibung: *Markus Wilhelm*

Simocybe (Ramicola) *Üppiger Olivschnitzling*

Simocybe (Ramicola) sumtuosa
Üppiger Olivschnitzling



Simocybe (Ramicola) sumtuosa (Ort.) Sing., *Üppiger Olivschnitzling*

Die Art kann wie folgt von S. centunculus unterschieden werden:

Meist einiges grösser, Hut bis 4 cm, sehr auffallend silberig bereift, nicht so düster, Sporen nur leicht grösser, aber deutlicher nierenförmig, Pileozystiden fast doppelt so lang, fast 100 µm. S. sumtuosa ist seltener, ich finde diese Art meist in der Nähe des Rheins.

Photos und Bestimmung von Markus Wilhelm

Pilze der Woche 27

Gattung	Art	Autor	Art Deutsch
Agaricus	augustus	Fr.	Braunschuppiger Riesenegerling
Amanita	ceciliae	Berkeley et Broome) Bas	Riesen-Streifling
Amanita	mairei	Foley	Silbergrauer Scheidenstreifling
Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
Amanita	vaginata	(Bull.) Vitt.	Grauer Scheidenstreifling
Boletus	pulverlulentus	Opat.	Schwarzblauender Röhrling
Chamaemyces	fracidus	(Fr.) Donk	Fleckender Schmierschirmling
Clitocybe	costata	Kühn. & Romagn.	Kerbrandiger Trichterling
Clitopilus	scyphoides	(Fr.) Sing.	Kreidiger Mehlräsling
Coprinus	acuminatus	(Romagnesi) Orton	Schmalsporiger Faltentintling
Cortinarius	fraudulosus	Britz.	Trügerischer Schleimkopf
Cortinarius	rubicundulus	(Rea) Pears.	Rötlichfaseriger Rauhkopf
Entoloma	flocculosum	(Bres.) Pac.	Flockiger Zwerg-Rötling
Hohenbuhelia	cyphelliformis	(Berk.) Mill.	Schälchenförmiger Muscheling
Inocybe	dunensis	P.D. Ort.	Dünen-Risspilz
Inocybe	petiginosa	(Fr.: Fr.) Gillet	Graugezonter Zwergrisspilz
Inocybe	rimosa	(Bull.: Fr:) Kummer	Kegeliger Risspilz
Lactarius	acris	(Bolt.: Fr.) Gray	Rosaanlaufender Milchling
Lactarius	camphoratus	(Bull.: Fr.) Fr.	Kamfermilchling
Lactarius	cremor	Fr.	Runzliger Zwergmilchling
Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
Marasmiellus	vaillantii	(Pers.: Fr.) Sing.	Matter Zwergschwindling
Marasmius	curreyi	Berk & Br.	Orangerötlicher Schwindling
Mycena	stipata	Maas Geester.& Schw.	Büscheliger Nitrat-Helmling
Porphyrellus	porphyrosporus	Fr.) Gilbert	Düsterer Röhrling
Rickenella	fibula	(Bull.: Fr.) Raith.	Orangegelber Heftelnabeling
Russula	amoenicolor	Rom.	Brätlingstäubling
Russula	amoeolens	Romagn.	Brauner Camemberttäubling
Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
Russula	heterophylla	(Fr.) Fr.	Grüner Speisetäubling
Russula	integra	(L.:) Fr. ss. Mre.	Braunroter Ledertäubling
Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling

Pilze der Woche 27

Gattung	Art	Autor	Art Deutsch
Russula	puellaris	Fr.	Milder Wachstäubling
Russula	raoultii	Quél.	Blassgeber Täubling
Russula	risigallina	(Batsch) Kuyp. & v. Vuu.	Wechselfarbiger Dottertäubling
Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
Simocybe	sumtuosa	(Ort.) Sing.	Üppiger Olivschnitzling
Tylopilus	felleus	(Bull.: Fr.) Karst.	Gallenröhrling
Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich sind auch Mikroaufnahmen eingeflochten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

Pilze der Woche 28

Macrolepiota rachodes var. hortensis *Garten-Riesenschirmling*

Standort:	In Gärten, Parkanlagen.
Fruchtkörper:	Hut bis 150 mm gross.
Mikromerkmale:	Sporen 10 x 6 µm, weiss, dickwandig, Cheilozystiden blasig.
Bemerkungen:	Ein Riesenschirmling, der auf Druck stark rötet und einen nicht schuppigen Stiel hat. Die doppelte Manchette ist mobil. Diese Varietät erscheint gesamthaft heller, als die *var. rachodes*. Die giftige *M. venenata* hat nach Bon einen nicht doppelten Ring und keine Schnallen an den Hyphensepten. Es sind von der *var. hortensis* und *M. venenata* Vergiftungen bekannt, es dürfte sich dabei jedoch um Verwechslungen handeln. Bei Funden auf Komposthaufen sollte man jedoch bei Genuss vorsichtig sein.



Macrolepiota rachodes var. hortensis *Garten-Riesenschirmling*

Pilze der Woche 28

Gattung	Art	Autor	Art Deutsch
Amanita	ceciliae	Berkeley et Broome) Bas	Riesen-Streifling
Boletus	luridus	Schäff.: Fr.	Netzstieliger Hexenröhrling
Boletus	aestivalis	(Paul.) Fr.	Sommersteinpilz
Clitocybe	gibba	(Pers.) Kumm.	Ockerbrauner Trichterling
Coprinus	domesticus	(Bolt.y: Fr.) Gra	Haus-Tintling
Galerina	vittiformis	(Fr.) Moser	Variabler Moos-Häubling
Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
Hygrocybe	conica	(Scopp.: Fr.) Kumm.	Kegeliger Saftling
Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
Lactarius	camphoratus	(Bull.: Fr.) Fr.	Kamfermilchling
Lactarius	cremor	Fr.	Runzliger Zwergmilchling
Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
Lactarius	subdulcis	(Per.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchen-Milchling
Lactarius	volemus	(Fr.) Fr.	Brättling
Leccinum	carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuss
Lenzites	betulina	(L. ex Fr.) Fr.	Birkenblättling
Macrolepiota	bohemica	(Wich.) Krgl. & Páz.	Garten-Riesenschirmling
Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
Pseudocraterellus	sinuosus	(Fr.: Fr.) Reid.	Krauser Leistling
Pseudohydnellum	gelatinosum	(Scop.: Fr.) Karst.	Zitterzahn
Russula	brunneoviolacea	Crawsh.	Grauvioletter Samttäubling
Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
Russula	laurocerasi	Melzer	Mandeltäubling
Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
Russula	turci	Bres.	Jodoformtäubling
Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
Russula	emetica	(Schäff.: Fr.) Gray	Kirschroter Speitäubling
Scleroderma	areolatum	Ehrenb.	Gefelderter Kartoffelbovist
Scleroderma	citrinum	Pers.	Dickschaliger Kartoffelbovist
Scutellinia	scutellata	(L. ex St. Amans) Lambotte	Holz-Schildborstling
Strobilomyces	strobilaceus	(Scop.: Fr.) Berk.	Strubelkopfröhrling
Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
Tricholoma	ustale	(Fr.: Fr.) Kumm.	Brandiger Ritterling
Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling



Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich sind auch Mikroaufnahmen eingeflochten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.



VEREIN FÜR PILZKUNDE BASEL

Pilze der Woche 29

Helvella macropus *Langfuss-Lorchel*

Standort: Auf Erde in Laub- und Nadelwälder.
Fruchtkörper: Hut bis 30 mm gross.
Mikromerkmale: Sporen 23 x 10 µm, spindelig, mit meistens 3 Tropfen.
Bemerkungen: Ein Langfüssler mit haariger Aussenseite und haarigem Stiel.

Scutellinia legalie *Stachelsporiger Schildborstling*

Standort: Auf nackter Erde.
Fruchtkörper: Hut bis 8 mm gross.
Mikromerkmale: Sporen 15 µm, ohne Stacheln.
Bemerkungen: Diese Art gehört in den Formenkreis derjenigen rundsporigen Arten mit an der Basis gegabelten Haaren. Zwei weitere Arten dieses Formenkreises sind: *S. barla*, Haare nur bis 350 µm und *S. trechispora,* Haare über 1000 µm. Die beiden letzgenannten Arten haben zudem etwas grössere Sporen.



Scutellinia legalie

Helvella macropus *Langfuss-Lorchel*

Scutellinia legalie *Stachelsporiger Schildborstling*

Pilze der Woche 29

Gattung	Art	Autor	Art Deutsch
Agaricus	arvensis	Schäffer : Fr.	Schafchampignon
Agaricus	silvicola	(Vittad.) Sacc.	Dünnfleischiger Anis-Egerling
Amanita	ceciliae	Berkeley et Broome) Bas	Riesen-Streifling
Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
Cantharellus	cibarius var. amethyst.	Quél.	Lilahütiger Eierschwamm
Cantharellus	friesii	Quél.	Fries´scher Pfifferling
Clavulina	cinereus	(Bull.: Fr.) Schröt.	Graue Koralle
Clitocybe	fragrans	(With.) Kumm.	Dufttrichterling
Coltricia	perennis	(L.: Fr.) Murrill	Brauner Dauerporling
Coprinus	bisporus	Lge.	Zweisporiger Tintling
Cortinarius	acutus	(Pers.: Fr.) Fr.	Spitzgebuckelter Wasserkopf
Cortinarius	sanguineus	(Wulf.: Fr.) Gray	Blutroter Hautkopf
Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
Helvella	macropus	(Per.: Fr.) Karsten	Langfuss-Lorchel
Inocybe	cervicolor	(Pers.) Quél.	Hirschbrauner Risspilz
Inocybe	pusio	Karst.	Radialrissiger Risspilz
Inocybe	rimosa	(Bull.: Fr:) Kummer	Kegeliger Risspilz
Lactarius	cremor	Fr.	Runzliger Zwergmilchling
Lactarius	deterrimus	Gröger	Fichtenreizker
Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
Lactarius	quietus	(Fr.) Fr.	Eichenmilchling
Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
Lactarius	subdulcis	(Per.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchen-Milchling
Lepiota	cristata	(Bolton.: Fr.) Kummer	Stink-Schirmling
Macrolepiota	procera	(Scop.: Fr. Sg.	Parasol
Mycena	pelianthina	(Fr.: Fr.) Quél.	Schwarzgezähnelter Helmling
Mycena	pelianthina	(Fr.: Fr.) Quél.	Schwarzgezähnelter Helmling
Mycena	stipata	Maas Geester.& Schw.	Büscheliger Nitrat-Helmling
Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
Peziza	succuosa	Berk.	Gelbmilchender Becherling



Pilze der Woche 29

Gattung	Art	Autor	Art Deutsch
Ramaria	rubella	(Schäff.: Krombh.) Peter.	Rotbraune Koralle
Russula	amethystina	Quélet	Amethysttäubling
Russula	cyanoxantha fo. pelter.	R. Maire.: Singer	Grüner Frauentäubling
Russula	gracillima	J. Schäffer	Zierlicher Birken-Täubling
Russula	integra	(L.:) Fr. ss. Mre.	Braunroter Ledertäubling
Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
Russula	puellaris	Fr.	Milder Wachstäubling
Russula	turci	Bres.	Jodoformtäubling
Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling
Scutellinia	legalie	Lohmeyer & Häffner	Stachelsporiger Schildborstling
Tricholoma	equestre	(L.: Fr.) Kumm.	Grünling
Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling



Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich sind auch Mikroaufnahmen eingeflochten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.



Pilze der Woche 30

Agarigus excellens *Schneeweisser Riesen-Champignon*

Standort: Nadelwälder.
Fruchtkörper: Hut bis über 150 mm gross.
Mikromerkmale: Sporen 10 x 6 µm, dunkelbraun, dickwandig.
Bemerkungen: Diese Art mit feinschuppig-faserigem Hut gehört in die Sektion *Flavescentes:* auf Druck und im Alter gilbend, Anis-Mandeln-Geruch. Der sehr ähnliche *A. macrosporus* unterscheidet sich durch den Standort auf Wiesen und den schwächeren Geruch als *A. excellens*. Vielleicht sind es sogar dieselben Arten?

Lactarius azonites *Rauchfarbener Rosamilchling*

Standort: Laubwälder.
Fruchtkörper: Hut bis 90 mm gross.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 7,5 µm mit netzig-verbundenen Rippen.
Bemerkungen: Eine Art unter den *Plinthogali* mit erst nach einiger Zeit rosaverfärbender Milch, fast weissem Stiel und glattem Hut. Geschmack scharf.

Agarigus exellens *Schneeweisser Riesen-Champignon*

Lactarius azonites *Rauchfarbener Rosamilchling*

Pilze der Woche 30

Gattung	Art	Autor	Art Deutsch
Suillus	granulatus	(L.: Fr.) Rouss.	Körnchenröhrling
Suillus	granulatus	(L.: Fr.) Rouss.	Körnchenröhrling
Agarigus	exellens	(Moll.) Moll.	Schneeweisser Riesen-Champignon
Cortinarius	acutus	(Pers.: Fr.) Fr.	Spitzgebuckelter Wasserkopf
Cortinarius	caerulescens	(Schäff.) Fr.	Blauer Klumpfuss
Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
Echinoderma	perplexum	(Knuds.) Bon	Ringloser Stachelschirmling
Hygrophorus	eburneus	(Bull.: Fr.) Fr.	Elfenbein-Schneckling
Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
Inocybe	cervicolor	(Pers.) Quél.	Hirschbrauner Risspilz
Inocybe	erubescens	Blytt	Ziegelroter Risspilz
Inocybe	fraudans	(Britz.) Sacc.	Birnen-Risspilz
Inocybe	fuscidula	Vel.	Braunstreifiger Risspilz
Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
Inocybe	rimosa	(Bull.: Fr:) Kummer	Kegeliger Risspilz
Lepista	splendens	(Pers.: Fr.) Konrad	Dichtblättriger Rötelritterling
Marasmius	scordonius	(Fr.: Fr.) Fr.	Küchen-Schwindling
Marasmius	torquescens	Quél.	Ledergelber Schwindling
Mycena	flavoalba	(Fr.) Quél.	Zitronengelber Helmling
Mycena	rubromarginata	(Fr.: Fr.) Kumm.	Rotschneidiger Helmling
Mycena	renati	Quélet	Gelbstieliger Nitrat-Helmling
Lactarius	azonites	(Bull.) Fr.	Rauchfarbener Rosamilchling
Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
Lactarius	volemus	(Fr.: Fr.) Fr.	Brätling
Russula	amethystina	Quélet	Amethysttäubling
Russula	aurea	Pers.	Goldtäubling
Russula	farinipes	Romell in Britz.	Mehlstieltäubling
Russula	illota	Romagn.	Morsetäubling
Russula	integra	(L.:) Fr. ss. Mre.	Braunroter Ledertäubling
Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
Russula	pseudodelica	Lange (nec J. Schäf.) sec. Blum	Scharfer Weisstäubling
Hydnellum	peckii	Banker in Peck	Scharfer Korkstacheling



Gattung	Art	Autor	Art Deutsch
Hydnellum	suaveolens	(Scop. Ex. Fries) Karst	Wohlriechender Korkstacheling
Phellodon	melaleucus	(Sw. apud Fr.: Fr.) Karst.	Schwarzweisser Korkstacheling
Phellodon	tomentosus	(L.: Fr.) Banker	Becherförmiger Korkstacheling
Ramaria	formosa	(Pers.: Fr.) Quél.	Dreifarbene Koralle
Geastrum	sessile	(Sow.) Pouz.	Gewimperter Erdstern

Marasmius scordonius
Küchen-Schwindling

Dieser Knoblauch-Schwindling unterscheidet sich von *M. alliaceus* durch nicht intensiven, angenehmen Knoblauchgeruch, die hellere Hutfarbe und Cheilozystiden mit fingerförmigen Auswüchsen.

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich sind auch Mikroaufnahmen eingeflochten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.



VEREIN FÜR PILZKUNDE BASEL

Pilze der Woche 31

Inocybe maculata *Gefleckter Risspilz*

Standort: Mischwälder.
Fruchtkörper: Hut bis 60 mm
Mikromerkmale: Sporen 9 x 5 µm
Bemerkungen: *I. maculata* gehört in den Formenkreis denjenigen Arten mit nur dünnwandigen Cheilozystiden. Unter diesen unterscheidet sie sich vorallem durch das weisse Velum in der Hutmitte und die ziemlich dunklen Fruchtkörper.

Clitocybe glareosa *Kiesliebender Trichterling*

Standort: Trockenrasen.
Fruchtkörper: Hut bis 50 mm.
Mikromerkmale: Sporen 7 x 3,5 µm.
Bemerkungen: Diese Art wächst in Kalktrockenrasen, oft in grösseren Mengen. Durch die schön rotbraune Farbe ist dieser Trichterling gut anzusprechen. Früher wurde dieser Pilz meist als *C. bresadolana* Singer bestimmt. Diese Art soll jedoch nur in alpinen Regionen vorkommen und sich vor allem durch eine stark braune Reaktion mit KOH von *C. glareosa* unterscheiden. Es gibt noch weitere ähnliche Trichterlinge, die dann aber im Wald zu finden sind. *Foto und Text: Markus Wilhelm*



Inocybe maculata, Cheilozystiden

Inocybe maculata, Sporen

Inocybe maculata *Gefleckter Risspilz*

Clitocybe glareosa *Kiesliebender Trichterling*

Pilze der Woche 31

1	Paxillus	filamentosus	Fr.	Erlen-Krempling
1	Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
1	Strobilomyces	strobilaceus	(Scop.: Fr.) Berk.	Strubelkopfröhrling
2	Agaricus	arvensis	Schäff.: Fr.	Schaf-Champignon
2	Agaricus	silvaticus	Schäff.: Fr.	Echter Wald-Champignon
2	Amanita	umbrinolutea	Secr.: Gill.) Bat.)	Verfärbender Scheidenstreifling
2	Clitocybe	glareosa	Röllin et Monthoux	Kiesliebender Trichterling
2	Clitopilus	prunulus	(Scop.: Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Cortinarius	spadiceus	Fr.	Brauner Schleimkopf
2	Cortinarius	torvus	(Bull.: Fr.) Fr.	Wohlriechender Gürtelfuss
2	Cortinarius	variecolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf
2	Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
2	Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Hypholoma	lateritium	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf
2	Inocybe	cookei	Bres.	Knolliger Risspilz
2	Inocybe	maculata	Boud.	Gefleckter Risspilz
2	Inocybe	rimosa	(Bull.: Fr:) Kummer	Kegeliger Risspilz
2	Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2	Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
2	Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
2	Mycena	pura	(Pers.: Fr.) Kumm.	Rettich-Helmling
2	Mycena	renati	Quélet	Gelbstieliger Nitrat-Helmling
2	Stropharia	semiglobata	(Batsch.: Fr.) Quél.	Halbkugeliger Träuschling
2	Tricholoma	inamoenum	(Fr.) Quél.	Lästiger Ritterling
2	Tricholoma	scalpturatum	(Fr.) Quél.	Gilbender Erd-Ritterlig
2	Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
3	Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
3	Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
3	Lactarius	rufus	(Scop.: Fr.) Fr.	Rotbrauner Milchling
3	Lactarius	subdulcis	(Per.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchen-Milchling
3	Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
3	Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



3	Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
3	Russula	integra	(L.:) Fr. ss. Mre.	Braunroter Ledertäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	queletii	Fr. in Quél.	Stachelbeertäubling
3	Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
3	Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
4	Antrodiella	hoehnelii	(Bres.: Höhn.) Niemelä	Spitzwarzige Tramete
4	Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
4	Cantharellus	friesii	Quél.	Fries´scher Pfifferling
4	Cantharellus	tubaeformis	Fr.	Durchbohrter Leistling
4	Hydnellum	concrescens	(Pers.: Schw.) Bank.	Gezonter Korkstacheling
4	Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
4	Phellodon	tomentosus	(L.: Fr.) Banker	Becherförmiger Korkstacheling
4	Telephora	penicillata	Pers.: Fr.	Pinsel-Warzenpilz
4	Telephora	terrestris	Fr.	Fächerförmiger Erdwarzenpilz
5	Bovista	pusilla	(Batsch: Pers.) Pers.	Zwerg-Bovist
7	Bulgaria	inquinans	(Prs.:) Fries	Gemeiner Schmutzbecherling
7	Humaria	hemisphaeria	(Wiggers ex. Fr.) Fuckel	Halbkugeliger Borstling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich sind auch Mikroaufnahmen eingeflochten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.



Pilze der Woche 32

Hydropus atramentosus *Schwärzender Wasserfuss*

Standort: Nadelholz, Weisstane.
Fruchtkörper: Hut bis 30 mm.
Mikromerkmale: Sporen 9 x 5 µm, amyloid, weiss.
Bemerkungen: Die Gattung Hydropus zeichnet sich aus durch Lactiferen, die manchmal einen Milchsaft ausscheiden. Diese Art scheidet einen wässerigen Saft aus, der anmittelbar schwarz wird. Im übrigen hat *A. atramentosus* ausgebuchtete Lamellen, spindelige Cheilozystiden und rundliche, tropfenförmige Sporen.

Psathyrella sacchariolens *Süssriechender Faserling*

Standort: In Verbindung mit Holzresten.
Fruchtkörper: Hut bis 30 mm.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 4,5 µm mit Keimporus, dunkelbraun.
Bemerkungen: Dieser Zärtling gehört in die Sektion derjenigen Mürblingen mit Cheilo- und Pleurozistiden sowie einem Velum, das den ganzen Hut überzieht. Unterschieden wird er unter anderem von *P. pervelata* durch den süsslichen Geruch wie *Hebeloma sacchariolens*.

Hydropus atramentosus *Schwärzender Wasserfuss*

Psathyrella sacchariolens *Süssriechender Faserling*

Psathyrella gossypina, Cheilozystiden

Psathyrella gossypina *Baumwoll-Faserling*

Standort: Laubholz.
Fruchtkörper: Hut bis 70 mm.
Mikromerkmale: Sporen 9 x 5 µm, mit Keimporus, dunkelbraun.
Bemerkungen: Dieser Zärtling gehört in die Sektion derjenigen Arten mit Cheilo- und Pleurozistiden sowie einem Velum, das den ganzen Hut überzieht. Innerhalb diesem Formenkreis zeichnet er sich durch die geschnäbelten Zystiden mit einem grossen Tropfen aus. Diese Art hat, gemessen an Artgenossen, eine feste Konsistenz. Nach Lit. soll sie im Jugendstadium einen Ring haben. Hingegen wird von der knolligen Stielbasis nichts erwähnt, diese ist jedoch in der Abbildung von MJ ersichtlich.

Pilze der Woche 32

1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1	Boletus	luridus	Schäff.: Fr.	Netzstieliger Hexenröhrling
1	Leccinum	carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuss
1	Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
1	Tylopilus	felleus	(Bull.: Fr.) Karst.	Gallenröhrling
1	Tylopilus	felleus	(Bull.: Fr.) Karst.	Gallenröhrling
1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
2	Agaricus	augustus	Fr.	Braunschuppiger Riesenegerling
2	Amanita	fulva	(Schäffer) Fr.	Rotbrauner Scheidenstreifling
2	Amanita	porphyria	Alb. & Schw.: Fr.	Porphyrbrauner Wulstling
2	Amanita	vaginata	(Bull.) Vitt.	Grauer Scheidenstreifling
2	Clitocybe	gibba	(Pers.) Kumm.	Ockerbrauner Trichterling
2	Clitopilus	prunulus	(Scop.: Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Cortinarius	bolaris	(Pers.: Fr.) Fr.	Rotschuppiger Rauhkopf
2	Cortinarius	bulliardii	(Pers.: Fr.) Fr.	Feuerfüssiger Gürtelfuss
2	Cortinarius	cotoneus	Fr.	Olivbrauner Rauhkopf
2	Cortinarius	crassus	(Fr.)	Trockener Schleimkopf
2	Cortinarius	fraudulosus	Britz.	Trügerischer Schleimkopf
2	Cortinarius	rubicundulus	(Rea) Pears.	Rötlichfaseriger Rauhkopf
2	Cortinarius	uraceus	Fr.	Olivbrauner Wasserkopf
2	Cortinarius	variecolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf
2	Gymnopilus	josserandii	Antonin	Kugelsporiger Flämmling
2	Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
2	Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
2	Hydropus	atramentosus	(Kbr.) Kotl. & Pouz.	Schwärzender Wasserfuss
2	Hygrophorus	penarius	Fr.	Trockener Schneckling
2	Hygrophorus	picea	Kühn.	Fichten-Schneckling
2	Inocybe	cookei	Bres.	Knolliger Risspilz
2	Inocybe	corydalina var. erinaceomorpha	Quél.	Grünbuckliger Risspilz
2	Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
2	Inocybe	geophylla var. lilacina	(Peck.) Gill.	Lilastieliger Risspilz
2	Inocybe	phaeocomis	(Pers.) Kuyp.	Braunschopfiger Risspilz
2	Inocybe	rimosa	(Bull.: Fr:) Kummer	Kegeliger Risspilz
2	Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



2	Lyophyllum	connatum	(Schum.: Fr.) Sing.	Weisser Büschelrasling
2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.)Kotl. et Pouz.	Breitblattrübling
2	Pluteus	chrysophaeus	(Schäff.: Fr.) Quél.	Gelbbrauner Dachpilz
2	Pluteus	roseipes	v. Höhn.	Sosastieliger Dachpilz
2	Psathyrella	gossypina	(Bulliard: Fr.) Pearson et Dennis	Baumwoll-Faserling
2	Psathyrella	sacchariolens	Enderle	Süssriechender Faserling
2	Tricholoma	sciodes	(Secr.) Martin	Schärflicher Ritterling
2	Tricholoma	sejunctum	(Sow.: Fr.) Quél.	Grüngelber Ritterling
2	Tricholoma	ustale	(Fr.: Fr.) Kumm.	Brandiger Ritterling
2	Volvariella	caesiotincta	Orton	Blaugrauer Scheidling
2	Volvariella	pusilla	(Pers.: Fr.) Sing.	Kleinster Scheidling
2	Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3	Lactarius	camphoratus	(Bull.: Fr.) Fr.	Kamfermilchling
3	Lactarius	glaucescens	Crossl.	Grünender Pfeffermilchling
3	Lactarius	helvus	(Fr.: Fr.) Fr.	Maggipilz
3	Lactarius	subdulcis	(Per.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchen-Milchling
3	Russula	amethystina	Quélet	Amethysttäubling
3	Russula	badia	Quél.	Zedernholztäublig
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
3	Russula	emetica	(Schäff.: Fr.) Gray	Kirschroter Speitäubling
3	Russula	faginea	Romagn.	Buchen-Heringstäubling
3	Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
3	Russula	integra	(L.:) Fr. ss. Mre.	Braunroter Ledertäubling
3	Russula	laurocerasi	Melzer	Mandeltäubling
3	Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
3	Russula	luteotacta	Rea	Gelbfleckender Täubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	puellaris	Fr.	Milder Wachstäubling
4	Bierkandera	adusta	(Willd.: Fr.) Karst.	Angebrannter Rauchporling
4	Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
4	Cantharellus	friesii	Quél.	Fries´scher Pfifferling
4	Cantharellus	melanoxeros	Desm.	Gelbvioletter Pfifferling
4	Cantharellus	tubaeformis	Fr.	Durchbohrter Leistling
4	Coltricia	perennis	(L.: Fr.) Murrill	Brauner Dauerporling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



Pilze der Woche 32

4	Craterellus	cornucopioides	Pers.	Totentrompete
4	Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
4	Pseudocraterellus	sinuosus	(Fr.: Fr.) Reid.	Krauser Leistling
4	Ramaria	flava	(Schäff.: Fr.) Quél.	Schwefelgebe Koralle
6	Pseudohydnellum	gelatinosum	(Scop.: Fr.) Karst.	Zitterzahn
7	Geoglossum	glabrum	Per.: Fries	Kahle Erdzunge
7	Helvella	elastica	(Bull. ex St. Aman) Boud.	Elastische Lorchel
7	Leotia	lubrica	Pers.	Gemeines Gallertkäppchen
7	Otidea	concinna	(Pers.: Fr.) Sacc.	Zitronengelber Öhrling
7	Peziza	badia	Pers. Ex Mérat	Kastanienbrauner Becherling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich sind auch Mikroaufnahmen eingeflochten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.



Pilze der Woche 33

Calocybe chrysenteron *Dottergelber Schönkopf*

Standort: Nadelwald.
Fruchtkörper: Hut bis 40 mm.
Mikromerkmale: Sporen 3 x 2,5 µm, weiss.
Bemerkungen: Diese Art gehört in den Formenkreis der gelben Schönköpfe. Sie unterscheidet sich durch gelbes Fleisch. *C. cerina* und *C. juncicola* haben weisses Fleisch. Alle haben einen Geruch nach Mehl und sind bitter.

Inocybe corydalina *Grünbuckliger Risspilz*

Standort: Besonders Laubwald.
Fruchtkörper: Hut bis 60 mm.
Mikromerkmale: Sporen 9 x 5 µm, glatt, mit Cheilo- und Pleurozystiden, ohne echte Caulozystiden.
Bemerkungen: Die *I. corydalina* gehört in den Formenkreis der Arten mit stark süsslichem Geruch und unterscheidet sich durch die grüne Hutmitte. Bei der abgebildeten Art könnte es sich wegen den ausgeprägten Schuppen um die *Varietät erinaceomorpha* handeln. Ebenfalls grüne Farbtöne auf dem Hut hat *I. haemacta,* diese riecht jedoch nach Pferdeschweiss.

Calocybe chrysenteron *Dottergelber Schönkopf*

Inocybe corydalina *Grünbuckliger Risspilz*

Pilze der Woche 33

1	Chalciporus	piperatus	(Bull.: Fr.) Bat.	Pfeffer-Röhrling
1	Gyroporus	castaneus	(Bull.: Fr.)	Hasen-Röhrling
1	Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
1	Strobilomyces	strobilaceus	(Scop.: Fr.) Berk.	Strubelkopfröhrling
1	Tylopilus	felleus	(Bull.: Fr.) Karst.	Gallenröhrling
1	Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
1	Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe
2	Agrocybe	erebia	(Fr.) Kühn.	Leberbrauner Ackerling
2	Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
2	Amanita	junquillea	Quélet	Narzissengelber Wulstling
2	Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Calocybe	chrysenteron	(Bull.: Fr.) Sing.: Bon	Dottergelber Schönkopf
2	Clitocybe	clavipes	(Pers.) Kumm.	Keulenfuss-Trichterling
2	Clitocybe	senilis	(Fr.) Singer	Greisen-Trichterling
2	Clitopilus	prunulus	(Scop.: Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Cortinarius	bolaris	(Pers.: Fr.) Fr.	Rotschuppiger Rauhkopf
2	Cortinarius	flexipes	(Pers.: Fr.) Fr.	Duftender Gürtelfuss
2	Cortinarius	semisanguineus	(Fr.)	Blutblättriger Hautkopf
2	Cortinarius	torvus	(Bull.: Fr.) Fr.	Wohlriechender Gürtelfuss
2	Entoloma	inusiastum	Noord.: Enderle & Lammers	Blotzheimer Rötling
2	Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
2	Gymnopus	dryophylla	(Bull.: Fr.) Kumm.	Waldfreund-Rübling
2	Gymnopus	fusipes	(Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling
2	Gymnopus	impudicus	(Fr.) Antonin Halling et Noordeloos	Unverschämter Blasssporrübling
2	Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
2	Hydropus	atramentosus	(Kbr.) Kotl. & Pouz.	Schwärzender Wasserfuss
2	Hydropus	marginellus	(Pers.: Fr.) Sing.	Braunschneidiger Wasserfuss
2	Hygrocybe	conica	(Scopp.: Fr.) Kumm.	Kegeliger Saftling
2	Inocybe	amethystina	Kuyp.	Violettlicher Risspilz
2	Inocybe	corydalina	Quél.	Grünbuckliger Risspilz
2	Inocybe	fuscidula	Vel.	Braunstreifiger Risspilz
2	Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
2	Inocybe	bongardii	(Weinm.) Quél.	Duftender Risspilz

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



2	Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2	Lepiota	castanea	Quél. (inkl. L. ignipes Locq. ex Bon	Kastanienbrauner Schirmling
2	Lepiota	sublaevigatua	Bon et Boiffard	Feinschuppiger Schirmling
2	Marasmiellus	candidus	(Bolt.: Fr.) Sing.	Schneeweisser Zwergschwindling
2	Marasmius	scordonius	(Fr.: Fr.) Fr.	Küchen-Schwindling
2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.)Kotl. et Pouz.	Breitblattrübling
2	Mycena	abramsii	(Murr.) Murr.	Voreilender Helmling
2	Mycena	amicta	(Fr.: Fr.) Quélet	Geschmückter Helmling
2	Mycena	epipterygia	(Scop.: Fr.) Gray	Dehnbarer Helmling
2	Mycena	pura	(Pers.: Fr.) Kumm.	Rettich-Helmling
2	Mycena	sanguinolenta	(Alb.-Schw.: Fr.) Kumm.	Purpurschneidiger Helmling
2	Mycena	zephirus	(Fr.: Fr.) Kumm.	Rostfleckiger Helmling
2	Pholiota	flammans	(Fr.:) Kummer	Feuerschüppling
2	Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
2	Pluteus	salicinus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Grauer Dachpilz
2	Psathyrella	conopilus	(Fr.: Fr.) Pears. & Dennis	Huthaarfaserling
2	Rozites	caperatus	(Pers.: Fr.) P. Karst.	Zigeunerpilz
2	Tricholoma	ustale	(Fr.: Fr.) Kumm.	Brandiger Ritterling
2	Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
3	Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
3	Lactarius	camphoratus	(Bull.: Fr.) Fr.	Kamfermilchling
3	Lactarius	circellatus	Fr.	Gebänderter Hainbuchenmilchling
3	Lactarius	fluens	Boud.	Braunfleckender Milchling
3	Lactarius	helvus	(Fr.: Fr.) Fr.	Maggipilz
3	Lactarius	subdulcis	(Per.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchen-Milchling
3	Lactarius	zonarius	(Bulliard) Fr.	Echter Zonenmilchling
3	Lactarius	volemus	(Fr.) Fr.	Brättling
3	Russula	amethystina	Quélet	Amethysttäubling
3	Russula	atropurpurea	(Krombh.) Britz.	Pupurschwarzer Täubling
3	Russula	aurea	Pers.	Goldtäubling
3	Russula	badia	Quél.	Zedernholztäublig
3	Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3	Russula	densifolia	Gill.	Dichtblättriger Schwärztäubling
3	Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



3	Russula	integra	(L.:) Fr. ss. Mre.	Braunroter Ledertäubling
3	Russula	ionochlora	Romagn.	Cremeblättriger Bunttäubling
3	Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	puellaris	Fr.	Milder Wachstäubling
3	Russula	romellii	Maire	Weissstieliger Ledertäubling
3	Russula	xerampelina	Schäff.: Fr.	Roter Heringstäubling
4	Auriscalpium	vulgare	Gray	Ohrlöffel-Stacheling
4	Clavulina	cristata	(Holmskj.: Fr.) Schröt.	Kammförmige Koralle
4	Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
4	Oligoporus	stipticus	(Pers.: Fr.) Gilb. & Ryv.	Bitterer Saftporling
4	Perenniporia	medulla-panis	(Jacq.: Fr.) Donk	Ockerbrauner Dauerporling
4	Polyporus	tuberaster	(Jacq.: Pers.) Fr.	Sklerotien-Porling
4	Ramaria	flava	(Schäff.: Fr.) Quél.	Schwefelgebe Koralle
4	Stereum	subtomentosum	Pouzar	Samtiger Schichtpilz
4	Telephora	palmata	Scop.: Fr.	Stinkender Warzenpilz
5	Bovista	dermoxantha	(Vittadini) De Toni	Zwerg-Bovist
5	Cyathus	striatus	(Huds.) ex Pers.	Striegeliger Teuerling
5	Scleroderma	citrinum	Pers.	Dickschaliger Kartoffelbovist
5	Scleroderma	verrucosum	(Bull.: Pers.) Pers.	Dünnschaliger Kartoffelbovist
5	Vascellum	pratense	Pers.: Pers.) Kreisel	Wiesen-Stäubling
6	Tremiscus	helveloides	(DC: Pers.) Donk	Roter Gallerttrichterling
7	Bulgaria	inquinans	(Prs.:) Fries	Gemeiner Schmutzbecherling
7	Helvella	crispa	Fr.	Herbstlorchel
7	Helvella	lacunosa	Afz. Ex Fr.	Grubenlorchel
7	Leotia	lubrica	Pers.	Gemeines Gallertkäppchen
7	Peziza	michelii	(Boudier) Dennis	Gelbfleischiger Lila-Becherling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich sind auch Mikroaufnahmen eingeflochten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.



VEREIN FÜR PILZKUNDE BASEL

Pilze der Woche 34

Pholiotina vestita *Bekleideter Glockenschüppling*

Standort: Auf mit Holz durchsetztem Boden.
Fruchtkörper: Hut bis 30 mm.
Mikromerkmale: Sporen 7 x 4 µm, braun, mit zylindrischen Cheilo und Caulozystiden, die HDS ist hymeniform.
Bemerkungen: Dieser hygrophane Glockenschüppling mit jung stark behangenem Hutrand unterscheidet sich von *C. appendiculatus* durch Sporen ohne sichtbaren Keimporus. Der hohle, stark überfaserte Stiel ist etwas holzig.

Cyathus striatus *Striegeliger Teuerling*

Standort: Morsches Holz.
Fruchtkörper: Hut bis 15 mm.
Mikromerkmale: Sporen 17 x 8 µm, glatt, hyalin. Septen mit Schnallen
Bemerkungen: Die Aussenseite der Exoperidie ist strigelig-haarig und die Innenseite gestreift. Nach dem Aufreissen des Deckels werden die Peridiolen am Grunde des Bechers sichtbar.

Kuriosität von Clitocybe nebularis. *Photo: Otto Höschle*

Pholiotina vestita *Bekleideter Glockenschüppling*

Cyathus striatus *Striegeliger Teuerling*

Pilze der Woche 34

1	Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
1	Boletus	luridus	Schäff.: Fr.	Netzstieliger Hexenröhrling
1	Tylopilus	felleus	(Bull.: Fr.) Karst.	Gallenröhrling
1	Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
2	Agaricus	silvicola	(Vittad.) Sacc.	Dünnfleischiger Anis-Egerling
2	Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
2	Amanita	citrina var. alba	(Schäff.) Pers.	Weisser Gilbwulstling
2	Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
2	Amanita	fulva	(Schäffer) Fr.	Rotbrauner Scheidenstreifling
2	Amanita	mairei	Foley	Silbergrauer Scheidenstreifling
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Amanita	solitaria	(Vittadini) Quélet	Meergrüner Wulstling
2	Amanita	vaginata	(Bull.) Vitt.	Grauer Scheidenstreifling
2	Clitocybe	gibba	(Pers.) Kumm.	Ockerbrauner Trichterling
2	Clitopilus	prunulus	(Scop.: Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Cortinarius	glandicolor	(Fr.:) Fr.	Spitzhütiger Gürtelfuss
2	Cystolepiota	seminuda	(Lasch.) Bon	Weisser Mehlschirmling
2	Gymnopus	maculata	(Alb. et Schw. Fr.)	Gefleckter Rübling
2	Hemymycena	cucullata	(Pers.: Fr.) Sing.	Gipsweisser Scheinhelmling
2	Hohenbuhelia	myxotricha	Lév.) Sing.	Behaarter Muscheling
2	Hydropus	atramentosus	(Kbr.) Kotl. & Pouz.	Schwärzender Wasserfuss
2	Hygrophorus	penarius	Fr.	Trockener Schneckling
2	Inocybe	napipes	Lge.	Rübenstieliger Risspilz
2	Inocybe	rimosa	(Bull.: Fr:) Kummer	Kegeliger Risspilz
2	Inocybe	bongardii	(Weinm.) Quél.	Duftender Risspilz
2	Lepiota	cristata var. pallidior	Boud. ex Bon	Stink-Schirmling var.
2	Lyophyllum	fumosum	(Pers.: Fr.) Ort.	Hellbrauner Büschelrasling
2	Mycena	pelianthina	(Fr.: Fr.) Quél.	Schwarzgezähnelter Helmling
2	Pholiota	flammans	(Fr.:) Kummer	Feuerschüppling
2	Pholiota	tuberculosa	(Schäff.: Fr.)	Rötender Schüppling
2	Pholiota	lubrica	(Pers.: Fr.) Singer	Weissflockiger Schüppling
2	Pholiotina	vestita	(Fr. in Quél.) Sing.	Bekleideter Glockenschüppling
2	Pluteus	salicinus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Grauer Dachpilz

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilze der Woche 34

2	Psathyrella	pygmea	(Bull.: Fr.) Sing.	Zwerg.Faserling
2	Rhodocybe	nitellina	(Fr.) Sing.	Gelbfuchsiger Tellerling
2	Tricholoma	sciodes	(Secr.) Martin	Schärflicher Ritterling
2	Tricholoma	sejunctum	(Sow.: Fr.) Quél.	Grüngelber Ritterling
2	Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3	Russula	amethystina	Quélet	Amethysttäubling
3	Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
3	Russula	grisea	Fr.	Grauvioletter Reiftäubling
3	Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	queletii	Fr. in Quél.	Stachelbeertäubling
3	Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
3	Russula	xerampelina	Schäff.: Fr.	Roter Heringstäubling
4	Cantharellus	friesii	Quél.	Fries´scher Pfifferling
4	Clavariadelphus	pistilaris	(Fr.) Donk	Herkuleskeule
4	Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
4	Polyporus	badius	(Pers.: Gray) v. Schw.	Kastanienbrauern Porling
4	Polyporus	tuberaster	(Jacq.: Pers.) Fr.	Sklerotien-Porling
4	Telephora	palmata	Scop.: Fr.	Stinkender Warzenpilz
5	Cyathus	striatus	(Huds.) ex Pers.	Striegeliger Teuerling
5	Geastrum	rufescens	Pers.	Rotbrauner Erdstern
5	Phallus	impudicus	L. ex Pers.	Stinkmorchel
6	Pseudohydnellum	gelatinosum	(Scop.: Fr.) Karst.	Zitterzahn
7	Helvella	elastica	(Bull. ex St. Aman) Boud.	Elastische Lorchel

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich sind auch Mikroaufnahmen eingeflochten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.



VEREIN FÜR PILZKUNDE BASEL

Pilze der Woche 35

Cortinarius variegatus *Variabler Schleimkopf*

Standort: Nadelwald.
Fruchtkörper: Hut bis 100 mm.
Mikromerkmale: Sporen 9 x 4 µm, die Warzen sind kaum sichtbar.
Bemerkungen: Dieser Schleimkopf gehört in die Untersektion Pflegmacium mit tonfarbigen Lamellen und am Stiel ausgeprägtem, weissen Velum. Die Stielbasis hat z.T. rosafarbige Velumresten. Diese sieht man erst richtig nach einigen Stunden, jedoch tags darauf sind sie wieder verschwunden. Sehr nahe verwandt ist *C. sebaceus*, nach Moser ohne Violettöne an der Stielbasis. Auch der Hut bei *C. sebaceus hat* weniger Rot-anteile.

Russula paludosa *Apfeltäubling*

Standort: Saure Nadelwälder
Fruchtkörper: Hut bis 100 mm.
Mikromerkmale: Sporen 9 x 7 µm, fein netzig verbunden.
Bemerkungen: Dieser fast milde Täubling fällt durch Grösse, glänzig-rote Hutfarbe, den langen weissen, manchmal etwas rot getönten Stiel auf. Die Huthaare sind schlank, z.T. verzweigt. Dermatocystiden sind vorhanden.

Albatrellus pes-caprae *Ziegenfussporling*

Standort: Nadelwald.
Fruchtkörper: Hut bis 100 mm.
Mikromerkmale: Sporen 10 x 7 µm, glatt, hyalin, mit Tropfen. Septen mit Schnallen
Bemerkungen: Dieser Pilz ist aufgrund seines Aussehens kaum zu verwechseln. Er ist auch einer der wenigen Porlinge, die auf Erdboden fruktifizieren.

Cortinarius variegatus *Variabler Schleimkopf*

Russula paludosa *Apfeltäubling*

Albatrellus pes-caprae *Ziegenfussporling*

Pilze der Woche 35

1	Boletus	aereus	Bull.: Fr.	Schwarzhütiger Steinpilz
1	Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
1	Boletus	luridus	Schäff.: Fr.	Netzstieliger Hexenröhrling
1	Gyroporus	castaneus	(Bull.: Fr.)	Hasen-Röhrling
1	Leccinum	quercinum	Pilát ex Pilát	Eichen-Rotkappe
1	Strobilomyces	strobilaceus	(Scop.: Fr.) Berk.	Strubelkopfröhrling
1	Tylopilus	felleus	(Bull.: Fr.) Karst.	Gallenröhrling
1	Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
2	Agaricus	augustus	Fr.	Braunschuppiger Riesenegerling
2	Agaricus	semotus	Fr.	Weinrötlicher Zwerg-Champignon
2	Agaricus	silvicola	(Vittad.) Sacc.	Dünnfleischiger Anis-Egerling
2	Agaricus	xanthoderma	Genev.	Karbol-Egerling
2	Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
2	Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
2	Amanita	mairei	Foley	Silbergrauer Scheidenstreifling
2	Amanita	pantherina	(DC.: Fr.) Krombh.	Pantherpilz
2	Amanita	porphyria	Alb. & Schw.: Fr.	Porphyrbrauner Wulstling
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Amanita	fulva	(Schäff.) Seyot	Rotbrauner Scheidenstreifling
2	Clitocybe	clavipes	(Pers.) Kumm.	Keulenfuss-Trichterling
2	Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
2	Clitocybula	lacerata	(Scropoli) Métrod	Fransiger Faserrübling
2	Cortinarius	variegatus	Bresadola	Variabler Schleimkopf
2	Cortinarius	alboviolacea	(Pers.: Fr.) Fr.	Weissvioletter Dickfuss
2	Cortinarius	bolaris	(Pers.: Fr.) Fr.	Rotschuppiger Rauhkopf
2	Cortinarius	bulbosus	(Sow.: Fr.) Fr.	Knolliger Gürtelfuss
2	Cortinarius	callisteus	(Fr.: Fr.) Fr.	Rhabarberfüssiger Raukopf
2	Cortinarius	camphoratus	(Fr.) Fr.	Bocks-Dickfuss
2	Cortinarius	crassus	(Fr.)	Trockener Schleimkopf
2	Cortinarius	delibutus	Fr.	Violettblättriger Schleimfuss
2	Cortinarius	elegantior	(Fr.) Fr.	Strohgelber Klumpfuss
2	Cortinarius	flexipes	(Pers.: Fr.) Fr.	Duftender Gürtelfuss

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilze der Woche 35

2	Cortinarius	infractus	(Pers.: Fr.) Fr.	Bitterer Schleimfuss
2	Cortinarius	isabellinus	(Batsch: Fr.) Fr.	Olivgelber Rauhkopf
2	Cortinarius	nemorensis	(Fr.) Lge.	Verfärbender Schleimkopf
2	Cortinarius	sommerfeltii	Høiland	Orangeblättriger Hautkopf
2	Entoloma	rhodopolium	(Fr.: Fr.) Kummer	Niedergedrückter Rötling
2	Gymnopus	maculata	(Alb. et Schw. Fr.)	Gefleckter Rübling
2	Hygrophorus	agathosmus	(Fr.) Fr.	Wohlriechender Schneckling
2	Hygrophorus	penarius	Fr.	Trockener Schneckling
2	Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
2	Inocybe	rimosa	(Bull.: Fr:) Kummer	Kegeliger Risspilz
2	Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2	Lepiota	cristata	(Bolton.: Fr.) Kummer	Stink-Schirmling
2	Lepista	nuda	(Bull.: Fr.) Cooke	Violetter Rötelritterling
2	Lyophyllum	infumatum	(Bres.) Kühn.	Rautensporiger Schwärzling
2	Marasmius	cohaerens	(Pers.: Fr.) Fr.	Hornstieliger Schwindling
2	Marasmius	torquescens	Quél.	Ledergelber Schwindling
2	Mycena	crocata	(Schrad.: Fr.) Kumm.	Safranmilchender Helmling
2	Mycena	renati	Quélet	Gelbstieliger Nitrat-Helmling
2	Pluteus	exiguus	(Pat.) Sacc.	Kleinster Dachpilz
2	Rozites	caperatus	(Pers.: Fr.) P. Karst.	Zigeunerpilz
2	Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
2	Tricholoma	sciodes	(Secr.) Martin	Schärflicher Ritterling
2	Tricholoma	sulphureum	(Bull.: Fr.) Kumm.	Schwefel-Ritterling
2	Tricholoma	ustale	(Fr.: Fr.) Kumm.	Brandiger Ritterling
2	Tricholoma	vaccinum	(Pers.: Fr.) Kumm.	Zottiger Ritterling
2	Volvariella	murinella	(Quél.) Mos.	Mausgrauer Scheidling
3	Lactarius	azonites	(Bull.) Fr.	Rauchfarbener Rosamilchling
3	Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
3	Lactarius	camphoratus	(Bull.: Fr.) Fr.	Kamfermilchling
3	Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
3	Lactarius	quietus	(Fr.) Fr.	Eichenmilchling
3	Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3	Russula	alutacea	(Pers.: Fr.) ss. restr. Melz. & Zvára	Ledertäubling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

VEREIN FÜR PILZKUNDE BASEL

Pilze der Woche 35

3	Russula	amethystina	Quélet	Amethysttäubling
3	Russula	anthracina	Romagn.	Lachsblättriger Schwärztäubling
3	Russula	badia	Quél.	Zedernholztäublig
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
3	Russula	decolorans	(Fr.) Fr.	Orangeroter Graustieltäubling
3	Russula	delica	Fr.	Gemeinder Weisstäubling
3	Russula	exalbicans	(Pers.) Melz. & Zvara	Verblassender Täubling
3	Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
3	Russula	integra	(L.:) Fr. ss. Mre.	Braunroter Ledertäubling
3	Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
3	Russula	nauseosa	(Pers.) Fr..	Geriefter Weichtäubling
3	Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3	Russula	paludosa	Britz.	Apfeltäubling
3	Russula	parazurea	Schäffer	Blaugüner Reiftäubling
3	Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
3	Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
3	Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
4	Albatrellus	pes-caprae	(Pers.) Pouz.	Ziegenfussporling
4	Albatrellus	ovinus	(Schäff.: Fr.) Kotl. & Pouz.	Schafporling
4	Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
4	Climacocystis	borealis	(Fr.) Kotl. & Pouz.	Nordischer Porling
4	Gloeophyllum	odoratum	(Wulf.: Fr.) Imyzeki	Fencheltramete
4	Pseudocraterellus	sinuosus	(Fr.: Fr.) Reid.	Krauser Leistling
4	Ramaria	flava	(Schäff.: Fr.) Quél.	Schwefelgebe Koralle
4	Ramaria	stricta	(Pers.: Fr.) Quél. s. str.	Steife Koralle
4	Sparassis	crispa	(Wulf. in Jacq.) Fr.	Krause Glucke
7	Cudonia	circinans	(Pers.: Fr.) Fr.	Helm-Kreisling
7	Helvella	crispa	Fr.	Herbstlorchel
7	Otidea	leporina	(Batsch (Fuckel	Hasen-Öhrling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich sind auch Mikroaufnahmen eingeflochten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.



VEREIN FÜR PILZKUNDE BASEL

Pilze der Woche 36

Scleroderma bovista *Netzsporiger Hartbovist*

Standort: In Wiesen und Wäldern.
Fruchtkörper: Hut bis 60 mm.
Mikromerkmale: Sporen 11 µm, die Warzen sind netzig verbunden.
Bemerkungen: Die netzig-gratigen Sporen, die Hyphen mit Schnallen und die dünne, weiche Exoperidie unterscheiden diesen Pilz von anderen Scleroderma Arten *Fotos von Markus Wilhelm.*

Marasmius torquescens *Ledergelber Schwindling*

Standort: In Laubwäldern.
Fruchtkörper: Hut bis 30 mm.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 5 µm. hyalin.
Bemerkungen: Ein häufiger Schwindling mit hymeniformer Huthaut und dickwandigen, braunen Huthaaren.

Marasmius cohaerens *Hornstieliger Schwindling*

Standort: Nadelwald.
Fruchtkörper: Hut bis 30 mm.
Mikromerkmale: Sporen 9 x 5 µm, hyalin.
Bemerkungen: Ein auffallendes Merkmal ist die hymeniforme, apikal mit bürstenförmigen Auswüchsen versehene HDS. Die Hutoberfläche ist samtig und matt.

Stielhaare von Marasmius cohaerens

Scleroderma bovista *Netzsporiger Hartbovist*



Scleroderma bovista *Sporen*

Marasmius torquescens
Ledergelber Schwindling

Marasmius cohaerens
Hornstieliger Schwindling

Pilze der Woche 36

1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1	Boletus	radicans	Pers.: Fr.	Bitter-Röhrling
1	Chroogomphus	rutilus	(Schäff.: Fr.) Millller	Kupferroter Gelbfuss
1	Strobilomyces	strobilaceus	(Scop.: Fr.) Berk.	Strubelkopfröhrling
2	Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
2	Amanita	submembranacea	(Bon) Gröger	Grauhäutiger Scheidenstreifling
2	Clitocybe	clavipes	(Pers.) Kumm.	Keulenfuss-Trichterling
2	Cortinarius	balteaus	Fr.	Violettrandiger Schleimkopf
2	Cortinarius	bolaris	(Pers.: Fr.) Fr.	Rotschuppiger Rauhkopf
2	Cortinarius	delibutus	Fr.	Violettblättriger Schleimfuss
2	Cortinarius	guttatus	Hry.	Getropfter Klumpfuss
2	Cortinarius	infractus	(Pers.: Fr.) Fr.	Bitterer Schleimfuss
2	Cortinarius	nemorensis	(Fr.) Lge.	Verfärbender Schleimkopf
2	Cortinarius	pilatii	Svrcek	Flocken-Gürtelfuss
2	Cortinarius	rubicundulus	(Rea) Pears.	Rötlichfaseriger Rauhkopf
2	Cortinarius	sommerfeltii	Høiland	Orangeblättriger Hautkopf
2	Cortinarius	variecolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf
2	Cortinarius	venetus	(Fr.). Fr.	Grüner Buchenwald-Rauhkopf
2	Cortinarius	vulpinus	(Vel.) Hry.	Gilbender Fuchs-Seidenkopf
2	Gymnopus	luxurians	(Peck) Murrill	Üppiger Blasssporrübling
2	Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
2	Hygrophorus	eburneus	(Bull.: Fr.) Fr.	Elfenbein-Schneckling
2	Hygrophorus	mesotephrus	Berk. & Br.	Olivgrauer Schneckling
2	Inocybe	corydalina	Quél.	Grünbuckliger Risspilz
2	Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
2	Inocybe	soluta	Vel.	Kurzsporiger Risspilz
2	Inocybe	subcarpta	Kühner et Boursier	Trapezsporiger Risspilz
2	Lyophyllum	loricatum	(Fr.) Kühn.	Gepanzerter Rasling
2	Marasmius	oreades	(Bolton.: Fr.) Fr.	Nelkenschwindling
2	Mycena	pelianthina	(Fr.: Fr.) Quél.	Schwarzgezähnelter Helmling
2	Panaeolus	caliginosus	Jungh.	Dunkler Düngerling
2	Pholiota	flammans	(Fr.:) Kummer	Feuerschüppling
2	Pleurotus	drynus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Berindeter Seitling
2	Psathyrella	conopilus	(Fr.: Fr.) Pears. & Dennis	Huthaarfaserling
2	Tricholoma	lascivum	(Fr.) Gill. ss. Lge.	Unverschämter Ritterling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

2	Tricholoma	orirubens	Quél.	Rötender Ritterling
2	Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
2	Tricholoma	sciodes	(Secr.) Martin	Schärflicher Ritterling
2	Tricholoma	sejunctum	(Sow.: Fr.) Quél.	Grüngelber Ritterling
2	Tricholoma	ustale	(Fr.: Fr.) Kumm.	Brandiger Ritterling
2	Tricholoma	virgatum	(Fr.: Fr.) Kumm.	Brennender Ritterling
2	Tricholomopsis	decora	(Fr.) Sing.	Olivgelber Holzritterling
2	Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3	Lactarius	acris	(Bolt.: Fr.) Gray	Rosaanlaufender Milchling
3	Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
3	Lactarius	camphoratus	(Bull.: Fr.) Fr.	Kamfermilchling
3	Lactarius	deliciosus	(L.): Fr.) Gray	Edelreizker
3	Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
3	Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
3	Lactarius	pyrogalus	(Bull.: Fr.) Fr.	Scharfer Hasel-Milchling
3	Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
3	Russula	acrifolia	Romagn.	Scharfblättriger Schwärztäubling
3	Russula	atropurpurea	(Krombh.) Britz.	Pupurschwarzer Täubling
3	Russula	carpini	Gir. & Hein.	Hainbuchentäubling
3	Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
3	Russula	integra	(L.:) Fr. ss. Mre.	Braunroter Ledertäubling
3	Russula	melliolens	Quél.	Honigtäubling
3	Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	raoultii	Quél.	Blassgeber Täubling
3	Russula	violeipes	Quélet	Violettstieliger Brätlingstäubling
4	Clavariadelphus	pistilaris	(Fr.) Donk	Herkuleskeule
4	Creolophus	cirrhatus	(Pers.: Fr.) Karst.	Dorniger Stachelbart
4	Daedaleopsis	confragosa	(Bolt.: Fr.) Schröt. s. str.	Rötende Tramete
4	Ramaria	stricta	(Pers.: Fr.) Quél. s. str.	Steife Koralle
4	Sarcodon	imbricatus	(L. ex Fr.) Karst.	Habichtspilz
5	Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
5	Scleroderma	bovista	Fr.	Rotbräunlicher Kartoffelbovist
7	Leotia	lubrica	Pers.	Gemeines Gallertkäppchen

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

VEREIN FÜR PILZKUNDE BASEL

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich sind auch Mikroaufnahmen eingeflochten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.



Pilze der Woche 37

Psathyrella spadicea *Schockoladenbrauner Faserling*

Standort: An der Basis lebender Laubbäume.
Fruchtkörper: Hut bis 60 mm.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 4 µm, ohne Keimporus, Cheilozystiden metuloid mit Kristallschopf, HDS hymeniform.
Bemerkungen: Wichtige Merkmale sind das büschelige Vorkommen an der Basis lebender Laubbäume, die matte, samtige Hutoberfläche, die Sporen ohne Keimporus sowie die Cheilozystiden, die an Risspilzzystiden erinnern.

Cortinarius triumphans *Gelbgestiefelter Schleimkopf*

Standort: Bei Birken.
Fruchtkörper: Hut bis 100 mm.
Mikromerkmale: Sporen 12 x 7 µm, mässig warzig, mandel- bis etwas zitronenförmig.
Bemerkungen: Dieser Schleimkopf gehört in die Sektion Triumphantes mit gelb-braunem Velum. Der Stiel ist stark vom Velum gestiefelt. Ausserdem ist er der einzige Birkenbegleiter im Formenkreis.

Psathyrella spadicea *Schockoladenbrauner Faserling*

Cortinarius triumphans *Gelbgestiefelter Schleimkopf*

Pilze der Woche 37

1	Boletus	aereus	Bull.: Fr.	Schwarzhütiger Steinpilz
1	Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
1	Porphyrellus	porphyrosporus	Fr.) Gilbert	Düsterer Röhrling
1	Tylopilus	felleus	(Bull.: Fr.) Karst.	Gallenröhrling
1	Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
2	Agrocybe	firma	(Peck) Kühn.	samtiger Ackerling
2	Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
2	Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
2	Amanita	fulva	(Schäffer) Fr.	Rotbrauner Scheidenstreifling
2	Amanita	muscaria	(L.) Hook.	Fliegenpilz
2	Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
2	Amanita	phalloides var. alba	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz w. Form
2	Amanita	porphyria	Alb. & Schw.: Fr.	Porphyrbrauner Wulstling
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Amanita	vaginata	(Bull.) Vitt.	Grauer Scheidenstreifling
2	Clitocybe	clavipes	(Pers.) Kumm.	Keulenfuss-Trichterling
2	Clitopilus	prunulus	(Scop.: Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Cortinarius	alboviolacea	(Pers.: Fr.) Fr.	Weissvioletter Dickfuss
2	Cortinarius	brunneus	(Pers.: Fr.) Fr.	Dunkelbrauner Gürtelfuss
2	Cortinarius	camphoratus	(Fr.) Fr.	Bocks-Dickfuss
2	Cortinarius	cinnabarinus	Fr.	Zinnoberroter Wasserkopf
2	Cortinarius	cinnamomeus	Fr.	Zimt-Hautkopf
2	Cortinarius	evernius	(Fr.: Fr.) Fr. ss. Mos.	Rettich-Gürtelfuss
2	Cortinarius	flexipes var. inolens	Lindst.	Geruchloser Duft-Gürtelfuss
2	Cortinarius	glaucescens	J. Schäffer	Grünstieliger Klumpfuss
2	Cortinarius	glaucopus	(Schäff.: Fr.)	Reihiger Klumpfuss
2	Cortinarius	hinnuleus	(Sow.) Fr.	Erdigriechender Gürtelfuss
2	Cortinarius	nemorensis	(Fr.) Lge.	Verfärbender Schleimkopf
2	Cortinarius	ochroleucus	(Schäfer: Fr.) Fr.	Trockener Schleimfuss
2	Cortinarius	semisanguineus	(Fr.)	Blutblättriger Hautkopf
2	Cortinarius	torvus	(Bull.: Fr.) Fr.	Wohlriechender Gürtelfuss
2	Cortinarius	triumphans	(Fr.) Fr.	Gelbgestiefelter Schleimkopf
2	Cortinarius	turmalis	Fr.	Rasiger Schleimkopf
2	Cortinarius	varius	Fr.	Ziegelgelber Schleimkopf
2	Cortinarius	venetus	(Fr.). Fr.	Grüner Buchenwald-Rauhkopf

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilze der Woche 37

2	Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
2	Entoloma	rhodopolium	(Fr.: Fr.) Kummer	Niedergedrückter Rötling
2	Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
2	Gymnopus	erytropus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Rotstieliger Rübling
2	Gymnopus	fusipes	(Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling
2	Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
2	Hygrophorus	discoideus	(Pers.: Fr.) Fr.	Braunscheibiger Schneckling
2	Hygrophorus	poetarum	Heim	Isabell-Schneckling
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Hypholoma	lateritium	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf
2	Inocybe	assimilata	(Britz.) Sacc.	Rundknolliger Risspilz
2	Inocybe	cookei	Bres.	Knolliger Risspilz
2	Inocybe	corydalina	Quél.	Grünbuckliger Risspilz
2	Inocybe	fraudans	(Britz.) Sacc.	Birnen-Risspilz
2	Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
2	Inocybe	rimosa	(Bull.: Fr:) Kummer	Kegeliger Risspilz
2	Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2	Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
2	Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
2	Lyophyllum	loricatum	(Fr.) Kühn.	Gepanzerter Rasling
2	Macrolepiota	mastoidea	(Fr.) Sing.	Zitzenschirmling
2	Marasmius	alliaceus	(Jacq.: Fr.) Fr.	Langstieliger Knoblauchschwindling
2	Marasmius	wynnei	Berk. & Br.	Violetlicher Schwindling
2	Mycena	galericulata	(Scop.:Fr.) Gray	Rosablättriger Helmling
2	Mycena	pelianthina	(Fr.: Fr.) Quél.	Schwarzgezähnelter Helmling
2	Mycena	polygramma	(Bull.: Fr.) Gray	Rillstieliger Helmling
2	Mycena	renati	Quélet	Gelbstieliger Nitrat-Helmling
2	Mycena	rosea	(Bull.) Gramberg	Rosa-Rettichhelmling
2	Mycena	stipata	Maas Geester.& Schw.	Büscheliger Nitrat-Helmling
2	Mycena	zephirus	(Fr.: Fr.) Kumm.	Rostfleckiger Helmling
2	Naucoria	amerescens	(Quel.) Rom.	Bitterer Erlenschnitzling
2	Pholiota	flammans	(Fr.:) Kummer	Feuerschüppling
2	Pluteus	diettrichii	Bresadola	Rissiger Dachpilz
2	Pluteus	salicinus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Grauer Dachpilz
2	Psathyrella	spadicea	(Schäff.) Sing.	Schockoladenbrauner Faserling
2	Tricholoma	bufonium	(Pers.: Fr.) Kumm.	Purpurbrauner Schwefel-Ritterling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

2	Tricholoma	luridum	(Schäff.: Fr.) Quél.	Graublättriger Ritterling
2	Tricholoma	orirubens	Quél.	Rötender Ritterling
2	Tricholoma	pseudonicticans	Bon	Blassfleischiger Fichtenritterling
2	Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
2	Tricholoma	scalpturatum	(Fr.) Quél.	Gilbender Erd-Ritterlig
2	Tricholoma	sciodes	(Secr.) Martin	Schärflicher Ritterling
2	Tricholoma	sulphureum	(Bull.: Fr.) Kumm.	Schwefel-Ritterling
2	Tricholoma	ustale	(Fr.: Fr.) Kumm.	Brandiger Ritterling
2	Tricholoma	virgatum	(Fr.: Fr.) Kumm.	Brennender Ritterling
2	Tricholomopsis	decora	(Fr.) Sing.	Olivgelber Holzritterling
3	Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
3	Lactarius	camphoratus	(Bull.: Fr.) Fr.	Kamfermilchling
3	Lactarius	flavidus	Boud.	Hellgelber Violettmilchling
3	Lactarius	fulvissimus	Rom. i. Kühn. & Rom.	Orangefuchsiger Milchling
3	Lactarius	rubrocinctus	Fr.	Rotgegürtelter Runzelmilchling
3	Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3	Lactarius	subdulcis	(Per.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchen-Milchling
3	Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
3	Russula	albonigra	(Krombh.) Fr.	Mentoltäubling
3	Russula	badia	Quél.	Zedernholztäublig
3	Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3	Russula	chloroides	(Krombh.) Bres.	Schmalblättriger Weisstäubling
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
3	Russula	cyanoxantha fo. pelteraui	R. Maire.: Singer	Grüner Frauentäubling
3	Russula	delica	Fr.	Gemeinder Weisstäubling
3	Russula	emetica	(Schäff.: Fr.) Gray	Kirschroter Speitäubling
3	Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
3	Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
3	Russula	heterophylla	(Fr.) Fr.	Grüner Speisetäubling
3	Russula	laurocerasi	Melzer	Mandeltäubling
3	Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
3	Russula	maculata	Quél. in Quél. & Roze	Gefleckter Täubling
3	Russula	mairei	Singer	Buchen-Speitäubling
3	Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3	Russula	turci	Bres.	Jodoformtäubling
3	Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilze der Woche 37

4	Cantharellus	auroa	(Batsch) Kuyp.	Duftender Gabeling, Goldfüsschen
4	Cantharellus	tubaeformis	Fr.	Durchbohrter Leistling
4	Craterellus	cornucopioides	Pers.	Totentrompete
4	Phellodon	niger	(Fr. ex Fr.) Karst.	Schwarzer Duftstacheling
5	Geastrum	fimbriatum	Fries	Gewimperter Erdstern
5	Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
5	Scleroderma	citrinum	Pers.	Dickschaliger Kartoffelbovist
5	Scleroderma	verrucosum	(Bull.: Pers.) Pers.	Dünnschaliger Kartoffelbovist
7	Helvella	crispa	Fr.	Herbstlorchel
7	Otidea	onotica	(Pers.: Fr.) Bonorden	Eselsohr

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich sind auch Mikroaufnahmen eingeflochten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.



Pilze der Woche 38

Mycena zephirus *Rostfleckiger Helmling*

Standort: Truppenweise bei Nadelbäumen.
Fruchtkörper: Hut bis 30 mm.
Mikromerkmale: Sporen 12 x 5 µm, zylindrisch, Zystiden stumpf spindelförmig bis leicht verzweigt. Huthauthyphen glatt. Stielcortexhyphen mit Auswüchsen.
Bemerkungen: Dieser weitverbreitete Helmling zeichnet sich hauptsächlich durch den vorallem im Alter rotfleckigen Hut und den gebrechlichen Stiel aus. Auch die schlanken Sporen sind ein guter, mikroskopischer Hinweis für diese Art. *M. laevigata,* ebenfalls im Nadelwald vorkommend, steht ihm nahe, hat jedoch einen zähen Stiel und nicht rotfleckigen Hut.

Cortinarius flexipes var. inolens

Standort: Nadelwälder.
Fruchtkörper: Hut bis 20 mm.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 5 µm, mässig warzig.
Bemerkungen: Dieser Wasserkopf gehört zu den kleinen, dunklbraunen Telamonien mit weiss gegürteltem Stiel. Der Geruch ist unauffällig, nicht nach Pelargonium wie bei der *var. flabellus*.

Mycena zephirus *Rostfleckiger Helmling*

Cortinarius flexipes var. inolens

Pilze der Woche 38

1	Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
1	Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
1	Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe
2	Agaricus	bitorquis	(Quélet) Sacc.	Trottoir-Champignon
2	Agaricus	macrosporus	(Møl. & Schäff.) Pilát	Grosssporiger Anischampignion
2	Agaricus	silvaticus	Schäff.: Fr.	Echter Wald-Champignon
2	Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
2	Amanita	muscaria	(L.) Hook.	Fliegenpilz
2	Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
2	Clitocybula	lacerata	(Scropoli) Métrod	Fransiger Faserrübling
2	Cortinarius	armillatus	(Fr.: Fr.) Fr.	Geschmückter Gürtelfuss
2	Cortinarius	bolaris	(Pers.: Fr.) Fr.	Rotschuppiger Rauhkopf
2	Cortinarius	elegantissimus	Hry.	Prächtiger Klumpfuss
2	Cortinarius	flexipes var. inolens	Lindstr.	Varietät von C. flexipes (o. Geruch)
2	Cortinarius	praestans	(Cord.) Gill.	Schleiereule
2	Cortinarius	torvus	(Bull.: Fr.) Fr.	Wohlriechender Gürtelfuss
2	Hebeloma	radicosum	(Bull.: Fr.) Rick.	Wurzelnder Fälbling
2	Hebeloma	senescens	(Batsch) Berk.	Bräunender Fälbling
2	Hohenbuhelia	myxotricha	Lév.) Sing.	Behaarter Muscheling
2	Hygrophorus	eburneus	(Bull.: Fr.) Fr.	Elfenbein-Schneckling
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Inocybe	corydalina	Quél.	Grünbuckliger Risspilz
2	Inocybe	flocculosa	(Berk.) Sacc.	Flockiger Risspilz
2	Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
2	Inocybe	hirtelloides	Stangl. & Ves.	Ocker-Risspilz
2	Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
2	Lepiota	cristata	(Bolton.: Fr.) Kummer	Stink-Schirmling
2	Lepista	inversa	(Scop.: Fr.) Pat.	Fuchsiger Rötelritterling
2	Lyophyllum	loricatum	(Fr.) Kühn.	Gepanzerter Rasling
2	Macrolepiota	rhacodes	(Vittad.) Singer	Safranschirmling
2	Mycena	zephirus	(Fr.: Fr.) Kumm.	Rostfleckiger Helmling
2	Naucoria	melinoides	(Bull.: Fr.) Kühn.	Honiggelber Sumpfschnitzling
2	Oudemansiella	mucida	(Schrad. ex Fr.) v.H.	Beringter Schleimrübling
2	Pholiota	astragalina	(Fr.) Singer	Safranroter Schüppling
2	Psathyrella	piluliformis	(Bull.: Fr.) Ort.	Wässeriger Faserling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilze der Woche 38

2	Rozites	caperatus	(Pers.: Fr.) P. Karst.	Zigeunerpilz
2	Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
2	Tricholoma	sciodes	(Secr.) Martin	Schärflicher Ritterling
3	Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
3	Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
3	Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3	Russula	amethystina	Quélet	Amethysttäubling
3	Russula	atropurpurea	(Krombh.) Britz.	Pupurschwarzer Täubling
3	Russula	badia	Quél.	Zedernholztäublig
3	Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
3	Russula	delica	Fr.	Gemeinder Weisstäubling
3	Russula	emetica	(Schäff.: Fr.) Gray	Kirschroter Speitäubling
3	Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
3	Russula	integra	(L.:) Fr. ss. Mre.	Braunroter Ledertäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3	Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
3	Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
3	Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling
4	Pseudocraterellus	sinuosus	(Fr.: Fr.) Reid.	Krauser Leistling
7	Xylaria	polymorpha	(Pers. ex Mér.) Grev.	Vielgestaltige Holzkeule

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich sind auch Mikroaufnahmen eingeflochten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

Pilze der Woche 39

Gyromitra infula *Bischofsmütze*

Standort:	Nadel- und Laubwald.
Fruchtkörper:	Hut bis 80 mm.
Mikromerkmale:	Sporen 20 x 8 µm, hyalin mit 2 Tropfen, Melzer negativ. Asci mit 8 Sporen.
Bemerkungen:	Dieser Pilz kan wohl durch seine Form kaum verwechselt werden, zumal die Doppelgänger, *G. esculenta* und *G. gigas* schon im Frühjahr erscheinen. Ansonsten gibt die Sporenform klar Auskunft.



VEREIN FÜR PILZKUNDE BASEL

Gyromitra infula *Bischofsmütze*

Pilze der Woche 39

1	Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
1	Boletus	luridus	Schäff.: Fr.	Netzstieliger Hexenröhrling
1	Chalciporus	piperatus	(Bull.: Fr.) Bat.	Pfeffer-Röhrling
1	Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
2	Agaricus	essettei	Bon	Schiefknolliger Anis-Champignon
2	Armillaria	ostoyae	Romagn.	Dunkler Hallimasch
2	Clitocybe	fragrans	(With.) Kumm.	Dufttrichterling
2	Clitocybe	metachroa	(Fr.) Kumm.	Staubfüssiger Trichterling
2	Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
2	Clitocybula	lacerata	(Scropoli) Métrod	Fransiger Faserrübling
2	Cortinarius	anserinus	(Vel.) Hry.	Buchen-Klumpfuss
2	Cortinarus	argutus	Fr.	Spitzbasiger Schleimkopf
2	Cortinarius	bolaris	(Pers.: Fr.) Fr.	Rotschuppiger Rauhkopf
2	Cortinarius	calochrous	Fr.	Amethystblättriger Klumpfuss
2	Cortinarius	camphoratus	(Fr.) Fr.	Bocks-Dickfuss
2	Cortinarius	croceifolius	(M.M. Moser) M.M. Moser	
2	Cortinarius	delibutus	Fr.	Violettblättriger Schleimfuss
2	Cortinarius	dionysae	Hry.	Mehligriechender Klumpfuss
2	Cortinarius	evernius	(Fr.: Fr.) Fr. ss. Mos.	Rettich-Gürtelfuss
2	Cortinarius	fasciatus	Fr. ss. Arn.	Rötlichgeschmückter Wasserkopf
2	Cortinarius	infractus	(Pers.: Fr.) Fr.	Bitterer Schleimfuss
2	Cortinarius	nanceiensis	Mr.	Gelbflockiger Schleimkopf
2	Cortinarius	odorifer	Britz	Anis-Klumpfuss
2	Cortinarius	olidus	Lge.	Gelbgegürtelter Schleimkopf
2	Cortinarius	percomis	Fr.	Würziger Schleimkopf
2	Cortinarius	praestans	(Cord.) Gill.	Schleiereule
2	Cortinarius	splendens	Hry.	Schöngelber Klumpfuss
2	Cortinarius	variecolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf
2	Cortinarius	vernus	Lind. & Melot	Frühlings-Wasserkopf
2	Cortinarius	vulpinus	(Vel.) Hry.	Gilbender Fuchs-Seidenkopf
2	Entoloma	conferendum	(Britz.) Noord.	Kreuzsporiger Rötling
2	Entoloma	pseudoturbidum	(Rom.) Mos.	Sepiabrauner Rötling
2	Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
2	Hebeloma	senescens	(Batsch) Berk.	Bräunender Fälbling
2	Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
2	Hydropus	atramentosus	(Kbr.) Kotl. & Pouz.	Schwärzender Wasserfuss

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

2	Hygrophorus	agathosmus	(Fr.) Fr.	Wohlriechender Schneckling
2	Hygrophorus	chrysodon	(Batsch.: Fr.) Fr	Goldzahn-Schneckling
2	Hygrophorus	pudorinus	(Fr.) Fr.	Orange-Schneckling
2	Hygrophorus	russula	(Schäff.: Fr.) Quél.	Geflecktblättriger Purpurschneckling
2	Inocybe	cookei	Bres.	Knolliger Risspilz
2	Inocybe	flocculosa	(Berk.) Sacc.	Flockiger Risspilz
2	Inocybe	phaeocomis	(Pers.) Kuyp.	Braunschopfiger Risspilz
2	Inocybe	praetervisa	Quél.	Zapfensporiger Risspilz
2	Inocybe	rimosa	(Bull.: Fr:) Kummer	Kegeliger Risspilz
2	Lacrymaria	lacrymabunda	(Bull.: Fr.) Pat.	Tränender Samumpilz
2	Lentinellus	cochleatus	(Pers.: Fr.) Karst.	Äniszähling
2	Lepista	densifolia	(Favre) Sing.	Dichtblättriger Rötelritterling
2	Lyophyllum	ambustum	(Fr.: Fr.) Sing.	Kohlen-Graublatt
2	Lyophyllum	atratum	(Fr.:Fr.) Singer	Traniges Graublatt
2	Lyophyllum	connatum	(Schum.: Fr.) Sing.	Weisser Büschelrasling
2	Lyophyllum	fumosum	(Pers.: Fr.) Ort.	Hellbrauner Büschelrasling
2	Lyophyllum	rancidum	(Fr.: Fr.) Sing.	Wurzel-Graublatt
2	Marasmius	wynnei	Berk. & Br.	Violetlicher Schwindling
2	Melanoleuca	cognata	(Fr.) Konr. et Maubl.	Frühlings-Weichritterling
2	Mycena	epipterygia	(Scop.: Fr.) Gray	Dehnbarer Helmling
2	Myxomphalia	maura	(Fr.: Fr.) Hora	Kohlennabeling
2	Omphalina	acerosa	(Fr.) Lange	Muschelnabeling
2	Pholiota	flammans	(Fr.:) Kummer	Feuerschüppling
2	Pholiota	highlandensis	(Peck) Hes & Sm.	Kohlenschüppling
2	Pluteus	salicinus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Grauer Dachpilz
2	Psathyrella	conopilus	(Fr.: Fr.) Pears. & Dennis	Huthaarfaserling
2	Tricholoma	columbetta	(Fr.) Kumm.	Seidiger Ritterling
2	Tricholoma	fracticum	(Britz.) Kreis.	Fastberingter Ritterling
2	Tricholoma	pseudonicticans	Bon	Blassfleischiger Fichtenritterling
2	Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
2	Tricholoma	sciodes	(Secr.) Martin	Schärflicher Ritterling
2	Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
2	Xerula	melanotricha	Dörfelt	Weisstannen-Wurzelrübling
2	Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3	Lactarius	albocarneus	Britz.	Klebriger Milchling
3	Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilze der Woche 39

3	Lactarius	fulvissimus	Rom. i. Kühn. & Rom.	Orangefuchsiger Milchling
3	Lactarius	luridus	(Pers.: Fr.) Gray	Gewöhnlicher Violettmilchling
3	Lactarius	picinus	Fr.	Pechschwarzer Milchling
3	Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
3	Lactarius	scrobiculatus	(Scop.: Fr.) Fr.	Grubiger Fichtenmilchling
3	Lactarius	subdulcis	(Per.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchen-Milchling
3	Lactarius	uvidus	(Fr.) Fr.	Klebrig-schleimiger Violettmilchling
3	Russula	acrifolia	Romagn.	Scharfblättriger Schwärztäubling
3	Russula	amethystina	Quélet	Amethysttäubling
3	Russula	aurea	Pers.	Goldtäubling
3	Russula	badia	Quél.	Zedernholztäublig
3	Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3	Russula	firmula	Schäffer	Scharfer Glanz-Täubling
3	Russula	integra	(L.:) Fr. ss. Mre.	Braunroter Ledertäubling
3	Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
3	Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3	Russula	pseudointegra	Arn. & Gor.	Ockerblättriger Zinnobertäubling
3	Russula	queletii	Fr. in Quél.	Stachelbeertäubling
3	Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling
4	Sarcodon	imbricatus	(L. ex Fr.) Karst.	Habichtspilz
7	Gyromitra	Infula	(Schäff. ex Pers.) Quél.	Bischofsmütze
7	Rustroemia	firma	(Pers. Ex. Gray) Saccardo emend. Dumont	Derber Stromakelch

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich sind auch Mikroaufnahmen eingeflochten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

Pilze der Woche 40

Hebeloma syrjense *Seifen-Fälbling*

Standort:	Nadelwald.
Fruchtkörper:	Hut bis 50 mm.
Mikromerkmale:	Sporen 10 x 6 µm, braun, warzig, Zystiden zylindrisch.
Bemerkungen:	Ein Fälbling bei Nadelbäumen mit jung nicht sichtbarer Cortina, dextrionid und mit sehr bitterem Geschmack. *H. collariatum* ist nicht dextrionid, hat jung eine Cortina und grössere Sporen. In Auenwäldern bei Laubbäumen.



VEREIN FÜR PILZKUNDE BASEL

Hebeloma syrjense *Seifen-Fälbling*



Hebeloma syrjense *Seifen-Fälbling*

Zystiden und Sporen

Pilze der Woche 40

1	Chalciporus	piperatus	(Bull.: Fr.) Bat.	Pfeffer-Röhrling
2	Armillaria	ostoyae	Romagn.	Dunkler Hallimasch
2	Baeospora	myosurus	(Fr.:) Sing.	Mäuseschwanz Amyloidsporrübling
2	Cortinarius	brunneus	(Pers.: Fr.) Fr.	Dunkelbrauner Gürtelfuss
2	Cortinarius	cinnamomeus	Fr.	Zimt-Hautkopf
2	Cortinarius	croceus	(Schäff.) Gray	Gelbblättriger Hautkopf
2	Cortinarius	decipiens	(Pers.: Fr.) Fr.	Lilastieliger Wasserkopf
2	Cortinarius	delibutus	Fr.	Violettblättriger Schleimfuss
2	Cortinarius	olidus	Lge.	Gelbgegürtelter Schleimkopf
2	Cortinarius	saturninus	Fr.	Blaufleischiger Gürtelfuss
2	Entoloma	euchroum	(Pers.: Fr.) Donk.	Violetter Rötling
2	Galerina	sideroides	(Fr.)Kühn.	Glimmerstieliger Häubling
2	Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
2	Gymnopus	dryophylla	(Bull.: Fr.) Kumm.	Waldfreund-Rübling
2	Hebeloma	pallidoluctuosum	Gröger et Zschieschang	Schwärzender Fälbling
2	Hebeloma	syrjense	Karsten	Seifen-Fälbling
2	Hygrocybe	psittacina	(Schäff.: Fr.) Wünsche	Papageigrüner Saftling
2	Hygrophorus	discoideus	(Pers.: Fr.) Fr.	Braunscheibiger Schneckling
2	Hygrophorus	pustulatus	(Fr.) Fr.	Schwarzpunktierter Schneckling
2	Inocybe	calamistrata	(Fr.:Fr.) Gill.	Blaufüssiger Risspilz
2	Inocybe	nitiduscula	(Britz.) Sacc.	Früher Risspilz
2	Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
2	Leucoagaricus	leucothites	(Vitt.) Was.	Rosablättriger Egerlingsschirmling
2	Marasmius	alliaceus	(Jacq.: Fr.) Fr.	Langstieliger Knoblauchschwindling
2	Mycena	crocata	(Schrad.: Fr.) Kumm.	Safranmilchender Helmling
2	Mycena	polygramma	(Bull.: Fr.) Gray	Rillstieliger Helmling
2	Pholiota	flammans	(Fr.:) Kummer	Feuerschüppling
2	Pluteus	salicinus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Grauer Dachpilz
2	Tricholoma	inamoenum	(Fr.) Quél.	Lästiger Ritterling
2	Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
2	Tricholoma	scalpturatum	(Fr.) Quél.	Gilbender Erd-Ritterlig
2	Tricholoma	vaccinum	(Pers.: Fr.) Kumm.	Zottiger Ritterling
3	Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
3	Lactarius	luridus	(Pers.: Fr.) Gray	Gewöhnlicher Violettmilchling
3	Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3	Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

VEREIN FÜR PILZKUNDE BASEL

Pilze der Woche 40

3	Russula	integra	(L.:) Fr. ss. Mre.	Braunroter Ledertäubling
3	Russula	queletii	Fr. in Quél.	Stachelbeertäubling
4	Cantharellus	tubaeformis	Fr.	Durchbohrter Leistling
4	Clavulinopsis	corniculata	(Fr.) Corner	Geweiförmige Wiesenkeule
4	Oligoporus	ptychogaster	(Ludwig) Falck	Bauchpilz-Mehlstaubporling
4	Ramaria	flaccida	(Fr.) Bourd.	Flattrige Fichtenkoralle
4	Spongiporus	lacteus	(Fr.) Aoshima et Kobayasi	Milchweisser Saftporling
6	Tremiscus	helveloides	(DC: Pers.) Donk	Roter Gallerttrichterling
7	Leotia	lubrica	Pers.	Gemeines Gallertkäppchen

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich sind auch Mikroaufnahmen eingeflochten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

Pilze der Woche 42

Pholiota jahnii *Pinselschüppling*

Standort:	Laubwald.
Fruchtkörper:	Hut bis 60 mm.
Mikromerkmale:	Sporen 5,5 x 3,5 µm, braun, dickwandig, ohne sichtbaren Keimporus. Chrysozystiden vorhanden.
Bemerkungen:	Dieser Schüppling unterscheidet sich zu anderen schmierigen Schüpplingen durch den dünnen Stiel und die kleinen Sporen ohne Keimporus sowie durch die dunklen Schuppen.



VEREIN FÜR PILZKUNDE BASEL

Pholiota jahnii *Pinselschüppling*

Pilze der Woche 42

1	Porphyrellus	porphyrosporus	Fr.) Gilbert	Düsterer Röhrling
2	Agaricus	silvicola	(Vittad.) Sacc.	Dünnfleischiger Anis-Egerling
2	Baeospora	myriadophylla	(Peck) Singer	Tausendblatt Amyloidsporrübling
2	Clitocybe	cerussata	(Fries) P. Kummer	Ähnlich Waldfreund Trichterling
2	Clitocybe	clavipes	(Pers.) Kumm.	Keulenfuss-Trichterling
2	Clitocybe	fragrans	(With.) Kumm.	Dufttrichterling
2	Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
2	Clitocybe	lignatilis	(Pers.) Karst.	Gemeiner Holztrichterling
2	Cortinarius	anserinus	(Vel.) Hry.	Buchen-Klumpfuss
2	Cortinarius	calochrous	Fr.	Amethystblättriger Klumpfuss
2	Cortinarius	cinnamomeus	Fr.	Zimt-Hautkopf
2	Cortinarius	conicus	(Vel.) Hry.	Kegeliger Gürtelfuss
2	Cortinarius	decipiens	(Pers.: Fr.) Fr.	Dunkelgebuckelter Wasserkopf
2	Cortinarius	dibaphus	Fr.	Bunter Klumpfuss
2	Cortinarius	multiformis	Fr.	Sägeblättriger Klumpfuss
2	Cortinarius	mussivus	(Fr.) Melot	Stinkender Schleimkopf
2	Cortinarius	saturninus	Fr.	Blaufleischiger Gürtelfuss
2	Entoloma	rhodopolium	(Fr.: Fr.) Kummer	Niedergedrückter Rötling
2	Galerina	stylifera	(Atk.) Sm. & Sing.	Behangner Häubling
2	Hebeloma	crustuliniforme	(Bull.: Fr.) Quél.	Tongrauer Fälbling
2	Hebeloma	radicosum	(Bull.: Fr.) Rick.	Wurzelnder Fälbling
2	Hebeloma	syrjense	Karsten	Seifen-Fälbling
2	Hydropus	atramentosus	(Kbr.) Kotl. & Pouz.	Schwärzender Wasserfuss
2	Hygrocybe	coccinea	(Schäff.: Fr.)	Kirschroter Saftling
2	Hygrocybe	grossula	(Pers.)	Gelboliver Ellerling
2	Hygrophorus	chrysodon	(Batsch.: Fr.) Fr	Goldzahn-Schneckling
2	Hygrophorus	pudorinus	(Fr.) Fr.	Orange-Schneckling
2	Inocybe	phaeocomis	(Pers.) Kuyp.	Braunschopfiger Risspilz
2	Inocybe	whitei	(Berk .et Br.) Sacc.	Weissrosa Risspilz
2	Lentinus	torulosus	(Pers.: Fr. Lloyd	Laubholz-Knäueling
2	Lepista	nuda	(Bull.: Fr.) Cooke	Violetter Rötelritterling
2	Lyophyllum	decastes	(Fr.: Fr.) Singer	Brauner Büschelrasling
2	Mycena	stipata	Maas Geester.& Schw.	Büscheliger Nitrat-Helmling
2	Mycena	zephirus	(Fr.: Fr.) Kumm.	Rostfleckiger Helmling
2	Pholiota	jahnii	Tjallingii-Beukers et Bas	Pinselschüppling
2	Pholiota	lenta	(Pers.: Fr.) Singer	Tonweisser Schüppling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilze der Woche 42

2	Pholiotina	striipes	(Cooke) Lundell	Weissstieliger Glockenschüppling
2	Pseudoclitocybe	cyathiformis	(Bull.) Sing.	Kaffebrauner Gabeltrichterling
2	Stropharia	aeruginosa	(Curtis:) Fr./Quél.	Grünspansträuschling
2	Tricholoma	atrosquamosum	(Chev.) Sacc.	Schwarzschuppiger Ritterling
2	Tricholoma	scalpturatum	(Fr.) Quél.	Gilbender Erd-Ritterlig
2	Tricholoma	tigrinum	Kumm.	Tiger-Ritterling
2	Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
2	Tubaria	hiemalis	Romagn. ex Bon	Winter-Trompetenschnitzling
3	Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
3	Lactarius	fluens	Boud.	Braunfleckender Milchling
3	Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3	Lactarius	scrobiculatus	(Scop.: Fr.) Fr.	Grubiger Fichtenmilchling
3	Lactarius	subdulcis	(Per.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchen-Milchling
3	Russula	amethystina	Quélet	Amethysttäubling
3	Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3	Russula	cyanoxantha fo. pelteraui	R. Maire.: Singer	Grüner Frauentäubling
3	Russula	illota	Romagn.	Morsetäubling
3	Russula	integra	(L.:) Fr. ss. Mre.	Braunroter Ledertäubling
3	Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	queletii	Fr. in Quél.	Stachelbeertäubling
4	Aportiporus	biennis	(Bull.: Fr.) Sing.	Rötender Saftwirrling
7	Humaria	hemisphaerica	(Weber: Fr.) Fuckel	Halbkugeliger Borstenbecherling
7	Peziza	succuosa	Berk.	Gelbmilchender Becherling
7	Rhizina	undulata	Fr. Fr.	Wellige Wurzellorchel

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich sind auch Mikroaufnahmen eingeflochten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

Pilze der Woche 43

Ionomidotis fulvotingens *Braunschwarzer Rindenbecher*

Standort:	An abgestorbenen Ästen von Ahorn, Erle, Hasel.
Fruchtkörper:	Hut bis 7 mm.
Mikromerkmale:	Sporen 8 x 1,5 µm, glatt, hyalin mit zwei Tropfen. Melzer neg., achtsporig, biserat. Paraphysen dünnfädig, an der Spitze z.T. gegabelt.
Bemerkungen:	Das büschelige Austreten der manchmal etwas gestielten Fruchtkörper aus der Rinde sowie das Verfärben des Farbstoffes zu rotbraun mit KOH, sind gute Hinweise zu dieser Art. Die Farbe ist etwas variabel.
Foto:	Markus Wilhelm.



Ionomidotis fulvotingens *Braunschwarzer Rinderbecher*

Pilze der Woche 43

1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1	Chalciporus	piperatus	(Bull.: Fr.) Bat.	Pfeffer-Röhrling
1	Suillus	bovinus	(L.: Fr.) Rouss.	Kuhröhrling
1	Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
2	Agaricus	silvaticus	Schäff.: Fr.	Echter Wald-Champignon
2	Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
2	Amanita	muscaria	(L.) Hook.	Fliegenpilz
2	Clitocybe	clavipes	(Pers.) Kumm.	Keulenfuss-Trichterling
2	Clitopilus	prunulus	(Scop.: Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Cortinarius	decipiens	(Pers.: Fr.) Fr.	Lilastieliger Wasserkopf
2	Cortinarius	evernius	(Fr.: Fr.) Fr. ss. Mos.	Rettich-Gürtelfuss
2	Cortinarius	hinnuleus	(Sow.) Fr.	Erdigriechender Gürtelfuss
2	Cortinarius	malicorius	Fr.	Orangerandiger Hautkopf
2	Cortinarius	saturninus	Fr.	Blaufleischiger Gürtelfuss
2	Cortinarius	vernus	Lind. & Melot	Frühlings-Wasserkopf
2	Cystoderma	amiantinum	(Scop.: Fr.) Fayod	Amiant-Körnchenschirmling
2	Galerina	sideroides	(Fr.)Kühn.	Glimmerstieliger Häubling
2	Hebeloma	crustuliniforme	(Bull.: Fr.) Quél.	Tongrauer Fälbling
2	Hebeloma	tomentosum	(Mos.) Grög. & Zsch.	Filziger Fälbling
2	Hygrophorus	chrysodon	(Batsch.: Fr.) Fr	Goldzahn-Schneckling
2	Hygrophorus	discoideus	(Pers.: Fr.) Fr.	Braunscheibiger Schneckling
2	Hygrophorus	eburneus	(Bull.: Fr.) Fr.	Elfenbein-Schneckling
2	Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2	Lentinus	adhaerens	(Alb. et Schw.: Fr.) Fr.	Harziger Sägeblättling
2	Lepiota	clypeolaria	(Bull.: Fr.) Kumm.	Wolliggestiefelter Schirmling
2	Lepista	irina	(Fr.) Big.	Veilchen-Rötelritterling
2	Oudemansiella	mucida	(Schrad. ex Fr.) v.H.	Beringter Schleimrübling
2	Psathyrella	spadicea	(Schäff.) Sing.	Schockoladenbrauner Faserling
2	Tricholoma	atrosquamosum	(Chev.) Sacc.	Schwarzschuppiger Ritterling
2	Tricholoma	orirubens	Quél.	Rötender Ritterling
2	Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
2	Tubaria	hiemalis	Romagn. ex Bon	Winter-Trompetenschnitzling
3	Lactarius	albocarneus	Britz.	Klebriger Milchling
3	Lactarius	luridus	(Pers.: Fr.) Gray	Gewöhnlicher Violettmilchling
3	Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

3	Lactarius	pubescens	(Schrad.) Fries	Flaumiger Milchling
3	Lactarius	rufus	(Scop.: Fr.) Fr.	Rotbrauner Milchling
3	Lactarius	scrobiculatus	(Scop.: Fr.) Fr.	Grubiger Fichtenmilchling
3	Lactarius	subdulcis	(Per.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchen-Milchling
3	Russula	amethystina	Quélet	Amethysttäubling
3	Russula	badia	Quél.	Zedernholztäublig
3	Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3	Russula	delica	Fr.	Gemeinder Weisstäubling
3	Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
3	Russula	integra	(L.:) Fr. ss. Mre.	Braunroter Ledertäubling
3	Russula	laurocerasi	Melzer	Mandeltäubling
3	Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	queletii	Fr. in Quél.	Stachelbeertäubling
3	Russula	sardonia	Fr.	Zitronenblättriger Täubling
3	Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
3	Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
4	Bjerkandera	fumosa	(Pers.: Fr.) Karst.	Graugelber Rauchporling
4	Ischnoderma	benzoinum	(Wahl.: Fr.) Karst.	Schwarzgebänderter Harzporling
4	Onnia	tomentosa	(Fr.) Karst.	Gestielter Filzporling
4	Phlebia	radiata	Fr.	Orangefarbener Kammpilz
4	Polyporus	brumalis	Pers.: Fr.	Winterporling
7	Inomidotis	fulvotingens	(Berk. & M.A. Curtis) E.K. Cash	

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich sind auch Mikroaufnahmen eingeflochten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

Pilze der Woche 44

Stropharia caerulea *Blauer Träuschling*

Standort:	An nährstoffreichen Standorten, Ruderalplätzen.
Fruchtkörper:	Hut bis 60 mm.
Mikromerkmale:	Sporen 8 x 4,5 µm, purpurbraun, dickwandig, ohne Keimporus, mit Chrysozystiden. HDS eine Ixokutis mit Schnallen, Hyphenenden z.T. kopfig.
Bemerkungen:	Makroskopisch unterscheidet sich dieser Pilz von *S. aeruginosa* durch den schwach entwickelten Ring und die nicht weissflockigen Lamellenschneiden. Mikroskopisch durch die kopfigen Hyphenenden der HDS und die Sporen ohne Keimporus.



Stropharia caerulea *Blauer Träuschling*

Pilze der Woche 44

1	Chroogomphus	rutilus	(Schäff.: Fr.) Millller	Kupferroter Gelbfuss
1	Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
2	Cortinarius	decipiens	(Pers.: Fr.) Fr.	Dunkelgebuckelter Wasserkopf
2	Cortinarius	saturninus	Fr.	Blaufleischiger Gürtelfuss
2	Crepidotus	mollis	(Schäff.L Fr.) Staude	Gallertfleischiges Stummelfüsschen
2	Entoloma	rhodopolium	(Fr.: Fr.) Kummer	Niedergedrückter Rötling
2	Hebeloma	crustuliniforme	(Bull.: Fr.) Quél.	Tongrauer Fälbling
2	Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
2	Hygrophorus	discoideus	(Pers.: Fr.) Fr.	Braunscheibiger Schneckling
2	Hygrophorus	unicolor	Grög.	Orangefalber Schneckling
2	Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
2	Lepista	nuda	(Bull.: Fr.) Cooke	Violetter Rötelritterling
2	Mycena	polygramma	(Bull.: Fr.) Gray	Rillstieliger Helmling
2	Mycena	stipata	Maas Geester.& Schw.	Büscheliger Nitrat-Helmling
2	Psathyrella	conopilus	(Fr.: Fr.) Pears. & Dennis	Huthaarfaserling
2	Psathyrella	microrrhiza	(Lasch.: Fr.)	Wurzelnder Faserling
2	Schizophyllum	commune	Fr.: Fr.	Gemeiner Spaltblättling
2	Stropharia	caerulea	Kreisel	Blauer Träuschling
2	Xerula	melanotricha	Dörfelt	Weisstannen-Wurzelrübling
3	Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
3	Lactarius	pubescens	(Schrad.) Fries	Flaumiger Milchling
3	Russula	queletii	Fr. in Quél.	Stachelbeertäubling
4	Creolophus	cirrhatus	(Pers.: Fr.) Karst.	Dorniger Stachelbart
4	Megalozystidium	lactescens	(Berkeley) Jülich	Milchende Gleozystidenrinde
4	Merulius	tremellosus	Fr.	Gallertfleischiger Fältling
4	Oligoporus	stipticus	(Pers.: Fr.) Gilb. & Ryv.	Bitterer Saftporling
4	Phanerochaete	sordida	(Karst.) Eriks. & Ryv.	Cremefarbener Zystidenrindenpilz
4	Subulicystidium	longisporum	(Pat.) Parm.	Langsporiger Sägedornling
4	Trechispora	vaga	(Fr.) Lib.	Schwefelgelber Rindenpilz
7	Daldinia	concentrica	(Bolt. ex Fr.) Ces. & de Not.	Kohliger Kugelpilz

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich sind auch Mikroaufnahmen eingeflochten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

Pilze der Woche 45

Mycena metata *Kegeliger Helmling*

Standort:	Laub- und Nadelwald.
Fruchtkörper:	Hut bis 20 mm.
Mikromerkmale:	Sporen 9 x 4,5 µm mit Tropfen. Cheilozystiden mit warzigen Auswüchsen. Basidien meist 4sporig.
Bemerkungen:	Er unterscheidet sich von *M. filopes* durch die warmen Brauntöne des Hutes und der Hut ist auch schon jung offen, d.h. den Stiel nicht umschliessend. Die *M. arcangeliana* hat, im Gegensatz zu beiden Arten *M. filopes* und *M. metata,* breitelliptische Sporen.



Mycena metata *Kegeliger Helmling*

Pilze der Woche 45

1	Boletus	luridus	Schäff.: Fr.	Netzstieliger Hexenröhrling
1	Porphyrellus	porphyrosporus	Fr.) Gilbert	Düsterer Röhrling
2	Clitocybe	cerussata	(Fries) P. Kummer	Ähnlich Waldfreund Trichterling
2	Clitocybe	clavipes	(Pers.) Kumm.	Keulenfuss-Trichterling
2	Clitocybe	fragrans	(With.) Kumm.	Dufttrichterling
2	Clitocybe	metachroa	(Fr.) Kumm.	Staubfüssiger Trichterling
2	Galerina	stylifera	(Atk.) Sm. & Sing.	Behangner Häubling
2	Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
2	Hygrocybe	grossula	(Pers.)	Gelboliver Ellerling
2	Hygrophorus	chrysodon	(Batsch.: Fr.) Fr	Goldzahn-Schneckling
2	Hygrophorus	pustulatus	(Fr.) Fr.	Schwarzpunktierter Schneckling
2	Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
2	Lentinus	adhaerens	(Alb. et Schw.: Fr.) Fr.	Harziger Sägeblättling
2	Lepista	nuda	(Bull.: Fr.) Cooke	Violetter Rötelritterling
2	Marasmius	androsaceus	(L.: Fr.) Fr.	Rosshaarschwindling
2	Mycena	crocata	(Schrad.: Fr.) Kumm.	Safranmilchender Helmling
2	Mycena	epipterygia	(Scop.: Fr.) Gray	Dehnbarer Helmling
2	Mycena	maculata	Karst.	Gefleckter Helmling
2	Mycena	metata	(Fr.: Fr.) Kumm.	Kegeliger Helmling
2	Mycena	polygramma	(Bull.: Fr.) Gray	Rillstieliger Helmling
2	Mycena	stipata	Maas Geester.& Schw.	Büscheliger Nitrat-Helmling
2	Tricholoma	scalpturatum	(Fr.) Quél.	Gilbender Erd-Ritterlig
3	Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
3	Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3	Russula	atropurpurea	(Krombh.) Britz.	Pupurschwarzer Täubling
3	Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3	Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
3	Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
4	Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
7	Bisporella	citrina	(Batsch ex Fr.) Korf & Carpenter	Zitronengelbes Holzbecherchen

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich sind auch Mikroaufnahmen eingeflochten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.



VEREIN FÜR PILZKUNDE BASEL

Exkursion Raedersdorf 11. Nov. 2007 Schlussbummel des Verein für Pilzkunde Basel

Nördlich Raedersdorf in den südexponierten Eichen-Hagebuchen-Wäldern, z.T. mit eingestreuten Nadelbäumen; dann ostwärts in den zu Oltingue gehörenden, schattig-moosigen Weisstannen-Wald und zurück nach Raedersdorf. Nachtessen in Lutter.

Trotz des starken Windes waren wir am abschliessenden Vereinsanlass, der Schlussbummel, immerhin noch 24 Pilzfreunde, die eifrig in den Wäldern um Raedersdorf, Elsass, nach Pilzen suchten. Bernard Gsell, der Organisator der Veranstaltung, hatte ein interessantes, artenreiches Gebiet ausgesucht, das leider nicht gerade hielt, was es versprach. Trotzdem, mit 83 Arten, die wir schliesslich gefunden haben und die in diesem Dokument aufgelistet sind, waren wir doch einigermassen zufrieden. Herzlichen Dank dem Organisator Dr. Bernard Gsell.
,

Galerina stylifera *Behangener Häubling*

Standort:	Totes Nadelholz.
Fruchtkörper:	Hut bis 40 mm.
Mikromerkmale:	Sporen 8 x 4,5 µm, braun, glatt. Cheilozystiden kopfig, keine Pleurozystiden.
Bemerkungen:	*Galerina stylifera* unterscheidet sich von *Galerina marginata* durch die nicht warzigen Sporen und den kopfigen Cheilozystiden. Aufgrund der Mikromerkmale wird *G. stylifera* und *G. sideroides* von einigen Autoren als identisch betrachtet.

Galerina stylifera *Behangener Häubling*

Pilze der Woche 46

1	Chroogomphus	rutilus	(Schäff.: Fr.) Millller	Kupferroter Gelbfuss
1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
2	Baeospora	myosurus	(Fr.:) Sing.	Mäuseschwanz Amyloidsporrübling
2	Clitocybe	cerussata	(Fries) P. Kummer	Ähnlich Waldfreund Trichterling
2	Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
2	Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
2	Clitocybe	phaeophthalma	(Pers.) Kp.	Ranziger Trichterling
2	Clitopilus	prunulus	(Scop.: Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Coprinus	comatus	(Müll.: Fr.) Pers.	Schopf-Tintling
2	Cortinarius	saturninus	Fr.	Blaufleischiger Gürtelfuss
2	Cortinarius	varius	Fr.	Ziegelgelber Schleimkopf
2	Cystoderma	amiantinum	(Scop.: Fr.) Fayod	Amiant-Körnchenschirmling
2	Galerina	stylifera	(Atk.) Sm. & Sing.	Behangener Häubling
2	Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
2	Hebeloma	radicosum	(Bull.: Fr.) Rick.	Wurzelnder Fälbling
2	Hebeloma	senescens	(Batsch) Berk.	Bräunender Fälbling
2	Hygrophorus	chrysodon	(Batsch.: Fr.) Fr	Goldzahn-Schneckling
2	Hygrophorus	discoideus	(Pers.: Fr.) Fr.	Braunscheibiger Schneckling
2	Hypholoma	capnoides	(Fr.: Fr.) Kummer	Rauchblättriger Schwefelkopf
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Hypholoma	lateritium	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf
2	Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
2	Inocybe	sindonia	(Fr.) Karst.	Wolligfädiger Risspilz
2	Lepista	glaucocana	(Bres.) Sing.	Blassblauer Rötelritterling
2	Lepista	nuda	(Bull.: Fr.) Cooke	Violetter Rötelritterling
2	Marasmiellus	ramealis	(Bull.: Fr.) Sing.	Ästchenschwindlng
2	Melanoleuca	grammopus	(Bulliard: Fr.) Patouillard	Rillstieliger Weichritterling
2	Melanoleuca	melaleuca	(Pers.: Fr.) Murr.	Gemeiner Weichritterling
2	Mycena	abramsii	(Murr.) Murr.	Voreilender Helmling
2	Mycena	crocata	(Schrad.: Fr.) Kumm.	Safranmilchender Helmling
2	Mycena	galericulata	(Scop.:Fr.) Gray	Rosablättriger Helmling
2	Mycena	pura	(Pers.: Fr.) Kumm.	Rettich-Helmling
2	Panellus	stypticus	(Bull.: Fr.) P.Karst.	Bitterer Muschelseitling
2	Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
2	Pluteus	salicinus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Grauer Dachpilz
2	Pseudoclitocybe	cyathiformis	(Bull.) Sing.	Kaffebrauner Gabeltrichterling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilze der Woche 46

2	Rickenella	fibula	(Bull.: Fr.) Raith.	Orangegelber Heftelnabeling
2	Ripartites	tricholoma	(Alb. & v. Schw.)	Bewimperter Filzkrempling
2	Schizophyllum	commune	Fr.: Fr.	Gemeiner Spaltblättling
2	Strobilurus	esculentus	(Wulf.: Fr) Sg.	Fichtenzapfenrübling
2	Tricholoma	scalpturatum	(Fr.) Quél.	Gilbender Erd-Ritterlig
2	Xerula	melanotricha	Dörfelt	Weisstannen-Wurzelrübling
3	Lactarius	deterrimus	Gröger	Fichtenreizker
3	Lactarius	intermedius	(Krombh.) Cke.	Grubiger Weisstannenmilchling
3	Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3	Russula	emetica	(Schäff.: Fr.) Gray	Kirschroter Speitäubling
3	Russula	nauseosa	(Pers.) Fr..	Geriefter Weichtäubling
4	Aleurodiscus	disciformis	(DC: Fr.) Pat.	Schüsselförmige Mehlscheibe
4	Bierkandera	adusta	(Willd.: Fr.) Karst.	Angebrannter Rauchporling
4	Clavulina	cristata	(Holmskj.: Fr.) Schröt.	Kammförmige Koralle
4	Craterellus	cornucopioides	Pers.	Totentrompete
4	Fomitopsis	pinicola	(Fr.) Karst.	Rotbrauner Baumschwamm
4	Hapalopilus	rutilans	(Pers.: Fr.) Karst.	Zimtfarbener Weichporling
4	Heterobasidion	annosum	(Fr.) Bref.	Wurzelschwamm
4	Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
4	Lenzites	betulina	(L. ex Fr.) Fr.	Birkenblättling
4	Merulius	tremellosus	Fr.	Gallertfleischiger Fältling
4	Oligoporus	caesius	(Schrad.: Fr.) Gilb. & Ryv.	Blauer Saftporling
4	Plicaturopsis	crispa	(Pers.: Fr.) Rea	Buchen-Aderzähling
4	Schizopora	paradoxa	(Schrad.: Fr.) Donk	Veränderlicher Spaltporling
4	Steccherinum	ochraceum	(Pers.ap.Gmel.: Fr.) S.F. Gray	Ockerrötlichr Resupinatstacheling
4	Stereum	hirsutum	(Willd.: Fr.) S.F. Gray	Zottiger Schichtpilz
4	Stereum	subtomentosum	Pouzar	Samtiger Schichtpilz
4	Tomentella	sublilacina	(Ellis & Holw.)	Altlila-Filzgewebe
4	Trametes	gibbosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Buckel-Tramete
4	Trametes	hirsuta	(Wulf.: Fr.) Pilát	Striegelige Tramete
4	Trametes	versicolor	(L.: Fr.) Pilát	Schmetterlings-Tramete
5	Geastrum	quadrifidum	Pers. ex Pers.	Kleiner Neststern
5	Geastrum	sessile	(Sow.) Pouz.	Gewimperter Erdstern
5	Lycoperdon	pyriforme	Schäff.: Pers.	Birnen-Stäubling
6	Dacrymyces	stillatus	Nees: Fr.	Zerfliessende Gallertträne
7	Amphisphaerella	xylostei	Pers.) Rulamort	Heckenkirschen-Porenpustelpilz

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

VEREIN FÜR PILZKUNDE BASEL

Pilze der Woche 46

7	Bertia	moriformis var. Multiseptata	(Tode: Fr.) De Not.	Maulbeer-Kugelpilz
7	Bisporella	citrina	(Batsch ex Fr.) Korf & Carpenter	Zitronengelbes Holzbecherchen
7	Daldinia	concentrica	(Bolt. ex Fr.) Ces. & de Not.	Kohliger Kugelpilz
7	Diaporthe	leiphaemia	(Fr.) Sacc.	Eichen-Pfortling
7	Hypoxylon	fragiforme	(Pers. ex Fr.) Kickx	Rötliche Kohlenbeere
7	Nectria	cinnabarina	(Tode ex Fr.) Fr.	Zinnoberroter Pustelpilz
7	Nectria	sinopica	(Fr.: Fr.) Fr.	Efeu-Pustelpilz
7	Peckiella	lateritia	(Fr.) Mayre	Steinreizker (an L: deliciosus)
7	Thyridaria	rubronotata	(Berk. & Broome) Sacc.	Ahorn-Rotpustelpilz
7	Trochila	laurocerasi	(Desm.) Fr.	Kirschlorbeer-Deckelbecherchen
7	Xylaria	hypoxylon	(L. ex Hooker) Grev.	Geweihförmige Holzkeule

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich sind auch Mikroaufnahmen eingeflochten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

Pilze der Woche 48

Octospora humosa *Gemeiner Moosbecherling*

Standort:	Auf Erde, zwischen Moos.
Fruchtkörper:	Hut bis 10 mm.
Mikromerkmale:	Sporen 19 x 12 µm, hyalin mit Tropfen. Asci achtsporig, nicht amyloid, Paraphysen apikal gebogen, septiert, teilweise verzweigt.
Bemerkungen:	*Octospora humosa* ist wohl die grösste Art in der Gattung mit nicht warzigen Sporen. Ferner sind die Sporen an den Enden abgerundet. Auch das kräftige Rot und das Vorkommen zwischen Moosen ist ein guter Hinweis.



Octospora humosa *Gemeiner Moosbecherling*

Octospora humosa, Asci und Paraphysen

Octospora humosa, Sporen

Pilze der Woche 48

1	Chalciporus	piperatus	(Bull.: Fr.) Bat.	Pfeffer-Röhrling
1	Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
2	Baeospora	myriadophylla	(Peck) Singer	Tausendblatt Amyloidsporrübling
2	Baeospora	myosurus	(Fr.:) Sing.	Mäuseschwanz Amyloidsporrübling
2	Clitocybe	clavipes	(Pers.) Kumm.	Keulenfuss-Trichterling
2	Clitocybe	fragrans	(With.) Kumm.	Dufttrichterling
2	Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
2	Clitocybe	georgiana	Clem.	Moderigriechender Trichterling
2	Galerina	hypnorum	(Schrank: Fr.) Kühner	Astmoos-Häubling
2	Crepidotus	mollis	(Schäff.L Fr.) Staude	Gallertfleischiges Stummelfüsschen
2	Crepidotus	cesatii	(Rabh.) Saccardo	Kugelsporiges Stummelfüsschen
2	Galerina	marginata	(Batsch) Kühn.	Gifthäubling
2	Galerina	stylifera	(Atk.) Sm. & Sing.	Behangener Häubling
2	Hygrocybe	grossula	(Pers.)	Gelboliver Ellerling
2	Hygrophorus	chrysodon	(Batsch.: Fr.) Fr	Goldzahn-Schneckling
2	Hygrophorus	pustulatus	(Fr.) Fr.	Schwarzpunktierter Schneckling
2	Hypholoma	marginatum	(Pers.: Fr.) Schroet.	Geselliger Schwefelkopf
2	Hypholoma	capnoides	(Fr.:Fr.) P. Kumm.	Rauchblättriger Schwefelkopf
2	Lentinus	adhaerens	(Alb. et Schw.: Fr.) Fr.	Harziger Sägeblättling
2	Lepista	nuda	(Bull.: Fr.) Cooke	Violetter Rötelritterling
2	Lyophyllum	anthracophilum	(Lasch.)	Brandstellengraublatt
2	Lyophyllum	rancidum	(Fr.: Fr.) Sing.	Wurzel-Graublatt
2	Marasmiellus	ramealis	(Bull.: Fr.) Sing.	Ästchenschwindlng
2	Marasmius	androsaceus	(L.: Fr.) Fr.	Rosshaarschwindling
2	Mycena	epipterygia	(Scop.: Fr.) Gray	Dehnbarer Helmling
2	Mycena	filopes	(Bull.:Fr.) Kumm.	Zerbrechlicher Fadenhelmling
2	Mycena	metata	(Fr.: Fr.) Kumm.	Kegeliger Helmling
2	Mycena	polygramma	(Bull.: Fr.) Gray	Rillstieliger Helmling
2	Mycena	rosella	(Fr.: Fr.) Kumm.	Rosa-Helmling
2	Mycena	vitilis	(Fr.) Quél.	Zäher Fadenhelmling
2	Panellus	mitis	(Pers.: Fr.) Sing.	Milder Muschelseitling
2	Pseudoclitocybe	cyathiformis	(Bull.) Sing.	Kaffebrauner Gabeltrichterling
2	Sarcomixa	serotina	(Schrad.: Fr.) Karst.	Gelbstieliger Muschelseitling
2	Strobilurus	esculentus	(Wulf.: Fr) Sg.	Fichtenzapfenrübling
2	Xerula	melanotricha	Dörfelt	Weisstannen-Wurzelrübling
3	Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilze der Woche 48

4	Cantharellus	tubaeformis	Fr.	Durchbohrter Leistling
4	Clavulina	cristata	(Holmskj.: Fr.) Schröt.	Kammförmige Koralle
4	Climacocystis	borealis	(Fr.) Kotl. & Pouz.	Nordischer Porling
4	Fomitopsis	pinicola	(Fr.) Karst.	Rotbrauner Baumschwamm
4	Heterobasidion	annosum	(Fr.) Bref.	Wurzelschwamm
4	Plicaturopsis	crispa	(Pers.: Fr.) Rea	Buchen-Aderzähling
4	Stereum	subtomentosum	Pouzar	Samtiger Schichtpilz
4	Trichaptum	abietinum	(Fr.) Ryv.	Tannentramete
6	Calocera	viscosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Klebriger Hörnling
6	Pseudohydnellum	gelatinosum	(Scop.: Fr.) Karst.	Zitterzahn
7	Octospora	humosa	(Fr.: Fr.) Dennis	Gemeiner Moosbecherling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen.
Gelegentlich sind auch Mikroaufnahmen eingeflochten.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.



PILZE DER WOCHE 49

Crepidotus variabilis *Gemeines Stummelfüsschen*

Standort:	Auf totem Holz von Laubbäumen, Kräuterstengeln.
Fruchtkörper:	Hut bis 30 mm.
Mikromerkmale:	Sporen 6 x 3 µm, fein warzig, zylindrisch, Sporenpulver graubraun. Basidien 4-sporig. Cheilozystiden verschieden gestaltet. HDS mit Schnallen.
Bemerkungen:	Sichere Merkmale zur Betsimmung dieser Art sind die Sporen und die Cheilozystiden.



Crepidotus variabilis, Cheilozystiden

Crepidotus variabilis *Gemeines Stummelfüsschen*

Pilze der Woche 49

2	Clitocybe	ditopus	(Fr.) Gill.	Mehltrichterling
2	Cortinarius	malicorius	Fr.	Orangerandiger Hautkopf
2	Crepidotus	variabilis	(Pers.: Fr.) Kummer	Gemeines Stummelfüsschen
2	Cystoderma	amiantinum	(Scop.: Fr.) Fayod	Amiant-Körnchenschirmling
2	Flammulina	velutipes	(Curtis.:Fr.) Singer	Samtfussrübling
2	Gymnopus	butyracea	(Bull.: Fr.) P. Kumm.	Butterrübling
2	Hypholoma	capnoides	(Fr.:Fr.) P. Kumm.	Rauchblättriger Schwefelkopf
2	Lentinus	adhaerens	(Alb. et Schw.: Fr.) Fr.	Harziger Sägeblättling
2	Lyophyllum	anthracophilum	(Lasch.)	Brandstellengraublatt
2	Mycena	inclinata	(Fr.) Quél.	Buntstieliger Helmling
2	Mycena	metata	(Fr.: Fr.) Kumm.	Kegeliger Helmling
2	Mycena	rosella	(Fr.: Fr.) Kumm.	Rosa-Helmling
2	Sarcomixa	serotina	(Schrad.: Fr.) Karst.	Gelbstieliger Muschelseitling
2	Tricholoma	terreum	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Erd-Ritterling
4	Cylindrobasidium	evolvens	(Fr.: Fr.) Jül.	Ablösender Rindenpilz
4	Hymenochaeta	cruenta	(Pers.: Fr.) Donk	Blutroter Borstenscheibling
4	Polyporus	brumalis	Pers.: Fr.	Winterporling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

1	Boletus	aereus	Bull.: Fr.	Schwarzhütiger Steinpilz
1	Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
1	Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1	Boletus	luridus	Schäff.: Fr.	Netzstieliger Hexenröhrling
1	Boletus	pulverlulentus	Opat.	Schwarzblauender Röhrling
1	Boletus	radicans	Pers.: Fr.	Bitter-Röhrling
1	Boletus	aestivalis	(Paul.) Fr.	Sommersteinpilz
1	Chalciporus	piperatus	(Bull.: Fr.) Bat.	Pfeffer-Röhrling
1	Chroogomphus	rutilus	(Schäff.: Fr.) Millller	Kupferroter Gelbfuss
1	Gyroporus	castaneus	(Bull.: Fr.)	Hasen-Röhrling
1	Leccinum	carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuss
1	Leccinum	quercinum	Pilát ex Pilát	Eichen-Rotkappe
1	Paxillus	filamentosus	Fr.	Erlen-Krempling
1	Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
1	Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
1	Porphyrellus	porphyrosporus	Fr.) Gilbert	Düsterer Röhrling
1	Strobilomyces	strobilaceus	(Scop.: Fr.) Berk.	Strubelkopfröhrling
1	Suillus	bovinus	(L.: Fr.) Rouss.	Kuhröhrling
1	Suillus	granulatus	(L.: Fr.) Rouss.	Körnchenröhrling
1	Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
1	Tapinella	panuoides	(Fr.: Fr.) Gilbert	Muschel-Krempling
1	Tylopilus	felleus	(Bull.: Fr.) Karst.	Gallenröhrling
1	Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
1	Xerocomus	communis	(Bulliard) Bon	Eichen-Filzröhrling
1	Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe
2	Agaricus	bitorquis	(Quélet) Sacc.	Trottoir-Champignon
2	Agaricus	essettei	Bon	Schiefknolliger Anis-Champignon
2	Agaricus	macrosporus	(Møl. & Schäff.) Pilát	Grosssporiger Anischampignion
2	Agaricus	semotus	Fr.	Weinrötlicher Zwerg-Champignon
2	Agaricus	silvaticus	Schäff.: Fr.	Echter Wald-Champignon
2	Agaricus	silvicola	(Vittad.) Sacc.	Dünnfleischiger Anis-Egerling
2	Agaricus	xanthoderma	Genev.	Karbol-Egerling
2	Agarigus	exellens	(Moll.) Moll.	Schneeweisser Riesen-Egerling
2	Agrocybe	dura	(Bolt.) Sing.	Rasiger Ackerling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



2	Agrocybe	erebia	(Fr.) Kühn.	Leberbrauner Ackerling
2	Agrocybe	firma	(Peck) Kühn.	samtiger Ackerling
2	Agrocybe	praecox	(Pers: Fr.) Fayod.	Voreilender Ackerling
2	Agrocybe	semiorbicularis	(Bull.: St. Am.) Fay.	Halbkugeliger Ackerling
2	Amanita	ceciliae	Berkeley et Broome) Bas	Riesen-Streifling
2	Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
2	Amanita	citrina var. alba	(Schäff.) Pers.	Weisser Gilbwulstling
2	Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
2	Amanita	fulva	(Schäffer) Fr.	Rotbrauner Scheidenstreifling
2	Amanita	junquillea	Quélet	Narzissengelber Wulstling
2	Amanita	mairei	Foley	Silbergrauer Scheidenstreifling
2	Amanita	muscaria	(L.) Hook.	Fliegenpilz
2	Amanita	pantherina	(DC.: Fr.) Krombh.	Pantherpilz
2	Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
2	Amanita	phalloides var. alba	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz w. Form
2	Amanita	porphyria	Alb. & Schw.: Fr.	Porphyrbrauner Wulstling
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Amanita	solitaria	(Vittadini) Quélet	Meergrüner Wulstling
2	Amanita	submembranacea	(Bon) Gröger	Grauhäutiger Scheidenstreifling
2	Amanita	umbrinolutea	Secr.: Gill.) Bat.)	Verfärbender Scheidenstreifling
2	Amanita	vaginata	(Bull.) Vitt.	Grauer Scheidenstreifling
2	Amanita	fulva	(Schäff.) Seyot	Rotbrauner Scheidenstreifling
2	Armillaria	mellea	(Val.: Fr.) Kummer	Honiggelber Hallimasch
2	Armillaria	ostoyae	Romagn.	Dunkler Hallimasch
2	Baeospora	myosurus	(Fr.:) Sing.	Mäuseschwanz Amyloidsporrübling
2	Bolbitius	vitellinus	(Pers.: Fr.) Fr.	Gold-Mistpilz
2	Calocera	viscosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Klebriger Hörnling
2	Calocybe	cambosa	(Fr.) Donk	Mairitterling
2	Calocybe	chrysenteron	(Bull.: Fr.) Sing.: Bon	Dottergelber Schönkopf
2	Chamaemyces	fracidus	(Fr.) Donk	Fleckender Schmierschirmling
2	Clitocybe	cerussata	(Fries) P. Kummer	Ähnlich Waldfreund Trichterling
2	Clitocybe	costata	Kühn. & Romagn.	Kerbrandiger Trichterling
2	Clitocybe	ditopus	(Fr.) Gill.	Mehltrichterling
2	Clitocybe	fragrans	(With.) Kumm.	Dufttrichterling
2	Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
2	Clitocybe	gibba	(Pers.) Kumm.	Ockerbrauner Trichterling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

2	Clitocybe	glareosa	Röllin et Monthoux	Kiesliebender Trichterling
2	Clitocybe	metachroa	(Fr.) Kumm.	Staubfüssiger Trichterling
2	Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
2	Clitocybe	phaeophthalma	(Pers.) Kp.	Ranziger Trichterling
2	Clitocybe	senilis	(Fr.) Singer	Greisen-Trichterling
2	Clitocybula	lacerata	(Scropoli) Métrod	Fransiger Faserrübling
2	Clitopilus	prunulus	(Scop.: Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Clitopilus	scyphoides	(Fr.) Sing.	Kreidiger Mehlräsling
2	Conocybe	lactea	(Lge.) Métr.	Milchweisses Samthäubchen
2	Coprinus	acuminatus	(Romagnesi) Orton	Schmalsporiger Faltentintling
2	Coprinus	bisporus	Lge.	Zweisporiger Tintling
2	Coprinus	comatus	(Müll.: Fr.) Pers.	Schopf-Tintling
2	Coprinus	domesticus	(Bolt.y: Fr.) Gra	Haus-Tintling
2	Cortinarius	acutus	(Pers.: Fr.) Fr.	Spitzgebuckelter Wasserkopf
2	Cortinarius	alboviolacea	(Pers.: Fr.) Fr.	Weissvioletter Dickfuss
2	Cortinarius	anserinus	(Vel.) Hry.	Buchen-Klumpfuss
2	Cortinarius	balteaus	Fr.	Violettrandiger Schleimkopf
2	Cortinarius	bolaris	(Pers.: Fr.) Fr.	Rotschuppiger Rauhkopf
2	Cortinarius	brunneus	(Pers.: Fr.) Fr.	Dunkelbrauner Gürtelfuss
2	Cortinarius	bulbosus	(Sow.: Fr.) Fr.	Knolliger Gürtelfuss
2	Cortinarius	bulliardii	(Pers.: Fr.) Fr.	Feuerfüssiger Gürtelfuss
2	Cortinarius	caerulescens	(Schäff.) Fr.	Blauer Klumpfuss
2	Cortinarius	callisteus	(Fr.: Fr.) Fr.	Rhabarberfüssiger Raukopf
2	Cortinarius	calochrous	Fr.	Amethystblättriger Klumpfuss
2	Cortinarius	camphoratus	(Fr.) Fr.	Bocks-Dickfuss
2	Cortinarius	cinnabarinus	Fr.	Zinnoberroter Wasserkopf
2	Cortinarius	cinnamomeus	Fr.	Zimt-Hautkopf
2	Cortinarius	cotoneus	Fr.	Olivbrauner Rauhkopf
2	Cortinarius	crassus	(Fr.)	Trockener Schleimkopf
2	Cortinarius	croceifolius	(M.M. Moser) M.M. Moser	
2	Cortinarius	croceus	(Schäff.) Gray	Gelbblättriger Hautkopf
2	Cortinarius	decipiens	(Pers.: Fr.) Fr.	Dunkelgebuckelter Wasserkopf
2	Cortinarius	delibutus	Fr.	Violettblättriger Schleimfuss
2	Cortinarius	dionysae	Hry.	Mehligriechender Klumpfuss
2	Cortinarius	elegantior	(Fr.) Fr.	Strohgelber Klumpfuss
2	Cortinarius	elegantissimus	Hry.	Prächtiger Klumpfuss

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

2	Cortinarius	evernius	(Fr.: Fr.) Fr. ss. Mos.	Rettich-Gürtelfuss
2	Cortinarius	fasciatus	Fr. ss. Arn.	Rötlichgeschmückter Wasserkopf
2	Cortinarius	flexipes	(Pers.: Fr.) Fr.	Duftender Gürtelfuss
2	Cortinarius	flexipes var. inolens	Lindstr.	Varietät von C. flexipes (o. Geruch)
2	Cortinarius	fraudulosus	Britz.	Trügerischer Schleimkopf
2	Cortinarius	glandicolor	(Fr.:) Fr.	Spitzhütiger Gürtelfuss
2	Cortinarius	glaucescens	J. Schäffer	Grünstieliger Klumpfuss
2	Cortinarius	glaucopus	(Schäff.: Fr.)	Reihiger Klumpfuss
2	Cortinarius	guttatus	Hry.	Getropfter Klumpfuss
2	Cortinarius	hinnuleus	(Sow.) Fr.	Erdigriechender Gürtelfuss
2	Cortinarius	infractus	(Pers.: Fr.) Fr.	Bitterer Schleimfuss
2	Cortinarius	isabellinus	(Batsch: Fr.) Fr.	Olivgelber Rauhkopf
2	Cortinarius	malicorius	Fr.	Orangerandiger Hautkopf
2	Cortinarius	nanceiensis	Mr.	Gelbflockiger Schleimkopf
2	Cortinarius	nemorensis	(Fr.) Lge.	Verfärbender Schleimkopf
2	Cortinarius	ochroleucus	(Schäfer: Fr.) Fr.	Trockener Schleimfuss
2	Cortinarius	odorifer	Britz	Anis-Klumpfuss
2	Cortinarius	olidus	Lge.	Gelbgegürtelter Schleimkopf
2	Cortinarius	percomis	Fr.	Würziger Schleimkopf
2	Cortinarius	pilatii	Svrcek	Flocken-Gürtelfuss
2	Cortinarius	praestans	(Cord.) Gill.	Schleiereule
2	Cortinarius	renidens	Fr.	Quitten-Wasserkopf
2	Cortinarius	rubicundulus	(Rea) Pears.	Rötlichfaseriger Rauhkopf
2	Cortinarius	sanguineus	(Wulf.: Fr.) Gray	Blutroter Hautkopf
2	Cortinarius	saturninus	Fr.	Blaufleischiger Gürtelfuss
2	Cortinarius	semisanguineus	(Fr.)	Blutblättriger Hautkopf
2	Cortinarius	sommerfeltii	Høiland	Orangeblättriger Hautkopf
2	Cortinarius	spadiceus	Fr.	Brauner Schleimkopf
2	Cortinarius	splendens	Hry.	Schöngelber Klumpfuss
2	Cortinarius	torvus	(Bull.: Fr.) Fr.	Wohlriechender Gürtelfuss
2	Cortinarius	triumphans	(Fr.) Fr.	Gelbgestiefelter Schleimkopf
2	Cortinarius	turmalis	Fr.	Rasiger Schleimkopf
2	Cortinarius	uraceus	Fr.	Olivbrauner Wasserkopf
2	Cortinarius	variecolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf
2	Cortinarius	variegatus	Bresadola	Variabler Schleimkopf
2	Cortinarius	varius	Fr.	Ziegelgelber Schleimkopf

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

2	Cortinarius	venetus	(Fr.). Fr.	Grüner Buchenwald-Rauhkopf
2	Cortinarius	vernus	Lind. & Melot	Frühlings-Wasserkopf
2	Cortinarius	vulpinus	(Vel.) Hry.	Gilbender Fuchs-Seidenkopf
2	Cortinarus	argutus	Fr.	Spitzbasiger Schleimkopf
2	Crepidotus	mollis	(Schäff.L Fr.) Staude	Gallertfleischiges Stummelfüsschen
2	Crepidotus	variabilis	(Pers.: Fr.) Kummer	Gemeines Stummelfüsschen
2	Cystoderma	amiantinum	(Scop.: Fr.) Fayod	Amiant-Körnchenschirmling
2	Cystolepiota	seminuda	(Lasch) Bon	Behangener Mehlschirmling
2	Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
2	Echinoderma	perplexum	(Knuds.) Bon	Ringloser Stachelschirmling
2	Entoloma	cetratum	(Fr.: Fr.) Moser	Ockerblättriger Rötlin
2	Entoloma	conferendum	(Britz.) Noord.	Kreuzsporiger Rötling
2	Entoloma	euchroum	(Pers.: Fr.) Donk.	Violetter Rötling
2	Entoloma	flocculosum	(Bres.) Pac.	Flockiger Zwerg-Rötling
2	Entoloma	inusiastum	Noord.: Enderle & Lammers	Blotzheimer Rötling
2	Entoloma	phaeocyathus	Noordeloos	Becher-Nabeling
2	Entoloma	pseudoturbidum	(Rom.) Mos.	Sepiabrauner Rötling
2	Entoloma	rhodopolium	(Fr.: Fr.) Kummer	Niedergedrückter Rötling
2	Flammulina	velutipes	(Curtis.:Fr.) Singer	Samtfussrübling
2	Galerina	sideroides	(Fr.)Kühn.	Glimmerstieliger Häubling
2	Galerina	sideroides	(Fr.)Kühn.	Glimmerstieliger Häubling
2	Galerina	stylifera	(Atk.) Sm. & Sing.	Behangener Häubling
2	Galerina	vittiformis	(Fr.) Moser	Variabler Moos-Häubling
2	Gymnopilus	josserandii	Antonin	Kugelsporiger Flämmling
2	Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
2	Gymnopus	butyracea	(Bull.: Fr.) P. Kumm.	Butterrübling
2	Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
2	Gymnopus	dryophylla	(Bull.: Fr.) Kumm.	Waldfreund-Rübling
2	Gymnopus	erytropus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Rotstieliger Rübling
2	Gymnopus	fusipes	(Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling
2	Gymnopus	impudicus	(Fr.) Antonin Halling et Noordel.	Unverschämter Blasssporrübling
2	Gymnopus	luxurians	(Peck) Murrill	Üppiger Blasssporrübling
2	Gymnopus	maculata	(Alb. et Schw. Fr.)	Gefleckter Rübling
2	Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
2	Hebeloma	crustuliniforme	(Bull.: Fr.) Quél.	Tongrauer Fälbling
2	Hebeloma	pallidoluctuosum	Gröger et Zschieschang	Schwärzender Fälbling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

2	Hebeloma	radicosum	(Bull.: Fr.) Rick.	Wurzelnder Fälbling
2	Hebeloma	senescens	(Batsch) Berk.	Bräunender Fälbling
2	Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
2	Hebeloma	syrjense	Karsten	Seifen-Fälbling
2	Hebeloma	tomentosum	(Mos.) Grög. & Zsch.	Filziger Fälbling
2	Hemymycena	cucullata	(Pers.: Fr.) Sing.	Gipsweisser Scheinhelmling
2	Hohenbuhelia	cyphelliformis	(Berk.) Mill.	Schälchenförmiger Muscheling
2	Hohenbuhelia	myxotricha	Lév.) Sing.	Behaarter Muscheling
2	Hydropus	atramentosus	(Kbr.) Kotl. & Pouz.	Schwärzender Wasserfuss
2	Hydropus	marginellus	(Pers.: Fr.) Sing.	Braunschneidiger Wasserfuss
2	Hygrocybe	conica	(Scopp.: Fr.) Kumm.	Kegeliger Saftling
2	Hygrocybe	psittacina	(Schäff.: Fr.) Wünsche	Papageigrüner Saftling
2	Hygrophorus	agathosmus	(Fr.) Fr.	Wohlriechender Schneckling
2	Hygrophorus	chrysodon	(Batsch.: Fr.) Fr	Goldzahn-Schneckling
2	Hygrophorus	discoideus	(Pers.: Fr.) Fr.	Braunscheibiger Schneckling
2	Hygrophorus	eburneus	(Bull.: Fr.) Fr.	Elfenbein-Schneckling
2	Hygrophorus	mesotephrus	Berk. & Br.	Olivgrauer Schneckling
2	Hygrophorus	penarius	Fr.	Trockener Schneckling
2	Hygrophorus	picea	Kühn.	Fichten-Schneckling
2	Hygrophorus	poetarum	Heim	Isabell-Schneckling
2	Hygrophorus	pudorinus	(Fr.) Fr.	Orange-Schneckling
2	Hygrophorus	pustulatus	(Fr.) Fr.	Schwarzpunktierter Schneckling
2	Hygrophorus	russula	(Schäff.: Fr.) Quél.	Geflecktblättriger Purpurschneckling
2	Hygrophorus	unicolor	Grög.	Orangefalber Schneckling
2	Hypholoma	capnoides	(Fr.: Fr.) Kummer	Rauchblättriger Schwefelkopf
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Hypholoma	lateritium	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf
2	Inocybe	amethystina	Kuyp.	Violettlicher Risspilz
2	Inocybe	assimilata	(Britz.) Sacc.	Rundknolliger Risspilz
2	Inocybe	calamistrata	(Fr.:Fr.) Gill.	Blaufüssiger Risspilz
2	Inocybe	cervicolor	(Pers.) Quél.	Hirschbrauner Risspilz
2	Inocybe	cookei	Bres.	Knolliger Risspilz
2	Inocybe	corydalina	Quél.	Grünbuckliger Risspilz
2	Inocybe	corydalina var.erinaceomorpha	Quél.	Grünbuckliger Risspilz
2	Inocybe	dunensis	P.D. Ort.	Dünen-Risspilz
2	Inocybe	erubescens	Blytt	Ziegelroter Risspilz

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

2	Inocybe	flocculosa	(Berk.) Sacc.	Flockiger Risspilz
2	Inocybe	fraudans	(Britz.) Sacc.	Birnen-Risspilz
2	Inocybe	fuscidula	Vel.	Braunstreifiger Risspilz
2	Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
2	Inocybe	geophylla var. lilacina	(Peck.) Gill.	Lilastieliger Risspilz
2	Inocybe	godeyi	Gill.	Rötender Risspilz
2	Inocybe	hirtelloides	Stangl. & Ves.	Ocker-Risspilz
2	Inocybe	maculata	Boud.	Gefleckter Risspilz
2	Inocybe	napipes	Lge.	Rübenstieliger Risspilz
2	Inocybe	nitiduscula	(Britz.) Sacc.	Früher Risspilz
2	Inocybe	petiginosa	(Fr.: Fr.) Gillet	Graugezonter Zwergrisspilz
2	Inocybe	phaeocomis	(Pers.) Kuyp.	Braunschopfiger Risspilz
2	Inocybe	praetervisa	Quél.	Zapfensporiger Risspilz
2	Inocybe	pusio	Karst.	Radialrissiger Risspilz
2	Inocybe	rimosa	(Bull.: Fr:) Kummer	Kegeliger Risspilz
2	Inocybe	sindonia	(Fr.) Karst.	Wolligfädiger Risspilz
2	Inocybe	soluta	Vel.	Kurzsporiger Risspilz
2	Inocybe	subcarpta	Kühner et Boursier	Trapezsporiger Risspilz
2	Inocybe	bongardii	(Weinm.) Quél.	Duftender Risspilz
2	Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2	Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
2	Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
2	Lacrymaria	lacrymabunda	(Bull.: Fr.) Pat.	Tränender Samumpilz
2	Lentinellus	cochleatus	(Pers.: Fr.) Karst.	Äniszähling
2	Lentinus	adhaerens	(Alb. et Schw.: Fr.) Fr.	Harziger Sägeblättling
2	Lepiota	castanea	Quél. (inkl. L. ignipes Locq. ex B.	Kastanienbrauner Schirmling
2	Lepiota	clypeolaria	(Bull.: Fr.) Kumm.	Wolliggestiefelter Schirmling
2	Lepiota	cristata	(Bolton.: Fr.) Kummer	Stink-Schirmling
2	Lepiota	cristata var. pallidior	Boud. ex Bon	Stink-Schirmling var.
2	Lepiota	lilacea	Bres.	Lila-Schirmling
2	Lepiota	sublaevigatua	Bon et Boiffard	Feinschuppiger Schirmling
2	Lepista	densifolia	(Favre) Sing.	Dichtblättriger Rötelritterling
2	Lepista	glaucocana	(Bres.) Sing.	Blassblauer Rötelritterling
2	Lepista	inversa	(Scop.: Fr.) Pat.	Fuchsiger Rötelritterling
2	Lepista	irina	(Fr.) Big.	Veilchen-Rötelritterling
2	Lepista	nuda	(Bull.: Fr.) Cooke	Violetter Rötelritterling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

2	Lepista	splendens	(Pers.: Fr.) Konrad	Dichtblättriger Rötelritterling
2	Leucoagaricus	leucothites	(Vitt.) Was.	Rosablättriger Egerlingsschirmling
2	Lyophyllum	anthracophilum	(Lasch.)	Brandstellengraublatt
2	Lyophyllum	atratum	(Fr.:Fr.) Singer	Traniges Graublatt
2	Lyophyllum	connatum	(Schum.: Fr.) Sing.	Weisser Büschelrasling
2	Lyophyllum	fumosum	(Pers.: Fr.) Ort.	Hellbrauner Büschelrasling
2	Lyophyllum	infumatum	(Bres.) Kühn.	Rautensporiger Schwärzling
2	Lyophyllum	loricatum	(Fr.) Kühn.	Gepanzerter Rasling
2	Lyophyllum	rancidum	(Fr.: Fr.) Sing.	Wurzel-Graublatt
2	Macrolepiota	bohemica	(Wich.) Krgl. & Páz.	Garten-Riesenschirmling
2	Macrolepiota	mastoidea	(Fr.) Sing.	Zitzenschirmling
2	Macrolepiota	procera	(Scop.: Fr. Sg.	Parasol
2	Macrolepiota	rhacodes	(Vittad.) Singer	Safranschirmling
2	Marasmiellus	candidus	(Bolt.: Fr.) Sing.	Schneeweisser Zwergschwindling
2	Marasmiellus	ramealis	(Bull.: Fr.) Sing.	Ästchenschwindlng
2	Marasmiellus	vaillantii	(Pers.: Fr.) Sing.	Matter Zwergschwindling
2	Marasmius	alliaceus	(Jacq.: Fr.) Fr.	Langstieliger Knoblauchschwindling
2	Marasmius	cohaerens	(Pers.: Fr.) Fr.	Hornstieliger Schwindling
2	Marasmius	curreyi	Berk & Br.	Orangerötlicher Schwindling
2	Marasmius	oreades	(Bolton.: Fr.) Fr.	Nelkenschwindling
2	Marasmius	rotula	(Scop.: Fr.) Fr.	Halsbandschwindling
2	Marasmius	scordonius	(Fr.: Fr.) Fr.	Küchen-Schwindling
2	Marasmius	torquescens	Quél.	Ledergelber Schwindling
2	Marasmius	wynnei	Berk. & Br.	Violetlicher Schwindling
2	Marasmius	androsaceus	(L.: Fr.) Fr.	Rosshaarschwindling
2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.)Kotl. et Pouz.	Breitblattrübling
2	Melanoleuca	cognata	(Fr.) Konr. et Maubl.	Frühlings-Weichritterling
2	Melanoleuca	grammopus	(Bulliard: Fr.) Patouillard	Rillstieliger Weichritterling
2	Melanoleuca	melaleuca	(Pers.: Fr.) Murr.	Gemeiner Weichritterling
2	Micromphale	perforans	(Hoffm.: Fr.) Gray	Nadelschwindling
2	Mycena	abramsii	(Murr.) Murr.	Voreilender Helmling
2	Mycena	amicta	(Fr.: Fr.) Quélet	Geschmückter Helmling
2	Mycena	crocata	(Schrad.: Fr.) Kumm.	Safranmilchender Helmling
2	Mycena	epipterygia	(Scop.: Fr.) Gray	Dehnbarer Helmling
2	Mycena	filopes	(Bull.:Fr.) Kumm.	Zerbrechlicher Fadenhelmling
2	Mycena	flavoalba	(Fr.) Quél.	Zitronengelber Helmling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

2	Mycena	galericulata	(Scop.:Fr.) Gray	Rosablättriger Helmling
2	Mycena	inclinata	(Fr.) Quél.	Buntstieliger Helmling
2	Mycena	maculata	Karst.	Gefleckter Helmling
2	Mycena	metata	(Fr.: Fr.) Kumm.	Kegeliger Helmling
2	Mycena	pelianthina	(Fr.: Fr.) Quél.	Schwarzgezähnelter Helmling
2	Mycena	polygramma	(Bull.: Fr.) Gray	Rillstieliger Helmling
2	Mycena	pura	(Pers.: Fr.) Kumm.	Rettich-Helmling
2	Mycena	renati	Quélet	Gelbstieliger Nitrat-Helmling
2	Mycena	rosea	(Bull.) Gramberg	Rosa-Rettichhelmling
2	Mycena	rosella	(Fr.: Fr.) Kumm.	Rosa-Helmling
2	Mycena	rubromarginata	(Fr.: Fr.) Kumm.	Rotschneidiger Helmling
2	Mycena	sanguinolenta	(Alb.-Schw.: Fr.) Kumm.	Purpurschneidiger Helmling
2	Mycena	stipata	Maas Geester.& Schw.	Büscheliger Nitrat-Helmling
2	Mycena	viridimarginata	Karst.	Grünschneidiger Helmling
2	Mycena	zephirus	(Fr.: Fr.) Kumm.	Rostfleckiger Helmling
2	Myxomphalia	maura	(Fr.: Fr.) Hora	Kohlennabeling
2	Naucoria	amerescens	(Quel.) Rom.	Bitterer Erlenschnitzling
2	Naucoria	melinoides	(Bull.: Fr.) Kühn.	Honiggelber Sumpfschnitzling
2	Omphalina	acerosa	(Fr.) Lange	Muschelnabeling
2	Oudemansiella	mucida	(Schrad. ex Fr.) v.H.	Beringter Schleimrübling
2	Panaeolus	caliginosus	Jungh.	Dunkler Düngerling
2	Panaeolus	foeniseccii	(Per.: Fr.) Schr.	Heudüngerling
2	Panellus	mitis	(Pers.: Fr.) Sing.	Milder Muschelseitling
2	Panellus	stypticus	(Bull.: Fr.) P.Karst.	Bitterer Muschelseitling
2	Phaeocollybia	lugubris	(Fr.) Heim	Gemeiner Wurzelschnitzling
2	Pholiota	astragalina	(Fr.) Singer	Safranroter Schüppling
2	Pholiota	flammans	(Fr.:) Kummer	Feuerschüppling
2	Pholiota	highlandensis	(Peck) Hes & Sm.	Kohlenschüppling
2	Pholiota	tuberculosa	(Schäff.: Fr.)	Rötender Schüppling
2	Pholiota	lubrica	(Pers.: Fr.) Singer	Weissflockiger Schüppling
2	Pholiotina	vestita	(Fr. in Quél.) Sing.	Bekleideter Glockenschüppling
2	Phytoconis	ericetorum	(Pers.: Fries) Redhead et Kuyper	Gefalteter Flechtennabeling
2	Pleurotus	drynus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Berindeter Seitling
2	Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
2	Pluteus	chrysophaeus	(Schäff.: Fr.) Quél.	Gelbbrauner Dachpilz
2	Pluteus	diettrichii	Bresadola	Rissiger Dachpilz

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

2	Pluteus	exiguus	(Pat.) Sacc.	Kleinster Dachpilz
2	Pluteus	leonius	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Löwengelber Dachpilz
2	Pluteus	nanus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Zwerg-Dachpilz
2	Pluteus	roseipes	v. Höhn.	Sosastieliger Dachpilz
2	Pluteus	salicinus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Grauer Dachpilz
2	Psathyrella	bipellis	(Quélet) Smith	Purpur-Mürbling
2	Psathyrella	candolleana	(Fr.: Fr.) Maire	Behangener Faserling
2	Psathyrella	conopilus	(Fr.: Fr.) Pears. & Dennis	Huthaarfaserling
2	Psathyrella	gossypina	(Bulliard: Fr.) Pearson et Dennis	Baumwoll-Faserling
2	Psathyrella	microrrhiza	(Lasch.: Fr.)	Wurzelnder Faserling
2	Psathyrella	piluliformis	(Bull.: Fr.) Ort.	Wässeriger Faserling
2	Psathyrella	pygmea	(Bull.: Fr.) Sing.	Zwerg.Faserling
2	Psathyrella	sacchariolens	Enderle	Süssriechender Faserling
2	Psathyrella	spadicea	(Schäff.) Sing.	Schockoladenbrauner Faserling
2	Pseudoclitocybe	cyathiformis	(Bull.) Sing.	Kaffebrauner Gabeltrichterling
2	Rhodocybe	nitellina	(Fr.) Sing.	Gelbfuchsiger Tellerling
2	Rickenella	fibula	(Bull.: Fr.) Raith.	Orangegelber Heftelnabeling
2	Ripartites	tricholoma	(Alb. & v. Schw.)	Bewimperter Filzkrempling
2	Rozites	caperatus	(Pers.: Fr.) P. Karst.	Zigeunerpilz
2	Sarcomixa	serotina	(Schrad.: Fr.) Karst.	Gelbstieliger Muschelseitling
2	Schizophyllum	commune	Fr.: Fr.	Gemeiner Spaltblättling
2	Simocybe	centunculus	(Fr.: Fr.) Karst.	Kleinsporiger Olivschnitzling
2	Simocybe	sumtuosa	(Ort.) Sing.	Üppiger Olivschnitzling
2	Strobilurus	esculentus	(Wulf.: Fr) Sg.	Fichtenzapfenrübling
2	Strobilurus	tenacellus	(Pers.:Fr.) Sing.	Bitterer Nagelschwamm
2	Stropharia	aeruginosa	(Curtis:) Fr./Quél.	Grünspansträuschling
2	Stropharia	caerulea	Kreisel	Blauer Träuschling
2	Stropharia	coronilla	(Bull.: Fr.) Quél.	Krönchenträuschling
2	Stropharia	rugosoannulata	Farl. ex Murr.	Rotbrauner Riesenträuschling
2	Stropharia	semiglobata	(Batsch.: Fr.) Quél.	Halbkugeliger Träuschling
2	Tricholoma	atrosquamosum	(Chev.) Sacc.	Schwarzschuppiger Ritterling
2	Tricholoma	bufonium	(Pers.: Fr.) Kumm.	Purpurbrauner Schwefel-Ritterling
2	Tricholoma	columbetta	(Fr.) Kumm.	Seidiger Ritterling
2	Tricholoma	equestre	(L.: Fr.) Kumm.	Grünling
2	Tricholoma	fracticum	(Britz.) Kreis.	Fastberingter Ritterling
2	Tricholoma	inamoenum	(Fr.) Quél.	Lästiger Ritterling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

2	Tricholoma	lascivum	(Fr.) Gill. ss. Lge.	Unverschämter Ritterling
2	Tricholoma	luridum	(Schäff.: Fr.) Quél.	Graublättriger Ritterling
2	Tricholoma	orirubens	Quél.	Rötender Ritterling
2	Tricholoma	pseudonicticans	Bon	Blassfleischiger Fichtenritterling
2	Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
2	Tricholoma	scalpturatum	(Fr.) Quél.	Gilbender Erd-Ritterlig
2	Tricholoma	sciodes	(Secr.) Martin	Schärflicher Ritterling
2	Tricholoma	sejunctum	(Sow.: Fr.) Quél.	Grüngelber Ritterling
2	Tricholoma	sulphureum	(Bull.: Fr.) Kumm.	Schwefel-Ritterling
2	Tricholoma	terreum	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Erd-Ritterling
2	Tricholoma	ustale	(Fr.: Fr.) Kumm.	Brandiger Ritterling
2	Tricholoma	vaccinum	(Pers.: Fr.) Kumm.	Zottiger Ritterling
2	Tricholoma	virgatum	(Fr.: Fr.) Kumm.	Brennender Ritterling
2	Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
2	Tricholomopsis	decora	(Fr.) Sing.	Olivgelber Holzritterling
2	Tubaria	hiemalis	Romagn. ex Bon	Winter-Trompetenschnitzling
2	Volvariella	caesiotincta	Orton	Blaugrauer Scheidling
2	Volvariella	murinella	(Quél.) Mos.	Mausgrauer Scheidling
2	Volvariella	pusilla	(Pers.: Fr.) Sing.	Kleinster Scheidling
2	Xeromphalina	fellea	Mre. & Mal.	Bitterer Glöckchennabeling
2	Xerula	melanotricha	Dörfelt	Weisstannen-Wurzelrübling
2	Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3	Lactarius	acris	(Bolt.: Fr.) Gray	Rosaanlaufender Milchling
3	Lactarius	albocarneus	Britz.	Klebriger Milchling
3	Lactarius	azonites	(Bull.) Fr.	Rauchfarbener Rosamilchling
3	Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
3	Lactarius	camphoratus	(Bull.: Fr.) Fr.	Kamfermilchling
3	Lactarius	circellatus	Fr.	Gebänderter Hainbuchenmilchling
3	Lactarius	cremor	Fr.	Runzliger Zwergmilchling
3	Lactarius	deliciosus	(L.): Fr.) Gray	Edelreizker
3	Lactarius	deterrimus	Gröger	Fichtenreizker
3	Lactarius	flavidus	Boud.	Hellgelber Violettmilchling
3	Lactarius	fluens	Boud.	Braunfleckender Milchling
3	Lactarius	fulvissimus	Rom. i. Kühn. & Rom.	Orangefuchsiger Milchling
3	Lactarius	glaucescens	Crossl.	Grünender Pfeffermilchling
3	Lactarius	helvus	(Fr.: Fr.) Fr.	Maggipilz

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

3	Lactarius	intermedius	(Krombh.) Cke.	Grubiger Weisstannenmilchling
3	Lactarius	luridus	(Pers.: Fr.) Gray	Gewöhnlicher Violettmilchling
3	Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
3	Lactarius	picinus	Fr.	Pechschwarzer Milchling
3	Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
3	Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
3	Lactarius	pubescens	(Schrad.) Fries	Flaumiger Milchling
3	Lactarius	pyrogalus	(Bull.: Fr.) Fr.	Scharfer Hasel-Milchling
3	Lactarius	quietus	(Fr.) Fr.	Eichenmilchling
3	Lactarius	rubrocinctus	Fr.	Rotgegürtelter Runzelmilchling
3	Lactarius	rufus	(Scop.: Fr.) Fr.	Rotbrauner Milchling
3	Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3	Lactarius	scrobiculatus	(Scop.: Fr.) Fr.	Grubiger Fichtenmilchling
3	Lactarius	subdulcis	(Per.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchen-Milchling
3	Lactarius	uvidus	(Fr.) Fr.	Klebrig-schleimiger Violettmilchling
3	Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
3	Lactarius	volemus	(Fr.: Fr.) Fr.	Brätling
3	Lactarius	zonarius	(Bulliard) Fr.	Echter Zonenmilchling
3	Russula	acrifolia	Romagn.	Scharfblättriger Schwärztäubling
3	Russula	albonigra	(Krombh.) Fr.	Mentoltäubling
3	Russula	alutacea	(Pers.: Fr.) ss. restr. Melz. & Zvára	Ledertäubling
3	Russula	amethystina	Quélet	Amethysttäubling
3	Russula	amoenicolor	Rom.	Brätlingstäubling
3	Russula	amoeolens	Romagn.	Brauner Camemberttäubling
3	Russula	anthracina	Romagn.	Lachsblättriger Schwärztäubling
3	Russula	atropurpurea	(Krombh.) Britz.	Pupurschwarzer Täubling
3	Russula	aurea	Pers.	Goldtäubling
3	Russula	badia	Quél.	Zedernholztäublig
3	Russula	brunneoviolacea	Crawsh.	Grauvioletter Samttäubling
3	Russula	carpini	Gir. & Hein.	Hainbuchentäubling
3	Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3	Russula	chloroides	(Krombh.) Bres.	Schmalblättriger Weisstäubling
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
3	Russula	cyanoxantha fo. pelteraui	R. Maire.: Singer	Grüner Frauentäubling
3	Russula	decolorans	(Fr.) Fr.	Orangeroter Graustieltäubling
3	Russula	delica	Fr.	Gemeinder Weisstäubling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

3	Russula	densifolia	Gill.	Dichtblättriger Schwärztäubling
3	Russula	emetica	(Schäff.: Fr.) Gray	Kirschroter Speitäubling
3	Russula	exalbicans	(Pers.) Melz. & Zvara	Verblassender Täubling
3	Russula	faginea	Romagn.	Buchen-Heringstäubling
3	Russula	farinipes	Romell in Britz.	Mehlstieltäubling
3	Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
3	Russula	firmula	Schäffer	Scharfer Glanz-Täubling
3	Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
3	Russula	grisea	Fr.	Grauvioletter Reiftäubling
3	Russula	heterophylla	(Fr.) Fr.	Grüner Speisetäubling
3	Russula	illota	Romagn.	Morsetäubling
3	Russula	integra	(L.:) Fr. ss. Mre.	Braunroter Ledertäubling
3	Russula	laurocerasi	Melzer	Mandeltäubling
3	Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
3	Russula	luteotacta	Rea	Gelbfleckender Täubling
3	Russula	maculata	Quél. in Quél. & Roze	Gefleckter Täubling
3	Russula	mairei	Singer	Buchen-Speitäubling
3	Russula	melliolens	Quél.	Honigtäubling
3	Russula	nauseosa	(Pers.) Fr..	Geriefter Weichtäubling
3	Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3	Russula	olivascens	(Pers.: Fr.) Bres.	Olivgrüner Täubling
3	Russula	paludosa	Britz.	Apfeltäubling
3	Russula	parazurea	Schäffer	Blaugüner Reiftäubling
3	Russula	pseudodelica	Lange (nec J. Schäf.) sec. Blum	Scharfer Weisstäubling
3	Russula	pseudointegra	Arn. & Gor.	Ockerblättriger Zinnobertäubling
3	Russula	puellaris	Fr.	Milder Wachstäubling
3	Russula	queletii	Fr. in Quél.	Stachelbeertäubling
3	Russula	raoultii	Quél.	Blassgeber Täubling
3	Russula	risigallina	(Batsch) Kuyp. & v. Vuu.	Wechselfarbiger Dottertäubling
3	Russula	romellii	Maire	Weissstieliger Ledertäubling
3	Russula	sardonia	Fr.	Zitronenblättriger Täubling
3	Russula	solaris	Ferd. et Winge	Sonnentäubling
3	Russula	spec.		
3	Russula	turci	Bres.	Jodoformtäubling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

3	Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
3	Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
3	Russula	violeipes	Quélet	Violettstieliger Brätlingstäubling
3	Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
3	Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling
3	Russula	xerampelina	Schäff.: Fr.	Roter Heringstäubling
3	Russula	gracillima	J. Schäffer	Zierlicher Birken-Täubling
4	Albatrellus	pes-caprae	(Pers.) Pouz.	Ziegenfussporling
4	Albatrellus	ovinus	(Schäff.: Fr.) Kotl. & Pouz.	Schafporling
4	Aleurodiscus	disciformis	(DC: Fr.) Pat.	Schüsselförmige Mehlscheibe
4	Antrodia	serialis	(Fr.) Donk	Reihige Tramete
4	Antrodiella	hoehnelii	(Bres.: Höhn.) Niemelä	Spitzwarzige Tramete
4	Auriscalpium	vulgare	Gray	Ohrlöffel-Stacheling
4	Bierkandera	adusta	(Willd.: Fr.) Karst.	Angebrannter Rauchporling
4	Bjerkandera	fumosa	(Pers.: Fr.) Karst.	Graugelber Rauchporling
4	Cantharellus	auroa	(Batsch) Kuyp.	Duftender Gabeling, Goldfüsschen
4	Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
4	Cantharellus	cibarius var. amethyst.	Quél.	Lilahütiger Eierschwamm
4	Cantharellus	friesii	Quél.	Fries´scher Pfifferling
4	Cantharellus	melanoxeros	Desm.	Gelbvioletter Pfifferling
4	Cantharellus	tubaeformis	Fr.	Durchbohrter Leistling
4	Clavariadelphus	pistilaris	(Fr.) Donk	Herkuleskeule
4	Clavulina	cinereus	(Bull.: Fr.) Schröt.	Graue Koralle
4	Clavulina	cristata	(Holmskj.: Fr.) Schröt.	Kammförmige Koralle
4	Clavulinopsis	corniculata	(Fr.) Corner	Geweiförmige Wiesenkeule
4	Climacocystis	borealis	(Fr.) Kotl. & Pouz.	Nordischer Porling
4	Coltricia	perennis	(L.: Fr.) Murrill	Brauner Dauerporling
4	Coniochaeta	velutina	(Fuckel) Cooke	
4	Craterellus	cornucopioides	Pers.	Totentrompete
4	Creolophus	cirrhatus	(Pers.: Fr.) Karst.	Dorniger Stachelbart
4	Cylindrobasidium	evolvens	(Fr.: Fr.) Jül.	Ablösender Rindenpilz
4	Cytidiella	melzerii	Pouzar	
4	Daedalea	quercina	(L. ex Fr.)	Eichenwirrling
4	Daedaleopsis	confragosa	(Bolt.: Fr.) Schröt. s. str.	Rötende Tramete
4	Daedaleopsis	tricolor	(Pers.) Bond. & Sing.	Purpurrote Tramete
4	Fometopsis	pinicola	(Fr.) Karst.	Rotbrauner Baumschwamm

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

4	Ganoderma	lucidum	(Curt.: Fr.) Karst.	Glänzender Lackporling
4	Gloeophyllum	abietinum	Fr. ex Fr.	Tannenblättling
4	Gloeophyllum	odoratum	(Wulf.: Fr.) Imyzeki	Fencheltramete
4	Hapalopilus	rutilans	(Pers.: Fr.) Karst.	Zimtfarbener Weichporling
4	Heterobasidion	annosum	(Fr.) Bref.	Wurzelschwamm
4	Hydnellum	concrescens	(Pers.: Schw.) Bank.	Gezonter Korkstacheling
4	Hydnellum	peckii	Banker in Peck	Scharfer Korkstacheling
4	Hydnellum	suaveolens	(Scop. Ex. Fries) Karst	Wohlriechender Korkstacheling
4	Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
4	Hymenochaeta	cruenta	(Pers.: Fr.) Donk	Blutroter Borstenscheibling
4	Hymenochaeta	rubiginosa	(Dicks.: Fr.) Lév.	Rotbrauner Borstenscheibling
4	Inonotus	dryophilus	(Berk.) Murrill	Eichen-Schillerporling
4	Ischnoderma	benzoinum	(Wahl.: Fr.) Karst.	Schwarzgebänderter Harzporling
4	Lenzites	betulina	(L. ex Fr.) Fr.	Birkenblättling
4	Megalozystidium	lactescens	(Berkeley) Jülich	Milchende Gleozystidenrinde
4	Meruliopsis	corium	(Fr.) Ginns	Lederartiger Fältling
4	Oligoporus	caesius	(Schrad.: Fr.) Gilb. & Ryv.	Blauer Saftporling
4	Oligoporus	ptychogaster	(Ludwig) Falck	Bauchpilz-Mehlstaubporling
4	Oligoporus	stipticus	(Pers.: Fr.) Gilb. & Ryv.	Bitterer Saftporling
4	Onnia	tomentosa	(Fr.) Karst.	Gestielter Filzporling
4	Perenniporia	medulla-panis	(Jacq.: Fr.) Donk	Ockerbrauner Dauerporling
4	Phanerochaete	sordida	(Karst.) Eriks. & Ryv.	Cremefarbener Zystidenrindenpilz
4	Phellinus	ferruginosus	(Schrad.: Fr.) Pat.	Rostbrauner Feuerschwamm
4	Phellinus	hartigii	(All. & Schn.) Bond.	Tannen-Feuerschwamm
4	Phellodon	melaleucus	(Sw. apud Fr.: Fr.) Karst.	Schwarzweisser Korkstacheling
4	Phellodon	niger	(Fr. ex Fr.) Karst.	Schwarzer Duftstacheling
4	Phellodon	tomentosus	(L.: Fr.) Banker	Becherförmiger Korkstacheling
4	Phlebia	radiata	Fr.	Orangefarbener Kammpilz
4	Plicaturopsis	crispa	(Pers.: Fr.) Rea	Buchen-Aderzähling
4	Polyporus	badius	(Pers.: Gray) v. Schw.	Kastanienbrauern Porling
4	Polyporus	brumalis	Pers.: Fr.	Winterporling
4	Polyporus	ciliatus	Fr.	Bewimperter Porling
4	Polyporus	squamosus	Huds.: Fr.	Schuppiger Porling
4	Polyporus	tuberaster	(Jacq.: Pers.) Fr.	Sklerotien-Porling
4	Pseudocraterellus	sinuosus	(Fr.: Fr.) Reid.	Krauser Leistling
4	Pycnoporus	cinnabarinus	(Jacq.: Fr.) Karst.	Zinnoberrote Tramete

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

4	Ramaria	flaccida	(Fr.) Bourd.	Flattrige Fichtenkoralle
4	Ramaria	flava	(Schäff.: Fr.) Quél.	Schwefelgebe Koralle
4	Ramaria	formosa	(Pers.: Fr.) Quél.	Dreifarbene Koralle
4	Ramaria	rubella	(Schäff.: Krombh.) Peter.	Rotbraune Koralle
4	Ramaria	stricta	(Pers.: Fr.) Quél. s. str.	Steife Koralle
4	Sarcodon	imbricatus	(L. ex Fr.) Karst.	Habichtspilz
4	Schizophyllum	commune	Fr. ex Fr.	Spaltblättling
4	Schizopora	paradoxa	(Schrad.: Fr.) Donk	Veränderlicher Spaltporling
4	Scytinostroma	portentosum	(Berk. & Curt.) Donk	Riechender Lederrindenpilz
4	Sparassis	crispa	(Wulf. in Jacq.) Fr.	Krause Glucke
4	Spongiporus	lacteus	(Fr.) Aoshima et Kobayasi	Milchweisser Saftporling
4	Steccherinum	ochraceum	(Pers.ap.Gmel.: Fr.) S.F. Gray	Ockerrötlichr Resupinatstacheling
4	Steccherium	fimbriatum	(Pers.: Fr.) Erik.	Gefranster Resupinatstacheling
4	Stereum	gausapatum	(Fr.) Fr.	Eichen-Schichtpilz
4	Stereum	hirsutum	(Willd.: Fr.) S.F. Gray	Zottiger Schichtpilz
4	Stereum	subtomentosum	Pouzar	Samtiger Schichtpilz
4	Subulicystidium	longisporum	(Pat.) Parm.	Langsporiger Sägedornling
4	Telephora	palmata	Scop.: Fr.	Stinkender Warzenpilz
4	Telephora	penicillata	Pers.: Fr.	Pinsel-Warzenpilz
4	Telephora	terrestris	Fr.	Fächerförmiger Erdwarzenpilz
4	Tomentella	sublilacina	(Ellis & Holw.)	Altlila-Filzgewebe
4	Trametes	gibbosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Buckel-Tramete
4	Trametes	hirsuta	(Wulf.: Fr.) Pilát	Striegelige Tramete
4	Trametes	versicolor	(L.: Fr.) Pilát	Schmetterlings-Tramete
4	Trechispora	vaga	(Fr.) Lib.	Schwefelgelber Rindenpilz
4	Tremella	mesenterica	Retz. ex Hook.	Goldgelber Zitterling
4	Trichaptum	abietinum	(Fr.) Ryv.	Tannentramete
4	Vesiculomyces	citrinus	(Pers.) Hagstr.	Zitronengelber Gloeozystidenpilz
4	Vuilleminia	comedens	(Nees: Fr.) Maire	Rindensprenger
5	Bovista	dermoxantha	(Vittadini) De Toni	Zwerg-Bovist
5	Bovista	limosa	Rostr.	Strand-Bovist
5	Bovista	pusilla	(Batsch: Pers.) Pers.	Zwerg-Bovist
5	Cyathus	striatus	(Huds.) ex Pers.	Striegeliger Teuerling
5	Geastrum	fimbriatum	Fries	Gewimperter Erdstern
5	Geastrum	quadrifidum	Pers. ex Pers.	Kleiner Neststern
5	Geastrum	rufescens	Pers.	Rotbrauner Erdstern

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

5	Geastrum	sessile	(Sow.) Pouz.	Gewimperter Erdstern
5	Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
5	Lycoperdon	pyriforme	Schäff.: Pers.	Birnen-Stäubling
5	Mutinus	caninus	(Huds.: Pers.) Fr.	Hundsrute
5	Phallus	impudicus	L. ex Pers.	Stinkmorchel
5	Scleroderma	areolatum	Ehrenb.	Gefelderter Kartoffelbovist
5	Scleroderma	bovista	Fr.	Rotbräunlicher Kartoffelbovist
5	Scleroderma	citrinum	Pers.	Dickschaliger Kartoffelbovist
5	Scleroderma	verrucosum	(Bull.: Pers.) Pers.	Dünnschaliger Kartoffelbovist
5	Vascellum	pratense	Pers.: Pers.) Kreisel	Wiesen-Stäubling
6	Auricularia	auricula-judae	(Bull. ex St. Am.) Wettst.	Judasohr
6	Auricularia	mesenterica	Dicks.: Fr.	Gezonter Ohrlappenpilz
6	Calocera	cornea	(Batsch.: Fr.) Fries	Eichenhörnling
6	Dacrymyces	stillatus	Nees: Fr.	Zerfliessende Gallertträne
6	Dacrymyces	variisporus	McNabb	Verschidensporige Gallertträne
6	Exidia	glandulosa	Fr.	Hexenbutter
6	Merulius	tremellosus	Fr.	Gallertfleischiger Fältling
6	Pseudohydnellum	gelatinosum	(Scop.: Fr.) Karst.	Zitterzahn
6	Tremiscus	helveloides	(DC: Pers.) Donk	Roter Gallerttrichterling
7	Amphisphaerella	xylostei	Pers.) Rulamort	Heckenkirschen-Porenpustelpilz
7	Ascocoryne	sarcoides	(Jacquin ex S.F. Fray) Grov. & Wil.	Fleischroter Gallertbecher
7	Bertia	moriformis var. Multiseptata	(Tode: Fr.) De Not.	Maulbeer-Kugelpilz
7	Bisporella	citrina	(Batsch ex Fr.) Korf & Carpenter	Zitronengelbes Holzbecherchen
7	Cudonia	circinans	(Pers.: Fr.) Fr.	Helm-Kreisling
7	Cudoniella	clavus	(A. & S. ex Fr.) Dennis	Wasserkreisling
7	Daldinia	concentrica	(Bolt. ex Fr.) Ces. & de Not.	Kohliger Kugelpilz
7	Diaporthe	leiphaemia	(Fr.) Sacc.	Eichen-Pfortling
7	Geoglossum	glabrum	Per.: Fries	Kahle Erdzunge
7	Gyromitra	Infula	(Schäff. ex Pers.) Quél.	Bischofsmütze
7	Helvella	crispa	Fr.	Herbstlorchel
7	Helvella	elastica	(Bull. ex St. Aman) Boud.	Elastische Lorchel
7	Helvella	lacunosa	Afz. Ex Fr.	Grubenlorchel
7	Helvella	macropus	(Per.: Fr.) Karsten	Langfuss-Lorchel
7	Humaria	hemisphaeria	(Wiggers ex. Fr.) Fuckel	Halbkugeliger Borstling
7	Hypoxylon	fragiforme	(Pers. ex Fr.) Kickx	Rötliche Kohlenbeere
7	Hypoxylon	multiforme	(Fr.) Fr.	Vielgestaltige Kohlenbeere

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

7	Inomidotis	fulvotingens	(Berk. & M.A. Curtis) E.K. Cash	
7	Leotia	lubrica	Pers.	Gemeines Gallertkäppchen
7	Nectria	cinnabarina	(Tode ex Fr.) Fr.	Zinnoberroter Pustelpilz
7	Nectria	sinopica	(Fr.: Fr.) Fr.	Efeu-Pustelpilz
7	Ombrophila	pura	(Pers.: Fr.) Baral	Buchen-Gallertkreisling
7	Otidea	concinna	(Pers.: Fr.) Sacc.	Zitronengelber Öhrling
7	Otidea	leporina	(Batsch (Fuckel	Hasen-Öhrling
7	Otidea	onotica	(Pers.: Fr.) Bonorden	Eselsohr
7	Peckiella	lateritia	(Fr.) Mayre	Steinreizker (an L: deliciosus)
7	Peziza	badia	Pers. Ex Mérat	Kastanienbrauner Becherling
7	Peziza	micropus	Pers.	Kurzstieliger Holzbecherling
7	Peziza	succuosa	Berk.	Gelbmilchender Becherling
7	Peziza	varia	(Hedw.) Fr.	Riesenbecherling
7	Peziza	michelii	(Boudier) Dennis	Gelbfleischiger Lila-Becherling
7	Protocrea	farinosa	(Berk. & Br.) Petch	Mehliger Krustenpustelpilz
7	Rustroemia	firma	(Pers. Ex. Gray) Saccardo emend. Dumont	Derber Stromakelch
7	Scutellinia	legalie	Lohmeyer & Häffner	Stachelsporiger Schildborstling
7	Scutellinia	scutellata	(L. ex St. Amans) Lambotte	Holz-Schildborstling
7	Tarzetta	catinus	(Holmsk. ex Fr.) Korf & J.K. Rog.	Tigelförmiger Kelchbecherling
7	Tarzetta	cupularis	(L. ex Fr.) Lambotte ss. Dennis	Napfförmiger Kelchbecherling
7	Thyridaria	rubronotata	(Berk. & Broome) Sacc.	Ahorn-Rotpustelpilz
7	Trochila	laurocerasi	(Desm.) Fr.	Kirschlorbeer-Deckelbecherchen
7	Xylaria	hypoxylon	(L. ex Hooker) Grev.	Geweihförmige Holzkeule
7	Xylaria	polymorpha	(Pers. ex Mér.) Grev.	Vielgestaltige Holzkeule
8	Fuligo	septica		Schleimpilz
8	Lycogala	epidendrum		Schleimpilz

Total 638 verschiedene Arten im Jahr 2007 gefunden

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



VEREIN FÜR PILZKUNDE BASEL

Pilze der Jahre 2006/2007/2010/2011/2012/2013

Das nachfolgende Dokument beinhaltet die Jahresarbeit des Vereins für Pilz-kunde Basel der Jahre 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013
Die gefundenen Pilze wurden jede Woche bestimmt, einige illustriert, dokumentiert und im Internet hochgeladen. Der Text auf der ersten, linken Seite wiederholt sich deswegen wöchentlich.

PILZE 2010

Idee und Realisation: Kurt Minder

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

.

Pilze der Woche 19

Stereum rameale *Ästchen-Schichtpilz*

Standort: Abgestorbenes Laubholz.
Fruchtkörper: Hut bis 10 mm, etwas abstehend.
Mikromerkmale: Sporen 7-9 x 2-3 µm, J+, Hyphensystem dimitisch, generative Hyphen ohne Schnallen. Pseudozystiden ohne Inhalt.
Bemerkungen: Ein häufiger Pilz, der sich vor allem wegen den inhaltslosen Pseudozystiden und den grösseren Sporen von S. hirsutum unterscheidet.

Xylaria hypoxylon *Geweihförmige Holzkeule*

Standort: Auf totem Laubholz.
Fruchtkörper: Bis 80 mm lang.
Mikromerkmale: Sporen 12-15 x 6 µm, mit Keimspalte. Asci 8sporig., Paraphysen fädig.
Bemerkungen: Häufiger Schlauch-Pilz auf verschiedenen Laubhözern. Ähnliche Fruchtkörper, jedoch kleiner, findet man an Fruchtschalen von Buchen.

Phaeomarasmius erinaceus *Igel-Schüppchenschnitzling*

Standort: Laubbäume
Fruchtkörper: Hut bis 10 mm.
Mikromerkmale: Sporen 9-13 x 7-9 µm, Septen mit Schnallen, mit zylindrischen Cheilozystiden, HDS kutikulär.
Bemerkungen: Ein seltener Pilz, den man hauptsächlich an Ästen und Zweigen von Birken und Weiden findet.

Foto: Markus Wilhelm

Stereum rameale *Ästchen-Schichtpilz*

Phaeomarasmius erinaceus
Igel-Schüppchen-Schnitzling

Xylaria hypoxylon *Geweihförmige Holzkeule*

Pilz-Fundliste der Woche 19

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Agrocybe	dura	(Bolt.) Sing.	Rasiger Ackerling
Agrocybe	praecox	(Pers: Fr.) Fayod.	Voreilender Ackerling
Auricularia	mesenterica	Dicks.: Fr.	Gezonter Ohrlappenpilz
Auriporia	aurulenta	David, Tortic et Jelic	Duftender Goldporling
Botryobasidium	subcoronatum	(v. Höhn. & Litsch.) Donk	Schnallentragende Traubenbasidie
Calocybe	gambosa	(Fr.) Donk	Mairitterling
Coprinus	kuehneri	Uljé & Bas.	Kleinsporiger Scheibchentintling
Coprinus	domesticus	(Bolt.y: Fr.) Gra	Haus-Tintling
Daedaleopsis	confragosa	(Bolt.: Fr.) Schröt. s. str.	Rötende Tramete
Gymnopus	dryophylla	(Bull.: Fr.) Kumm.	Waldfreund-Rübling
Hydropus	subalpinus	(v.Höhnel) Singer	Buchenwald-Wasserfuss
Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
Marasmius	alliaceus	(Jacq.: Fr.) Fr.	Langstieliger Knoblauchschwindling
Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.)Kotl. et Pouz.	Breitblattrübling
Mycena	renati	Quélet	Gelbstieliger Nitrat-Helmling
Mycena	vitilis	(Fr.(Quélet	Zäher Fadenhelmling
Phaeomarasmius	erinaceus	(Fr.) Kühn.	Igel-Schüppchenschnitzling
Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
Polyporus	ciliatus	Fr.	Bewimperter Porling
Steccherinum	ochraceum	(Pers.ap.Gmel.: Fr.) S.F. Gray	Ockerrötlichr Resupinatstacheling
Stereum	rameale	(Pers.: Fr.) Burt	Ästchen-Schichtpilz
Strobilurus	tenacellus	(Pers.:Fr.) Sing.	Bitterer Nagelschwamm
Stropharia	rugosoannulata	Farl. ex Murr.	Rotbrauner Riesenträuschling
Tulostoma	brumale	Pers.: Pers.	Zizen-Stielbovist

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

Laetiporus sulfureus

Pilze der Woche 20

Pluteus petasatus *Schuppigseidiger Dachpilz*

Standort: Büschelig auf morschem Laubholz.
Fruchtkörper: Hut bis 100 mm.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 5 µm, mit Hakenzystiden, diese z.-T. mit seitlichen Stacheln, HDS kutikulär, Terminalzellen teilweise aufsteigend. Ohne Schnallen.
Bemerkungen: Dieser Dachpilz ist in der Hutfarbe variabel, auch ist er z.T. stark oder schwach schuppig. Die Schuppen auf dem Hut, die Hakenzystiden mit den Stacheln seitlich an der Zystidenwand und keine Schnallen an den Septen sind die wichtigsten Trennungsmerkmale.

Pluteus phlebophorus *Runzeliger Dachpilz*

Standort: Inner- und ausserhalb von Wäldern an morschem, liegendem Holz.
Fruchtkörper: Bis 40 mm.
Mikromerkmale: Sporen 7 x 6 µm, HDS hymeniform, Septen ohne Schnallen, Zystiden spindelig bis flaschenförmig.
Bemerkungen: Er gehört in den Formenkreis mit hauptsächlich kugeligen Zellen der HDS. Gegenüber P. nanus hat er einen deutlich stärker gerunzelten Hut.

Pluteus petasatus:
Pleurozystiden

Pluteus petasatus *Schuppigseidiger Dachpilz*

Pluteus phlebophorus *Runzeliger Dachpilz*

Pilz-Fundliste der Woche 20

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Agrocybe	praecox	(Pers: Fr.) Fayod.	Voreilender Ackerling
Agrocybe	semiorbicularis	(Bull.: St. Am.) Fay.	Halbkugeliger Ackerling
Calocybe	gambosa	(Fr.) Donk	Mairitterling
Clitocybe	fragrans	(With.) Kumm.	Dufttrichterling
Entoloma	clypeatum	(L.: Fr.) Kumm.	Schild-Rötling
Entoloma	conferendum	(Britz.) Noord.	Kreuzsporiger Rötling
Gymnopus	dryophylla	(Bull.: Fr.) Kumm.	Waldfreund-Rübling
Hydropus	subalpinus	(v.Höhnel) Singer	Buchenwald-Wasserfuss
Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
Marasmius	buxi	Fr. in Quél.	Buchsblatt-Schwindling
Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.)Kotl. et Pouz.	Breitblattrübling
Mycena	abramsii	(Murr.) Murr.	Voreilender Helmling
Mycena	adscendens	(Lasch.) MG.	Zarter Helmling
Mycena	galericulata	(Scop.:Fr.) Gray	Rosablättriger Helmling
Mycena	renati	Quélet	Gelbstieliger Nitrat-Helmling
Phaeomarasmius	erinaceus	(Fr.) Küh.	Igel-Schüppling
Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
Pluteus	petasatus	(Fr.) Gill	Seidiger Dachpilz
Pluteus	phlebophorus	(Ditmar.: Fr.) Kumm.	Runzeliger Dachpilz
Psathyrella	spadiceogrisea	(Schäff.) Fr. Maire	Dungbewohnender Faserling
Daedalea	quercina	(L. ex Fr.)	Eichenwirrling
Fomitopsis	pinicola	(Fr.) Karst.	Rotbrauner Baumschwamm
Gloeophyllum	abietinum	Fr. ex Fr.	Tannenblättling
Hymenochaeta	rubiginosa	(Dicks.: Fr.) Lév.	Rotbrauner Borstenscheibling
Laetiporus	sulfureus	Murr.	Schwefelporling
Phanerochaete	sordida	(Karst.) Eriks. & Ryv.	Cremefarbener Zystidenrindenpilz
Phellinus	contiguus	(Pers.: Fr.) Pat.	Grosssporiger Feuerschwamm
Polyporus	badius	(Pers.: Gray) v. Schw.	Kastanienbrauern Porling
Polyporus	ciliatus	Fr.	Bewimperter Porling
Polyporus	mori	Pollini: Fr.	Wabenporling
Pulcherricium (Tevana)	caeruleum	(Fr.) Parm.	Blauer Rindenpilz
Exidia	glandulosa	Fr.	Hexenbutter
Paxina	acetabulum	(Pers.) O. Kutze	Hochgerippter Becherling
Peziza	arvernensis	Pers. Ex Mérat	Buchenwaldbecherling



Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

Agaricus bitorquis | *Trottoir-Champignon*

Pilze der Woche 21

Gymnopus acervatus
Büscheliger Blasssporrübling

Standort: Büschelig im Häcksel
Fruchtkörper: Hut bis 50 mm.
Mikromerkmale: Sporen 7 x 3 µm, Cheilozystiden verschieden, HDS koralloid.
Bemerkungen: Die koralloide HDS, die Cheilozystiden, die Sporen und der schwache Geruch nach Bittermandeln sowie das büschelige Erscheinen kennzeichnen diesen Pilz.

Mycrophale foetens
Gemeiner Stinkschwindling

Standort: An morschen Strünken, Laubholz
Fruchtkörper: Hut bis 35 mm.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 4 µm, Septen mit Schnallen.
Bemerkungen: M. foetens unterscheidet sich von M. brassicolens durch etwas grössere Sporen und kleinerem Q-Wert; der M. perforans hat seinen Standort auf Nadelstreu und ist in der Regel kleiner. Neu wird diese Art in der Gattung Marasmiellus geführt.

Kuehneromyces lignicola
Glattstieliges Stockschwämmchen

Standort: An morschen Strünken, Nadelholz
Fruchtkörper: Hut bis 30 mm.
Mikromerkmale: Sporen 6,5 x 4 µm, Septen mit Schnallen, Cheilozystiden mit knotigen Auswüchsen an der Spitze.
Bemerkungen: Der glatte Stiel und der schwache Geruch unterscheiden diese Art von K. mutabilis. Mikroskopisch trennen sich die beiden Arten durch unterschiedliche Zystiden. K. lignicola hat z.T. knotige Auswüchse an der Spitze der Zystiden.

Gymnopus acervatus *Büscheliger Blasssporrübling*





Gymnopus acervatus, Mikromerkmale:

links oben: Cheilozystiden
rechts oben: HDS
rechts unten: Sporen und Basidien



Microphale foetens *Gemeiner Stinkschwindling*

Kuehneromyces lignicola *Glattstieliges Stockschwämmchen*





Kueneromyces lignicola
Mikro

Pilz-Fundliste der Woche 21

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Agaricus	bitorquis	(Quélet) Sacc.	Trottoir-Champignon
Agrocybe	semiorbicularis	(Bull.: St. Am.) Fay.	Halbkugeliger Ackerling
Agrocybe	praecox	(Pers: Fr.) Fayod.	Voreilender Ackerling
Calocybe	gambosa	(Fr.) Donk	Mairitterling
Coprinus	micaceus	(Bull.: Fr.) Fr.	Glimmertintling
Gymnopus	acervatus	(Fr.) Murrill	Büscheliger Blasssporrübling
Gymnopus	dryophylla	(Bull.: Fr.) Kumm.	Waldfreund-Rübling
Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
Kuehneromyces	lignicola	(Peck) Redhead	Glattstieliges Stockschwämmchen
Micromphale	foetidum	(Sow..: Fr.) Singer	Gemeinder Stinkschwindling
Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
Mycena	leptophylla	(Peck) Sacc.	Aprikosenfarbener Helmling
Mycena	vitilis	(Fr.(Quélet	Zäher Fadenhelmling
Psathyrella	spadiceogrisea	(Schäff.) Fr. Maire	Dungbewohnender Faserling
Stropharia	rugosoannulata	Farl. ex Murr.	Rotbrauner Riesenträuschling
Bjerkandera	adusta	(Willd.: Fr.) Karst.	Angebrannter Rauchporling
Ganoderma	applanatum	(Pers.) Pat.	Flacher Lackporling
Stereum	gausapatum	(Fr.) Fr.	Eichen-Schichtpilz
Stereum	hirsutum	(Willd.: Fr.) S.F. Gray	Zottiger Schichtpilz
Trametes	gibbosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Buckel-Tramete
Trametes	versicolor	(L.: Fr.) Pilát	Schmetterlings-Tramete



Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

Hypocrea rufa | *Rotbrauner Scheiben-Pustelpilz*

Pilze der Woche 22

Clitocybe sinopica
Kohlentrichterling

Standort: Laub- und Nadelwald, Brandstellen, ab Frühling
Fruchtkörper: Hut bis 60 mm.
Mikromerkmale: Sporen 9 x 5 µm,
Bemerkungen: Die wichtigsten Merkmale sind die frühe Erscheinungszeit, der Farbkontrast Hut/Lamellen und der deutliche Geruch nach Mehl sowie das Vorkommen in höheren Lagen.

Gymnopus aquosus
Wässeriger Rübling

Standort: Laub- und Nadelwald, an Holz, Frühjahr
Fruchtkörper: Hut bis 60 mm.
Mikromerkmale: Sporen 6 x 3 µm.
Bemerkungen: Dieser Rübling steht dem Waldfreundrübling nahe, insbesondere wegen der putzelartigen Huthaut. Die Hutfarbe ist jedoch blasser und hat weniger Warmtöne. Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal sind jedoch die blasenförmigen Cheilozystiden.

Mitrula paludosa
Sumpfhaubenpilz

Standort: Auf faulendem Holz-, Pflanzenresten, in stehendem oder fliessendem Wasser
Fruchtkörper: Hut bis 50 mm hoch.
Mikromerkmale: Sporen -15 x -3 µm, oft septiert.
Bemerkungen: Farbe und Standort trennen diesen Pilz zu anderen Arten der Gattung und zur Gattung Heyderia, diese hat einen anderen Stielansatz.

Clitocybe sinopica *Kohlentrichterling*

Gymnopus aquosus *Wässriger Rübling*

Mitrula paludosa *Sumpfhaubenpilz*

Pilz-Fundliste der Woche 22

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Agrocybe	praecox	(Pers: Fr.) Fayod.	Voreilender Ackerling
Amanita	junquillea	Quélet	Narzissengelber Wulstling
Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
Amanita	umbrinolutea	Secr.: Gill.) Bat.)	Verfärbender Scheidenstreifling
Calocybe	gambosa	(Fr.) Donk	Mairitterling
Clitocybe	sinopica	(Fr.) Kumm.	Kohlentrichterling
Coprinus	atramentarius	(Bull.:Fr.) Fr.	Falten-Tintling
Coprinus	cinereus	(Schäff. Fr.) Gray	Wollstieliger Misttintling
Coprinus	micaceus	(Bull.: Fr.) Fr.	Glimmertintling
Crepidotus	applanatus	(Pers.) Kumm.	Gerieftes Stummelfüsschen
Gymnopus	aquosus	(Bull.: Fr.) Kumm.	Wässriger Rübling
Gymnopus	dryophylla	(Bull.: Fr.) Kumm.	Waldfreund-Rübling
Gymnopus	erytropus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Rotstieliger Rübling
Hydropus	subalpinus	(v.Höhnel) Singer	Buchenwald-Wasserfuss
Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
Marasmiellus	ramealis	(Bull.: Fr.) Sing.	Ästchenschwindlng
Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.)Kotl. et Pouz.	Breitblattrübling
Mycena	acicula	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Orangeroter Helmling
Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
Mycena	renati	Quélet	Gelbstieliger Nitrat-Helmling
Mycena	vitilis	(Fr.) Quél.	Zäher Fadenhelmling
Pholiotina	teneroides	(Lge.) Sing.	Zweisporiger Glockenschüppling
Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
Strobilurus	stephanocystis	(Hora) Sg.	Milder Nagelschwamm
Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
Antrodia	xantha	(Fr.: Fr.) Ryv.	Gelbliche Resupinattramete
Hyphodontia	aspera	(Fr.) Eriksson	Bärtiger Zähnchenrindenpilz



Pilz-Fundliste der Woche 22

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Phlebiopsis	roumerguerii		
Piptoporus	betulinus	(Bulliard) Karsten	Birken-Hautporling
Polyporus	ciliatus	Fr.	Bewimperter Porling
Polyporus	tuberaster	(Jacq.: Pers.) Fr.	Sklerotien-Porling
Skeletocutis	nivea	(Jungh.) Keller	Schneeweisser Feinporling
Dacrymyces	capitata	Schw.	Gestielte Gallertträne
Cudoniella	clavus	(A. & S. ex Fr.) Dennis	Wasserkreisling
Hypocrea	rufa	(Pers.: Fr.) Fr.	Rotbrauner Scheiben-Pustelpilz
Lasiosphaeria	spermoides	Pers.	Gesäter Kohlenkugelpilz
Mitrula	paludosa	(Batsch ex Morat) Karst.	Sumpfhaubenpilz



Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

Vibrissea truncorum | *Abgestutztes Fadenscheibchen*

Pilze der Woche 23

Tarzetta cupularis

Kerbrandiger Napfbecherling

Standort: Auf nackter, lehmhaltigen Erde.
Fruchtkörper: Hut bis 20 mm, grauweisslich.
Mikromerkmale: Sporen 20 x 12 µm, mit zwei Öltropfen.
Bemerkungen: Sein Doppelgänger ist T. catinus mit grösseren Fruchtkörpern und mehr Ockeranteile der Fruchtkörper. Die Sporen von T. cupularis haben einen etwas kleineren Q-Wert.

Kuehneromyces mutabilis

Gemeines Stockschwämmchen

Standort: Büschelig auf Laubholz, seltener auch Nadelholz.
Fruchtkörper: Hut bis 50 mm, stark hygrophan.
Mikromerkmale: Sporen 7 x 4 µm, mit Cheilozystiden.
Bemerkungen: Das Stockschwämmchen kann verwechselt werden mit Häublingen, die vorallem in Farbe und Hygrophanität ähnlich sein können. Das beste Unterscheidungsmerkmal ist der angenehme Geruch und Geschmack beim Stockschwämmchen und der Stiel ist beim Stockschwämmchen unterhalb des Rings stärker schuppig. Mikroskopisch sind Unterschiede der Zystiden, der Sporen, beim Stockschwämmchen nicht warzig, wobei auch bei den Häublingen die Warzen an den Sporen mit dem Lichtmikroskop manchmal nicht sichtbar sind.

Stropharia rugosoannulata

Riesen-Träuschling

Standort: Auf Holzmulch, auch gezüchtet auf Stroh.
Fruchtkörper: Hut bis 150 mm, glatt, nicht schmierig.
Mikromerkmale: Sporen 12 x 8 µm, mit Keimporus., dickwandig, mit Chrysozystiden.
Bemerkungen: Es gibt eine ähnliche Art in Nadelwäldern, die unterhalb des Stiels weisse Schüppchen hat.

Tarzetta cupularis | *Kerbrandiger Napfbecherling*

Asci und Sporen von Tarzetta cupularis

Kuehneromyces mutabilis | *Gemeines Stockschwämmchen*

Mikro von
Kuehneromyces mutabilis



Cheilozystiden

Stropharia rugosoannulata | *Riesen-Träuschling*

Pilz-Fundliste der Woche 23

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Agaricus	aestivalis	(Møll.) Pil.	Sommer-Egerling
Coprinus	disseminatus	(Pers.: Fr.) S.F.Gray	Gesäter Tintling
Entoloma	conferendum	(Britz.) Noord.	Kreuzsporiger Rötling
Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
Gymnopus	dryophylla	(Bull.: Fr.) Kumm.	Waldfreund-Rübling
Hygrocybe	conica	(Scopp.: Fr.) Kumm.	Kegeliger Saftling
Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
Marasmius	rotula	(Scop.: Fr.) Fr.	Halsbandschwindling
Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.)Kotl. et Pouz.	Breitblattrübling
Panaeolus	foeniseccii	(Per.: Fr.) Schr.	Heudüngerling
Pluteus	leonius	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Löwengelber Dachpilz
Stropharia	rugosoannulata	Farl. ex Murr.	Rotbrauner Riesenträuschling
Russula	romellii	Maire	Weissstieliger Ledertäubling
Coriolopsis	gallica	(Fr.) Ryv.	Braune Borstentramete
Polyporus	ciliatus	Fr.	Bewimperter Porling
Polyporus	mori	Pollini: Fr.	Wabenporling
Skeletocutis	carneogrisea	David	Fleischgrauer Knorpelporling
Peziza	arvernensis	Pers. Ex Mérat	Buchenwaldbecherling
Tarzetta	cupularis	(Rehm) Boud.	Napfförmiger Kelchbecherling
Vibrissea	truncorum	(L. ex Hooker) Grev.	Abgestutztes Tentakelkeulchen



Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

Mycena laevigata | *Schlüpfriger Helmling*

Pilz-Fundliste der Woche 24

Amanita excelsa *Grauer Wulstling*

Standort: Laub- und Nadelwald.
Fruchtkörper: Hut bis 100 mm, Hutrand glatt, Manchette oberhalb gerieft, Stiel nicht in die Stielbasis eingepfropft, Velumresten weiss.
Mikromerkmale: Sporen 9.5 x 7 µm, J+, Chelozystiden blasig.
Bemerkungen: Beim giftigen Pantherpilz sind die Velumresten weiss, der Hutrand ist meistens gerieft, die Manchette ist oberhalb nicht gerieft und der Stiel ist in die Knolle eingepfropft, die Zystiden sind schlanker, die Sporen sind in Melzer negativ.

Inocybe perbrevis *Fastwurzelnder Risspilz*

Standort: Laubwald, lemiger Boden.
Fruchtkörper: Hut bis 30 mm, z.T. sehr klein.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 5 µm, Cheilozystiden dünnwandig ohne Kristalle, ohne Pleuro- und Caulozystiden.
Bemerkungen: Ein kleiner Risspilz mit gelb-ckerfarbenem, fein schuppigen Hut. Geruchlos. Eine ähnliche Art ist *I. dulcamara*, diese ist jedoch bedeutend grösser. und hat zylindrische, oft mehrfach septierte Cheilozystiden.

Hypholoma elongatum

Torfmoos-Schwefelkopf

Standort: In Mooren, zwischen Sphagnum.
Fruchtkörper: Hut bis 20 mm. Stiel etwas starr.
Mikromerkmale: Sporen 10 x 6 µm, mit Cheilo- und Chrysozystiden.
Bemerkungen: Eine ähnliche Art ist *H. polytrichi*, dieser wächst jedoch nicht im Sphagnum.

Amanita excelsa | *Grauer Wulstling*

Amanita excelsa
Cheilocystiden und Sporen



Inocybe | *perbrevis*

Inocybe perbrevis
Cheilocystiden und Sporen



Hypholoma elongatum | *Torfmoos-Schwefelkopf*

Frühjahrsaauselug 2010

Pilze aus der Region Etang de la Gruère

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Agaricus	aestivalis	(Møl.) Pil.	Sommer-Egerling
Calocybe	gambosa	(Fr.) Donk	Mairitterling
Entoloma	conferendum	(Britz.) Noord.	Kreuzsporiger Rötling
Hypholoma	elongatum	(Pers.: Fr.) Rick.	Torfmoos-Schwefelkopf
Inocybe	queletii	Maire et Konr.	Weisstannen-Risspilz
Inocybe	fuscidula	Vel.	Braunstreifiger Risspilz
Kuehneromyces	lignicola	Singer et Smith	Glattstieliges Stockschwämmchen
Micromphale	perforans	(Hoffm.: Fr.) Gray	Nadelschwindling
Mycena	epipterygia	(Scop.: Fr.) Gray	Dehnbarer Helmling
Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
Mycena	stipata	Maas Geester.& Schw.	Büscheliger Nitrat-Helmling
Mycena	viridimarginata	Karst.	Grünschneidiger Helmling
Mycena	vitilis	(Fr.(Quélet	Zäher Fadenhelmling
Nycena	laevigata	(Lasch: Fr.) Gillet	Schlüpfriger Helmling
Panaeolus	papilionaceus	(Bull.: Fr.) Quél.	Behangener Düngerling
Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
Fomitopsis	pinicola	(Fr.) Karst.	Rotbrauner Baumschwamm
Gloeophyllum	odoratum	(Wulf.: Fr.) Imyzeki	Fencheltramete
Peziza	praetervisa	Berkeley et Curtis	Braunvioletter Brandstellenbecherling

Pilz-Fundliste der Woche 24

Region Basel

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
Boletus	luridus	Schäff.: Fr.	Netzstieliger Hexenröhrling
Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
Agaricus	bitorquis	(Quélet) Sacc.	Trottoir-Champignon
Agrocybe	dura	(Bolt.) Sing.	Rasiger Ackerling
Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
Inocybe	perbrevis	(Weinmann) Gillet	Fastwurzelnder Risspilz
Marasmius	rotula	(Scop.: Fr.) Fr.	Halsbandschwindling
Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling

Kuehneromyces lignicola
Glattstieliges Stockschwämmchen



Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

Marasmius torquescens, Spinula in der Huthaut

Pilz-Fundliste der Woche 25

Marasmius torquescens *Filzstieliger Schwindling*

Standort:	Laubwald.
Fruchtkörper:	Hut bis 40 mm, durchscheinend gerieft. Stiel steif.
Mikromerkmale:	Sporen 8.5 x 5 µm, mit Cheilo- und Pleurozystiden. HDS hymeniform. Spinula im Stiel und in der HDS.
Bemerkungen:	Der ähnliche *M. cohaerens* hat eine anders gestaltete HDS, die Zellen haben apikal bürstenähnliche Auswüchse.

Lentinellus torulosus *Birkenknäuling*

Standort:	Laubholz.
Fruchtkörper:	Hut bis 100 mm, jung rosalila, später ockerfarben bis gelbbraun und lila überhaucht.
Mikromerkmale:	Sporen 6.5 x 3 µm, mit dickwandigen Cheilo- und Pleurozystiden. HDS kutikulär mit Schnallen.
Bemerkungen:	Ein Sägeblättling mit glatter Lamellenschneide. Man sollte die Farbveränderung während des alterns beachten.

Coprinus ellisii *Falscher Holztintling*

Standort:	Laubreste, Zweige, besonders Buche.
Fruchtkörper:	Hut bis 40 mm, Stiel-Basis knollenförmig.
Mikromerkmale:	Sporen 7 x 4 µm, elliptisch, bohnenförmig.
Bemerkungen:	Dieser Tintling gehört in die Sektion mit kleinen, flockigen, persistenten Velumflöckchen bestehend aus Ketten mit spindeligen oder rundlichen, dickwandigen Zellen. Mit KOH negativ.

Marasmius torquescens | *Filzstieliger Schwindling*

Lentinellus torulosus | *Birkenknäueling*

Coprinus ellisii | *Falscher Holztintling*

Pilz-Fundliste der Woche 25

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Agrocybe	semiorbicularis	(Bull.: St. Am.) Fay.	Halbkugeliger Ackerling
Amanita	eliae	Quél.	Kammrandiger Wulstling
Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
Amanita	junquillea	Quélet	Narzissengelber Wulstling
Amanita	pantherina	(DC.: Fr.) Krombh.	Pantherpilz
Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
Chamaemyces	fracidus	(Fr.) Donk	Fleckender Schmierschirmling
Clitocybe	costata	Kühn. & Romagn.	Kerbrandiger Trichterling
Clitocybe	gibba	(Pers.) Kumm.	Ockerbrauner Trichterling
Clitopilus	brunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
Coprinus	ellisii	Orton	Falscher Holztintling
Gymnopus	acervatus	(Fr.) Murrill	Büscheliger Blasssporrübling
Gymnopus	dryophylla	(Bull.: Fr.) Kumm.	Waldfreund-Rübling
Gymnopus	fusipes	(Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling
Gymnopus	impudicus	(Fr.) Antonin Halling et Noordeloos	Unverschämter Blasssporrübling
Hemimycena	lactea	(Pers.: Fr.) Sing.	Milchweisser Scheinhelmling
Hydropus	subalpinus	(v.Höhnel) Singer	Buchenwald-Wasserfuss
Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
Inocybe	erubescens	Blytt	Ziegelroter Risspilz
Inocybe	riomosa	(Bull.: Fr.) Kummer	Kegeliger Risspilz
Lentinus	torulosus	(Pers.: Fr. Lloyd	Laubholz-Knäueling
Macrolepiota	procera	(Scop.: Fr. Sg.	Parasol
Macrolepiota	rhacodes	(Vittad.) Singer	Safranschirmling
Marasmiellus	ramealis	(Bull.: Fr.) Sing.	Ästchenschwindlng
Marasmius	oreades	(Bolton.: Fr.) Fr.	Nelkenschwindling
Marasmius	rotula	(Scop.: Fr.) Fr.	Halsbandschwindling
Marasmius	torquescens	Quél.	Ledergelber Schwindling
Melanoleuca	verrucipes	(Fr.) Singer	Rauhstiel-Weichritterling
Mycena	sanguinolenta	(Alb. & Schw.: Fr.) Kumm.	Purpurschneidiger Helmling
Mycena	pelianthina	(Fr.: Fr.) Quél.	Schwarzgezähnelter Helmling
Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
Mycena	sanguinolenta	(Alb.-Schw.: Fr.) Kumm.	Purpurschneidiger Helmling
Pluteus	ephebeus	(Fr.: Fr.) Gill.	Graufilziger Dachpilz

Pilz-Fundliste der Woche 25

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Psathyrella	candolleana	(Fr.: Fr.) Maire	Behangener Faserling
Rickenella	fibula	(Bull.: Fr.) Raith.	Orangegelber Heftelnabeling
Lactarius	cremor	Fr.	Runzliger Zwergmilchling
Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
Russula	grisea	Fr.	Grauvioletter Reiftäubling
Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
Russula	puellaris	Fr.	Milder Wachstäubling
Russula	risigallina	(Batsch) Kuyp. & v. Vuu.	Wechselfarbiger Dottertäubling
Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
Botryobasidium	globosporum		
Dentropolyporus	umbellatus	(Pers.: Fr.) Jül.	Eichhase
Heterobasidion	annosum	(Fr.) Bref.	Wurzelschwamm
Oligoporus	subcaesius	(David) Dung.	Fastblauer Saftporling
Pycnoporellus	fulgens	(Fr.) Donk	Leuchtender Weichporling
Ramaria	formosa	(Pers.: Fr.) Quél.	Dreifarbene Koralle
Skeletocutis	nivea	(Jungh.) Keller	Schneeweisser Feinporling
Langermannia	gigantea	(Batsch: Pers.) Rostk.	Riesenbovist
Phallus	impudicus	L. ex Pers.	Stinkmorchel
Bourdotia	galzini	(Bres.) Trozz. in. Sac.	
Peziza	arvernensis	Pers. Ex Mérat	Buchenwaldbecherling
Scutellinia	scutellata	(Fuck.) Boud.	Holz-Schildborstling

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

Pilze der Woche 28

Omphalina sphagnicola *Torfmoss-Nabeling*

Standort: In Mooren bei Sphagnum.
Fruchtkörper: Hut bis 30 mm.
Mikromerkmale: Sporen 10 x 4 µm, ohne Schnallen und Zystiden.
Bemerkungen: Die Sporenform, Hyphen ohne Schnallen, der Standort in Mooren und das frühe Erscheinen kennzeichnen diesen Pilz.

Galerina tibiicystis *Bereifter Häubling*

Standort: In Mooren bei Sphagnum.
Fruchtkörper: Hut bis 30 mm.
Mikromerkmale: Sporen 9,5 x 7 µm, Cheilozystiden kopfig mit langem Hals, ebenfalls die Caulozystiden.
Bemerkungen: Dieser Pilz unterscheidet sich von anderen moorbewohnenden Galerien durch schlanke, kopfige Zystiden.

Omphalina sphagnicola | *Torfmoos-Nabeling*

Galerina tibiicystis | *Bereifter Häubling*

Pilz-Fundliste der Woche 28

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
Boletus	aestivalis	(Paul.) Fr.	Sommersteinpilz
Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
Amanita	strobiliformis	(Paul.: Vitt.) Bertillon	Fransiger Wulstling
Gymnopus	fusipes	(Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling
Psathyrella	candolleana	(Fr.: Fr.) Maire	Behangener Faserling
Russula	aurea	Pers.	Goldtäubling
Russula	cyanoxantha fo. pelter.	R. Maire.: Singer	Grüner Frauentäubling
Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
Russula	grisea	Fr.	Grauvioletter Reiftäubling
Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
Russula	raoultii	Quél.	Blassgeber Täubling
Russula	romellii	Maire	Weissstieliger Ledertäubling
Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling
Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
Polyporus	arcularius	(Batsch) Fr.	Weitlöcheriger Porling

Zur Systematik

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

Pilze der Woche 29

Amanita strobiliformis *Fransiger Wulstling*

Standort: Bei Laubbäumen.
Fruchtkörper: Hut bis 200 mm.
Mikromerkmale: Sporen 11 x 8 µm.
Bemerkungen: Dieser Pilz gehört in die Sektion Lepidella mit amyloiden Sporen, Stiel ohne Volva und starkem, abwischbaren Velum.

Marasmius quercophilus

Braunscheibiger Schwindling

Standort: Laubstreu, Eichen, Kastanien.
Fruchtkörper: Hut bis 10 mm.
Mikromerkmale: Sporen
Bemerkungen: Dieser Schwindling gehört in den Formenkreis derjenigen Arten mit typisch marasmoider Form und deren Stielbasis direkt am Substrat angewachsen ist.
Foto: Markus Wilhelm

Amanita strobiliformis | *Fransiger Wulstling*

Marasmius quercophilus | *Braunscheibiger Schwindling*

Pilz-Fundliste der Woche 29

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
Leccinum	carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuss
Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
Xerocomus	armeniacus	(Quél.) Quél.	Aprikosenfarbiger Filzröhrling
Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
Amanita	strobiliformis	(Paul.: Vitt.) Bertillon	Fransiger Wulstling
Gymnopus	fusipes	(Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling
Marasmius	quercophilus	Pouzar	Braunscheibiger Schwindling
Lactarius	glaucescens	Crossl.	Grünender Pfeffermilchling
Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
Lactarius	volemus	(Fr.: Fr.) Fr.	Brätling
Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
Russula	cyanox. fo. pelteraui	R. Maire.: Singer	Grüner Frauentäubling
Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
Russula	grisea	Fr.	Grauvioletter Reiftäubling
Russula	laurocerasi	Melzer	Mandeltäubling
Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
Russula	puellula	Ebb. Moell. & Schäff.	Buchen Zwergtäubling
Russula	risigallina	(Batsch) Kuyp. & v. Vuu.	Wechselfarbiger Dottertäubling
Russula	romellii	Maire	Weissstieliger Ledertäubling
Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
Fomitopsis	pinicola	(Fr.) Karst.	Rotbrauner Baumschwamm
Phaeolus	schweinitzii	(Fr.) Pat.	Kiefernbraunporling
Polyporus	tuberaster	(Jacq.: Pers.) Fr.	Sklerotien-Porling

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

Pilze der Woche 30

Datronia mollis *Weicher Resupinatporling*

Standort: Laubholz.
Fruchtkörper: Überzüge von mehreren cm.
Mikromerkmale: Sporen 9 x 4 µm.
Bemerkungen: Das Hyphensystem ist dimitisch, die Septen haben Schnallen. Die helle Fruchtschicht ist labyrinthisch-porig.

Chrysomphalina (Gerronema) strombodes *Gelbblättriger Nabeling*

Standort: Laub- und Nadelholz.
Fruchtkörper: bis 40 cm.
Mikromerkmale: Sporen 8 x,5 µm. Septen mit Schnallen.
Bemerkungen: Dieser Pilz wird auch unter der Gattung Gerronema aufgeführt. Die Gattung unterscheidet sich von der Gattung Omphalina durch das Lamellentrama (pachypodial). Nicht lichenisiert.

Datronia mollis | *Weicher Resupinatporling*

Chrysomphalina strombodes | *Gelbblättriger Nabeling*

Pilz-Fundliste der Woche 30

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Boletus	appendiculatus	Schaeff.	Anhängsel-Röhrling
Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
Gyroporus	cyanescens	(Bull.: Fr.) Quél.	Kornblumen-Röhrling
Leccinum	crocipodium	(Letellier) Walting	Gelbporiger Rauhfuss
Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
Chrysomphalina	strombodes	(Berk. & Mt.) Clç.	Hellblättriger Gelbnabeling
Lentinus	lepideus	(Buxb. ex Fr.) Fr.	Schuppiger Sägeblättling
Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
Lactarius	volemus	(Fr.: Fr.) Fr.	Brätling
Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
Russula	illota	Romagn.	Morsetäubling
Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
Russula	puellaris	Fr.	Milder Wachstäubling
Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
Daedalea	quercina	(L. ex Fr.)	Eichenwirrling
Datronia	mollis	(Sommerf.: Fr.) Donk	Weicher Resupinatporling
Hydnum	repandum var. rufescens		(Fr.) Barla Rotgelber Stoppelpilz
Inonotus	hispidus	(Fr.) Karst.	Zottiger Schillerporling
Phaeolus	schweinitzii	(Fr.) Pat.	Kiefernbraunporling
Trametes	gibbosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Buckel-Tramete

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

Pilze der Woche 31

Artomyces pyxidatus *Verzweigte Becherkoralle*

Standort: Laubholz.
Fruchtkörper: bis 13 cm hoch.
Mikromerkmale: Sporen 5 x 2,5 µm, feinwarzig. Mit Schnallen.
Bemerkungen: Das wichtigste Merkmal sind die becherförmigen Enden an den äussersen Verzweigungen.

Crinipellis stipitaria *Zitzen Haarschwindling*

Standort: Pflanzenreste.
Fruchtkörper: bis 15 mm.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 5 µm.
Bemerkungen: Der Hut ist auffällig gezont und wie der Stiel behaart. Die Hyphen der Huthaut sind dickwandig, lang. Der Habitus und die Konsistenz ist ähnlich wie Marasmius. die Huthaut ist jedoch anders gestaltet.

Hypocrea rufa, Asci



Hypocrea rufa

Artomyces pyxidatus | *Verzweigte Becherkoralle*

Crinipellis stipitaria | *Zitzen Haarschwindling*

Pilz-Fundliste der Woche 31

Boletus	pseudoregius	Huber ex Est.	Blauender Königsröhrling
Boletus	radicans	Pers.: Fr.	Bitter-Röhrling
Leccinum	crocipodium	(Letellier) Walting	Gelbporiger Rauhfuss
Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
Amanita	vaginata	(Bull.) Vitt.	Grauer Scheidenstreifling
Clitocybe	gibba	(Pers.) Kumm.	Ockerbrauner Trichterling
Clitopilus	brunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
Conocybe	lactea	(Lge.) Métr.	Milchweisses Samthäubchen
Coprinus	disseminatus	(Pers.: Fr.) S.F.Gray	Gesäter Tintling
Crinipellis	stipitaria	(Fr.) Pat.	Zitzen Haarschwindling
Gymnopus	dryophylla	(Bull.: Fr.) Kumm.	Waldfreund-Rübling
Gymnopus	fusipes	(Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling
Gymnopus	oreadoides	(Pass.) Orton	Flattriger Rübling
Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
Hydropus	subalpinus	(v.Höhnel) Singer	Buchenwald-Wasserfuss
Lentinellus	cochleatus var. inolens	Konr. & Maubl.	Geruchloser Äniszähling
Marasmiellus	candidus	(Bolt.: Fr.) Sing.	Schneeweisser Zwergschwindling
Marasmiellus	ramealis	(Bull.: Fr.) Sing.	Ästchenschwindlng
Marasmius	rotula	(Scop.: Fr.) Fr.	Halsbandschwindling
Marasmius	scordonius	(Fr.: Fr.) Fr.	Küchen-Schwindling
Mycena	capillaris	(Schum.: Fr.) Kumm.	Buchenblatt-Helmling
Mycena	polygramma	(Bull.: Fr.) Gray	Rillstieliger Helmling
Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
Pluteus	leonius	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Löwengelber Dachpilz
Pluteus	petasatus	(Fr.) Gill	Seidiger Dachpilz
Psathyrella	candolleana	(Fr.: Fr.) Maire	Behangener Faserling
Rickenella	fibula	(Bull.: Fr.) Raith.	Orangegelber Heftelnabeling
Simocybe	sumtuosa	(Ort.) Sing.	Üppiger Olivschnitzling
Stropharia	coronilla	(Bull.: Fr.) Quél.	Krönchenträuschling
Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
Lactarius	glaucescens	Crossl.	Grünender Pfeffermilchling
Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling



Pilz-Fundliste der Woche 31

Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
Russula	illota	Romagn.	Morsetäubling
Russula	lilacea var.	Quél.	Rotstieliger Reiftäubling
Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
Artomyces	pyxidatus	(Pers.: Fr.) Jül.	Becherkoralle
Bjerkandera	adusta	(Willd.: Fr.) Karst.	Angebrannter Rauchporling
Ganoderma	lipsiense	(Batsch.: Pers.) Atkinson	Flacher Lackporling
Grandinia	granulosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Rauher Zähnchenrindenpilz
Heterobasidion	annosum	(Fr.) Bref.	Wurzelschwamm
Hydnum	repandum v.rufescens	(Fr.) Barla	Rotgelber Stoppelpilz
Hymenoscyphus	albidus	(Roberge) Phill.	Weisses Stengelbecherchen
Hypocrea	rufa	(Pers.: Fr.) Fr.	Scheiben-Krustenkugelpilz
Phanerochaete	sordida	(Karst.) Eriks. & Ryv.	Cremefarbener Zystidenrindenpilz
Polyporus	tuberaster	(Jacq.: Pers.) Fr.	Sklerotien-Porling
Pycnoporellus	fulgens	(Fr.) Donk	Leuchtender Weichporling
Pycnoporus	cinnabarinus	(Jacq.: Fr.) Karst.	Zinnoberrote Tramete
Rogersella	sambuci	Liberta et Navas	Weisser Holunderrindenpilz
Skeletocutis	nivea	(Jungh.) Keller	Schneeweisser Feinporling
Trametes	gibbosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Buckel-Tramete
Tulasnella	violea	(Quél.) Bourdot er Galzin	Lilafarbener Wachskrustenpilz
Xerocomus	communis	(Bulliard) Bon	Eichen-Filzröhrling

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

Hohenbuehelia mastrucata | Pelziger Muscheling

Pilze der Woche 32

Rhodocybe nitellina | *Gelbfuchsiger Tellerling*

Standort: Nadel- und Laubwald.
Fruchtkörper: bis 5 cm.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 4,5 µm, gratig-warzig, Septen mit Schnallen, keine Zystiden.
Bemerkungen: Die Hutfarbe, der hygrophane Hut, der in der Mitte etwas niedergedrückt ist, der mehlartige Geruch und Geschmack sind die Hauptmerkmale dieses Pilzes.

Russula vinosa *Weinroter Graustieltäubling*

Standort: Meist im Nadelwald in höheren Lagen.
Fruchtkörper: bis 100 mm.
Mikromerkmale: Sporen 9 x 8 µm, isoliert warzig, mit Primordialhyphen.
Bemerkungen: Dieser Pilz gehört zu den Graustieltäublingen, die im Alter am Stiel und in den Lamellen schwärzen.

Pluteus thomsonii *Graustieliger Aderndachpilz*

Standort: In Wäldern auf totem Holz.
Fruchtkörper: bis 30 mm.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 6 µm, Zystiden z.T. mit ausgezogener Spitze. HDS hymeniform, Cheilocystiden spindelig bis keulig, Pleurozystiden selten. Septen ohne Schnallen.
Bemerkungen: Dieser Pilz unterscheidet sich zu anderen Pluteus-Arten durch die stark adrige Hutdeckschicht sowie durch anders gestaltete Cheilozystiden. Er gehört zu den samtigen Arten wegen der hymeniformen Huthaut.
Foto: Markus Wilhelm@

Rhodocybe nitellina | *Gelbfuchsiger Tellerling*

Russula vinosa | *Weinroter Graustieltäubling*

Pluteus thomsonii | *Graustieliger Aderndachpilz*

Pilz-Fundliste der Woche 32

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
Boletus	radicans	Pers.: Fr.	Bitter-Röhrling
Boletus	satanas	Lenz	Satansröhrling
Boletus	aestivalis	(Paul.) Fr.	Sommersteinpilz
Chalciporus	piperatus	(Bull.: Fr.) Bat.	Pfeffer-Röhrling
Gyroporus	castaneus	(Bull.: Fr.)	Hasen-Röhrling
Leccinum	carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuss
Leccinum	crocipodium	(Letellier) Walting	Gelbporiger Rauhfuss
Suillus	granulatus	(L.: Fr.) Rouss.	Körnchenröhrling
Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe
Amanita	fulva	(Schäffer) Fr.	Rotbrauner Scheidenstreifling
Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
Bolbitius	vitellinus	(Pers.: Fr.) Fr.	Gold-Mistpilz
Callistosporium	elaeodes	(Rom) Bon	Olivbrauner Goldrübling
Callistosporium	luteoolivaceum	(Berk. & M.A. Curt.) Sing.	Gelbblättriger Scheinrübling
Clitocybe	costata	Kühn. & Romagn.	Kerbrandiger Trichterling
Clitocybe	gibba	(Pers.) Kumm.	Ockerbrauner Trichterling
Clitopilus	brunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
Conocybe	lactea	(Lange) Métrod	Milchweisses Samthäubchen
Conocybe	dumentorum	(Velen.) Syrcek	Hecken-Samthäubchen
Crepidotus	applanatus	(Pers.) Kumm.	Gerieftes Stummelfüsschen
Crepidotus	ehrendorferi	Hauskn. & Kris.	Aprikosenfarbenes Stummelfüsschen
Crepidotus	mollis	(Schäff.L Fr.) Staude	Gallertfleischiges Stummelfüsschen
Crepidotus	subverrucisporus	Pil.	Rauhsporges Stummelfüsschen
Entoloma	incarnatofuscescens	(Britz.) Noord.	Lilagrauer Rötling
Flagelloscypha	minutissima	(Korf) Donk	Hängebecherchen
Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
Hohenbuhelia	angustata	(Berk.) Sing.	Schmaler Muscheling
Hohenbuhelia	auriscalpium	(Maire) Singer	Späne-Muscheling

Pilz-Fundliste der Woche 32

Hohenbuhelia	geogenia	(DC.: Fr.) Sing.	Trichterförmiger Muscheling
Hohenbuhelia	mastrucata	(Fr.: Fr.) Sing.	Pelz-Muscheling
Hydropus	atramentosus	(Kbr.) Kotl. & Pouz.	Schwärzender Wasserfuss
Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
Lacrymaria	lacrymabunda	(Bull.: Fr.) Pat.	Tränender Samumpilz
Lentinellus	ursinus	(Fr.) Kühn.	Filziger Zähling
Marasmiellus	ramealis	(Bull.: Fr.) Sing.	Ästchenschwindlng
Marasmiellus	foetidus	(Sow..: Fr.) Ant. et Noord.	Stinkender Zwergschwindling
Marasmius	alliaceus	(Jacq.: Fr.) Fr.	Langstieliger Knoblauchschwindling
Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.)Kotl. et Pouz.	Breitblattrübling
Melanophyllum	haematospermum	(Bull.: Fr.) Kreis.	Blutblättriger Zwergschirmling
Pholiota	tuberculosa	(Schäff.: Fr.)	Rötender Schüppling
Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
Pluteus	chrysophaeus	(Schäff.: Fr.) Quél.	Gelbbrauner Dachpilz
Pluteus	diettrichii	Bresadola	Rissiger Dachpilz
Pluteus	ephebeus	(Fr.: Fr.) Gill.	Graufilziger Dachpilz
Pluteus	leonius	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Löwengelber Dachpilz
Pluteus	podospileus	Sacc. & Cub. in Sacc.	Flockenstieliger Dachpilz
Pluteus	thomsonii	(Berk. & Br.) Dennis	Graustieliger Aderndachpilz
Psathyrella	candolleana	(Fr.: Fr.) Maire	Behangener Faserling
Resubinatus	applicatus	(Batsch: Fr.) Gray	Grauer Zwergseitling
Rhodocybe	nitellina	(Fr.) Sing.	Gelbfuchsiger Tellerling
Simocybe	sumtuosa	(Ort.) Sing.	Üppiger Olivschnitzling
Volvariella	caesiotincta	Orton	Blaugrauer Scheidling
Volvariella	pusilla	(Pers.: Fr.) Sing.	Kleinster Scheidling
Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
Lactarius	glaucescens	Crossl.	Grünender Pfeffermilchling
Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
Lactarius	volemus	(Fr.: Fr.) Fr.	Brätling
Russula	delica	Fr.	Gemeinder Weisstäubling
Russula	heterophylla	(Fr.) Fr.	Grüner Speisetäubling
Russula	illota	Romagn.	Morsetäubling
Russula	integra	(L.:) Fr. ss. Mre.	Braunroter Ledertäubling

Pilz-Fundliste der Woche 32

Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
Russula	solaris	Ferd. et Winge	Sonnentäubling
Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
Russula	violeipes	Quélet	Violettstieliger Brätlingstäubling
Russula	vinosa	Lindblad	Weinroter Graustieltäubling
Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
Cantharellus	friesii	Quél.	Fries´scher Pfifferling
Cerrena	unicolor	(Bulliard: Fr.) Murrill	Aschgrauer Langporenpilz
Eichleriella	deglubens	(Berk. & Britz.) Reid.	Dornige Wachskruste
Fibrodontia	grossypina	Parmasto	Baumwoll-Faserzahn
Fistulina	hepatica	Schäff. ex Fr.	Leberreischling
Fomes	fomentarius	(L.: Fr.) Fr.	Echter Zunderschwamm
Fomitopsis	pinicola	(Fr.) Karst.	Rotbrauner Baumschwamm
Gloeophyllum	odoratum	(Wulf.: Fr.) Imyzeki	Fencheltramete
Helvella	leucomelaena	Schff.	Schwarzweisse Becherlorchel
Hericinum	coralloides	(Scop.) Pers.	Ästiger-Stachelbart
Oligoporus	subcaesius	(David) Dung.	Fastblauer Saftporling
Phellinus	hartigii	(All. & Schn.) Bond.	Tannen-Feuerschwamm
Polyporus	tuberaster	(Jacq.: Pers.) Fr.	Sklerotien-Porling
Steccherinum	ochraceum	(Pers.ap.Gmel.: Fr.) S.F. Gray	Ockerrötlichr Resupinatstacheling
Tomentella	crinalis	(Fr.) Larsen	Haariges Filzgewebe
Trametes	gibbosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Buckel-Tramete
Calvatia	utriformis	(Bul.: Pers.:) Jaap	Hasenbovist
Geastrum	striatum	DC.	Kragen-Erdstern
Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
Calocera	viscosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Klebriger Hörnling
Helvella	elastica	Boud.	Elastische Lorchel
Humaria	hemisphaerica	(Berk. & Br.) Nannf.	Halbkugeliger Borstenbecherling
Hymenoscyphus	albidus	(Roberge) Phill.	Weisses Stengelbecherchen
Hypocrea	lactea	(Fr.) Fr.	Gelblicher Krustenpustelpilz
Hypoxylon	ticinense	Petrini	Keimporus-Kohlenbeere
Scutellinia	hybrida	Sow.	

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

Galerina badipes | Braunfüssiger Häubling
Ähnlich Galerina marginata, auch die Mikromerkmale. Unterschied: die Basidien bei G. badipes sind mehrheitlich 2-sporig.

Pilze der Woche 33

Psathyrella leucotephra | *Ringfaserling*

Standort: Büschelig im Laubwald, an oder in der Nähe von Strünken.
Fruchtkörper: bis 7 cm.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 5 µm, nur Cheilozystiden.
Bemerkungen: Diese nicht häufige Art gleicht P. candoleana gut, hat jedoch einen häutigen Ring.

Mycena pelianthina | *Schwarzgezähnelter Helmling*

Standort: In Laubwäldern.
Fruchtkörper: bis 50 mm.
Mikromerkmale: Sporen 6 x 3 µm.
Bemerkungen: Der Rettichgeruch und die dunkle Lamellenschneide kennzeichnen diesen Pilz gut.

Lepiota brunneoincarnata

Fleischbräunlicher Schirmling

Standort: Er liebt grasige, milde Standorte in Laubstreu.
Fruchtkörper: bis 30 mm.
Mikromerkmale: Sporen 9 x 4,5 µm.
Bemerkungen: Dieser Pilz gehört zu denjenigen Arten mit elliptischen Sporen. (Ovispora). Der Hut ist weisslich und hat konzentrisch angeordnete, weinbraune Schüppchen. Der Stiel hat keinen Ring, jedoch ist er im unteren Teil gürtelartig mit Schüppchen besetzt. Geruch nach Obst. Die Art ist giftig.

Huthaut

Cheilozystiden



Sporen



Das Bild zeigt schön die Veränderlichkeit bei den Faserlingen/Mürblingen beim Altern oder Trocknen
Hier bei Psathyrella leucotephra (beringter Mürbling)

Mycena pelianthina | *Schwarzgezähnelter Helmling*

Lepiota brunneoincarnata | *Fleischbräunlicher Schirmling*

Pilz-Fundliste der Woche 33

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Boletus	aereus	Bull.: Fr.	Schwarzhütiger Steinpilz
Boletus	appendiculatus	Schaeff.	Anhängsel-Röhrling
Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
Boletus	radicans	Pers.: Fr.	Bitter-Röhrling
Boletus	regius	Krombh.	Königs-Röhrling
Boletus	satanas	Lenz	Satansröhrling
Boletus	aestivalis	(Paul.) Fr.	Sommersteinpilz
Chalciporus	piperatus	(Bull.: Fr.) Bat.	Pfeffer-Röhrling
Gyrodon	lividus	(Bull.: Fr.) Sacc.	Erlengrübling
Hygrophoropsis	aurantiaca	(Wulf.) Mre.	Falscher Pfifferling
Leccinum	carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuss
Leccinum	crocipodium	(Letellier) Walting	Gelbporiger Rauhfuss
Leccinum	quercinum	Pilát ex Pilát	Eichen-Rotkappe
Porphyrellus	porphyrosporus	Fr.) Gilbert	Düsterer Röhrling
Suillus	placidus	(Bonord.) Singer	Elfenbein-Röhrling
Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
Xerocomus	communis	(Bulliard) Bon	Eichen-Filzröhrling
Xerocomus	ferrugineus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe (Varietät)
Agaricus	langei	(Møl.) Møl.	Grosssporgiger Blutchampignon
Agaricus	silvaticus	Schäff.: Fr.	Echter Wald-Champignon
Agaricus	pilatianus	Bohus	Gefaltetberingter Egerling
Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
Amanita	pantherina	(DC.: Fr.) Krombh.	Pantherpilz
Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
Amanita	solitaria	(Vittadini) Quélet	Meergrüner Wulstling
Clitocybe	gibba	(Pers.) Kumm.	Ockerbrauner Trichterling
Clitopilus	brunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
Entoloma	excentricum	Bres.	Marmorierter Rötling
Galerina	badipes	(Fr.) Kühn.	Braunfüssiger Häubling
Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
Gymnopus	dryophylla	(Bull.: Fr.) Kumm.	Waldfreund-Rübling
Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
Hohenbuhelia	geogenia	(DC.: Fr.) Sing.	Trichterförmiger Muscheling

Pilz-Fundliste der Woche 33

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Hypholoma	radicosum	E.Lange	Wurzelnder Schwefelkopf
Inocybe	riomosa	(Bull.: Fr.) Kummer	Kegeliger Risspilz
Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
Lepiota	brunneoincarnata	Chod. & Mart.	Fleischbräunlicher Schirmling
Lepiota	cristata	(Bolton.: Fr.) Kummer	Stink-Schirmling
Lepiota	ventriosospora	Reid	Gelbwolliger Schirmling
Lepista	densifolia	(Favre) Sing.	Dichtblättriger Rötelritterling
Lepista	flaccida	(Sowerby Fries) Patouillard	Fuchsiger Rötelritterling
Lyophyllum	deliberatum	(Britz.) Kreisel	Rautensporiger Raseling
Lyophyllum	paelochroum	Clmç.	Lemfarbener Schwärzling
Marasmius	torquescens	Quél.	Ledergelber Schwindling
Mycena	pelianthina	(Fr.: Fr.) Quél.	Schwarzgezähnelter Helmling
Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
Mycena	renati	Quélet	Gelbstieliger Nitrat-Helmling
Mycena	sanguinolenta	(Alb.-Schw.: Fr.) Kumm.	Purpurschneidiger Helmling
Pholiota	astragalina	(Fr.) Singer	Safranroter Schüppling
Psathyrella	leucotephra	(Berk. & Br.) Ort.	Ringfaserling
Psathyrella	piluliformis	(Bull.: Fr.) Ort.	Wässeriger Faserling
Psathyrella	pygmea	(Bull.: Fr.) Sing.	Zwerg.Faserling
Tricholoma	tigrinum	Kumm.	Tiger-Ritterling
Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
Tricholomopsis	decora	(Fr.) Sing.	Olivgelber Holzritterling
Lactarius	aurantiacus	(Pers.: Fr.) Gray	Echter Orange-Milchling
Lactarius	azonites	(Bull.) Fr.	Rauchfarbener Rosamilchling
Lactarius	evosmus	Kühn. & Rom.	Blasser Zonenmilchling
Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
Lactarius	volemus	(Fr.: Fr.) Fr.	Brätling
Russula	adulterina	Fr. ss. Rom.	Scharfer Brauntäubling
Russula	aurea	Pers.	Goldtäubling
Russula	carpini	Gir. & Hein.	Hainbuchentäubling
Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
Russula	delica	Fr.	Gemeinder Weisstäubling
Russula	illota	Romagn.	Morsetäubling

Pilz-Fundliste der Woche 33

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Russula	integra	(L.:) Fr. ss. Mre.	Braunroter Ledertäubling
Russula	laurocerasi	Melzer	Mandeltäubling
Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
Russula	maculata	Quél. in Quél. & Roze	Gefleckter Täubling
Russula	nauseosa	(Pers.) Fr..	Geriefter Weichtäubling
Russula	pseudointegra	Arn. & Gor.	Ockerblättriger Zinnobertäubling
Russula	risigallina	(Batsch) Kuyp. & v. Vuu.	Wechselfarbiger Dottertäubling
Russula	romellii	Maire	Weissstieliger Ledertäubling
Russula	turci	Bres.	Jodoformtäubling
Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling
Bjerkandera	adusta	(Willd.: Fr.) Karst.	Angebrannter Rauchporling
Bourdotia	galzinii	(Bres.) Trott.	
Cantharellus	friesii	Quél.	Fries´scher Pfifferling
Ceriporia	purpurea	(Fr.) Donk	Purpurner Wachsporling
Climacocystis	borealis	(Fr.) Kotl. & Pouz.	Nordischer Porling
Polyporus	badius	(Pers.: Gray) v. Schw.	Kastanienbrauern Porling
Sarcodon	imbricatus	(L.: Fr.) Karst.	Habichtsstacheling
Lycoperdon	echinatum	Pers.: Pers.	Igel-Stäubling
Scleroderma	areolatum	Ehrenb.	Gefelderter Kartoffelbovist

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

.

Cortinarius opimus | Unförmiger Dickfuss

Pilze der Woche 34

Amanita phalloides und var. alba

Grüner Knollenblätterpilz und die weisse Form

Standort: In Laubwäldern, Haselsträuchern.
Fruchtkörper: Hut bis 100 mm. Stiel mit häutigem, oberseits gerieftem Ring. Stielbasis mit abstehender Volva.
Mikromerkmale: Sporen 10 x 7 µm, Melzer+, KOH-Reaktion negativ.
Bemerkungen: Das Foto zeigt den Grünen Knollenblätterpilz und die weisse Varietät (beide KOH neg.) Der Frühlingsknollenblätterpilz (Amanita verna) hat eine gelbe KOH-Reaktion, ebenfals der Spitzhütige Knollenblätterpilz (Amanita virosa). Als Standort wird meistens Laubwälder angegeben, aber es gibt auch Funde bei Haselsträuchern. Der Pilz ist tötlich giftig.
Foto: Mauro Seggiani

Nyctalis parasitica | *Beschleierter Zwitterling*

Standort: Auf faulenden Fruchtkörpern von anderen Pilzen.
Fruchtkörper: Hut bis 25 mm. Geruch nach Mehl.
Mikromerkmale: Sporen 6 x 4 µm, mit glatten Chlamydosporen, 14 x 9 µm.
Bemerkungen: Ein weiterer, auf alten Fruchtkörpern von Pilzen lebende Art, ist N. asterospora, mit pulverigen Fruchtkörpern und anderen Mikromerkmalen.

Cortinarius nemorensis | *Verfärbender Schleimkopf*

Standort: In Laubwäldern.
Fruchtkörper: Hut bis 100 mm. Geruch schwach erdig. Fleisch mit KOH lebhaft gelb.
Mikromerkmale: Sporen 11 x 6 µm.
Bemerkungen: Er ist wohl der Doppelgänger von C. variecolor mit starkem Erdgeruch im Nadelwald. C. largus, auch im Laubwald, hat hellere Hüte.

Amanita phalloides und var. alba | *Grüner Knollenblätterpilz und die weisse Form*

Nyctalis parasitica | *Beschleierter Zwitterling*

Cortinarius nemorensis | *Verfärbender Schleimkopf*

Pilz-Fundliste der Woche 34

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Boletinus	cavipes	(Klotzsch) Kalchbrenner	Hohlfuss-Schuppenröhrling
Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
Boletus	luridus	Schäff.: Fr.	Netzstieliger Hexenröhrling
Boletus	queletii	Schulzer	Glattstieliger Hexenröhrling
Boletus	satanas	Lenz	Satansröhrling
Chalciporus	piperatus	(Bull.: Fr.) Bat.	Pfeffer-Röhrling
Leccinum	carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuss
Leccinum	quercinum	Pilát ex Pilát	Eichen-Rotkappe
Leccinum	scabrum	(Bull.: Fr.) Gray	Birkenpilz
Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
Xerocomus	subtomentosus var. ferrugineus		(L.: Fr.) Quél. Ziegenlippe (Varietät)
Agaricus	silvaticus	Schäff.: Fr.	Echter Wald-Champignon
Agaricus	silvicola	(Vittad.) Sacc.	Dünnfleischiger Anis-Egerling
Amanita	ceciliae	Berkeley et Broome) Bas	Riesen-Streifling
Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
Amanita	junquillea	Quélet	Narzissengelber Wulstling
Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
Amanita	phalloides var. alba	(Fr.) Link	Weisser Knollenblätter-Pilz
Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
Amanita	vaginata	(Bull.) Vitt.	Grauer Scheidenstreifling
Clitocybe	costata	Kühn. & Romagn.	Kerbrandiger Trichterling
Clitocybe	gibba	(Pers.) Kumm.	Ockerbrauner Trichterling
Clitocybe	odora	(Bulliard: Fr.) Kumm.	Grüner Anistrichterling
Clitocybe	phaeophthalma	(Pers.) Kp.	Ranziger Trichterling
Clitopilus	brunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
Cortinarius	bolaris	(Pers.: Fr.) Fr.	Rotschuppiger Rauhkopf
Cortinarius	duracinus	Fr.	Spindeliger Wasserkopf
Cortinarius	malicorius	Fr.	Orangerandiger Hautkopf
Cortinarius	nemorensis	(Fr.) Lge.	Verfärbender Schleimkopf
Cortinarius	purpurascens	Fr.	Purpurfleckender Klumpfuss

Pilz-Fundliste der Woche 34

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Cortinarius	rubellus	Cooke	Spitzgebuckelter Rauhkoopf
Cortinarius	sommerfeltii	Høiland	Orangeblättriger Hautkopf
Cortinarius	trivialis	Lge.	Natterstieliger Schleimfuss
Cortinarius	caesiocortinatus	J.Schäffer	Rudlichsporiger Klumpfuss
Cortinarius	semisanguineus	(Fr.)	Blutblättriger Hautkopf
Entoloma	rhodopolium	(Fr.: Fr.) Kummer	Niedergedrückter Rötling
Entoloma	sinuatum	(Bull.: Pers.: Fr.) Kumm.	Riesen-Rötling
Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
Gymnopus	fusipes	(Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling
Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
Hygrophoropsis	aurantiaca	(Wulff.: Fr.) Maire	Falscher Pfifferling
Hygrophorus	penarius	Fr.	Trockener Schneckling
Inocybe	cookei	Bres.	Knolliger Risspilz
Inocybe	riomosa	(Bull.: Fr.) Kummer	Kegeliger Risspilz
Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
Lepiota	castanea	Quél. (inkl. L. ignipes Locq. ex Bon	Kastanienbrauner Schirmling
Lepiota	cristata	(Bolton.: Fr.) Kummer	Stink-Schirmling
Lepiota	ventriosospora	Reid	Gelbwolliger Schirmling
Macrolepiota	mastoidea	(Fr.) Sing.	Zitzenschirmling
Macrolepiota	procera	(Scop.: Fr. Sg.	Parasol
Mycena	galericulata	(Scop.:Fr.) Gray	Rosablättriger Helmling
Mycena	pelianthina	(Fr.: Fr.) Quél.	Schwarzgezähnelter Helmling
Mycena	renati	Quélet	Gelbstieliger Nitrat-Helmling
Nyctalis	parasitica	(Bull.: Fr.) Fr.	Beschleierter Zwitterling
Pluteus	leonius	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Löwengelber Dachpilz
Psathyrella	candolleana	(Fr.: Fr.) Maire	Behangener Faserling
Psathyrella	leucotephra	(Berk. & Br.) Ort.	Ringfaserling
Tricholoma	tigrinum	Kumm.	Tiger-Ritterling
Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
Lactarius	azonites	(Bull.) Fr.	Rauchfarbener Rosamilchling
Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
Gattung	Art	Autor	Deutsch

Pilz-Fundliste der Woche 34

Lactarius	intermedius	(Krombh.) Cke.	Grubiger Weisstannenmilchling
Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
Lactarius	quietus	(Fr.) Fr.	Eichenmilchling
Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
Russula	aurea	Pers.	Goldtäubling
Russula	chloroides	(Krombh.) Bres.	Schmalblättriger Weisstäubling
Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
Russula	delica	Fr.	Gemeinder Weisstäubling
Russula	farinipes	Romell in Britz.	Mehlstieltäubling
Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
Russula	integra	(L.:) Fr. ss. Mre.	Braunroter Ledertäubling
Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
Russula	pseudointegra	Arn. & Gor.	Ockerblättriger Zinnobertäubling
Russula	solaris	Ferd. et Winge	Sonnentäubling
Russula	turci	Bres.	Jodoformtäubling
Russula	versicolor	Schäff.	Vielfarbener Täubling
Russula	xerampelina	Schäff.: Fr.	Roter Heringstäubling
Albatrellus	cristatus	(Schäff.: Fr.) Kotl. & Pouz.	Grüner Kammporling
Bjerkandera	adusta	(Willd.: Fr.) Karst.	Angebrannter Rauchporling
Cantharellus	melanoxeros	Desm.	Gelbvioletter Pfifferling
Craterellus	cornucopioides	Pers.	Totentrompete
Fistulina	hepatica	Schäff. ex Fr.	Leberreischling
Polyporus	badius	(Pers.: Gray) v. Schw.	Kastanienbrauern Porling
Telephora	palmata	Scop.: Fr.	Stinkender Warzenpilz
Calvatia	exipuliformis	(Schäff.: Pers.) Perd.	Beutelstäubling
Lycoperdon	mammaeforme	Pers.	Flocken-Stäubling
Tremella	mesenterica	Retz. ex Hook.	Goldgelber Zitterling

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze und die Pilztafeln ab S.13) befinden sich auf dieser HP. Fotos ohne Autor-Angabe sind vom Webbetreuer K. Minder.

Ramaria subbotrytis | Rosenrote Koralle (Photo: Markus Wilhelm

Pilze der Woche 35

Cortinarius purpurascens
Purpurfleckender Klumpfuss

Standort: Nadelwald.
Fruchtkörper: Hut bis 110 mm.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 5 µm, mandelförmig, mässig warzig.
Bemerkungen: Lamellen auf Druck dunkler verfärbend. KOH auf Huthaut rotbraun.

Cortinarius cotoneus | *Olivbrauner Raukopf*

Standort: Laubwald.
Fruchtkörper: Hut bis 100 mm.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 7 µm, rundlich, mässig warzig.
Bemerkungen: Junge Fruchtkörper haben eine oliv-grüne Farbe, alte werden dunkel-oliv. Der ähnliche C. melanotus hat nicht rundliche Sporen.

Lactarius romagnesii | *Dunkler Korallenmilchling*

Standort: Laubwald.
Fruchtkörper: Hut bis 90 mm.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 7 µm, flügelsporig.
Bemerkungen: Er unterscheidet sich von L. picinus durch den gerippten Hutrand, das Vorkommen im Laubwald und die Milch zieht beim Betupfen Fäden. Geruch etwas fischartig.

Inonotus cuticularis | *Flacher Schillerporling*

Standort: Lebende Laubbäume.
Fruchtkörper: Hut bis 220 mm.
Mikromerkmale: Sporen 7 x 5,5 µm, bräunlich. Monomitisch, Septen ohne Schnallen, mit Setae, besonders markant in der Hutdeckschicht (siehe Bild).
Bemerkungen: Bei makroskopischer Unsicherheit, sollte man die Hutdeckschicht im Mikroskop betrachten, die sehr eindrücklich ist.
Photos: Markus Wilhelm.

Cortinarius purpurascens | *Purpurfleckender Klumpfuss*

Cortinarius cotoneus | *Olivbrauner Raukopf*

Lactarius romagnesii | *Dunkler Korallenmilchling*

Inonotus cuticularis| *Flacher Schillerporling*

Setae im Hutfilz, in Wasser

10 µm

Inonotus cuticularis| *Flacher Schillerporling*

Pilz-Fundliste der Woche 35

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Boletus	aereus	Bull.: Fr.	Schwarzhütiger Steinpilz
Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
Boletus	fechtneri	Velen.	Silber-Röhrling
Boletus	queletii	Schulzer	Glattstieliger Hexenröhrling
Boletus	radicans	Pers.: Fr.	Bitter-Röhrling
Boletus	regius	Krombh.	Königs-Röhrling
Boletus	satanas	Lenz	Satansröhrling
Boletus	aestivalis	(Paul.) Fr.	Sommersteinpilz
Chalciporus	piperatus	(Bull.: Fr.) Bat.	Pfeffer-Röhrling
Gomphidius	glutinosus	(Schäff.: Fr.) Fr.	Kuhmaul
Leccinum	aurantiacum	(Bull.) Gray	Espen-Rotkappe
Leccinum	scabrum	(Bull.: Fr.) Gray	Birkenpilz
Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
Suillus	variegatus	Sw.: Fr. Kuntze	Sandröhrling
Suillus	viscidus	(L.) Rouss.	Grauer Lärchenröhrling
Tylopilus	felleus	(Bull.: Fr.) Karst.	Gallenröhrling
Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
Xerocomus	communis	(Bulliard) Bon	Eichen-Filzröhrling
Xerocomus	porosporus	(Imler ex Romero et Bon) Contu	Düsterer Rotfuss-Filzröhrling
Xerocomus	rubellus	Krombholz) Quélet	Blutroter Filzröhrling
Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe
Xerocomus	subtoment. var. ferrug.	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe (Varietät)
Agaricus	vaporarius	(Vitt.) Mos.	Kompost-Champignon
Amanita	caesarae	(Scop.) Pers.	Kaiserling
Amanita	ceciliae	Berkeley et Broome) Bas	Riesen-Streifling
Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
Amanita	fulva	(Schäffer) Fr.	Rotbrauner Scheidenstreifling
Amanita	junquillea	Quélet	Narzissengelber Wulstling
Amanita	mairei	Foley	Silbergrauer Scheidenstreifling
Amanita	muscaria	(L.) Hook.	Fliegenpilz
Amanita	pantherina	(DC.: Fr.) Krombh.	Pantherpilz

Pilz-Fundliste der Woche 35

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
Amanita	porphyria	Alb. & Schw.: Fr.	Porphyrbrauner Wulstling
Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
Amanita	strobiliformis	(Paul.: Vitt.) Bertillon	Fransiger Wulstling
Amanita	muscaria	(L.) Pers.	Fliegenpilz
Clitocybe	odora	(Bulliard: Fr.) Kumm.	Grüner Anistrichterling
Cortinarius	anomalus	(Fr.: Fr.) Fr.	Braunvioletter Dickfuss
Cortinarius	argutus	Fr.	Spitzbasiger Schleimkopf
Cortinarius	bolaris	(Pers.: Fr.) Fr.	Rotschuppiger Rauhkopf
Cortinarius	cinnabarinus	Fr.	Zinnoberroter Wasserkopf
Cortinarius	cinnamomeus	Fr.	Zimt-Hautkopf
Cortinarius	cotoneus	Fr.	Olivbrauner Rauhkopf
Cortinarius	crassus	(Fr.)	Trockener Schleimkopf
Cortinarius	delibutus	Fr.	Violettblättriger Schleimfuss
Cortinarius	hinnuleus	(Sow.) Fr.	Erdigriechender Gürtelfuss
Cortinarius	infractus	(Pers.: Fr.) Fr.	Bitterer Schleimfuss
Cortinarius	largus	Fr.	Blasser Schleimkopf
Cortinarius	olivaceofuscus	Kühn.	Hainbuchen-Hautkopf
Cortinarius	purpurascens	Fr.	Purpurfleckender Klumpfuss
Cortinarius	renidens	Fr.	Quitten-Wasserkopf
Cortinarius	torvus	(Bull.: Fr.) Fr.	Wohlriechender Gürtelfuss
Cortinarius	traganus	Fr.	Lila-Dickfuss
Cortinarius	vibratilis	(Fr.) Fr.	Galliger Schleimfuss
Cortinarius	violaceus	(L.: Fr.) Gray	Dunkelvioletter Dickfuss
Cortinarius	epipoleus	Fr.	Stahlblauer Kleinspor-Schleimfuss
Entoloma	rhodopolium	(Fr.: Fr.) Kummer	Niedergedrückter Rötling
Entoloma	sinuatum	(Bull.: Pers.: Fr.) Kumm.	Riesen-Rötling
Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
Gymnopus	distorta	(Fr.) Quél.	Drehstieliger Rübling
Gymnopus	ocior	(Pers.) Antonin et Noordeloons	Gelbblättriger Rübling
Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
Hygrophorus	eburneus	(Bull:. Fr.) Fr.	Elfenbein-Schneckling

Pilz-Fundliste der Woche 35

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Hygrophorus	nemoreus	(Pers.: Fr.) Fr.	Hain-Schneckling
Hygrophorus	penarius	Fr.	Trockener Schneckling
Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
Inocybe	adequata	(Britz.) Sacc.	Weinrötlicher Risspilz
Inocybe	cookei	Bres.	Knolliger Risspilz
Inocybe	fraudans	(Britz.) Sacc.	Birnen-Risspilz
Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
Inocybe	leucoblema	Kühner	Silbrigbeschleierter Risspilz
Inocybe	petiginosa	(Fr.: Fr.) Gillet	Graugezonter Zwergrisspilz
Inocybe	riomosa	(Bull.: Fr.) Kummer	Kegeliger Risspilz
Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
Lacrymaria	lacrymabunda	(Bull.: Fr.) Pat.	Tränender Samumpilz
Lentinellus	cochleatus	(Pers.: Fr.) Karst.	Äniszähling
Lepiota	clypeolaria	(Bull.: Fr.) Kumm.	Wolliggestiefelter Schirmling
Lepiota	cristata	(Bolton.: Fr.) Kummer	Stink-Schirmling
Lyophyllum	decastes	(Fr.: Fr.) Singer	Brauner Büschelrasling
Marasmius	cohaerens	(Pers.: Fr.) Fr.	Hornstieliger Schwindling
Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.)Kotl. et Pouz.	Breitblattrübling
Pholiota	astragalina	(Fr.) Singer	Safranroter Schüppling
Pholiota	gummosa	(Lasch.: Fr.) Sing.	Strohblasser Schüppling
Pholiota	tuberculosa	(Schäff.: Fr.)	Rötender Schüppling
Pluteus	atromarginatus	(Sing.) Kühn.	Schwarzschneidiger Dachpilz
Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
Pluteus	leonius	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Löwengelber Dachpilz
Pluteus	plautus	(Weinm.) Gill.	Samtfüssiger Dachpilz
Psathyrella	piluliformis	(Bull.: Fr.) Ort.	Wässeriger Faserling
Schizophyllum	commune	Fr.: Fr.	Gemeiner Spaltblättling
Tricholoma	luridum	(Schäff.: Fr.) Quél.	Graublättriger Ritterling
Tricholoma	scalpturatum	(Fr.) Quél.	Gilbender Erd-Ritterlig
Tricholoma	sulphureum	(Bull.: Fr.) Kumm.	Schwefel-Ritterling
Tricholoma	tigrinum	Kumm.	Tiger-Ritterling
Tricholoma	umbonatum	Lge. ex Clç. & Bon	Buckliger Ritterling

Pilz-Fundliste der Woche 35

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Tricholoma	ustale	(Fr.: Fr.) Kumm.	Brandiger Ritterling
Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
Tricholomopsis	decora	(Fr.) Sing.	Olivgelber Holzritterling
Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
Lactarius	azonites	(Bull.) Fr.	Rauchfarbener Rosamilchling
Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
Lactarius	fluens	Boud.	Braunfleckender Milchling
Lactarius	fulvissimus	Rom. i. Kühn. & Rom.	Orangefuchsiger Milchling
Lactarius	intermedius	(Krombh.) Cke.	Grubiger Weisstannenmilchling
Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
Lactarius	quietus	(Fr.) Fr.	Eichenmilchling
Lactarius	romagnesii	Bon	Kerbrandiger Korallenmilchling
Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
Lactarius	turpis	(Weinm.) Fr.	Olivbrauner Milchling
Russula	anthracina	Romagn.	Lachsblättriger Schwärztäubling
Russula	aurea	Pers.	Goldtäubling
Russula	badia	Quél.	Zedernholztäublig
Russula	chloroides	(Krombh.) Bres.	Schmalblättriger Weisstäubling
Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
Russula	cyanoxantha fo. pelt.	R. Maire.: Singer	Grüner Frauentäubling
Russula	exalbicans	(Pers.) Melz. & Zvara	Verblassender Täubling
Russula	farinipes	Romell in Britz.	Mehlstieltäubling
Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
Russula	insignis	Quél.	Milder Kammtäubling
Russula	integra	(L.:) Fr. ss. Mre.	Braunroter Ledertäubling
Russula	ionochlora	Romagn.	Cremeblättriger Bunttäubling
Russula	laurocerasi	Melzer	Mandeltäubling
Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
Russula	luteotacta	Rea	Gelbfleckender Täubling
Russula	mairei	Singer	Buchen-Speitäubling
Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling



Pilz-Fundliste der Woche 35

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
Russula	pseudointegra	Arn. & Gor.	Ockerblättriger Zinnobertäubling
Russula	raoultii	Quél.	Blassgeber Täubling
Russula	turci	Bres.	Jodoformtäubling
Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
Russula	xerampelina	Schäff.: Fr.	Roter Heringstäubling
Cantharellus	auroa	(Batsch) Kuyp.	Duftender Gabeling, Goldfüsschen
Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
Cantharellus	friesii	Quél.	Fries´scher Pfifferling
Cantharellus	melanoxeros	Desm.	Gelbvioletter Pfifferling
Cantharellus	tubaeformis	Fr.	Durchbohrter Leistling
Cantharellus	tubaeformis var. lutes.	(Fr.) Gill.	Gelbstieliger Trompetenpfifferling
Clavariadelphus	pistilaris	(Fr.) Donk	Herkuleskeule
Climacocystis	borealis	(Fr.) Kotl. & Pouz.	Nordischer Porling
Craterellus	cornucopioides	Pers.	Totentrompete
Dentropolyporus	umbellatus	(Pers.: Fr.) Jül.	Eichhase
Hydnellum	peckii	Banker in Peck	Scharfer Korkstacheling
Inonotus	cuticularis	(Bull.: Fr.) Karst.	Flacher Schillerporling
Inonotus	dryadeus	(Pers.: Fr.) Murrill	Tropfender Schillerporling
Pseudocraterellus	sinuosus	(Fr.: Fr.) Reid.	Krauser Leistling
Pycnoporellus	fulgens	(Fr.) Donk	Leuchtender Weichporling
Ramaria	botrytis	(Pers.: Fr.) Ricken	Hahnenkamm
Ramaria	formosa	(Pers.: Fr.) Quél.	Dreifarbene Koralle
Ramaria	subbotrytis	(Koker) Corner	Hahnenkammähnliche Koralle
Sarcodon	imbricatus	(L. ex Fr.) Karst.	Habichtspilz
Telephora	penicillata	Pers.: Fr.	Pinsel-Warzenpilz
Calvatia	exipuliformis	(Schäff.: Pers.) Perd.	Beutelstäubling
Lycoperdon	echinatum	Pers.: Pers.	Igel-Stäubling
Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
Helvella	crispa	(Bull. ex St. Aman) Boud.	Herbstlorchel
Scutellinia	scutellata	(Fuck.) Boud.	Holz-Schildborstling

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze und die Pilztafeln ab S.13) befinden sich auf dieser HP. Fotos ohne Autor-Angabe sind vom Webbetreuer K. Minder.

Agaricus augustus | Braunschuppiger Riesen-Egerling Foto: Mauro Seggiani

Pilze der Woche 36

Boletus queletii | *Glattstieliger Hexenröhrling*

Standort: Laubwald.
Fruchtkörper: Hut bis 110 mm.
Mikromerkmale: Sporen 12 x 5,5 µm.
Bemerkungen: Er gehört zu denjenigen Hexenröhrlingen (rotporige Röhrlinge) mit glattem Stiel, der manchmal im untersten Teil ein Netz aufweisen kann.

Cortinarius orellanus | *Orangefuchsiger Raukopf*

Standort: Laubwald.
Fruchtkörper: Hut bis 60 mm.
Mikromerkmale: Sporen 9 x 5,5 µm, elliptisch bis mandelförmig.
Bemerkungen: Der körnige Hut, der kupferfarbene Stiel mit wenig Velum kennzeichen diesen gefährlich Giftpilz.

Rozites caperata | *Reifpilz*

Standort: Nadelwald.
Fruchtkörper: Hut bis 100 mm.
Mikromerkmale: Sporen 11 x 8 µm.
Bemerkungen: Der gerunzelte mit einem Reif überdeckten Hut, der geteilte Ring, der faserige Stiel, der angenehme Geruch und Geschmack sind die wichtigsten Merkmale dieses Pilzes. Verwechslungen währen möglich, wenn der Ring nicht mehr vorhanden ist, mit Cortinarius diabolicus.

Inonotus dryadeus | *Tropfender Schillerporling*

Standort: An lebenden Eichen.
Fruchtkörper: Hut bis 250 mm.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 6 µm mit kleinen Setae.
Bemerkungen: Dieser Pilz hat im Wachstumstadium auf dem Hut rotbraune Guttationstropfen. Das Hymenophor ist fein porig, weisslich.

.

Boletus queletii | *Glattstieliger Hexenröhrling*

Cortinarius orellanus | *Orangefuchsiger Raukopf*

Rozites caperata | *Reifpilz*

Inonotus dryadeus | *Tropfender Schillerporling*

Pilz-Fundliste der Woche 36

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
Boletus	luridus	Schäff.: Fr.	Netzstieliger Hexenröhrling
Boletus	depilatus	Redeuilh	Gefleckthütiger Röhrling
Boletus	fechtneri	Velen.	Silber-Röhrling
Boletus	queletii	Schulzer	Glattstieliger Hexenröhrling
Leccinum	carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuss
Pulveroboletus	gentilis	(Quél.) Pouzar	Goldporiger Röhrling
Xerocomus	rubellus	(Kromb..: Quélet)	Blutroter Filz-Röhrling
Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe
Agaricus	aestivalis	(Møl.) Pil.	Sommer-Egerling
Agaricus	pilatianus	Bohus	Gefaltetberingter Karbol-Egerling
Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
Amanita	strobiliformis	(Paul.: Vitt.) Bertillon	Fransiger Wulstling
Amanita	ceciliae	Berkeley et Broome) Bas	Riesen-Streifling
Amanita	pantherina	(DC.: Fr.) Krombh.	Pantherpilz
Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
Armillaria	mellea	(Val.: Fr.) Kummer	Honiggelber Hallimasch
Calocybe	chrysenteron	(Bull.: Fr.) Sing.: Bon	Dottergelber Schönkopf
Clitocybe	odora	(Bulliard: Fr.) Kumm.	Grüner Anistrichterling
Cortinarius	anomalus	(Fr.: Fr.) Fr.	Braunvioletter Dickfuss
Cortinarius	bolaris	(Pers.: Fr.) Fr.	Rotschuppiger Rauhkopf
Cortinarius	brunneus	(Pers.: Fr.) Fr.	Dunkelbrauner Gürtelfuss
Cortinarius	odorifer	Britz	Anis-Klumpfuss
Cortinarius	variecolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf
Cortinarius	violaceus	(L.: Fr.) Gray	Dunkelvioletter Dickfuss
Cortinarius	argutus	Fr.	Spitzbasiger Schleimkopf
Cortinarius	cinnabarinus	Fr.	Zinnoberroter Wasserkopf
Cortinarius	crassus	(Fr.)	Trockener Schleimkopf
Cortinarius	elegantior	(Fr.) Fr.	Strohgelber Klumpfuss
Cortinarius	hinnuleus	(Sow.) Fr.	Erdigriechender Gürtelfuss
Cortinarius	infractus	(Pers.: Fr.) Fr.	Bitterer Schleimfuss

Pilz-Fundliste der Woche 36

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Cortinarius	largus	Fr.	Blasser Schleimkopf
Cortinarius	nemorensis	(Fr.) Lge.	Verfärbender Schleimkopf
Cortinarius	ophiopus	Peck	Schlangenfüssiger Schleimkopf
Cortinarius	orellanus	(Fr.) Fr.	Orangefuchsiger Rauhkopf
Cortinarius	purpurascens	Fr.	Purpurfleckender Klumpfuss
Cortinarius	traganus	Fr.	Lila-Dickfuss
Cortinarius	vulpinus	(Vel.) Hry.	Gilbender Fuchs-Seidenkopf
Echinoderma	asperum	(Pers.: Fr.) Bon	Spitzschuppiger Stachelschirmling
Entoloma	griseoluridum	(Kühn. ex Noord.	Olivgrauer Rötling
Entoloma	lividoalbum	(Kühn. & Rom.) Kubicka	Weisstieliger Rötling
Entoloma	rhodopolium	(Fr.: Fr.) Kummer	Niedergedrückter Rötling
Entoloma	rhodopolium var. nid.	(Fr.)Nordel./Kumm.	Alkalischer Rötling
Entoloma	sinuatum	(Bull.: Pers.: Fr.) Kumm.	Riesen-Rötling
Gymnopus	butyracea	(Bull.: Fr.) P. Kumm.	Butterrübling
Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
Helvella	atra	Holmskjold: Fr.	Schwarze Lorchel
Hemimycena	cucullata	(Pers.: Fr.) Sing.	Gipsweisser Scheinhelmling
Hohenbuhelia	petaloides	(Bull.: Fr.) Quél.	Erd-Muscheling
Hygrophorus	chrysodon	(Batsch.: Fr.) Fr	Goldzahn-Schneckling
Hygrophorus	eburneus	(Bull:. Fr.) Fr.	Elfenbein-Schneckling
Hygrophorus	cossus	(Sow. ex Fr.) Fr.	Verfärbender Schneckling
Hygrophorus	erubescens	(Fr.: Fr.) Fr.	Rasiger Purpurschneckling
Hygrophorus	penarius	Fr.	Trockener Schneckling
Hygrophorus	russula	(Schäff.: Fr.) Quél.	Geflecktblättriger Purpurschneckling
Hygrophorus	chrysodon	(Batsch: Fr.) Fr.	Goldzahn-Schneckling
Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
Hypholoma	radicosum	E.Lange	Wurzelnder Schwefelkopf
Inocybe	fraudans	(Britz.) Sacc.	Birnen-Risspilz
Inocybe	fuscidula	Vel.	Braunstreifiger Risspilz
Inocybe	phaeocomis	(Pers.) Kuyp.	Braunschopfiger Risspilz
Inocybe	riomosa	(Bull.: Fr.) Kummer	Kegeliger Risspilz
Inocybe	terrigena	(Fr.) Kuyp.	Schuppenstieliger Risspilz
Inocybe	adequata	(Britz.) Sacc.	Weinrötlicher Risspilz

Pilz-Fundliste der Woche 36

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Inocybe	corydalina	Quél.	Grünbuckliger Risspilz
Inocybe	haemacta	(Berk. & Cke.) Sacc.	Grünroter Risspilz
Inocybe	phaeodisca	Kühn.	Braunscheibiger Risspilz
Inocybe	rimosa	(Bull.: Fr:) Kummer	Kegeliger Risspilz
Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
Lepiota	castanea	Quél. (inkl. L. ignipes Locq. ex Bon	Kastanienbrauner Schirmling
Lepiota	subincarnata	Lge.	Fleischfarbener Schirmling
Lepiota	ventriosospora	Reid	Gelbwolliger Schirmling
Lepista	glaucocana	(Bres.) Sing.	Blassblauer Rötelritterling
Lyophillum	amariusculum	Clémençon	Bitterlicher Rasling
Lyophyllum	loricatum	(Fr.) Kühn.	Gepanzerter Rasling
Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.)Kotl. et Pouz.	Breitblattrübling
Mycena	galericulata	(Scop.:Fr.) Gray	Rosablättriger Helmling
Omphalina	acerosa	(Fr.) Lange	Muschelnabeling
Oudemansiella	mucida	(Schrad. ex Fr.) v.H.	Beringter Schleimrübling
Pholiota	astragalina	(Fr.) Singer	Safranroter Schüppling
Pholiota	flammans	(Fr.:) Kummer	Feuerschüppling
Pluteus	leonius	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Löwengelber Dachpilz
Rhodocybe	nitellina	(Fr.) Sing.	Gelbfuchsiger Tellerling
Rhodocybe	melleopallens	P.D. Ort.	Honigbrauner Tellerling
Rozites	caperatus	(Pers.: Fr.) P. Karst.	Zigeunerpilz
Sericeomyces	serenus	(Fr.) Heinem.	Weisser Seidenschirmling
Tricholoma	luridum	(Schäff.: Fr.) Quél.	Graublättriger Ritterling
Tricholoma	scalpturatum	(Fr.) Quél.	Gilbender Erd-Ritterlig
Tricholoma	pseudonicticans	Bon	Blassfleischiger Fichtenritterling
Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
Tricholoma	sejunctum	(Sow.: Fr.) Quél.	Grüngelber Ritterling
Tricholoma	sulphureum	(Bull.: Fr.) Kumm.	Schwefel-Ritterling
Tricholomopsis	decora	(Fr.) Sing.	Olivgelber Holzritterling
Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling

Pilz-Fundliste der Woche 36

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Lactarius	deterrimus	Gröger	Fichtenreizker
Lactarius	intermedius	(Krombh.) Cke.	Grubiger Weisstannenmilchling
Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
Lactarius	fluens	Boud.	Braunfleckender Milchling
Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
Russula	albonigra	(Krombh.) Fr.	Mentoltäubling
Russula	badia	Quél.	Zedernholztäublig
Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
Russula	cyanoxantha fo. pelt.	R. Maire.: Singer	Grüner Frauentäubling
Russula	laurocerasi	Melzer	Mandeltäubling
Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
Russula	pseudointegra	Arn. & Gor.	Ockerblättriger Zinnobertäubling
Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling
Russula	anthracina	Romagn.	Lachsblättriger Schwärztäubling
Russula	aurea	Pers.	Goldtäubling
Russula	delica	Fr.	Gemeinder Weisstäubling
Russula	faginea	Romagn.	Buchen-Heringstäubling
Russula	farinipes	Romell in Britz.	Mehlstieltäubling
Russula	luteotacta	Rea	Gelbfleckender Täubling
Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
Russula	queletii	Fr. in Quél.	Stachelbeertäubling
Russula	solaris	Ferd. et Winge	Sonnentäubling
Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
Bjerkandera	adusta	(Willd.: Fr.) Karst.	Angebrannter Rauchporling
Cantharellus	tubaeformis	Fr.	Durchbohrter Leistling
Fomitopsis	pinicola	(Fr.) Karst.	Rotrandiger Baumschwamm
Gloeophyllum	odoratum	(Wulf.: Fr.) Imyzeki	Fencheltramete
Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
Inonotus	cuticularis	(Bull.: Fr.) Karst.	Flacher Schillerporling

Pilz-Fundliste der Woche 36

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Oligoporus	subcaesius	(David) Dung.	Fastblauer Saftporling
Phylloporia	ribis	(Schumacher Fr.) Ryvarden	Beeren Strauchporling
Polyporus	badius	(Pers.: Gray) v. Schw.	Kastanienbrauern Porling
Ramaria	botrytis	(Pers.: Fr.) Ricken	Hahnenkamm
Ramaria	flava	(Schäff.: Fr.) Quél.	Schwefelgebe Koralle
Ramaria	formosa	(Pers.: Fr.) Quél.	Dreifarbene Koralle
Ramaria	fennica var. fumigata	(Karst.) (Peck) Schild	Violettgraue Koralle
Ramaria	flavescens	(Schäff.) Peters.	Gelbliche Koralle
Sarcodon	imbricatus	(L. ex Fr.) Karst.	Habichtspilz
Telephora	palmata	Scop.: Fr.	Stinkender Warzenpilz
Trametes	gibbosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Buckel-Tramete
Trametes	versicolor	(L.: Fr.) Pilát	Schmetterlings-Tramete
Trechispora	farinacea	(Pers.: Fr.) Lib.	Mehliger Stachelsporling
Lycoperdon	pyriforme	Schäff.: Pers.	Birnen-Stäubling
Phallus	impudicus	L. ex Pers.	Stinkmorchel
Calocera	viscosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Klebriger Hörnling
Sebacina	inkrustans	(Pers.:Ffr.) Tul.	Erd-Wachskruste
Helvella	elastica	Boud.	Elastische Lorchel
Helvella	lacunosa	(Pers.) O. Kuntze	Grubenlorchel
Helvella	albella	Quélet	Weissliche Lorchel
Leotia	lubrica	(Fr.) Karst.	Gemeines Gallertkäppchen
Otidea	onotica	(Pers.) Fuck.	Eselsohr
Peziza	badia	Pers. ex Fries	Kastanienbrauner Becherling
Xylaria	polymorpha	(Pers.: Fr.) Greville	Vielgestaltige Holzkeule

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze und die Pilztafeln ab S.13) befinden sich auf dieser HP. Fotos ohne Autor-Angabe sind vom Webbetreuer K. Minder.

Inocye fraudans | Birnen-Risspilz

Pilze der Woche 37

Boletus rhodopurpureus
Blaufleckender Purpur-Röhrling

Standort: Laubwald.
Fruchtkörper: Hut bis 150 mm.
Mikromerkmale: Sporen 16 x 6 µm.
Bemerkungen: Dieser Purpurröhrling ändert die Hutfarbe auf Druck im Gegensatz zum Nahverwandten B. rhodoxanthus oder B. rubrosanguineus.

Tricholoma sulfurescens | *Gelbweisser Ritterling*

Standort: Nadelbäume.
Fruchtkörper: Hut bis 80 mm.
Mikromerkmale: Sporen 6 x 5 µm, Schnallen vorhanden.
Bemerkungen: Ein seltener, weisslicher, stark gilbender Ritterling mit biterlichem Geschmack.

Inocybe bongardii | *Duftender Risspilz*

Standort: Laubbäume.
Fruchtkörper: Hut bis 50 mm.
Mikromerkmale: Sporen 12 x 7 µm, Cheilozystiden zylindrisch, dünnwandig.
Bemerkungen: Er ist ein Doppelgänger von I. servicolor, jedoch mit süsslichem Geruch.

Lactarius subumbonatus
Schwachnabeliger Milchling

Standort: Laubbäume.
Fruchtkörper: Hut bis 60 mm.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 7 µm, gratig-netzig. Ohne Macrocystiden.
Bemerkungen: Der Hut ist etwas gerunzelt und hat manchmal eine Papille, Milch wässerig.

Boletus rhodopurpureus | *Blaufleckender Purpur-Röhrling*

Tricholoma sulfurescens | *Gelbweisser Ritterling*

Inocybe bongardii | *Duftender Risspilz*

Lactarius subumbonatus | *Schwachnabeliger Milchling*

Pilz-Fundliste der Woche 37

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Boletinus	cavipes	(Klotzsch) Kalchbrenner	Hohlfuss-Schuppenröhrling
Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
Boletus	rhodopurpureus	(Smotlacha	Blaufleckender Purpur-Röhrling
Boletus	luridus	Schäff.: Fr.	Netzstieliger Hexenröhrling
Chroogomphus	rutilus	(Schaeff.: Fr.) O.K. Miller	Kupferroter Gelbfuss
Gomphidius	roseus	(Schäff.: Fr.) Karsten	Rosaroter Schmierling
Leccinum	carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuss
Suillus	bovinus	(L.: Fr.) Rouss.	Kuhröhrling
Tylopilus	felleus	(Bull.: Fr.) Karst.	Gallenröhrling
Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe
Amanita	ceciliae	Berkeley et Broome) Bas	Riesen-Streifling
Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
Amanita	junquillea	Quélet	Narzissengelber Wulstling
Amanita	virosa	(Fr.) Bertillon	Spitzhütiger Knollenblätterpilz
Clitocybe	clavipes	(Pers.) Kumm.	Keulenfuss-Trichterling
Clitocybe	gibba	(Pers.) Kumm.	Ockerbrauner Trichterling
Clitocybe	odora	(Bulliard: Fr.) Kumm.	Grüner Anistrichterling
Coprinus	atramentarius	(Bull.:Fr.) Fr.	Falten-Tintling
Cortinarius	alboviolacea	(Pers.: Fr.) Fr.	Weissvioletter Dickfuss
Cortinarius	allutus	Fr. ss. Mos.	Bereifter Klumpfuss
Cortinarius	argutus	Fr.	Spitzbasiger Schleimkopf
Cortinarius	armillatus	(Fr.: Fr.) Fr.	Geschmückter Gürtelfuss
Cortinarius	atrovirens	Kalchbr.	Schwarzgrüner Klumpfuss
Cortinarius	bolaris	(Pers.: Fr.) Fr.	Rotschuppiger Rauhkopf
Cortinarius	brunneus	(Pers.: Fr.) Fr.	Dunkelbrauner Gürtelfuss
Cortinarius	calochrous	Fr.	Amethystblättriger Klumpfuss
Cortinarius	caninus	(Fr.: Fr.)	Rostfuchsiger Dickfuss
Cortinarius	cinnabarinus	Fr.	Zinnoberroter Wasserkopf
Cortinarius	claricolor	Fr.	Weissgestiefelter Schleimkopf
Cortinarius	delibutus	Fr.	Violettblättriger Schleimfuss

Pilz-Fundliste der Woche 37

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Cortinarius	evernius	(Fr.: Fr.) Fr. ss. Mos.	Rettich-Gürtelfuss
Cortinarius	hinnuleus	(Sow.) Fr.	Erdigriechender Gürtelfuss
Cortinarius	infractus	(Pers.: Fr.) Fr.	Bitterer Schleimfuss
Cortinarius	largus	Fr.	Blasser Schleimkopf
Cortinarius	malicorius	Fr.	Orangerandiger Hautkopf
Cortinarius	nemorensis	(Fr.) Lge.	Verfärbender Schleimkopf
Cortinarius	olidus	Lge.	Gelbgegürtelter Schleimkopf
Cortinarius	ophiopus	Peck	Schlangenfüssiger Schleimkopf
Cortinarius	purpureus	(Bulliard ex Pers.: Fr.) Fuckel	Purpurroter Hautkopf
Cortinarius	rufoolivaceus	(Pers.: Fr.)	Violettroter Klumpfuss
Cortinarius	salor	Fr.	Blauer Schleimfuss
Cortinarius	semisanguineus	(Fr.)	Blutblättriger Hautkopf
Cortinarius	sommerfeltii	Høiland	Orangeblättriger Hautkopf
Cortinarius	torvus	(Bull.: Fr.) Fr.	Wohlriechender Gürtelfuss
Cortinarius	traganus	Fr.	Lila-Dickfuss
Cortinarius	variecolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf
Cortinarius	pseudovulpinus	Henry et Ramm	Fuchsighütiger Schleimkopfs
Cortinarius	rheubarbarinus	Henry	Rhabarber-Wasserkopf
Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
Entoloma	griseorubidum	Kühn. ex. Noord.	Graubrauner Nabelrötling
Entoloma	rhodopolium	(Fr.: Fr.) Kummer	Niedergedrückter Rötling
Entoloma	sinuatum	(Bull.: Pers.: Fr.) Kumm.	Riesen-Rötling
Gymnopus	acervatus	(Fr.) Murrill	Büscheliger Blasssporrübling
Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
Hebeloma	radicosum	(Bull.: Fr.) Rick.	Wurzelnder Fälbling
Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
Hygrophorus	chrysodon	(Batsch.: Fr.) Fr	Goldzahn-Schneckling
Hygrophorus	cossus (discoxanthus)	(Sow. ex Fr.) Fr.	Verfärbender Schneckling
Hygrophorus	eburneus	(Bull:. Fr.) Fr.	Elfenbein-Schneckling
Hygrophorus	penarius	Fr.	Trockener Schneckling
Hygrophorus	russula	(Schäff.: Fr.) Quél.	Geflecktblättriger Purpurschneckling
Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
Hypholoma	lateritium	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf

Pilz-Fundliste der Woche 37

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Inocybe	adequata	(Britz.) Sacc.	Weinrötlicher Risspilz
Inocybe	asterospora	Quélet	Sternsporiger Risspilz
Inocybe	bongardii	(Weinmann) Quélet	Duftender Risspilz
Inocybe	corydalina	Quél.	Grünbuckliger Risspilz
Inocybe	flocculosa	(Berk.) Sacc.	Flockiger Risspilz
Inocybe	fraudans	(Britz.) Sacc.	Birnen-Risspilz
Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
Inocybe	phaeodisca	Kühn.	Braunscheibiger Risspilz
Inocybe	riomosa	(Bull.: Fr.) Kummer	Kegeliger Risspilz
Inocybe	sindonia	(Fr.) Karst.	Wolligfädiger Risspilz
Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
Limacella	glioderma	(Fr.) Konr. & Maulb.	Schmieriger Schleimschirmling
Macrolepiota	mastoidea	(Fr.) Sing.	Zitzenschirmling
Marasmius	cohaerens	(Pers.: Fr.) Fr.	Hornstieliger Schwindling
Marasmius	torquescens	Quél.	Ledergelber Schwindling
Mycena	flavescens	Velen.	Olivgelber Helmling
Mycena	galericulata	(Scop.:Fr.) Gray	Rosablättriger Helmling
Mycena	inclinata	(Fr.) Quél.	Buntstieliger Helmling
Mycena	zephirus	(Fr.: Fr.) Kumm.	Rostfleckiger Helmling
Nyctalis	parasitica	(Bull.: Fr.) Fr.	Beschleierter Zwitterling
Phaeocollybia	lugubris	(Fr.) Heim	Gemeiner Wurzelschnitzling
Pholiota	adiposa	(Fr.) Kumm.	Schleimiger Schüppling
Pholiota	flammans	(Fr.:) Kummer	Feuerschüppling
Pholiotina	vestita	(Fr. in Quél.) Sing.	Bekleideter Glockenschüppling
Pluteus	diettrichii	Bresadola	Rissiger Dachpilz
Pluteus	ephebeus	(Fr.: Fr.) Gill.	Graufilziger Dachpilz
Psathyrella	piluliformis	(Bull.: Fr.) Ort.	Wässeriger Faserling
Resubinatus	applicatus	(Batsch: Fr.) Gray	Grauer Zwergseitling
Rozites	caperatus	(Pers.: Fr.) P. Karst.	Zigeunerpilz
Tricholoma	album	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Weisser Ritterling
Tricholoma	columbetta	(Fr.) Kumm.	Seidiger Ritterling
Tricholoma	luridum	(Schäff.: Fr.) Quél.	Graublättriger Ritterling
Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling

Pilz-Fundliste der Woche 37

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Tricholoma	sciodes	(Secr.) Martin	Schärflicher Ritterling
Tricholoma	sejunctum	(Sow.: Fr.) Quél.	Grüngelber Ritterling
Tricholoma	sulfurescens	Bres.	Gelbweisser Ritterling
Tricholoma	sulphureum	(Bull.: Fr.) Kumm.	Schwefel-Ritterling
Tricholoma	umbonatum	Lge. ex Clç. & Bon	Buckliger Ritterling
Tricholoma	ustale	(Fr.: Fr.) Kumm.	Brandiger Ritterling
Tricholoma	virgatum	(Fr.: Fr.) Kumm.	Brennender Ritterling
Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
Tricholomopsis	decora	(Fr.) Sing.	Olivgelber Holzritterling
Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
Lactarius	acerrimus	Britz.	Queradriger Milchling
Lactarius	acris	(Bolt.: Fr.) Gray	Rosaanlaufender Milchling
Lactarius	camphoratus	(Bull.: Fr.) Fr.	Kamfermilchling
Lactarius	cremor	Fr.	Runzliger Zwergmilchling
Lactarius	intermedius	(Krombh.) Cke.	Grubiger Weisstannenmilchling
Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
Lactarius	picinus	Fr.	Pechschwarzer Milchling
Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
Lactarius	romagnesii	Bon	Kerbrandiger Korallenmilchling
Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
Lactarius	scrobiculatus	(Scop.: Fr.) Fr.	Grubiger Fichtenmilchling
Lactarius	serifluus	(De Candollo: Fr.) Fr.	Wässeriger Milchling
Lactarius	subumbonatus	Lindgren	Schwachnabeliger Milchling
Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
Russula	adulterina	Fr. ss. Rom.	Scharfer Brauntäubling
Russula	alnetorum	(Bull.) Fr.	Erlentäubling
Russula	aurea	Pers.	Goldtäubling
Russula	badia	Quél.	Zedernholztäublig
Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
Russula	cyanoxantha fo. pelt.	R. Maire.: Singer	Grüner Frauentäubling
Russula	delica	Fr.	Gemeinder Weisstäubling
Russula	faginea	Romagn.	Buchen-Heringstäubling
Russula	farinipes	Romell in Britz.	Mehlstieltäubling

Pilz-Fundliste der Woche 37

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
Russula	fragilis	(Pers.: Fr.) Fr.	Wechselfarbiger Speitäubling
Russula	integra	(L.:) Fr. ss. Mre.	Braunroter Ledertäubling
Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
Russula	minutula	Velen.	Kleiner Rosa-Täubling
Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
Russula	olivascens	(Pers.: Fr.) Bres.	Olivgrüner Täubling
Russula	pseudointegra	Arn. & Gor.	Ockerblättriger Zinnobertäubling
Russula	queletii	Fr. in Quél.	Stachelbeertäubling
Russula	raoultii	Quél.	Blassgeber Täubling
Russula	rubra	(Lmck. Fr.) Fr.	Scharfer Zinnobertäubling
Russula	solaris	Ferd. et Winge	Sonnentäubling
Russula	violeipes	Quélet	Violettstieliger Brätlingstäubling
Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
Cantharellus	tubaeformis	Fr.	Durchbohrter Leistling
Cantharellus	cinereus	Pers. ex Fr.	Grauer Leistling
Cantharellus	friesii	Quél.	Fries´scher Pfifferling
Cantharellus	melanoxeros	Desm.	Gelbvioletter Pfifferling
Craterellus	cornucopoides	Pers.	Totentrompete
Clavariadelphus	pistilaris	(Fr.) Donk	Herkuleskeule
Clavariadelphus	truncatus	(Quél.) Donk	Abgestutzte Herkuleskeule
Cotylidia	pannosa	(Sowerby: Fr.) Reid	Moos-Kreiselpilz
Hydnum	repandum var. rufesc.	(Fr.) Barla	Rotgelber Stoppelpilz
Physisporinus	sanguinolentus	(Alb. & Schw.: Fr.) Pilát	Blutender Eisporling
Pseudocraterellus	sinuosus	(Fr.: Fr.) Reid.	Krauser Leistling
Sparassis	crispa	(Wulf. in Jacq.) Fr.	Krause Glucke
Tulasnella	violea	(Quél.) Bourdot er Galzin	Lilafarbener Wachskrustenpilz
Calvatia	exipuliformis	(Schäff.: Pers.) Perd.	Beutelstäubling
Calocera	cornea	(Batsch: Fr.) Fr.	Eichenhörnling
Calocera	viscosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Klebriger Hörnling
Dacrymyces	variisporus	McNabb	Verschidensporige Gallertträne
Guepinopsis	buccina	(Pers.: Fr.) Kennedy	Becherförmiger Haargallenpilz
Cordyceps	ophioglossoides	(Erh. ex Fr.) Link	Zungen-Kernkeule
Otidea	onotica	(Pers.) Fuck.	Eselsohr

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze und die Pilztafeln ab S.13) befinden sich auf dieser HP. Fotos ohne Autor-Angabe sind vom Webbetreuer K. Minder.

Cortinarius orellanus | Orangefuchsiger Raukopf

Pilze der Woche 38

Inonotus dryadeus | *Tropfender Schillerporling*

Standort: Parasitisch an Eichen.
Fruchtkörper: Hut bis 250 mm.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 6 µm. mit Setae, ohne Schnallen, Hyphensystem dimitisch.
Bemerkungen: Das Vorkommen an stehenden Eichen und die Guttationstropfen kennzeichen diesen Pilz gut. Ein weiterer Eichenbegleiter, ohne Guttationstropfen und dunkleren Hut Ist I. dryadeus, ohne Setae.

Fistulina hepatica | *Ochsenzunge*

Standort: An Eichen.
Fruchtkörper: Hut bis 200 mm.
Mikromerkmale: Sporen 6 x 4,5 µm, Hyphen mit Schnallen, Hyphensystem monomitisch.
Bemerkungen: Diese Art ist an Eiche gebunden. Die jungen FK sind lachs- oder weinrot, fein warzig und etwas klebrig. Unterseite porig.

Cortinarius turmalis | *Rasiger Schleimkopf*

Standort: Nadel- und Laubwald.
Fruchtkörper: Hut bis 100 mm.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 4 µm, schwach warzig.
Bemerkungen: Im Gegensatz zu C. variegatus hat er keine violetten Velumspuren an der Stielbasis und ist etwas gedrungener als C. claricolor.

Inonotus dryadeus | *Tropfender Schillerporling*

Fistulina hepatica | *Ochsenzunge*

Cortinarius turmalis | *Rasiger Schleimkopf*

Pilz-Fundliste der Woche 38

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Suillus	bovinus	(L.: Fr.) Rouss.	Kuhröhrling
Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
Agaricus	silvicola	(Vittad.) Sacc.	Dünnfleischiger Anis-Egerling
Agaricus	xanthoderma var. lep.	Mre.	Schirmlingsartiger Karbol-Egerling
Cortinarius	anserinus	(Vel.) Hry.	Buchen-Klumpfuss
Cortinarius	balaustinus	Fr.	Feuerblättriger Wasserkopf
Cortinarius	elegantissimus	Hry.	Prächtiger Klumpfuss
Cortinarius	nemorensis	(Fr.) Lge.	Verfärbender Schleimkopf
Cortinarius	olidus	Lge.	Gelbgegürtelter Schleimkopf
Cortinarius	rubellus	Cooke	Spitzgebuckelter Rauhkoopf
Cortinarius	turmalis	Fr.	Rasiger Schleimkopf
Cortinarius	variecolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf
Entoloma	nitidum	Quél.	Stahlblauer Rötling
Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
Hygrophorus	cossus (discoxanthus)	(Sow. ex Fr.) Fr.	Verfärbender Schneckling
Hygrophorus	eburneus	(Bull:. Fr.) Fr.	Elfenbein-Schneckling
Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
Hypholoma	lateritium	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf
Inocybe	maculata	Boud.	Gefleckter Risspilz
Lepiota	cristata	(Bolton.: Fr.) Kummer	Stink-Schirmling
Macrolepiota	rhacodes	(Vittad.) Singer	Safranschirmling
Pholiota	squarrosa	(Pers.: Fr.) Kumm.	Sparriger Schüppling
Psathyrella	piluliformis	(Bull.: Fr.) Ort.	Wässeriger Faserling
Pseudoclitocybe	cyathiformis	(Bull.) Sing.	Kaffebrauner Gabeltrichterling
Tricholoma	pseudonicticans	Bon	Blassfleischiger Fichtenritterling
Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
Tricholoma	sejunctum	(Sow.: Fr.) Quél.	Grüngelber Ritterling
Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
Lactarius	fulvissimus	Rom. i. Kühn. & Rom.	Orangefuchsiger Milchling
Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
Albatrellus	cristatus	(Schäff.: Fr.) Kotl. & Pouz.	Grüner Kammporling

Pilz-Fundliste der Woche 38

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Cantharellus	tubaeformis	Fr.	Durchbohrter Leistling
Oligoporus	caesius	(Schrad.: Fr.) Gilb. & Ryv.	Blauer Saftporling
Ramaria	flava	(Schäff.: Fr.) Quél.	Schwefelgebe Koralle
Calvatia	exipuliformis	(Schäff.: Pers.) Perd.	Beutelstäubling
Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
Lycoperdon	pyriforme	Schäff.: Pers.	Birnen-Stäubling

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze und die Pilztafeln ab S.13) befinden sich auf dieser HP. Fotos ohne Autor-Angabe sind vom Webbetreuer K. Minder.

Cortinarius rubricosus | Schwärzender Wasserkopf

Pilze der Woche 39

Pluteus roseipes | *Rosastieliger Dachpilz*

Standort: Bei Nadelbäumen.
Fruchtkörper: Hut bis 80 mm.
Mikromerkmale: Sporen 7 x 6 µm. Zystiden apikal mit kleinen Auswüchsen.
Bemerkungen: Ein Dachpilz mit dunkelbraunem, samtigem, weiss bereiftem Hut. Stiel rosa angehaucht.

Tricholoma vaccinum var. fulvosquamosum
Zottiger Ritterling Varietät

Standort: Bei Nadelbäumen.
Fruchtkörper: Hut bis 80 mm.
Mikromerkmale: Sporen 7 x 4,5 µm.
Bemerkungen: Dieser Ritterling unterscheidet sich vom Typus durch die kräftigere Beschuppung des Hutes. Der Hutrand ist nur schwach behangen. Fundort Davos.

Lepiota boudieri | *Fuchsbrauner Schirmling*

Standort: Laub- und Nadelbäume.
Fruchtkörper: Hut bis 30 mm.
Mikromerkmale: Sporen 9 x 3 µm, seitlich gespornt.
Bemerkungen: Diese Art könnte verwechselt werden mit L. castanea. Dieser hat jedoch einen unangenehmen Geruch und etwas grössere Sporen. Die Schuppen auf dem Hut sind offener.

Pluteus roseipes | *Rosastieliger Dachpilz*

Tricholoma vaccinum var. fulvosquamosum |Zottiger Ritterling Varietät

Lepiota boudieri | *Fuchsbrauner Schirmling*

Pilz-Fundliste der Woche 39

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
Chroogomphus	helveticus	(Singer) Moser	Filziger Gelbfuss
Leccinum	quercinum	Pilát ex Pilát	Eichen-Rotkappe
Pulveroboletus	gentilis	(Quél.) Pouzar	Goldporiger Röhrling
Strobilomyces	strobilaceus	(Scop.: Fr.) Berk.	Strubelkopfröhrling
Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
Agaricus	arvensis	Schäff.: Fr.	Schaf-Champignon
Agaricus	semotus	Fr.	Weinrötlicher Zwerg-Champignon
Agaricus	silvicola	(Vittad.) Sacc.	Dünnfleischiger Anis-Egerling
Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
Amanita	muscaria	(L.) Hook.	Fliegenpilz
Amanita	strobiliformis	(Paul.: Vitt.) Bertillon	Fransiger Wulstling
Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
Clitocybe	phaeophthalma	(Pers.) Kp.	Ranziger Trichterling
Cortinarius	alboviolacea	(Pers.: Fr.) Fr.	Weissvioletter Dickfuss
Cortinarius	anserinus	(Vel.) Hry.	Buchen-Klumpfuss
Cortinarius	argutus	Fr.	Spitzbasiger Schleimkopf
Cortinarius	atrovirens	Kalchbr.	Schwarzgrüner Klumpfuss
Cortinarius	bolaris	(Pers.: Fr.) Fr.	Rotschuppiger Rauhkopf
Cortinarius	caesiocanescens	(Mos.) Kühm. & Rom.	Violettgrauer Klumpfuss
Cortinarius	calochrous	Fr.	Amethystblättriger Klumpfuss
Cortinarius	caninus	(Fr.: Fr.)	Rostfuchsiger Dickfuss
Cortinarius	cinnabarinus	Fr.	Zinnoberroter Wasserkopf
Cortinarius	crassus	(Fr.)	Trockener Schleimkopf
Cortinarius	decipiens	(Pers.: Fr.) Fr.	Dunkelgebuckelter Wasserkopf
Cortinarius	elegantior	(Fr.) Fr.	Strohgelber Klumpfuss
Cortinarius	infractus	(Pers.: Fr.) Fr.	Bitterer Schleimfuss
Cortinarius	largus	Fr.	Blasser Schleimkopf
Cortinarius	multiformis	Fr.	Sägeblättriger Klumpfuss
Cortinarius	odoratus	(Jog.: Mos.) Mos.	Hellgrüner Duft-Klumfuss
Cortinarius	olidus	Lge.	Gelbgegürtelter Schleimkopf
Cortinarius	praestans	(Cord.) Gill.	Schleiereule
Cortinarius	pseudosulphureus	Hry. ex Ort.	Grünlings-Klumpfuss
Cortinarius	purpurascens	Fr.	Purpurfleckender Klumpfuss

Pilz-Fundliste der Woche 39

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Cortinarius	salor	Fr.	Blauer Schleimfuss
Cortinarius	saturninus	Fr.	Blaufleischiger Gürtelfuss
Cortinarius	semisanguineus	(Fr.)	Blutblättriger Hautkopf
Cortinarius	splendens	Hry.	Schöngelber Klumpfuss
Cortinarius	variecolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf
Cortinarius	varius	Fr.	Ziegelgelber Schleimkopf
Cortinarius	rubricosus	Fries ss. Moser	Schwärzender Wasserkopf
Cortinarius	subargentatus	Orton	Weisser Dickfuss
Entoloma	rhodopolium var. nid.	(Fr.)Nordel./Kumm.	Alkalischer Rötling
Gymnopus	butyracea	(Bull.: Fr.) P. Kumm.	Butterrübling
Hebeloma	senescens	(Batsch) Berk.	Bräunender Fälbling
Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
Hemimycena	lactea	(Pers.: Fr.) Sing.	Milchweisser Scheinhelmling
Hygrophorus	cossus (discoxanthus)	(Sow. ex Fr.) Fr.	Verfärbender Schneckling
Hygrophorus	eburneus	(Bull:. Fr.) Fr.	Elfenbein-Schneckling
Hygrophorus	penarius	Fr.	Trockener Schneckling
Hygrophorus	picea	Kühn.	Fichten-Schneckling
Hygrophorus	poetarum	Heim	Isabell-Schneckling
Hygrophorus	russula	(Schäff.: Fr.) Quél.	Geflecktblättriger Purpurschneckling
Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
Hypholoma	sublateritium	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf
Inocybe	corydalina	Quél.	Grünbuckliger Risspilz
Inocybe	phaeocomis	(Pers.) Kuyp.	Braunschopfiger Risspilz
Lepiota	boudieri	Bres.	Fuchsbräunlicher Schirmling
Lepista	flaccida	(Sowerby Fries) Patouillard	Fuchsiger Rötelritterling
Lepista	nuda	(Bull.: Fr.) Cooke	Violetter Rötelritterling
Lyophyllum	connatum	(Schum.: Fr.) Sing.	Weisser Büschelrasling
Lyophyllum	decastes	(Fr.: Fr.) Singer	Brauner Büschelrasling
Macrolepiota	rhacodes	(Vittad.) Singer	Safranschirmling
Mycena	crocata	(Schrad.: Fr.) Kumm.	Safranmilchender Helmling
Mycena	rosea	(Bull.) Gramberg	Rosa-Rettichhelmling
Mycena	zephirus	(Fr.: Fr.) Kumm.	Rostfleckiger Helmling
Oudemansiella	mucida	(Schrad. ex Fr.) v.H.	Beringter Schleimrübling
Stropharia	caerulea	Kreisel	Blauer Träuschling

Pilz-Fundliste der Woche 39

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Tricholoma	orirubens	Quél.	Rötender Ritterling
Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
Tricholoma	scalpturatum	(Fr.) Quél.	Gilbender Erd-Ritterlig
Tricholoma	sciodes	(Secr.) Martin	Schärflicher Ritterling
Tricholoma	sulphureum	(Bull.: Fr.) Kumm.	Schwefel-Ritterling
Tricholoma	vaccinum var.	(Pers.: Fr.) Kumm.	Zottiger Ritterling
Tricholomopsis	decora	(Fr.) Sing.	Olivgelber Holzritterling
Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
Lactarius	pubescens	(Schrad.) Fries	Flaumiger Milchling
Lactarius	pyrogalus	(Bull.: Fr.) Fr.	Scharfer Hasel-Milchling
Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
Russula	atropurpurea	(Krombh.) Britz.	Pupurschwarzer Täubling
Russula	badia	Quél.	Zedernholztäublig
Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
Russula	mustelina	Fr.	Wieseltäubling
Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
Russula	xerampelina	Schäff.: Fr.	Roter Heringstäubling
Albatrellus	pes-caprae	(Pers.) Pouz.	Ziegenfussporling
Clavulina	cinereus	(Bull.: Fr.) Schröt.	Graue Koralle
Craterellus	cinereus	Pers.: Fries ss. Kühner et Rom.	Gelblichgraue Trompete
Craterellus	cornucopioides	Pers.	Totentrompete
Polyporus	badius	(Pers.: Gray) v. Schw.	Kastanienbrauern Porling
Pseudocraterellus	sinuosus	(Fr.: Fr.) Reid.	Krauser Leistling
Sarcodon	imbricatus	(L.: Fr.) Karst.	Habichtsstacheling
Lycoperdon	echinatum	Pers.: Pers.	Igel-Stäubling
Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
Lycoperdon	pyriforme	Schäff.: Pers.	Birnen-Stäubling
Auricularia	auricula-judae	(Bull. ex St. Am.) Wettst.	Judasohr
Tremiscus	helveloides	(DC: Pers.) Donk	Roter Gallerttrichterling
Aleuria	aurantia	(Fr.) Fuckel	Gemeiner Orangebecherling
Helvella	crispa	(Bull. ex St. Aman) Boud.	Herbstlorchel
Leotia	lubrica	(Fr.) Karst.	Gemeines Gallertkäppchen
Spatularia	flavida	Tulasne	Gelber Spateling

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze und die Pilztafeln ab S.13) befinden sich auf dieser HP. Fotos ohne Autor-Angabe sind vom Webbetreuer K. Minder.

Pluteus aurantiorugosus | Orangeroter Dachpilz | Foto: Markus Wilhelm

Pilze der Woche 40

Hygrophorus capreolarius | *Weinroter Schneckling*

Standort: Nadelwald.
Fruchtkörper: Hut bis 80 mm.
Mikromerkmale: Sporen 7 x 5 µm.
Bemerkungen: Ein Schneckling der nicht gilbt und dessen Oberfläche des Hutes fast trocken ist. Zudem ist der ganze Pilz mehr oder weniger gleich weinrot gefärbt. Ohne speziellen Geruch, Geschmack mild.

Cystoderma jasonis | *Langsporiger Körnchenschirmling*

Standort: Nadelwald.
Fruchtkörper: Hut bis 30 mm.
Mikromerkmale: Sporen 6 x 3 µm. HDS aus rundlichen Zellen und vielen asexuelle Sporen.
Bemerkungen: Der Hut ist feinkörnig und erhält dadurch einen samtigen Eindruck. Die Sporen sind verhältnismässig lang. Fundort Davos.

Cortinarius flexipes | *Duftender Gürtelfuss*

Standort: Nadelwald.
Fruchtkörper: Hut bis 30 mm.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 5 µm.
Bemerkungen: Diese Art gehört zu den kleinen, dunkelbraunen Telamonien mit weissem Velum. Zudem hat C. flexipes zusätzlich, vorallem im jungen Zustand, weisses Velum auf dem Hut. Der Geruch ist stark pelargoniumartig. Sein Doppelgänger, die var. inolens, hat einen unbedeutenden Geruch.

Hygrophorus capreolarius | *Weinroter Schneckling*

Cystoderma jasonis | *Langsporiger Körnchenschirmling*

Cortinarius flexipes | *Duftender Gürtelfuss*

Cortinarius praestans | *Schleiereule*

Pilz-Fundliste der Woche 40

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
Boletus	luridus	Schäff.: Fr.	Netzstieliger Hexenröhrling
Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
Armillaria	ostoyae	Romagn.	Dunkler Hallimasch
Clitocybe	clavipes	(Pers.) Kumm.	Keulenfuss-Trichterling
Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
Cortinarius	alboviolacea	(Pers.: Fr.) Fr.	Weissvioletter Dickfuss
Cortinarius	anomalus	(Fr.: Fr.) Fr.	Braunvioletter Dickfuss
Cortinarius	camphoratus	(Fr.) Fr.	Bocks-Dickfuss
Cortinarius	croceocaeruleus	(Pers.: Fr.) Fr.	Safranblauer Schleimfuss
Cortinarius	cyanobasilis		
Cortinarius	decipiens	(Pers.: Fr.) Fr.	Lilastieliger Wasserkopf
Cortinarius	elegantior	(Fr.) Fr.	Strohgelber Klumpfuss
Cortinarius	evernius	(Fr.: Fr.) Fr. ss. Mos.	Rettich-Gürtelfuss
Cortinarius	hinnuleus	(Sow.) Fr.	Erdigriechender Gürtelfuss
Cortinarius	largus	Fr.	Blasser Schleimkopf
Cortinarius	praestans	(Cord.) Gill.	Schleiereule
Cortinarius	torvus	(Bull.: Fr.) Fr.	Wohlriechender Gürtelfuss
Cortinarius	flavovirens	Hry	Gelbgrüner Klumpfuss
Cortinarius	flexipes	(Pers.: Fr.) Fr.	Duftender Gürtelfuss
Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
Hebeloma	crustuliniforme	(Bull.: Fr.) Quél.	Tongrauer Fälbling
Hebeloma	radicosum	(Bull.: Fr.) Rick.	Wurzelnder Fälbling
Hygrophorus	agathosmus	(Fr.) Fr.	Wohlriechender Schneckling
Hygrophorus	capreolarius	(Kalchbr.) Sacc.	Weinroter Schneckling
Hygrophorus	pudorinus	(Fr.) Fr.	Orange-Schneckling
Hypholoma	capnoides	(Fr.: Fr.) Kummer	Rauchblättriger Schwefelkopf
Hypholoma	sublateritium	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf
Inocybe	riomosa	(Bull.: Fr.) Kummer	Kegeliger Risspilz
Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen

Pilz-Fundliste der Woche 40

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Lepiota	clypeolaria	(Bull.: Fr.) Kumm.	Wolliggestiefelter Schirmling
Lepista	irina	(Fr.) Big.	Veilchen-Rötelritterling
Limacella	guttata	(Fr.) Konr. et Maubl.	Getropfter Schleimschirmling
Lyophyllum	connatum	(Schum.: Fr.) Sing.	Weisser Büschelrasling
Macrolepiota	mastoidea	(Fr.) Sing.	Zitzenschirmling
Mycena	rosea	(Bull.) Gramberg	Rosa-Rettichhelmling
Pluteus	aurantiorugosus	(Trog) Saccardo	Orangeroter Dachpilz
Tricholoma	atrosquamosum	(Chev.) Sacc.	Schwarzschuppiger Ritterling
Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
Tricholoma	viridilutescens	Moser	Sögeblättriger Ritterling
Tricholoma	sciodes	(Secr.) Martin	Schärflicher Ritterling
Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
Clavariadelphus	truncatus	(Quél.) Donk	Abgestutzte Herkuleskeule
Fomitopsis	pinicola	(Fr.) Karst.	Rotbrauner Baumschwamm
Inonotus	hispidus	(Fr.) Karst.	Zottiger Schillerporling
Trametes	versicolor	(L.: Fr.) Pilát	Schmetterlings-Tramete
Geastrum	sessile	(Sow.) Pouz.	Gewimperter Erdstern

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze und die Pilztafeln ab S.13) befinden sich auf dieser HP. Fotos ohne Autor-Angabe sind vom Webbetreuer K. Minder.

Cortinarius splendens | Leuchtendgelber Klumpfuss

Pilze der Woche 41

Marasmius hudsonii | *Stechpalmen-Schwindling*

Standort: Auf toten Blättern von Stechpalmen.
Fruchtkörper: Hut bis 6 mm.
Mikromerkmale: Sporen 12 x 6 µm.
Bemerkungen: Dieser kleine Schwindling wächst auf toten Blättern von Stechpalmen. Die braunen Haare auf Hut und Stiel sind bis 700 µm lang. *Fotos von Markus Wilhelm.*

Lactarius pubescens | *Flaumiger Birken-Milchling*

Standort: Bei Birken.
Fruchtkörper: Hut bis 80 mm.
Mikromerkmale: Sporen 7 x 5,5 µm.
Bemerkungen: Ein weisser Milchling mit eingerolltem Hutrand und dieser jung wollig mit Haaren besetzt. Milch weiss unveränderlich und scharf. Der ähnliche L. scoticus hat einen schlankeren Stiel und bevorzugt sumpfige Standorte bei Birken.

Tricholoma pessundatum | *Getropfter Ritterling*

Standort: Nadelbäume, besonders Föhren.
Fruchtkörper: Hut bis 120 mm.
Mikromerkmale: Sporen 6 x 4 µm.
Bemerkungen: Dieser Ritterling ist jung etwas schmierig und hat einen mehlartigen Geruch. Der Hut ist getropft und feinschuppig. Ein weiterer Kiefernbegleiter ist T. stans, der ist jedoch kleiner und hat keinen getropften Hut. Die Sporen sind etwas grösser.

Marasmius hudsonii | *Stechpalmen-Schwindling*





Marasmius hudsonii | *Stechpalmen-Schwindling*

Lactarius pubescens | *Flaumiger Birken-Milchling*

Tricholoma pessundatum | *Getropfter Ritterling*

Pilz-Fundliste der Pilzausstellung 2010

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Boletinus	cavipes	(Klotzsch) Kalchbrenner	Hohlfuss-Schuppenröhrling
Boletus	regius	Krombh.	Königs-Röhrling
Chalciporus	piperatus	(Bull.: Fr.) Bat.	Pfeffer-Röhrling
Chroogomphus	rutilus	(Schaeff.: Fr.) O.K. Miller	Kupferroter Gelbfuss
Hygrophoropsis	aurantiaca	(Wulff.: Fr.) Maire	Falscher Pfifferling
Leccinum	scabrum	(Bull.: Fr.) Gray	Birkenpilz
Paxillus	filamentosus	Fr.	Erlen-Krempling
Paxillus	panuoides	Fr.	Muschel-Krempling
Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
Pulveroboletus	gentilis	(Quél.) Pouzar	Goldporiger Röhrling
Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
Suillus	bovinus	(L.: Fr.) Rouss.	Kuhröhrling
Suillus	tridentinus	(Bresad.) Singer	Rostroter Lärchenröhrling
Suillus	viscidus	(L.) Rouss.	Grauer Lärchenröhrling
Tapinella	panuoides	(Fr.: Fr.) Gilbert	Muschel-Krempling
Tylopilus	felleus	(Bull.: Fr.) Karst.	Gallenröhrling
Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
Xerocomus	communis	(Bulliard) Bon	Eichen-Filzröhrling
Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe
Agaricus	silvaticus	Schäff.: Fr.	Echter Wald-Champignon
Agaricus	arvensis	Schäff.: Fr.	Schaf-Champignon
Agaricus	silvicola	(Vittad.) Sacc.	Dünnfleischiger Anis-Egerling
Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
Amanita	fulva	(Schäffer) Fr.	Rotbrauner Scheidenstreifling
Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
Amanita	junquillea	Quélet	Narzissengelber Wulstling
Amanita	muscaria	(L.) Hook.	Fliegenpilz
Amanita	pantherina	(DC.: Fr.) Krombh.	Pantherpilz
Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
Amanita	porphyria	Alb. & Schw.: Fr.	Porphyrbrauner Wulstling
Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
Amanita	strobiliformis	(Paul.: Vitt.) Bertillon	Fransiger Wulstling

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Amanita	muscaria	(L.) Pers.	Fliegenpilz
Armillaria	mellea	(Val.: Fr.) Kummer	Honiggelber Hallimasch
Armillaria	ostoyae	Romagn.	Dunkler Hallimasch
Baeospora	myriadophylla	(Peck) Singer	Tausendblatt Amyloidsporrübling
Clitocybe	metachroa	(Fr.) Kumm.	Staubfüssiger Trichterling
Clitocybe	candicans	(Pers.) Kumm.	Wachsstieliger Trichterling
Clitocybe	fragrans	(With.) Kumm.	Dufttrichterling
Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
Clitocybe	odora	(Bulliard: Fr.) Kumm.	Grüner Anistrichterling
Clitocybe	phyllophila	(Pers.) Kumm.	Bleiweisser Trichterling
Clitocybula	lacerata	(Scropoli) Métrod	Fransiger Faserrübling
Clitopilus	brunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
Coprinus	comatus	(Müll.: Fr.) Pers.	Schopf-Tintling
Cortinarius	camphoratus	(Fr.) Fr.	Bocks-Dickfuss
Cortinarius	evernius	(Fr.: Fr.) Fr. ss. Mos.	Rettich-Gürtelfuss
Cortinarius	glaucopus	(Schäff.: Fr.)	Reihiger Klumpfuss
Cortinarius	infractus	(Pers.: Fr.) Fr.	Bitterer Schleimfuss
Cortinarius	laniger	Fr.	Wolliger Gürtelfuss
Cortinarius	melanotus	Kalchbr.	Braunnetziger Rauhkopf
Cortinarius	odoratus	(Jog.: Mos.) Mos.	Hellgrüner Duft-Klumfuss
Cortinarius	semisanguineus	(Fr.)	Blutblättriger Hautkopf
Cortinarius	turgidus	Fr.	Tonweisser Dickfuss
Cortinarius	turmalis	Fr.	Rasiger Schleimkopf
Cortinarius	triumphans	Fr.	Gelbgestiefelter Schleimkopfs
Cortinarius	mussivus	(Fr.) Melot	Stinkender Schleimkopf
Cortinarius	vibratilis	(Fr.) Fr.	Galliger Schleimfuss
Cortinarius	balaustinus	Fr.	Feuerblättriger Wasserkopf
Cortinarius	elegantissimus	Hry.	Prächtiger Klumpfuss
Cortinarius	largus	Fr.	Blasser Schleimkopf
Cortinarius	subbalaustinus	Hry.	Zimblättriger Birken-Wasserkopf
Cortinarius	torvus	(Bull.: Fr.) Fr.	Wohlriechender Gürtelfuss
Cortinarius	aureofulvus	Mos.	Rostgelber Klumpfuss
Cortinarius	cinnamomeus	Fr.	Zimt-Hautkopf
Cortinarius	dibaphus	Fr.	Bunter Klumpfuss

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Cortinarius	praestans	(Cord.) Gill.	Schleiereule
Cortinarius	anomalus	(Fr.: Fr.) Fr.	Braunvioletter Dickfuss
Cortinarius	anserinus	(Vel.) Hry.	Buchen-Klumpfuss
Cortinarius	argutus	Fr.	Spitzbasiger Schleimkopf
Cortinarius	atrovirens	Kalchbr.	Schwarzgrüner Klumpfuss
Cortinarius	bolaris	(Pers.: Fr.) Fr.	Rotschuppiger Rauhkopf
Cortinarius	bulliardii	(Pers.: Fr.) Fr.	Feuerfüssiger Gürtelfuss
Cortinarius	caerulescens	(Schäff.) Fr.	Blauer Klumpfuss
Cortinarius	caesiocanescens	(Mos.) Kühm. & Rom.	Violettgrauer Klumpfuss
Cortinarius	calochrous	Fr.	Amethystblättriger Klumpfuss
Cortinarius	caninus	(Fr.: Fr.)	Rostfuchsiger Dickfuss
Cortinarius	cinnabarinus	Fr.	Zinnoberroter Wasserkopf
Cortinarius	croceocaeruleus	(Pers.: Fr.) Fr.	Safranblauer Schleimfuss
Cortinarius	decipiens	(Pers.: Fr.) Fr.	Lilastieliger Wasserkopf
Cortinarius	dionysae	Hry.	Mehligriechender Klumpfuss
Cortinarius	elegantior	(Fr.) Fr.	Strohgelber Klumpfuss
Cortinarius	glaucopus var. acyan.	(Mos.) Nezd.	Blasser Reihen-Klumpfuss
Cortinarius	hinnuleus	(Sow.) Fr.	Erdigriechender Gürtelfuss
Cortinarius	infractus var. obscur.	(Secr.) Hry	Dunkler Bitterer Schleimkopf
Cortinarius	malicorius	Fr.	Orangerandiger Hautkopf
Cortinarius	nanceiensis	Mr.	Gelbflockiger Schleimkopf
Cortinarius	nemorensis	(Fr.) Lge.	Verfärbender Schleimkopf
Cortinarius	odorifer	Britz	Anis-Klumpfuss
Cortinarius	olidus	Lge.	Gelbgegürtelter Schleimkopf
Cortinarius	percomis	Fr.	Würziger Schleimkopf
Cortinarius	purpurascens	Fr.	Purpurfleckender Klumpfuss
Cortinarius	splendens	Hry.	Schöngelber Klumpfuss
Cortinarius	triumphans	(Fr.) Fr.	Gelbgestiefelter Schleimkopf
Cortinarius	variecolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf
Cortinarius	variegatus	Bresadola	Variabler Schleimkopf
Cortinarius	varius	Fr.	Ziegelgelber Schleimkopf
Cortinarius	venetus	(Fr.). Fr.	Grüner Buchenwald-Rauhkopf
Cortinarius	violaceus	(L.:Fr.) Fr.	Dunkelvioletter Schleierling
Cortinarius	pulchellus	Lange	Kleinster Violett-Gürtrelfuss
Cortinarius	dibaphus var. nemoreus		

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Cortinarius	emolitus	Fr. (s.str.)	Weichstieliger Schleimfuss
Cortinarius	rufoolivaceus	(Pers.: Fr.)	Violettroter Klumpfuss
Cortinarius	uraceus	Fr.	Olivbrauner Wasserkopf
Cortinarius	spilomeus	(Fr.: Fr.) Fr.	Kupferschuppiger Seidenkopf
Crepidotus	variabilis	(Pers.: Fr.) Kummer	Gemeines Stummelfüsschen
Crepidotus	cesatii	(Rabh.) Saccardo	Kugelsporiges Stummelfüsschen
Cystoderma	amiantinum	(Scop.: Fr.) Fayod	Amiant-Körnchenschirmling
Cystolepiota	adulterina	(Moll.) Bon	Hecken-Mehlschirmling
Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
Entoloma	byssisedum	(Pers.: Fr.) Donk.	Stummelfuss-Rötling
Entoloma	conferendum	(Britz.) Noord.	Kreuzsporiger Rötling
Entoloma	griseorubidum	Kühn. ex. Noord.	Graubrauner Nabelrötling
Entoloma	nitidum	Quél.	Stahlblauer Rötling
Entoloma	rhodopolium	(Fr.: Fr.) Kummer	Niedergedrückter Rötling
Entoloma	sinuatum	(Bull.: Pers.: Fr.) Kumm.	Riesen-Rötling
Galerina	sideroides	(Fr.)Kühn.	Glimmerstieliger Häubling
Galerina	marginata	(Batsch) Kühn.	Gifthäubling
Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
Gymnopus	butyracea	(Bull.: Fr.) P. Kumm.	Butterrübling
Gymnopus	fusipes	(Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling
Gymnopus	maculata	(Alb. et Schw. Fr.)	Gefleckter Rübling
Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
Gymnopus	dryophylla	(Bull.: Fr.) Kumm.	Waldfreund-Rübling
Gymnopus	erytropus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Rotstieliger Rübling
Hebeloma	radicosum	(Bull.: Fr.) Rick.	Wurzelnder Fälbling
Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
Hebeloma	crustuliniforme	(Bull.: Fr.) Quél.	Tongrauer Fälbling
Hemimycena	cucullata	(Pers.: Fr.) Sing.	Gipsweisser Scheinhelmling
Hohenbuhelia	auriscalpium	(Maire) Singer	Späne-Muscheling
Hygrocybe	chlorophana	(Fr.) Wünsche	Stumpfer Saftling
Hygrocybe	coccinea	(Schäff.: Fr.)	Kirschroter Saftling
Hygrocybe	laeta	(Pers.: Fr.) Kummer	Zäher Saftling
Hygrocybe	murinacea	(Fr.: Fr.) Moser	Nichtrötender Nitrat-Saftling
Hygrocybe	splendidissima	(Orton) Moser	Prächtiger Saftling
Hygrocybe	obrussea	(Fr.: Fr.) Wünsche	Schnürsporiger Saftling

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Hygrocybe	pratensis	(Pers.: Fr.) Donk.	Wiesen-Ellerling
Hygrocybe	psittacina	(Schäff.: Fr.) Wünsche	Papageigrüner Saftling
Hygrocybe	punicea	(Fr.) Kumm.	Grösster Saftling
Hygrophorus	agathosmus	(Fr.) Fr.	Wohlriechender Schneckling
Hygrophorus	capreolarius	(Kalchbr.) Sacc.	Weinroter Schneckling
Hygrophorus	eburneus	(Bull:. Fr.) Fr.	Elfenbein-Schneckling
Hygrophorus	pudorinus	(Fr.) Fr.	Orange-Schneckling
Hygrophorus	chrysodon	(Batsch.: Fr.) Fr	Goldzahn-Schneckling
Hygrophorus	discoideus	(Pers.: Fr.) Fr.	Braunscheibiger Schneckling
Hygrophorus	penarius	Fr.	Trockener Schneckling
Hygrophorus	poetarum	Heim	Isabell-Schneckling
Hygrophorus	pustulatus	(Fr.) Fr.	Schwarzpunktierter Schneckling
Hygrophorus	unicolor	Grög.	Orangefalber Schneckling
Hypholoma	sublateritium	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf
Hypholoma	capnoides	(Fr.: Fr.) Kummer	Rauchblättriger Schwefelkopf
Inocybe	corydalina	Quél.	Grünbuckliger Risspilz
Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
Inocybe	cervicolor	(Pers.) Quél.	Hirschbrauner Risspilz
Inocybe	flocculosa	(Berk.) Sacc.	Flockiger Risspilz
Inocybe	fraudans	(Britz.) Sacc.	Birnen-Risspilz
Inocybe	fuscidula	Vel.	Braunstreifiger Risspilz
Inocybe	riomosa	(Bull.: Fr.) Kummer	Kegeliger Risspilz
Inocybe	geophylla var. lilacina	(Peck.) Gill.	Lilastieliger Risspilz
Inocybe	whitei	(Berk .et Br.) Sacc.	Weissrosa Risspilz
Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
Lacrymaria	lacrymabunda	(Bull.: Fr.) Pat.	Tränender Samumpilz
Lentinellus	cochleatus var. inolens	Konr. & Maubl.	Geruchloser Äniszähling
Lentinellus	cochleatus	(Pers.: Fr.) Karst.	Äniszähling
Lentinus	adhaerens	(Alb. et Schw.: Fr.) Fr.	Harziger Sägeblättling
Lepiota	castanea	Quél. (inkl. L. ignipes Locq. ex Bon	Kastanienbrauner Schirmling
Lepiota	ventriosospora	Reid	Gelbwolliger Schirmling
Lepiota	clypeolaria	(Bull.: Fr.) Kumm.	Wolliggestiefelter Schirmling
Lepiota	echinella	Quél. & Bernard	Striegeliger Schirmling

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Lepiota	cristata	(Bolton.: Fr.) Kummer	Stink-Schirmling
Lepista	flaccida	(Sowerby Fries) Patouillard	Fuchsiger Rötelritterling
Lepista	nuda	(Bull.: Fr.) Cooke	Violetter Rötelritterling
Lepista	panaeolus	(Fr.) Karst.	Horngrauer Rötelritterling
Lepista	irina	(Fr.) Big.	Veilchen-Rötelritterling
Lepista	sordida	(Fr.) Sing.	Fleischbrauner Rötelritterling
Leucoagaricus	leucothites	(Vitt.) Was.	Rosablättriger Egerlingsschirmling
Leucocortinarius	bulbiger	(A. & S.: Fr.) Sing.	Knolliger Schleierritterling
Lyophyllum	fumosum	(Pers.: Fr.) Ort.	Hellbrauner Büschelrasling
Lyophyllum	connatum	(Schum.: Fr.) Sing.	Weisser Büschelrasling
Lyophyllum	decastes	(Fr.: Fr.) Singer	Brauner Büschelrasling
Lyophyllum	deliberatum	(Britz.) Kreisel	Rautensporiger Raseling
Lyophyllum	leucophaeatum	(Karsten) Karsten	Gerberei-Rasling
Lyophyllum	rancidum	(Fr.) Singer	Wurzel-Graublatt
Macrocystidia	cucumis	(Pers.: Fr.) Joss.	Gurkenschnitzling
Macrolepiota	excoriata	Schäff.: Fr.) Wass.	Ackerschirmling
Macrolepiota	mastoidea	(Fr.) Sing.	Zitzenschirmling
Macrolepiota	procera	(Scop.: Fr. Sg.	Parasol
Marasmiellus	perforans	(Hofmann: Fries) Antonin er Noord.	Nadel-Zwergschwindling
Marasmius	alliaceus	(Jacq.: Fr.) Fr.	Langstieliger Knoblauchschwindling
Marasmius	oreades	(Bolton.: Fr.) Fr.	Nelkenschwindling
Melanoleuca	amica	(Fr.) Sing. ss. Bres.	Föhren-Weichritterling
Melanoleuca	polioleuca	(Fr.) Kühn. & Mre.	Schwarzweisser Weichritterling
Mycena	epipterygia	(Scop.: Fr.) Gray	Dehnbarer Helmling
Mycena	galericulata	(Scop.:Fr.) Gray	Rosablättriger Helmling
Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
Mycena	rosea	(Bull.) Gramberg	Rosa-Rettichhelmling
Mycena	diosma	Krgl. & Schwöb.	Duftender Rettichhelmling
Mycena	inclinata	(Fr.) Quél.	Buntstieliger Helmling
Mycena	pelianthina	(Fr.: Fr.) Quél.	Schwarzgezähnelter Helmling
Mycena	zephirus	(Fr.: Fr.) Kumm.	Rostfleckiger Helmling
Mycena	crocata	(Schrad.: Fr.) Kumm.	Safranmilchender Helmling
Mycena	maculata	Karst.	Gefleckter Helmling
Mycena	stipata	Maas Geester.& Schw.	Büscheliger Nitrat-Helmling
Mycena	vitilis	(Fr.) Quél.	Zäher Fadenhelmling

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Mycena	rosella	(Fr.: Fr.) Kumm.	Rosa-Helmling
Naucoria	melinoides	(Bull.: Fr.) Kühn.	Honiggelber Sumpfschnitzling
Nyctalis	asterophora	Fr.	Stäubender Zwitterling
Nyctalis	parasitica	(Bull.: Fr.) Fr.	Beschleierter Zwitterling
Oudemansiella	mucida	(Schrad. ex Fr.) v.H.	Beringter Schleimrübling
Panellus	stypticus	(Bull.: Fr.) P.Karst.	Bitterer Muschelseitling
Pholiota	adiposa	(Fr.) Kumm.	Schleimiger Schüppling
Pholiota	flammans	(Fr.:) Kummer	Feuerschüppling
Pholiota	jahnii	Tjallingii-Beukers et Bas	Pinselschüppling
Pholiota	squarrosa	(Pers.: Fr.) Kumm.	Sparriger Schüppling
Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
Pluteus	aurantiorugosus	(Trog) Saccardo	Orangeroter Dachpilz
Pluteus	phlebophorus	(Ditmar.: Fr.) Kumm.	Runzeliger Dachpilz
Pluteus	plautus	(Weinm.) Gill.	Samtfüssiger Dachpilz
Psathyrella	piluliformis	(Bull.: Fr.) Ort.	Wässeriger Faserling
Psathyrella	cotonea	(Quél.) Kon. & Maub.	Schwefelfüssiger Faserling
Psathyrella	maculata	(Parker) A.H. Smith.	Fleckiger Saumpilz
Pseudoclitocybe	expallens	(Pers.) Sing.	Verblassender Gabeltrichterling
Pseudoclitocybe	cyathiformis	(Bull.) Sing.	Kaffebrauner Gabeltrichterling
Rhodocybe	gemina	(Fr.). Kuyp. & Noord.	Würziger Tellerling
Rickenella	swartzii	(Fr.) Kuyper	Lilastieliger Heftelnabeling
Ripartites	tricholoma	(Alb. & v. Schw.)	Bewimperter Filzkrempling
Stropharia	aeruginosa	(Curtis:) Fr./Quél.	Grünspansträuschling
Tricholoma	atrosquamosum	(Chev.) Sacc.	Schwarzschuppiger Ritterling
Tricholoma	orirubens	Quél.	Rötender Ritterling
Tricholoma	pseudonicticans	Bon	Blassfleischiger Fichtenritterling
Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
Tricholoma	sejunctum	(Sow.: Fr.) Quél.	Grüngelber Ritterling
Tricholoma	pessundatum	(Fr.) Quélet	Getropfter Kiefern-Ritterling
Tricholoma	sulphureum	(Bull.: Fr.) Kumm.	Schwefel-Ritterling
Tricholoma	albidum	Bon	Weisser Erdritterling
Tricholoma	cingulatum	(Ahnf.: Fr.) Jac.	Beringter Ritterling
Tricholoma	myomyces	(Pers.: Fr.) Lge.	Maus-Ritterling
Tricholoma	terreum	(Schäff.:) Fr.) Kumm.	Erdritterling
Tricholoma	vaccinum	(Pers.: Fr.) Kumm.	Zottiger Ritterling

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Tricholoma	ustale	(Fr.: Fr.) Kumm.	Brandiger Ritterling
Tricholoma	acerbum	(Bull.: Fr.) Quél.	Gerippter Ritterling
Tricholoma	apium	Schäff.	Sellerie-Ritterling
Tricholoma	columbetta	(Fr.) Kumm.	Seidiger Ritterling
Tricholoma	equestre	(L.: Fr.) Kumm.	Grünling
Tricholoma	fulvum	(DC.: Fr.) Sacc.	Gelbblättriger Ritterling
Tricholoma	lascivum	(Fr.) Gill. ss. Lge.	Unverschämter Ritterling
Tricholoma	scalpturatum	(Fr.) Quél.	Gilbender Erd-Ritterlig
Tricholoma	squarrulosum	Bres.	Stielschuppiger Ritterling
Tricholoma	tigrinum	Kumm.	Tiger-Ritterling
Tricholoma	umbonatum	Lge. ex Clç. & Bon	Buckliger Ritterling
Tricholoma	ustaloides	Romagn.	Bitterer Eichen-Ritterling
Tricholoma	virgatum	(Fr.: Fr.) Kumm.	Brennender Ritterling
Tricholoma	batschii	Gulden ex Christ. et Noordeloons	Fastberingter Ritterling
Tricholoma	cingulatum	(Ahnfelt) Jacobatsch	Beringter Erdritterling
Tricholoma	myomyces	(Pers.Fr.) Lange	Mausgrauer Erdritterling
Tricholoma	stiparophyllum	(Lund) Karsten	Gerippter Gasritterling
Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
Tricholomopsis	decora	(Fr.) Sing.	Olivgelber Holzritterling
Tubaria	conspersa	(Pers.: Fr.) Fay.	Flockiger Trompetenschnitzling
Tubaria	hiemalis	Romagn. ex Bon	Winter-Trompetenschnitzling
Volvariella	gloiocephala	(DC.: Fr.) Boek. & End.	Grosser Scheidling
Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
Lactarius	rufus	(Scop.: Fr.) Fr.	Rotbrauner Milchling
Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
Lactarius	chrysorrheus	Fr.	Goldfüssiger Milchling
Lactarius	intermedius	(Krombh.) Cke.	Grubiger Weisstannenmilchling
Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
Lactarius	semisanguifluus	Helm & Lecl.	Spangrün-weinroter Kiefernreizker
Lactarius	acris	(Bolt.: Fr.) Gray	Rosaanlaufender Milchling
Lactarius	aurantiacus	(Pers.: Fr.) Gray	Echter Orange-Milchling
Lactarius	badiosanguineus	Kühn & Rom.	Braunroter Milchling
Lactarius	camphoratus	(Bull.: Fr.) Fr.	Kamfermilchling
Lactarius	deliciosus	(L.): Fr.) Gray	Edelreizker

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Lactarius	deterrimus	Gröger	Fichtenreizker
Lactarius	evosmus	Kühn. & Rom.	Blasser Zonenmilchling
Lactarius	fulvissimus	Rom. i. Kühn. & Rom.	Orangefuchsiger Milchling
Lactarius	glyciosmus	(Fr.: Fr.) Fr.	Blasser Duftmilchling
Lactarius	hepaticus	Plowr. in Poud.	Leberbrauner Milchling
Lactarius	lacunarum	(Rom.) Lge. ex Hora	Pfützenmilchling
Lactarius	luridus	(Pers.: Fr.) Gray	Gewöhnlicher Violettmilchling
Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
Lactarius	picinus	Fr.	Pechschwarzer Milchling
Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
Lactarius	pubescens	(Schrad.) Fries	Flaumiger Milchling
Lactarius	pyrogalus	(Bull.: Fr.) Fr.	Scharfer Hasel-Milchling
Lactarius	quietus	(Fr.) Fr.	Eichenmilchling
Lactarius	sanguifluus	(Paul) Fr.	Blutreizker
Lactarius	subumbonatus	Lindgren	Schwachnabeliger Milchling
Lactarius	tabidus	Fr. (non ss. Boud.Neuh)	Flattermilchling
Lactarius	trivialis	(Fr.: Fr.) Fr.	Nordischer Milchling
Lactarius	turpis	(Weinm.) Fr.	Olivbrauner Milchling
Lactarius	vietus	(Fr.) Fr.	Grünfleckender Milchling
Russula	amethystina	Quélet	Amethysttäubling
Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
Russula	emetica	(Schäff.: Fr.) Gray	Kirschroter Speitäubling
Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
Russula	queletii	Fr. in Quél.	Stachelbeertäubling
Russula	turci	Bres.	Jodoformtäubling
Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
Russula	faginea	Romagn.	Buchen-Heringstäubling
Russula	integra	(L.:) Fr. ss. Mre.	Braunroter Ledertäubling
Russula	laurocerasi	Melzer	Mandeltäubling
Russula	albonigra	(Krombh.) Fr.	Mentoltäubling
Russula	atropurpurea	(Krombh.) Britz.	Pupurschwarzer Täubling
Russula	badia	Quél.	Zedernholztäublig
Russula	chloroides	(Krombh.) Bres.	Schmalblättriger Weisstäubling

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Russula	luteotacta	Rea	Gelbfleckender Täubling
Russula	mairei	Singer	Buchen-Speitäubling
Russula	mustelina	Fr.	Wieseltäubling
Russula	nauseosa	(Pers.) Fr..	Geriefter Weichtäubling
Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
Russula	parazurea	Schäffer	Blaugüner Reiftäubling
Russula	sanguinea	(Bull. ex St. Am.) Fr.	Blutroter Täubling
Russula	xerampelina	Schäff.: Fr.	Roter Heringstäubling
Russula	fragrantissima	Rom.	Starkduftender Stinktäubling
Albatrellus	cristatus	(Schäff.: Fr.) Kotl. & Pouz.	Grüner Kammporling
Albatrellus	pes-caprae	(Pers.) Pouz.	Ziegenfussporling
Boletopsis	leucomelaena	(Pers.) Fayod	Grauer Russporling
Bondarzewia	montana	(Quél.) Singer	Bergporling
Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
Cantharellus	cinereus	Pers. ex Fr.	Grauer Leistling
Cantharellus	friesii	Quél.	Fries´scher Pfifferling
Cantharellus	melanoxeros	Desm.	Gelbvioletter Pfifferling
Cantharellus	tubaeformis	Fr.	Durchbohrter Leistling
Clavariadelphus	liguta	(Schäff.: Fr.) Donk	Zungenkeule
Clavariadelphus	pistilaris	(Fr.) Donk	Herkuleskeule
Clavariadelphus	truncatus	(Quél.) Donk	Abgestutzte Herkuleskeule
Clavulina	cinereus	(Bull.: Fr.) Schröt.	Graue Koralle
Climacocystis	borealis	(Fr.) Kotl. & Pouz.	Nordischer Porling
Coltricia	perennis	(L.: Fr.) Murrill	Brauner Dauerporling
Coriolopsis	gallica	(Fr.) Ryv.	Braune Borstentramete
Craterellus	cornucopioides	Pers.	Totentrompete
Daedalea	quercina	(L. ex Fr.)	Eichenwirrling
Daedaleopsis	confragosa	(Bolt.: Fr.) Schröt. s. str.	Rötende Tramete
Datronia	mollis	(Sommerf.: Fr.) Donk	Weicher Resupinatporling
Dentropolyporus	umbellatus	(Pers.: Fr.) Jül.	Eichhase
Fomes	fomentarius	(L.: Fr.) Fr.	Echter Zunderschwamm
Fomitopsis	pinicola	(Fr.) Karst.	Rotbrauner Baumschwamm
Ganoderma	lipsiense	(Batsch.: Pers.) Atkinson	Flacher Lackporling
Ganoderma	lucidum	(Curt.: Fr.) Karst.	Glänzender Lackporling
Gloeophyllum	odoratum	(Wulf.: Fr.) Imyzeki	Fencheltramete

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Hydnellum	peckii	Banker in Peck	Scharfer Korkstacheling
Hydnellum	suaveolens	(Scop. Ex. Fries) Karst	Wohlriechender Korkstacheling
Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
Hymenochaeta	rubiginosa	(Dicks.: Fr.) Lév.	Rotbrauner Borstenscheibling
Inonotus	cuticularis	(Bull.: Fr.) Karst.	Flacher Schillerporling
Inonotus	dryadeus	(Pers.: Fr.) Murrill	Tropfender Schillerporling
Inonotus	dryophilus	(Berk.) Murrill	Eichen-Schillerporling
Inonotus	hispidus	(Fr.) Karst.	Zottiger Schillerporling
Inonotus	radiatus	(Sow. ex Fr.) Karst.	Erlen-Schillerporling
Ischnoderma	benzoinum	(Wahl.: Fr.) Karst.	Schwarzgebänderter Harzporling
Ischnoderma	trogii	(Fr.) Donk	Gestielter Tannen-Harzporling
Lenzites	warnieri	Dur. & Mont.	Pappelblättling
Lenzites	betulina	(L. ex Fr.) Fr.	Birkenblättling
Macrotyphula	filiformis	(Bulliard) Paechnatz	Fadenförmige Röhrenkeule
Meripilus	giganteus	(Pers.: Fr.) Karst.	Riesenporling
Merulius	tremellosus	Fr.	Gallertfleischiger Fältling
Oligoporus	leucomallelus	(Murr.) Gilb. & Ryv.	Gloecystiden-Saftporling
Oligoporus	placenta	(Fr.) Gilb. & Ryv.	Rosafarbener Saftporling
Phellinus	conchatus	(Pers.: Fr.) Quél.	Muschelförmiger Feuerschwamm
Phellinus	contiguus	(Pers.: Fr.) Pat.	Grosssporiger Feuerschwamm
Phellinus	hartigii	(All. & Schn.) Bond.	Tannen-Feuerschwamm
Phellinus	hippophaëcola	Jahn	Sanddorn-Feuerschwamm
Phellinus	igniarius	(L.: Fr.) Quél.	Falscher Zunderschwamm
Phellinus	punctatus	(Fr.: Karst.) Pilát	Polsterförmiger Feuerschwamm
Phellinus	robustus	(Karst.) Bourd. & Galz.	Eichen-Feuerschwamm
Phellinus	trivialis	(Bres.) Kreisel	Weiden-Feuerschwamm
Phellinus	tuberculosus	(Baumg.) Niem.	Pflaumen-Feuerschwamm
Phellodon	niger	(Fr. ex Fr.) Karst.	Schwarzer Duftstacheling
Phellodon	tomentosus	(L.: Fr.) Banker	Becherförmiger Korkstacheling
Piptoporus	betulinus	(Bulliard) Karsten	Birken-Hautporling
Polyporus	badius	(Pers.: Gray) v. Schw.	Kastanienbrauern Porling
Polyporus	melanopus	(Pers.: Sw.) Fr.	Braunfuss-Porling
Polyporus	mori	Pollini: Fr.	Wabenporling
Pseudocraterellus	sinuosus	(Fr.: Fr.) Reid.	Krauser Leistling
Pycnoporellus	fulgens	(Fr.) Donk	Leuchtender Weichporling

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Pycnoporus	cinnabarinus	(Jacq.: Fr.) Karst.	Zinnoberrote Tramete
Ramaria	abietina	(Pers.: Fr.) Quél.	Gelbgrüne Koralle
Ramaria	stricta	(Pers.: Fr.) Quél. s. str.	Steife Koralle
Ramaria	pallida	(Schäff. em. Bres.) Ricken	Bauchwehkoralle
Sarcodon	imbricatus	(L.: Fr.) Karst.	Habichtsstacheling
Sarcodon	imbricatus	(L. ex Fr.) Karst.	Habichtspilz
Schizopora	paradoxa	(Schrad.: Fr.) Donk	Veränderlicher Spaltporling
Sistotrema	confluens	Fr.	Gestielter Zahnling
Sparassis	crispa	(Wulf. in Jacq.) Fr.	Krause Glucke
Stereum	subtomentosum	Pouzar	Samtiger Schichtpilz
Telephora	palmata	Scop.: Fr.	Stinkender Warzenpilz
Telephora	terrestris	Fr.	Fächerförmiger Erdwarzenpilz
Trametes	versicolor	(L.: Fr.) Pilát	Schmetterlings-Tramete
Trametes	gibbosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Buckel-Tramete
Trametes	hirsuta	(Wulf.: Fr.) Pilát	Striegelige Tramete
Trametes	suaveolens	(Fr.) Fr.	Anis-Tramete
Trichaptum	abietinum	(Fr.) Ryv.	Tannentramete
Bovista	plumbea	Pers. ex Pers.	Eierbovist
Calvatia	utriformis	(Bul.: Pers.:) Jaap	Hasenbovist
Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
Lycoperdon	molle	Pers.: Pers.	Weichlicher Stäubling
Lycoperdon	pyriforme	Schäff.: Pers.	Birnen-Stäubling
Lycoperdon	umbrinum	Pers.: Pers.	Brauner Stäubling
Vascellum	pratense	Pers.: Pers.) Kreisel	Wiesen-Stäubling
Auricularia	auricula-judae	(Bull. ex St. Am.) Wettst.	Judasohr
Calocera	viscosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Klebriger Hörnling
Aleuria	aurantia	(Fr.) Fuckel	Gemeiner Orangebecherling
Bisporella	citrina	(Batsch ex Fr.) Korf & Carpenter	Zitronengelbes Holzbecherchen
Gyromitra	Infula	(Bres.) Kreisel	Bischofsmütze
Helvella	crispa	(Bull. ex St. Aman) Boud.	Herbstlorchel
Helvella	lacunosa	(Pers.) O. Kuntze	Grubenlorchel
Helvella	macropus	(Pers.: Fr.) Karsten	Langfuss-Lorchel
Helvella	macropus	(Weber: Fr.) Fuckel	Langfuss-Lorchel
Otidea	onotica	(Pers.) Fuck.	Eselsohr

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze und die Pilztafeln ab S.13) befinden sich auf dieser HP. Fotos ohne Autor-Angabe sind vom Webbetreuer K. Minder.

Hygrophorus chrysodon | Goldzahn-Schneckling

Pilze der Woche 42
Herbstbummel

Pholiota squarrosa | *Sparriger Schüppling*

Standort: An Laub- und Nadelholz.
Fruchtkörper: Hut bis 100 mm.
Mikromerkmale: Sporen 7 x 4 µm mit kleinem Keimporus, mit Chrysozystiden. Die Schuppen auf dem Hut sind trichodermal aufgebaut.
Bemerkungen: Ein grosser Schüppling mit trockenen Hut. Andere, ähnliche Schüpplinge haben einen schmierigen Hut.

Cortinarius triumphans | *Gelbgestiefelter Schleimkopf*

Standort: Bei Birken an sumpfigen Stellen.
Fruchtkörper: Hut bis 90 mm.
Mikromerkmale: Sporen 12 x 7 µm.
Bemerkungen: Dieser stattliche Cortinar gehört in die Sektion Triumphantes mit gelbem Velum. Der Standort und der gelbgestiefelte Stiel kennzeichen diese Art gut.

Limacella guttata
Getropfter Schleimschirmling

Standort: Laub- und Nadelwald.
Fruchtkörper: Hut bis 100 mm.
Mikromerkmale: Sporen 5 x 4 µm. HDS im Zentrum ein Ixotrichoderm.
Bemerkungen: Der Hut ist bei feuchtem Wetter etwas schmierig. Geruch und Geschmack mehlartig.

Pholiota squarrosa | *Sparriger Schüppling*

Cortinarius triumphans | *Gelbgestiefelter Schleimkopf*

Limacella guttata | *Getropfter Schleimschirmling*

Pilz-Fundliste der Woche 42 (Herbstbummel)

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Chroogomphus	rutilus	(Schaeff.: Fr.) O.K. Miller	Kupferroter Gelbfuss
Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
Suillus	luteus	(L.: Fr.) Rouss.	Butterpilz
Xerocomus	pruinatus	(Fr.) Quél.	Stattlicher Rotfuss-Röhrling
Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
Amanita	muscaria	(L.) Hook.	Fliegenpilz
Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
Armillaria	mellea	(Val.: Fr.) Kummer	Honiggelber Hallimasch
Bolbitius	vitellinus	(Pers.: Fr.) Fr.	Gold-Mistpilz
Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
Clitocybe	phyllophila	(Pers.) Kumm.	Bleiweisser Trichterling
Clitocybula	lacerata	(Scropoli) Métrod	Fransiger Faserrübling
Coprinus	comatus	(Müll.: Fr.) Pers.	Schopf-Tintling
Coprinus	micaceus	(Bull.: Fr.) Fr.	Glimmertintling
Cortinarius	anserinus	(Vel.) Hry.	Buchen-Klumpfuss
Cortinarius	cagei	Melot	Zweifarbiger Wasserkopf
Cortinarius	calochrous	Fr.	Amethystblättriger Klumpfuss
Cortinarius	cinnabarinus	Fr.	Zinnoberroter Wasserkopf
Cortinarius	delibutus	Fr.	Violettblättriger Schleimfuss
Cortinarius	infractus	(Pers.: Fr.) Fr.	Bitterer Schleimfuss
Cortinarius	mussivus	(Fr.) Melot	Stinkender Schleimkopf
Cortinarius	nemorensis	(Fr.) Lge.	Verfärbender Schleimkopf
Cortinarius	odorifer	Britz	Anis-Klumpfuss
Cortinarius	orichalceus	Fr.	Blutroter Klumpfuss
Cortinarius	praestans	(Cord.) Gill.	Schleiereule
Cortinarius	salor	Fr.	Blauer Schleimfuss
Cortinarius	splendens	Hry.	Schöngelber Klumpfuss
Cortinarius	triumphans	(Fr.) Fr.	Gelbgestiefelter Schleimkopf
Cortinarius	varius	Fr.	Ziegelgelber Schleimkopf
Cortinarius	violaceus	(L.:Fr.) Fr.	Dunkelvioletter Schleierling
Cystoderma	amiantinum	(Scop.: Fr.) Fayod	Amiant-Körnchenschirmling
Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
Entoloma	rhodop. v. nidorosum	(Fr.)Nordel./Kumm.	Alkalischer Rötling
Flammulina	velutipes	(Curtis.:Fr.) Singer	Samtfussrübling

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Galerina	stylifera	(Atk.) Sm. & Sing.	Behangener Häubling
Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
Hebeloma	radicosum	(Bull.: Fr.) Rick.	Wurzelnder Fälbling
Hebeloma	senescens	(Batsch) Berk.	Bräunender Fälbling
Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
Hebeloma	sordescens	Vesterholt	Schwarzknolliger Fälbling
Hemimycena	cucullata	(Pers.: Fr.) Sing.	Gipsweisser Scheinhelmling
Hohenbuhelia	auriscalpium	(Maire) Singer	Späne-Muscheling
Hygrophorus	chrysodon	(Batsch.: Fr.) Fr	Goldzahn-Schneckling
Hygrophorus	eburneus	(Bull:. Fr.) Fr.	Elfenbein-Schneckling
Hygrophorus	poetarum	Heim	Isabell-Schneckling
Hygrophorus	pudorinus	(Fr.) Fr.	Orange-Schneckling
Hypholoma	capnoides	(Fr.: Fr.) Kummer	Rauchblättriger Schwefelkopf
Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
Hypholoma	sublateritium	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf
Inocybe	cervicolor	(Pers.) Quél.	Hirschbrauner Risspilz
Inocybe	corydalina	Quél.	Grünbuckliger Risspilz
Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
Inocybe	haemacta	(Berk. & Cke.) Sacc.	Grünroter Risspilz
Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
Lacrymaria	lacrymabunda	(Bull.: Fr.) Pat.	Tränender Samumpilz
Lentinus	torulosus	(Pers.: Fr. Lloyd	Laubholz-Knäueling
Lepiota	clypeolaria	(Bull.: Fr.) Kumm.	Wolliggestiefelter Schirmling
Lepista	flaccida	(Sowerby Fries) Patouillard	Fuchsiger Rötelritterling
Lepista	glaucocana	(Bres.) Sing.	Blassblauer Rötelritterling
Limacella	guttata	(Fr.) Konr. et Maubl.	Getropfter Schleimschirmling
Lyophyllum	connatum	(Schum.: Fr.) Sing.	Weisser Büschelrasling
Lyophyllum	rancidum	(Fr.) Singer	Wurzel-Graublatt
Macrocystidia	cucumis	(Pers.: Fr.) Joss.	Gurkenschnitzling
Mycena	epipterygia	(Scop.: Fr.) Gray	Dehnbarer Helmling
Pholiota	flammans	(Fr.:) Kummer	Feuerschüppling
Pholiota	jahnii	Tjallingii-Beukers et Bas	Pinselschüppling
Pholiota	lenta	(Pers.: Fr.) Singer	Tonweisser Schüppling
Pholiota	squarrosa	(Pers.: Fr.) Kumm.	Sparriger Schüppling
Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Pluteus	salicinus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Grauer Dachpilz
Pseudoclitocybe	cyathiformis	(Bull.) Sing.	Kaffebrauner Gabeltrichterling
Tricholoma	inamoenum	(Fr.) Quél.	Lästiger Ritterling
Tricholoma	terreum	(Schäff.:) Fr.) Kumm.	Erdritterling
Tricholoma	ustale	(Fr.: Fr.) Kumm.	Brandiger Ritterling
Xerula	melanotricha	Dörfelt	Weisstannen-Wurzelrübling
Lactarius	acris	(Bolt.: Fr.) Gray	Rosaanlaufender Milchling
Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
Lactarius	intermedius	(Krombh.) Cke.	Grubiger Weisstannenmilchling
Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
Lactarius	picinus	Fr.	Pechschwarzer Milchling
Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
Lactarius	romagnesii	Bon	Kerbrandiger Korallenmilchling
Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
Lactarius	scrobiculatus	(Scop.: Fr.) Fr.	Grubiger Fichtenmilchling
Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
Russula	integra	(L.:) Fr. ss. Mre.	Braunroter Ledertäubling
Cantharellus	tubaeformis	Fr.	Durchbohrter Leistling
Clavulina	cinereus	(Bull.: Fr.) Schröt.	Graue Koralle
Clavulina	cristata	(Holmskj.: Fr.) Schröt.	Kammförmige Koralle
Climacocystis	borealis	(Fr.) Kotl. & Pouz.	Nordischer Porling
Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
Ramaria	stricta	(Pers.: Fr.) Quél. s. str.	Steife Koralle
Trametes	gibbosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Buckel-Tramete
Trametes	hirsuta	(Wulf.: Fr.) Pilát	Striegelige Tramete
Trametes	versicolor	(L.: Fr.) Pilát	Schmetterlings-Tramete
Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
Lycoperdon	pyriforme	Schäff.: Pers.	Birnen-Stäubling
Calocera	viscosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Klebriger Hörnling
Pseudohydnum	gelatinosum	(Scop.: Fr.) Karst.	Zitterzahn
Aleuria	aurantia	(Fr.) Fuckel	Gemeiner Orangebecherling
Helvella	elastica	Boud.	Elastische Lorchel
Helvella	lacunosa	(Pers.) O. Kuntze	Grubenlorchel
Peziza	succuosa	(Hedw.) Fr.	Gelbmilchender Becherling
Xylaria	hypoxylon	Nitschke	Geweihförmige Holzkeule

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze und die Pilztafeln ab S.13) befinden sich auf dieser HP. Fotos ohne Autor-Angabe sind vom Webbetreuer K. Minder.

Hygrophorus olivaceoalbus | Natterstieliger Schneckling

Pilze der Woche 43

Bjerkandera adusta

Angebrannter Rauchporling

Standort:	Totes Holz von Laubbäumen.
Fruchtkörper:	Hut bis 60 mm.
Mikromerkmale:	Sporen 5 x 2,5 µm. Hyphensystem monomitisch, mit Schnallen.
Bemerkungen:	Die Porenschicht ist zuerst hellgrau, wird jedoch später und bei Druck dunkel- bis schwarzgrau. Die Poren sind sehr klein. Am gleichen Substrat befindet sich noch Xylaria hypoxylon, ein Ascomycet mit schwarzen Sporen, die eine Keimspalte. haben.

Cortinarius salor | *Blauer Schleimfuss*

Standort:	Laub- und Nadelwald.
Fruchtkörper:	Hut bis 60 mm.
Mikromerkmale:	Sporen 10 x 8 µm, rundlich.
Bemerkungen:	Diese Art ist farblich ziemlich veränderlich. Ältere Pilze können mit C. epipoleus verwechselt werden, der aber ein Nadelholzbegleiter ist, schwach warzige und etwas kleinere Sporen hat. Autoren wie Brandrud sind jedoch der Auffassung, dass die beiden oben erwähnten Arten eine und die selbe Art sind.

Bjerkandera adusta | *Angebrannter Rauchporling*

Cortinarius salor | *Blauer Schleimfuss*

Pilz-Fundliste der Woche 43

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
Armillaria	ostoyae	Romagn.	Dunkler Hallimasch
Clitocybe	cerussata	(Fries) P. Kummer	Ähnlich Waldfreund Trichterling
Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
Clitocybe	metachroa	(Fr.) Kumm.	Staubfüssiger Trichterling
Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
Cortinarius	anomalus	(Fr.: Fr.) Fr.	Braunvioletter Dickfuss
Cortinarius	salor	Fr.	Blauer Schleimfuss
Galerina	stylifera	(Atk.) Sm. & Sing.	Behangener Häubling
Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
Gymnopus	butyracea	(Bull.: Fr.) P. Kumm.	Butterrübling
Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
Gymnopus	distorta	(Fr.) Quél.	Drehstieliger Rübling
Hygrophorus	olivaceoalbus	(Fr.: Fr.) Fr.	Natterstieliger Schneckling
Hygrophorus	pustulatus	(Fr.) Fr.	Schwarzpunktierter Schneckling
Hypholoma	capnoides	(Fr.: Fr.) Kummer	Rauchblättriger Schwefelkopf
Inocybe	fuscidula	Vel.	Braunstreifiger Risspilz
Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
Lepista	flaccida	(Sowerby Fries) Patouillard	Fuchsiger Rötelritterling
Lepista	nuda	(Bull.: Fr.) Cooke	Violetter Rötelritterling
Lyophyllum	fumosum	(Pers.: Fr.) Ort.	Hellbrauner Büschelrasling
Mycena	metata	(Fr.: Fr.) Kumm.	Kegeliger Helmling
Pholiota	lenta	(Pers.: Fr.) Singer	Tonweisser Schüppling
Stropharia	aeruginosa	(Curtis:) Fr./Quél.	Grünspansträuschling
Tricholoma	terreum	(Schäff.:) Fr.) Kumm.	Erdritterling
Lactarius	aurantiacus	(Pers.: Fr.) Gray	Echter Orange-Milchling
Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
Bjerkandera	adusta	(Willd.: Fr.) Karst.	Angebrannter Rauchporling

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
Clavulina	cinereus	(Bull.: Fr.) Schröt.	Graue Koralle
Polyporus	brumalis	Pers.: Fr.	Winterporling
Geastrum	triplex	Jungh.	Halskrausen-Erdstern
Xylaria	hypoxylon	Nitschke	Geweihförmige Holzkeule
Xylaria	longipes	(Pers. ex Mér.) Grev.	Langstielige Ahorn-Holzkeule

Clitocybe nebularis | Nebelgrauer Trichterling

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze und die Pilztafeln ab S.13) befinden sich auf dieser HP. Fotos ohne Autor-Angabe sind vom Webbetreuer K. Minder.

Glitocybe phaeophthalma | Bitterlicher Trichterling

Pilze der Woche 44

Clitocybe vibecina | *Weicher Trichterling*

Standort: Nadel- und Laubwald.
Fruchtkörper: Hut bis 50 mm.
Mikromerkmale: Sporen 6 x 3,5 µm.
Bemerkungen: Dieser Trichterling gehört zu denjenigen Arten mit grauen Lamellen, einem feucht grauen, etwas speckig glänzendem Hut und kaum wahrnehmbarem Geruch. Auffallend ist der eingerollte und geriefte Hutrand. Weitere Trichterlinge mit grauen Lamellen unterscheiden sich zu C. vibecinae durch Sporengrösse und Geruch.

Phleogena faginea | *Buchen-Köpfchenträger*

Standort: Laubbäume.
Fruchtkörper: Hut bis 6 mm hoch, Kopfteil bis 3 mm ø.
Mikromerkmale: Sporen 4,5-9x 4,5-10 µm, gelblichbraun, mit Konidiensporen. Die Basidien sind querseptiert, 4-teilig. Schnallen vorhanden.
Bemerkungen: Dieser Pilz erinnert an einen Schleimpilz. Ein weiteres makroskopisches Merkmal ist der Maggi-Geruch.

Finder und Fotos: *Markus Wilhelm*.



HDS von Glitocybe phaeophthalma

Clitocybe vibecina | *Weicher Trichterling*

Phleogena faginea | *Buchen-Köpfchenträger*

junge Basidien

Basidien in Kongo,
querseptiert, mit kaum sichtbaren
Sterigmen, Sporen dickwandig,
breiter als lang

10 µm

Phleogena | *faginea*

Pilz-Fundliste der Woche 44

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Aleuria	aurantia	(Fr.) Fuckel	Gemeiner Orangebecherling
Ascocoryne	sarcoides	(Jacquin ex S.F. Fray) Groves & Wilson	Fleischroter Gallertbecher
Bjerkandera	adusta	(Willd.: Fr.) Karst.	Angebrannter Rauchporling
Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
Clavulina	cristata	(Holmskj.: Fr.) Schröt.	Kammförmige Koralle
Clitocybe	cerussata	(Fries) P. Kummer	Ähnlich Waldfreund Trichterling
Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
Clitocybe	metachroa	(Fr.) Kumm.	Staubfüssiger Trichterling
Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
Clitocybe	phaeophthalma	(Pers.) Kp.	Ranziger Trichterling
Clitocybe	vibecina	(Fr.:Fr.) Quél.	Weicher Trichterling
Coprinus	atramentarius	(Bull.:Fr.) Fr.	Falten-Tintling
Coprinus	comatus	(Müll.: Fr.) Pers.	Schopf-Tintling
Cortinarius	anomalus	(Fr.: Fr.) Fr.	Braunvioletter Dickfuss
Cortinarius	elegantissimus	Hry.	Prächtiger Klumpfuss
Cortinarius	salor	Fr.	Blauer Schleimfuss
Daedaleopsis	tricolor	(Pers.) Bond. & Sing.	Purpurrote Tramete
Daldinia	concentrica	(Bolt. ex Fr.) Ces. & de Not.	Kohliger Kugelpilz
Galerina	stylifera	(Atk.) Sm. & Sing.	Behangener Häubling
Geastrum	sessile	(Sow.) Pouz.	Gewimperter Erdstern
Geastrum	triplex	Jungh.	Halskrausen-Erdstern
Gloeophyllum	odoratum	(Wulf.: Fr.) Imyzeki	Fencheltramete
Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
Hebeloma	mesophaeum	(Pers.: Fr.) Quélet	Dunkelscheibiger Fälbling
Hebeloma	crustuliniforme	(Bull.: Fr.) Quél.	Tongrauer Fälbling
Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
Hebeloma	sordescens	Vesterholt	Schwarzknolliger Fälbling
Helvella	crispa	(Bull. ex St. Aman) Boud.	Herbstlorchel
Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
Hygrophorus	chrysodon	(Batsch.: Fr.) Fr	Goldzahn-Schneckling
Hygrophorus	pudorinus	(Fr.) Fr.	Orange-Schneckling
Hypholoma	capnoides	(Fr.: Fr.) Kummer	Rauchblättriger Schwefelkopf

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Hypholoma	marginatum	(Pers.: Fr.) Schroet.	Geselliger Schwefelkopf
Hypholoma	sublateritium	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf
Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
Inocybe	nitiduscula	(Britz.) Sacc.	Früher Risspilz
Ischnoderma	benzoinum	(Wahl.: Fr.) Karst.	Schwarzgebänderter Harzporling
Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
Lepiota	ventriosospora	Reid	Gelbwolliger Schirmling
Lepista	flaccida	(Sowerby Fries) Patouillard	Fuchsiger Rötelritterling
Lepista	glaucocana	(Bres.) Sing.	Blassblauer Rötelritterling
Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
Lycoperdon	pyriforme	Schäff.: Pers.	Birnen-Stäubling
Lyophyllum	decastes	(Fr.: Fr.) Singer	Brauner Büschelrasling
Lyophyllum	paelochroum	Clmç.	Lemfarbener Schwärzling
Marasmius	alliaceus	(Jacq.: Fr.) Fr.	Langstieliger Knoblauchschwindling
Marasmius	torquescens	Quél.	Ledergelber Schwindling
Meruliopsis	corium	(Fr.) Ginns	Lederartiger Fältling
Merulius	tremellosus	Fr.	Gallertfleischiger Fältling
Mycena	epipterygia	(Scop.: Fr.) Gray	Dehnbarer Helmling
Mycena	pelianthina	(Fr.: Fr.) Quél.	Schwarzgezähnelter Helmling
Mycena	rosea	(Bull.) Gramberg	Rosa-Rettichhelmling
Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
Phleogena	faginea	(Fr. ex. Fr.) Link	Buchen-Köpfchenträger
Pholiota	adiposa	(Fr.) Kumm.	Schleimiger Schüppling
Pholiota	graminis	(Quél.) Sing.	Gras-Schüppling
Pleurotus	ostreatus	(Jacquin: Fr.) Kummer	Austern-Seitling
Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
Polyporus	badius	(Pers.: Gray) v. Schw.	Kastanienbrauern Porling
Psathyrella	microrrhiza	(Lasch.: Fr.)	Wurzelnder Faserling
Psathyrella	multipedata	(Peck) Sm.	Büscheliger Faserling
Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
Steccherinum	ochraceum	(Pers.ap.Gmel.: Fr.) S.F. Gray	Ockerrötlichr Resupinatstacheling

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Stropharia	albonites	(Fr.) Karst.	Hyalinweisser Träuschling
Stropharia	caerulea	Kreisel	Blauer Träuschling
Suillus	collinitus	Fr. ss. Flury, Mos.	Ringloser Butterröhrling
Suillus	granulatus	(L.: Fr.) Rouss.	Körnchenröhrling
Trametes	gibbosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Buckel-Tramete
Tremella	foliacea	(Pers. S.F. Gray) Pers.	Rotbrauner Zitterling
Tricholoma	scalpturatum	(Fr.) Quél.	Gilbender Erd-Ritterlig
Tricholoma	sulphureum	(Bull.: Fr.) Kumm.	Schwefel-Ritterling
Tricholoma	terreum	(Schäff.:) Fr.) Kumm.	Erdritterling
Tubaria	hiemalis	Romagn. ex Bon	Winter-Trompetenschnitzling
Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
Xylaria	hypoxylon	Nitschke	Geweihförmige Holzkele
Xylaria	polymorpha	(Pers.: Fr.) Greville	Vielgestaltige Holzkeule

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze und die Pilztafeln ab S.13) befinden sich auf dieser HP. Fotos ohne Autor-Angabe sind vom Webbetreuer K. Minder.

Hygrophorus pustulatus | Schwarzpunktierter Schneckling

Pilze der Woche 45

Russula fellea | *Gallentäubling*

Standort: Laubwald.
Fruchtkörper: Hut bis 90 mm.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 7,5 µm, netzig-warzig.
Bemerkungen: Dieser weisssporige Täubling hat, im Gegensatz zu R. ochroleuca, ebenfalls ein Weisssporer, nicht ganz weisse Lamellen und er ist sehr scharf, was beim Ockertäubling nicht der Fall ist.

Cortinarius ochroleucus

Standort: Laubwald.
Fruchtkörper: Hut bis 40 mm.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 5 µm.
Bemerkungen: Einge Autoren synomisieren diesen Pilz mit C. barbatus. Auch C. eburneus ist sehr ähnlich in Farbe und Sporenmasse. Unterschiede sind die Hutfarbe, die bei C. ochroleucus etwas intensiver ins ockerliche geht und der kaum kleberige Hut bei C. ochreaceus.

Lactarius rufus | *Rotbrauner Milchling*

Standort: Nadelwald.
Fruchtkörper: Hut bis 100 mm.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 6 µm, netzig-warzig.
Bemerkungen: Dieser scharfe Milchling hat jung meistens einen spitzen Buckel auf dem Hut. Milch weiss.

Russula fellea | *Gallentäubling*

Cortinarius ochroleucus

Lactarius rufus | *Rotbrauner Milchling*

Pilz-Fundliste der Woche 45

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Chalciporus	piperatus	(Bull.: Fr.) Bat.	Pfeffer-Röhrling
Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
Suillus	collinitus	Fr. ss. Flury, Mos.	Ringloser Butterröhrling
Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
Clitocybe	fragrans	(With.) Kumm.	Dufttrichterling
Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
Clitocybe	ericetorum	(Bulliard) Quélet	Heide-Trichterling
Coprinus	atramentarius	(Bull.:Fr.) Fr.	Falten-Tintling
Cortinarius	melanotus	Kalchbr.	Braunnetziger Rauhkopf
Cortinarius	ochroleucus	(Schäff.: Fr.) Fr.	
Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämling
Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
Hygrophorus	pudorinus	(Fr.) Fr.	Orange-Schneckling
Hygrophorus	pustulatus	(Fr.) Fr.	Schwarzpunktierter Schneckling
Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
Inocybe	geophylla var. lilacina	(Peck.) Gill.	Lilastieliger Risspilz
Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
Lepiota	clypeolaria	(Bull.: Fr.) Kumm.	Wolliggestiefelter Schirmling
Lyophyllum	rancidum	(Fr.: Fr.) Sing.	Wurzel-Graublatt
Mycena	maculata	Karst.	Gefleckter Helmling
Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
Panellus	stypticus	(Bull.: Fr.) P.Karst.	Bitterer Muschelseitling
Psathyrella	microrrhiza	(Lasch.: Fr.)	Wurzelnder Faserling
Pseudoclitocybe	cyathiformis	(Bull.) Sing.	Kaffebrauner Gabeltrichterling
Ripartites	tricholoma	(Alb. & v. Schw.)	Bewimperter Filzkrepling
Tricholoma	atrosquamosum	(Chev.) Sacc.	Schwarzschuppiger Ritterling
Tricholoma	pseudonicticans	Bon	Blassfleischiger Fichtenritterling
Tricholoma	sciodes	(Secr.) Martin	Schärflicher Ritterling
Tricholoma	terreum	(Schäff.:) Fr.) Kumm.	Erdritterling
Volvariella	gloiocephala	(DC.: Fr.) Boek. & End.	Grosser Scheidling

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Lactarius	deterrimus	Gröger	Fichtenreizker
Lactarius	intermedius	(Krombh.) Cke.	Grubiger Weisstannenmilchling
Lactarius	rufus	(Scop.: Fr.) Fr.	Rotbrauner Milchling
Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmichling
Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
Russula	amethystina	Quélet	Amethysttäubling
Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
Russula	luteotacta	Rea	Gelbfleckender Täubling
Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
Russula	queletii	Fr. in Quél.	Stachelbeertäubling
Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
Bjerkandera	adusta	(Willd.: Fr.) Karst.	Angebrannter Rauchporling
Cantharellus	cibarius var. ameth.	Quél.	Lilahütiger Eierschwamm
Cantharellus	tubaeformis	Fr.	Durchbohrter Leistling
Cerocorticum	molare	(Chaill.: Fr.) Jül. & Stalp.	Gezähnter Reibeisenpilz
Clavulina	cristata	(Holmskj.: Fr.) Schröt.	Kammförmige Koralle
Daedalea	quercina	(L. ex Fr.)	Eichenwirrling
Daedaleopsis	confragosa	(Bolt.: Fr.) Schröt. s. str.	Rötende Tramete
Fomes	fomentarius	(L.: Fr.) Fr.	Echter Zunderschwamm
Fomitopsis	pinicola	(Fr.) Karst.	Rotbrauner Baumschwamm
Ganoderma	lipsiense	(Batsch.: Pers.) Atkinson	Flacher Lackporling
Heterobasidion	annosum	(Fr.) Bref.	Wurzelschwamm
Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
Inonotus	dryadeus	(Pers.: Fr.) Murrill	Tropfender Schillerporling
Merulius	tremellosus	Fr.	Gallertfleischiger Fältling
Phellinus	hartigii	(All. & Schn.) Bond.	Tannen-Feuerschwamm
Phlebia	radiata	Fr.	Orangefarbener Kammpilz
Piptoporus	betulinus	(Bulliard) Karsten	Birken-Hautporling
Spongiporus	subcaesius	David	Fastblauer Saftporling
Steccherinum	ochraceum	(Pers.ap.Gmel.: Fr.) S.F. Gray	Ockerrötlichr Resupinatstacheling
Stereum	hirsutum	(Willd.: Fr.) S.F. Gray	Zottiger Schichtpilz
Stereum	subtomentosum	Pouzar	Samtiger Schichtpilz
Trametes	versicolor	(L.: Fr.) Pilát	Schmetterlings-Tramete

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Trichaptum	abietinum	(Fr.) Ryv.	Tannentramete
Scleroderma	citrinum	Pers.	Dickschaliger Kartoffelbovist
Ascocoryne	sarcoides	(Jacquin ex S.F. Fray) Groves & Wilson	Fleischroter Gallertbecher
Bisporella	citrina	(Batsch ex Fr.) Korf & Carpenter	Zitronengelbes Holzbecherchen
Daldinia	concentrica	(Bolt. ex Fr.) Ces. & de Not.	Kohliger Kugelpilz

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze und die Pilztafeln ab S.13) befinden sich auf dieser HP. Fotos ohne Autor-Angabe sind vom Webbetreuer K. Minder.

Mycena purpureofuscua | Lilaschneidiger Helmling

Pilze der Woche 46

Lepista personata | *Lilastiel-Rötelritterling*

Standort: Grasland.
Fruchtkörper: Hut bis 120 mm.
Mikromerkmale: Sporen 7 x 4,5 µm, schwach warzig.
Bemerkungen: Der ± violette Stiel, der seidige Hut, der angenehme Geruch und Geschmack sowie das Vorkommen im Grasland bis in den Winter kennzeichnen diesen guten Speise-Pilz gut.

Flammulina velutipes | *Samtfussrübling*

Standort: Laubbäume.
Fruchtkörper: Hut bis 60 mm.
Mikromerkmale: Sporen 9 x 4 µm, zylindrisch, hyalin.
Bemerkungen: Die Hutoberfläche ist schmierig-kleberig, der Rand ist schwach gerieft und der Stiel ist, vorallem gegen die Basis dunkel, samtig. Man kann den Pilz bei geeigneter Temperatur den ganzen Winter finden.

Psathyrella piluliformis | *Wässeriger Faserling*

Standort: Laubbäume.
Fruchtkörper: Hut bis 60 mm.
Mikromerkmale: Sporen 5 x 3 µm.
Bemerkungen: Hauptmerkmale sind: das büschelige Erscheinen auf Laubholz, der stark hygrophane Hut, der jung weisse Stiel und die verhältnismässig kleinen Sporen mit undeutlichem Keimpo-

Lepista personata | *Lilastiel-Rötelritterling*

Flammulina velutipes | *Samtfussrübling*

Psathyrella piluliformis | *Wässeriger Faserling*

Pilz-Fundliste der Woche 46

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Agaricus	silvicola	(Vittad.) Sacc.	Dünnfleischiger Anis-Egerling
Clitocybe	fragrans	(With.) Kumm.	Dufttrichterling
Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
Flammulina	velutipes	(Curtis.:Fr.) Singer	Samtfussrübling
Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
Gymnopus	buthyracea var. asema	(Fr.: Fr.) Quél.	Horngrauer Butterrübling
Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
Hypholoma	sublateritium	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf
Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
Lepista	personata	(Fr.: Fr.) Cke.	Lilastiel-Rötelritterling
Mycena	purpureofuscua	(Peck) Saccardo	Lilaschneidiger Helmling
Psathyrella	piluliformis	(Bull.: Fr.) Ort.	Wässeriger Faserling
Pseudoclitocybe	cyathiformis	(Bull.) Sing.	Kaffebrauner Gabeltrichterling
Tricholoma	terreum	(Schäff.:) Fr.) Kumm.	Erdritterling
Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
Russula	fragilis	(Pers.: Fr.) Fr.	Wechselfarbiger Speitäubling
Merulius	tremellosus	Fr.	Gallertfleischiger Fältling
Helvella	crispa	(Bull. ex St. Aman) Boud.	Herbstlorchel



VEREIN FÜR PILZKUNDE BASEL

Pilze der Jahre 2006/2007/2010/2011/2012/2013

Das nachfolgende Dokument beinhaltet die Jahresarbeit des Vereins für Pilz-kunde Basel der Jahre 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013
Die gefundenen Pilze wurden jede Woche bestimmt, einige illustriert, dokumentiert und im Internet hochgeladen. Der Text auf der ersten, linken Seite wiederholt sich deswegen wöchentlich.

PILZE 2011

Idee und Realisation: Kurt Minder

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

.

PILZE DER WOCHE 16

Lentinus cyathiformis *Becherförmiger Sägeblättling*

Standort:	Laubholz.
Fruchtkörper:	Hut bis 100 mm, Hutmitte niedergedrückt.
Mikromerkmale:	Sporen 10–14 x 4–5 µm, mit Cheilozystiden und Schnallen, Huttrama mit Skeletthyphen.
Bemerkungen:	Ein seltener Pilz mit z.T. anastomosierenden Lamellen, die ± in den Stiel hinuter laufen.
Photo:	Mauro Seggiani.

Psathyrella melanthina *Rosagrauer Faserling*

Standort:	Laubholz.
Fruchtkörper:	Hut bis 50 mm, mit faserigen Schüppchen.
Mikromerkmale:	Sporen 9–11 x 5–6 µm, Pleurozystiden fehlen.
Bemerkungen:	Ebenfalls ein seltener Pilz, der im ersten Moment nicht an einen Zärtling erinnert, ist doch der ganze Pilz verhältnismässig derbfleischig. Er gehört in die Sektion Pseudostropharia mit Arten, die an Holz wachsen.

Lentinus cyathiformis *Becherförmiger Sägeblättling*

Psathyrella melanthina *Rosagrauer Faserling*

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 16

Frühlings-Pilzausstellung 2011

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Calocybe	gambosa	(Fr.) Donk	Mairitterling
Coprinus	auricomus	Pat.	Braunhaariger Tintling
Hydropus	subalpinus	(v.Höhnel) Singer	Buchenwald-Wasserfuss
Hygrophorus	marzuolus	(Fr.) Bres.	Märzellerling
Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
Lentinus	adhaerens	(Alb. et Schw.: Fr.) Fr.	Harziger Sägeblättling
Lentinus	tigrinus	(Bull.: Fr.) Fr.	Getiegerter Sägeblättling
Lentinus	cyathiformis	(Schäffer: Fr.) Bresadola	Becherförmiger Sägeblättling
Micromphale	foetidum	(Sow..: Fr.) Singer	Gemeiner Stinkschwindling
Mycena	galericulata	(Scop.:Fr.) Gray	Rosablättriger Helmling
Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
Pluteus	petasatus	(Fr.) Gill	Seidiger Dachpilz
Pluteus	pouzarianus	Sing.	Schnallen-Dachpilz
Psathyrella	marcescibilis	(Britz.) Sg.	Grauweisser Faserling
Psathyrella	melanthina	(Fr.) K.v.Wav.	Rosagrauer Faserling
Strobilurus	tenacellus	(Pers.:Fr.) Sing.	Bitterer Nagelschwamm
Antrodia	serialis	(Fr.) Donk	Reihige Tramete
Bjerkandera	adusta	(Willd.: Fr.) Karst.	Angebrannter Rauchporling
Coriolopsis	gallica	(Fr.) Ryv.	Braune Borstentramete
Daedalea	quercina	(L. ex Fr.)	Eichenwirrling
Daedaleopsis	tricolor	(Pers.) Bond. & Sing.	Purpurrote Tramete
Daedaleopsis	confragosa	(Bolt.: Fr.) Schröt. s. str.	Rötende Tramete
Fomes	fomentarius	(L.: Fr.) Fr.	Echter Zunderschwamm
Fomitopsis	pinicola	(Fr.) Karst.	Rotrandiger Baumschwamm
Ganoderma	applanatum	(Pers.) Pat.	Flacher Lackporling
Ganoderma	carnosum	Pat.	Dunkler Lackporling
Gloeophyllum	odoratum	(Wulf.: Fr.) Imyzeki	Fencheltramete
Hymenochaeta	rubiginosa	(Dicks.: Fr.) Lév.	Rotbrauner Borstenscheibling
Laetiporus	sulphureus	(Fr.) Murr.	Schwefelporling
Phellinus	ferruginosus	(Schrad.: Fr.) Pat.	Rostbrauner Feuerschwamm
Phellinus	hartigii	(All. & Schn.) Bond.	Tannen-Feuerschwamm
Phellinus	robustus	(Karst.) Bourd. & Galz.	Eichen-Feuerschwamm
Polyporus	squamosus	Huds.: Fr.	Schuppiger Porling



Gattung	Art	Autor	Deutsch
Polyporus	badius	(Pers.: Gray) v. Schw.	Kastanienbrauern Porling
Polyporus	brumalis	Pers.: Fr.	Winterporling
Polyporus	ciliatus	Fr.	Bewimperter Porling
Polyporus	mori	Pollini: Fr.	Wabenporling
Polyporus	tuberaster	(Jacq.: Pers.) Fr.	Sklerotien-Porling
Schizopora	paradoxa	(Schrad.: Fr.) Donk	Veränderlicher Spaltporling
Steccherinum	bourdotii	Saliba & David	Rundsporiger Resupinatstacheling
Trametes	gibbosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Buckel-Tramete
Trametes	hirsuta	(Wulf.: Fr.) Pilát	Striegelige Tramete
Auricularia	mesenterica	Dicks.: Fr.	Gezonter Ohrlappenpilz
Arachnopeziza	aurata	Fuckel	Blassgoldenes Spinnwebebecherchen
Daldinia	concentrica	(Bolt. ex Fr.) Ces. & de Not.	Kohliger Kugelpilz
Disciotis	venosa	Fr.	Morchelbecherling
Gyromitra	parma*	Breitenbach et Maas Geesteranus	Schildförmige Lorchel
Helvella	leucomelaena	Schff.	Schwarzweisse Becherlorchel
Hypoxylon	deustum	Hoffmann: Fr.) Greville	Brandfladen-Kohlenbeere
Leptosphaeria	acuta		Zugespitzer Kugelpilz
Mitrophora	semilibera	Fr.	Käppchen-Morchel
Morchella	conica	Pers. Ex St. Amans	Spitzmorchel
Morchella	esculenta	(Tode ex Fr.) Fr.	Speisemorchel
Sarcoscypha	coccinea	(Beck ex Saccardo) Boudier	Zinnoberroter Prachtsbecherling
Ustulina	deusta	Swartz ex Pers.	Brandiger Krustenpilz
Xylaria	polymorpha	(Pers.: Fr.) Greville	Vielgestaltige Holzkeule
Xylaria	carpophila	(Pers.) Fr.	Buchenfruchtschalen-Holzkeule

Rost- und Brandpilze			
Odrospora	ariae		Anemonen Brandpilz
Tranzschelia	fusca		Anemonenrost
Uromyces	ficariae		Scharbockstkraut-Rost
Urozystis	anemonens		Anemonen Brandpilz

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

.

PILZE DER WOCHE 18

Inocybe queletii *Weisstannen-Frühlingsrisspilz*

Standort: Nadelholz (Weisstanne).
Fruchtkörper: Hut bis 60 mm, radialfaserig.
Mikromerkmale: Sporen 7–10 x 4–5,5 µm, glatt, mit Cheilo-, Pleuro- und Caulozystiden, letztere im oberen Stielbereich, dickwandig und apikal mit Kristallen.
Bemerkungen: Ein häufiger Risspilz im Frühjahr, der durch die stattliche Grösse, den radial faserigen Hut und dem spermatischen Geruch sowie die knollige Stielbasis auffällt.

Stropharia semiglobata *Halbkugeliger Träuschling*

Standort: Erde, Dung.
Fruchtkörper: Hut bis 35 mm.
Mikromerkmale: Sporen 15–20 x 8–11 µm, mit Cheilo- und Chrysozystiden.
Bemerkungen: Ein kleiner Träuschling mit schmieriger Huthaut und sehr grossen Sporen.
Photo: Dr. Bernard Gsell.

Suillus granulatus | Körnchenröhrling

Inocybe queletii *Weisstannen-Frühlingsrisspilz*

Stropharia semiglobata *Halbkugeliger Träuschling*

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 18

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Suillus	granulatus	(L.: Fr.) Rouss.	Körnchenröhrling
Amanita	vaginata	(Bull.) Vitt.	Grauer Scheidenstreifling
Calocybe	gambosa	(Fr.) Donk	Mairitterling
Inocybe	queletii	Maire et Konr.	Weisstannen-Risspilz
Stropharia	semiglobata	(Batsch.: Fr.) Quél.	Halbkugeliger Träuschling
Ganoderma	carnosum	Pat.	Dunkler Lackporling
Bisporella	citrina	(Batsch ex Fr.) Korf & Carpenter	Zitronengelbes Holzbecherchen

Bisporella citrina | Zitronengelbes Holzbecherchen

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

.

PILZE DER WOCHE 20

Hydropus subalpinus *Buchenwald-Wasserfuss*

Standort:	Laubbäume.
Fruchtkörper:	Hut bis 50 mm, Lamellen elastisch, zäh, Stiel oft tief wurzelnd.
Mikromerkmale:	Sporen 6,5–9 x 2,5–4 µm, z.T. allantoid, inamyloid, Latex fehlt. Mit Schnallen. Der Hut hat durch die besondere Struktur eine matt glänzende Wirkung.
Bemerkungen:	H. subalpinus ist der einzige in der Gattung mit allantoiden Sporen. Er gleicht optisch etwas an eine Megacollybia, ist jedoch deutlich kleiner und hat nicht einen stark radialfaserigen Hut.

Phellinus hartigii *Tannen-Feuerschwamm*

Standort:	Weisstannen.
Fruchtkörper:	FK bis 200 mm breit.
Mikromerkmale:	Sporen 6–8 x 6–7,5 µm, hyalin ohne Zystiden und Setae, Hyphensystem dimitisch, ohne Schnallen, Skeletthyphen braun.
Bemerkungen:	Er unterscheidet sich zu anderen Arten der Gattung hauptsächlich durch das Fehlen von Setae und das Vorkommen an Weisstannen.

Hydropus subalpinus *Buchenwald-Wasserfuss*

Phellinus hartigii *Tannen-Feuerschwamm*

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 20

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
Calocybe	gambosa	(Fr.) Donk	Mairitterling
Gymnopus	dryophilus	(Bulliard: Fr.) Murrill	Waldfreund-Rübling
Hydropus	subalpinus	(Höhnel) Singer	Buchenwald-Wasserfuss
Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
Mycena	filopes	(Bull.:Fr.) Kumm.	Zerbrechlicher Fadenhelmling
Mycena	renati	Quélet	Gelbstieliger Nitrat-Helmling
Panellus	stipticus	(Bulliard: Fr.) Karsten	Bitterscharfer Zwergknäueling
Russula	cyanoxantha	(Schäffer) Fr.	Violettgrüner Frauentäubling
Russula	heterophylla	(Fr.) Fr.	Grüner Speisetäubling
Daedaleopsis	tricolor	(Pers.) Bond. & Sing.	Purpurrote Tramete
Laetiporus	sulphureus	(Fr.) Murr.	Schwefelporling
Phellinus	hartigii	(All. & Schn.) Bond.	Tannen-Feuerschwamm
Polyporus	tuberaster	(Jacq.: Pers.) Fr.	Sklerotien-Porling
Polyporus	squamosus	Fr.	Schuppiger Porling
Stereum	hirsutum	(Willd.: Fr.) S.F. Gray	Zottiger Schichtpilz
Stereum	subtomentosum	Pouzar	Samtiger Schichtpilz
Trametes	gibbosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Buckel-Tramete

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

.

PILZE DER WOCHE 21

Panaeolus foeniseccii *Heudüngerling*

Standort: Wiesen und Parkanlagen, kurz nach dem Mähen.
Fruchtkörper: Hut bis 20 mm, hygrophan.
Mikromerkmale: Sporen 13–16 x 7–9 µm, dunkelbraun, warzig.
Bemerkungen: Das Erscheinen kurz nach dem Mähen und die grossen, warzigen Sporen sind die wichtigsten Merkmale dieser Art.

Phaeolus schweinitzii *Kiefernbraunporling*

Standort: Strünke und Wurzeln von Nadelbäumen.
Fruchtkörper: FK bis 300 mm. Poren labyrinthisch, grüngelb.
Mikromerkmale: Sporen 5–7 x 3,5–4,5 µm, Zystiden z.T. mit bräunlichem Inhalt. Hyphensystem monomitisch. Septen ohne Schnallen.
Bemerkungen: Frisch infiziertes Holz soll nach Terpentin riechen.

Gymnopus dryophilus
Waldfreund-Rübling

Panaeolus foeniseccii *Heudüngerling*

Phaeolus schweinitzii *Kiefernbraunporling*

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 21

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
Agrocybe	praecox	(Pers: Fr.) Fayod.	Voreilender Ackerling
Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
Gymnopus	dryophilus	(Bulliard: Fr.) Murrill	Waldfreund-Rübling
Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
Lentinus	torulosus	(Pers.: Fr. Lloyd	Laubholz-Knäueling
Marasmius	wettsteinii		Wettsteins Schwindling
Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
Melanoleuca	subalpina	(Britz.) Bresninsky & Stangl	Alpen-Weichritterling
Mycena	abramsii	(Murr.) Murr.	Voreilender Helmling
Panaeolus	foeniseccii	(Per.: Fr.) Schr.	Heudüngerling
Psathyrella	candolleana	(Fr.: Fr.) Maire	Behangener Faserling
Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
Russula	grisea	Fr.	Grauvioletter Reiftäubling
Datronia	mollis	(Sommerf.) Donk	Weicher Resupinatporling
Ganoderma	lipsiense	(Batsch.: Pers.) Atkinson	Flacher Lackporling
Hyphoderma	radula	(Fr.: Fr.) Donk	Reibeisenpilz
Phaeolus	schweinitzii	(Fr.) Pat.	Kiefernbraunporling
Trichaptum	abietinum	(Fr.) Ryv.	Tannentramete



Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

.

PILZE DER WOCHE 22

Phytoconis (Gerronema) ericetorum
Gefalteter Flechtennabeling

Standort:	Zwischen Moosen und Flechten.
Fruchtkörper:	Hut bis 15 mm.
Mikromerkmale:	Sporen 8–10 x 6–7 µm. Schnallen und Zystiden fehlen.
Bemerkungen:	diese Art unterscheidet sich zu verwandten Arten ohne Schnallen durch die tropfenförmigen Sporen.

Polyporus badius *Kastanienbrauner Porling*

Standort:	An totem Holz von Laubbäumen.
Fruchtkörper:	bis 250 mm. Poren sehr klein.
Mikromerkmale:	Sporen 6,5–8,5 x 3–4 µm, hyalin.
Hyphensystem	dimitisch. generative Hyphen dünnwandig ohne Schnallen, Skeletthyphen hyalin.
Bemerkungen:	P. melanotus und P. varius sind ähnliche Arten, haben jedoch Schnallen an den Hyphen.

Phytoconis (Gerronema)ericetorum *Gefalteter Flechtennabeling*

Polyporus badius *Kastanienbrauner Porling*

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 22

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Agrocybe	praecox	(Pers: Fr.) Fayod.	Voreilender Ackerling
Phytoconis (Gerronema)	ericetorum	(Pers.: Fr.) Redhead et Kuyper	Gefalteter Flechtennabeling
Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
Fomitopsis	pinicola	(Fr.) Karst.	Rotbrauner Baumschwamm
Gloeophyllum	odoratum	(Wulf.: Fr.) Imyzeki	Fencheltramete
Heterobasidion	annosum	(Fr.) Bref.	Wurzelschwamm
Laetiporus	sulfureus	Murr.	Schwefelporling
Phellinus	hartigii	(All. & Schn.) Bond.	Tannen-Feuerschwamm
Polyporus	badius	(Pers.: Gray) v. Schw.	Kastanienbrauner Porling
Schizopora	paradoxa	(Schrad.: Fr.) Donk	Veränderlicher Spaltporling
Stereum	hirsutum	(Willd.: Fr.) S.F. Gray	Zottiger Schichtpilz
Trichaptum	abietinum	(Fr.) Ryv.	Tannentramete
Daldinia	concentrica	(Bolt. ex Fr.) Ces. & de Not.	Kohliger Kugelpilz



Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

.

PILZE DER WOCHE 23

Pluteus plautus *Verschiedenfarbiger Dachpilz*

Standort: Laub- und Nadelholz.
Fruchtkörper: Hut bis 60 mm.
Mikromerkmale: Sporen 6,5–8,5 x 5,5–7 µm. TZ der Huthaut keulenförmig,
Bemerkungen: Diese Art wird in der Literatur z.T. mit P. semibulbosus gleichgestellt. Die Farben sind verschieden, daher wohl der deutsche Name.

Amanita strobiliformis *Fransiger Wulstling*

Standort: Laubbäume, Parkanlagen.
Fruchtkörper: FK bis 200 mm.
Mikromerkmale: Sporen 10–12,5 x 7,5–9 µm, amyloid.
Bemerkungen: Die scholligen, grauen Velumresten auf dem Hut und das vergängliche, rasiercrèmeartige Velum am Stiel und vorallem am Hutrand, sind gute Hinweise dieser Art.

Lepiota micropholis *Winziger Schirmling*

Standort: Glashäuser, Blumentöpfe.
Fruchtkörper: FK bis 20 mm.
Mikromerkmale: Sporen 5–5,5 x 2,5–3,5 µm. Cheilozystiden keulig. HDS spindelig.
Bemerkungen: Diese Art wurde in einem Blumentopf gefunden. Hauptmerkmal ist die schwarze Hutmitte. Arten mit ähnlich grossen Sporen in der Sektion Ovisporae haben eine andere Hutfarbe und manchmal schuppigen Stiel.

Pluteus plautus *Verschiedenfarbiger Dachpilz*

Amanita strobiliformis *Fransiger Wulstling*

Lepiota micropholis *Winziger Schirmling*

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 23

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Agaricus	pseudopratensis	(Bohus) Wasser	Falscher Wiesenegerling
Agaricus	aestivalis	(Moell.) Pil.	Sommer-Egerling
Agrocybe	dura	(Bolt.) Sing.	Rasiger Ackerling
Amanita	strobiliformis	(Paul.: Vitt.) Bertillon	Fransiger Wulstling
Gymnopus	dryophilus	(Bulliard: Fr.) Murrill	Waldfreund-Rübling
Lepiota	micropholis	Berkeley et Broome) Saccardo	Winziger Schirmling
Marasmius	rotula	(Scop.: Fr.) Fr.	Halsbandschwindling
Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
Pluteus	cinereofuscus	Lge.	Graubrauner Dachpilz
Pluteus	plautus	(Weinmann) Schillet	Verschiedenfarbiger Dachpilz
Schizophyllum	commune	Fr.: Fr.	Gemeiner Spaltblättling
Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
Bjerkandera	adusta	(Willd.: Fr.) Karst.	Angebrannter Rauchporling
Polyporus	ciliatus	Fr.	Bewimperter Porling
Polyporus	mori	Pollini: Fr.	Wabenporling
Stereum	subtomentosum	Pouzar	Samtiger Schichtpilz



Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

PILZE DER WOCHE 24

Entoloma asprellum *Stahlblaustieliger Rötling*

Standort:	Magerwiesen.
Fruchtkörper:	Hut bis 30 mm.
Mikromerkmale:	Sporen 9,5–12 x 7–8,5 µm. TZ der Huthaut in der Mitte keulenförmig, ohne Schnallen. Pigment intracellulär.
Bemerkungen:	Die wichtigsten Merkmale sind die länglichen Sporen, die keuligen Endzellen der HDS und der blaugraue Stiel, der schnell bräunlich wird sowie das Vorkommen auf Alpweiden.

Entoloma asprellum *Stahlblaustieliger Rötling*

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 24

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Entoloma	asprellum	(Fr.) Fayod	Stahlblaustieliger Rötling
Gymnopus	dryophilus	(Bulliard: Fr.) Murrill	Waldfreund-Rübling
Hygrocybe	subpapillata	Kühner	Trockenfuss-Saftling
Hypholoma	polytrichi	(Fr.: Fr.) Singer	Moos-Schwefelkoopf
Inocybe	fuscidula	Vel.	Braunstreifiger Risspilz
Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
Inocybe	leucoblema	Kühner	Silbrigbeschleierter Risspilz
Kuehneromyces	lignicola	(Peck) Redhead	Glattstieliges Stockschwämmchen
Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
Marasmiellus	perforans	(Hofmann: Fries) Antonin er Noord.	Nadel-Zwergschwindling
Marasmius	wettsteinii	Sacc. & Syd.	Wettsteins-Schwindling
Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
Panaeolus	fimicola	(Fr.) Gill.	Mist-Düngerling
Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
Psathyrella	sacchariolens	Enderle	Süssriechender Faserling
Stropharia	semiglobata	(Batsch.: Fr.) Quél.	Halbkugeliger Träuschling
Fomitopsis	pinicola	(Fr.) Karst.	Rotbrauner Baumschwamm
Geastrum	quadrifidum	Pers. ex Pers.	Kleiner Neststern
Sarcospaera	crassa	(Santi ex Steudel.) Pouz.	Kronenbecherling



Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

Panaeolus papilionaceus | *Behangener Düngerling*
Foto: Markus Wilhelm

PILZE DER WOCHE 25

Gymnopus impudicus *Unverschämter Blasssporrübling*

Standort: Nadelholz, am Boden, auf Holz.
Fruchtkörper: Hut bis 30 mm.
Mikromerkmale: Sporen 5,5–7,5 x 3–4 µm.
Bemerkungen: Die Arten der Sektion Impudicae haben einen widerlichen Geruch nach faulem Kohl. G. impudicus ist der dunkelste der Sektion.

Amanita eliae *Kammrandiger Wulstling*

Standort: Laubbäume.
Fruchtkörper: Hut bis 80 mm. Stiel bis 120 mm. Hutrand gerieft.
Mikromerkmale: Sporen 10–13 x 6–8 µm.
Bemerkungen: Er gehört zu den Wulstlingen mit gerieftem Hutrand und ist nicht amyloid. Die Hutfarbe ist variable, weisslich, ockerlich, rosa, weinbräunlich. Vom ebenfalls nicht amyloiden A. pantherina unterscheidet er sich mit grösseren und nur vereinzelten Velumflocken auf dem Hut, den nicht eingepfropften Stiel und die kleineren Fruchtkörper. Die Sporen sind etwas länglicher und die Marginalzellen sind oft mehrfach septiert.
Foto: Markus Wilhelm

Flammulaster carpophilus *Buchenwald-Flockenschüppling*

Standort: Laubstreu.
Fruchtkörper: Hut bis 10 mm.
Mikromerkmale: Sporen 7–9 x 4,5–5,5 µm, ockergelb, mandel- bis zitronenförmig. Huthaut kutikulär. Velumresen auf dem Hut aus kugeligen Zellen. Cheilozystiden spitzspindelig.
Bemerkungen: Die beiden F. rhombisporus haben deutlich zitronenförmige Sporen.
Foto: Markus Wilhelm

Diplomitoporus lindbladii *Grauschillernder Resupinatporling*

Standort: Weisstanne berindet.
Fruchtkörper: Resupinat, leicht abtrennbar.
Mikromerkmale: Sporen 5,5–7 x 2–3 µm, mit Schnallen, Jod neg., dimitisch.
Fotos: Markus Wilhelm.

Gymnopus impudicus *Unverschämter Blasssporrübling*

Amanita eliae *Kammrandiger Wulstling*

Flammulaster carpophilus *Buchenwald-Flockenschüppling*

Diplomitoporus lindbladii *Grauschillernder Resupinatporling*

Trama in Kongo, dimitisch mit unverzweigten Skeletthyphen, die in KOH quellen und sich auflösen. Basidien 4-sporig, mit Schnallen

10 µm

Diplomitoporus lindbladii *Grauschillernder Resupinatporling Mmkro*

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 25

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Boletus	luridus	Schäff.: Fr.	Netzstieliger Hexenröhrling
Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
Agaricus	bitorquis	(Quélet) Sacc.	Trottoir-Champignon
Agrocybe	semiorbicularis	(Bull.: St. Am.) Fay.	Halbkugeliger Ackerling
Amanita	eliae	Quél.	Kammrandiger Wulstling
Clitopilus	brunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
Flammulaster	carpophilus	(Fr.) Earle	Buchenwald-Flockenschüppling
Gymnopus	dryophilus	(Bulliard: Fr.) Murrill	Waldfreund-Rübling
Gymnopus	impudicus	(Fr.) Antonin Halling et Noordeloos	Unverschämter Blasssporrübling
Lacrymaria	lacrymabunda	(Bull.: Fr.) Pat.	Tränender Samumpilz
Lentinus	tigrinus	(Bull.: Fr.) Fr.	Getiegerter Sägeblättling
Marasmius	oreades	(Bolton.: Fr.) Fr.	Nelkenschwindling
Marasmius	rotula	(Scop.: Fr.) Fr.	Halsbandschwindling
Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
Panaeolus	foeniseccii	(Per.: Fr.) Schr.	Heudüngerling
Panaeolus	papilionaceus	(Bull.: Fr.) Quél.	Behangener Düngerling
Pluteus	cinereofuscus	Lge.	Graubrauner Dachpilz
Pluteus	salicinus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Grauer Dachpilz
Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
Russula	delica	Fr.	Gemeinder Weisstäubling
Russula	grisea	Fr.	Grauvioletter Reiftäubling
Russula	puellaris	Fr.	Milder Wachstäubling
Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
Antrodiella	hoehnelii	(Bres.: Höhn.) Niemelä	Spitzwarzige Tramete
Diplomitoporus	lindbladii	(Berk.) Gilb. & Ryv.	Grauschillernder Resupinatporling
Polyporus	tuberaster	(Jacq.: Pers.) Fr.	Sklerotien-Porling
Peziza	arvernensis	Pers. Ex Mérat	Buchenwaldbecherling



Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

PILZE DER WOCHE 26

Agrocybe cylindracea *Südlicher Ackerling*

Standort: Laub-Holz.
Fruchtkörper: Hut bis 100 mm.
Mikromerkmale: Sporen 8–10 x 5–6 µm, mit Keimporus.
Bemerkungen: Die Art gehört zu den Ackerlingen mit Ring, meist büschelig, Stielbasis dunkelbraun, Geruch schwach nach Mehl.
Foto: Markus Wilhelm.

Chaetocalathus craterellus

Trichteriger Muschelseitling

Standort: Holz, Laubstreu, Rinde.
Fruchtkörper: Hut bis 12 mm.
Mikromerkmale: Sporen 7–9 x 5–6 µm, tropfenförmig, hyalin, mit z.T. fingerförmigen Cheilozystiden. Terminalzellen (Haare) dextrionid. Schnallen vorhanden.
Bemerkungen: Die einzige Art der Gattung, gleicht etwas an einen Crepidotus, hat aber hyaline Sporen und ist verkehrt muschelförmig am Substrat angewachsen. Die Lamellen laufen zentral zusammen.
Foto: Markus Wilhelm.

Omphalina discorosea *Rosablättriger Holznabeling*

Standort: Laub-Holz.
Fruchtkörper: Hut bis 40 mm.
Mikromerkmale: Sporen 7–8 x 3,5–4,6, Sporenpulver rosa. Schnallen vorhanden.
Bemerkungen: Eine weitere Omphalina-Art mit Rosa-Sporenpulver ist O. demissa, hat aber grössere Sporen und wächst auf Erde.
Foto: Markus Wilhelm.

Agrocybe cylindracea *Südlicher Ackerling*

Chaetocalathus craterellus *Trichteriger Muschelseitling*

Omphalina discorosea *Rosablättriger Holznabeling*

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 26

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
Boletus	aestivalis	(Paul.) Fr.	Sommersteinpilz
Chalciporus	piperatus	(Bull.: Fr.) Bat.	Pfeffer-Röhrling
Leccinum	carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuss
Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
Porphyrellus	porphyrosporus	Fr.) Gilbert	Düsterer Röhrling
Suillus	granulatus	(L.: Fr.) Rouss.	Körnchenröhrling
Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
Agaricus	aestivalis	(Möll.) Pil.	Sommer-Egerling
Agrocybe	cylindracea	(DC: Fr.) Mre.	Südlicher Ackerling
Agrocybe	semiorbicularis	(Bull.: St. Am.) Fay.	Halbkugeliger Ackerling
Amanita	eliae	Quél.	Kammrandiger Wulstling
Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
Amanita	pantherina	(DC.: Fr.) Krombh.	Pantherpilz
Amanita	vaginata	(Bull.) Vitt.	Grauer Scheidenstreifling
Chaetocalathus	craterellus	(Dur. & Lv.) Sing.	Trichteriger Muschelseitling
Clitocybe	costata	Kühn. & Romagn.	Kerbrandiger Trichterling
Clitocybe	gibba	(Pers.) Kumm.	Ockerbrauner Trichterling
Clitopilus	brunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
Inocybe	nitiduscula	(Britz.) Sacc.	Früher Risspilz
Inocybe	queletii	Maire et Konr.	Weisstannen-Risspilz
Lentinus	torulosus	(Pers.: Fr. Lloyd	Laubholz-Knäueling
Omphalina	discorosea	(Pil.) Her. & Kotl.	Rosablättriger Holznabeling
Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
Lactarius	circellatus	Fr.	Gebänderter Hainbuchenmilchling
Russula	grisea	Fr.	Grauvioletter Reiftäubling



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 26

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Russula	romellii	Maire	Weissstieliger Ledertäubling
Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
Russula	turci	Bres.	Jodoformtäubling
Russula	pectinata	(Bull.: St. Am.) Fr.	Stinkender Kammtäubling
Russula	risigallina var.	(Batsch) Kuyp. & v. Vuu.	Wechselfarbiger Dottertäubling
Russula	cyanoxantha	(Schäffer) Fr.	Violettgrüner Frauentäubling
Dentropolyporus	umbellatus	(Pers.: Fr.) Jül.	Eichhase
Phallus	impudicus	L. ex Pers.	Stinkmorchel
Peziza	succuosa	(Hedw.) Fr.	Gelbmilchender Becherling



Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

.

PILZE DER WOCHE 27

Russula lilacea *Rotstieliger Reiftäubling*

Standort:	Laubwald.
Fruchtkörper:	Hut bis 50 mm.
Mikromerkmale:	Sporen 6–8 x 5–7 µm, isoliert stachelig, mit Primordialhyphen, ohne Dermatozystiden.
Bemerkungen:	Die Art kann sehr unterschiedliche Hut-Farbe haben, z.B. trübweinrot oder violett mit Rosatönen. Die Huthaut ist meistens etwas körnig und der Hutrand ist gerieft. Sporenpulver fast weiss.

Russula rubra *Scharfer Zinnobertäubling*

Standort:	Laubwald.
Fruchtkörper:	Hut bis 70 mm.
Mikromerkmale:	Sporen 6,5–8,5 x 6–7,5 µm, isoliert stachelig, mit Dermatozystiden.
Bemerkungen:	Die einzige Art der Sektion Lepidinae, Lilaceinae, Roseinae mit scharfem Geschmack. Die Huthaut ist matt, jedoch etwas leuchtend. Sporenpulver gelb.

Russula carpini *Hainbuchentäubling*

Standort:	Laub- und Mischwälder.
Fruchtkörper:	Hut bis 110 mm.
Mikromerkmale:	Sporen 7,5–10 x 6,5–8 µm, isoliert warzig, mit Dermatozystiden.
Bemerkungen:	Die Hutfarbe ist unterschiedlich, grünlich, bräunlich rot, blass violett. Auch isolierte Sporen in der Gruppe der Ledertäublinge mit ähnlichen Farben hat R. sericatula, ebenfalls im Laubwald mit etwas anderen Huthautelementen. Sporenpulver ocker.

Russula lilacea *Rotstieliger Reiftäubling*

Russula rubra *Scharfer Zinnobertäubling*

Russula carpini *Hainbuchentäubling*

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 27

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
Boletus	luridus	Schäff.: Fr.	Netzstieliger Hexenröhrling
Leccinum	carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuss
Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
Agaricus	silvaticus	Schäff.: Fr.	Echter Wald-Champignon
Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
Clitocybe	gibba	(Pers.) Kumm.	Ockerbrauner Trichterling
Clitopilus	brunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
Cortinarius	argutus	Fr.	Spitzbasiger Schleimkopf
Gymnopus	dryophilus	(Bulliard: Fr.) Murrill	Waldfreund-Rübling
Gymnopus	fusipes	(Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling
Lyophyllum	decastes	(Fr.: Fr.) Singer	Brauner Büschelrasling
Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
Pluteus	petasatus	(Fr.) Gill	Seidiger Dachpilz
Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
Russula	carpini	Gir. & Hein.	Hainbuchentäubling
Russula	cyanoxantha	(Schäffer) Fr.	Violettgrüner Frauentäubling
Russula	cyanoxantha fo. pelt.	R. Maire.: Singer	Grüner Frauentäubling
Russula	faginea	Romagn.	Buchen-Heringstäubling
Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
Russula	grisea	Fr.	Grauvioletter Reiftäubling
Russula	heterophylla	(Fr.) Fr.	Grüner Speisetäubling
Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
Russula	lilacea	Quél.	Rotstieliger Reiftäubling
Russula	melliolens	Quél.	Honigtäubling
Russula	rubra	(Lmck. Fr.) Fr.	Scharfer Zinnobertäubling
Russula	solaris	Ferd. et Winge	Sonnentäubling
Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling



Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

.

PILZE DER WOCHE 28

Amanita beckerii *Braunhäutiger Streifling*

Standort: Laubwald.
Fruchtkörper: Hut bis 120 mm.
Mikromerkmale: Sporen 8,5–10,5 x 8,5–10,5 µm,
Bemerkungen: Hut mit Eindellungen und flockigen Velumresten. Volva weiss. Velum mit rundlichen, ballonartigen Zellen.

Pleurotus cornucopiae *Rillstieliger Seitling*

Standort: Laubholz.
Fruchtkörper: Hut bis 100 mm.
Mikromerkmale: Sporen 8,5–11 x 3,5–5 µm,
Bemerkungen: Fruchtkörper ohne Velumresten. Huttrama dimitisch. Sporenpulver weiss.

Russula galochroa *Elfenbeintäubling*

Standort: Laubbäume.
Fruchtkörper: Hut bis 70 mm.
Mikromerkmale: Sporen 6–8 x 5–6,5 µm, mit isolierten Warzen und Dermatocystiden. Spp. gelb.
Bemerkungen: Diese Art gleicht etwas an eine ausgeblasste R. cyanoxantha. Im Gegensatz zu R. cyanoxantha hat die Art jedoch gelbe Sporenfarbe. Der Geschmack ist etwas schärflich.

Amanita beckerii *Braunhäutiger Streifling*

Pleurotus cornucopiae *Rillstieliger Seitling*

Russula galochroa *Elfenbeintäubling*

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 28

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Boletus	luridus	Schäff.: Fr.	Netzstieliger Hexenröhrling
Boletus	aestivalis	(Paul.) Fr.	Sommersteinpilz
Leccinum	carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuss
Amanita	beckeri	Huijsman	Braunhäutiger Scheidenstreifling
Amanita	ceciliae	Berkeley et Broome) Bas	Riesen-Streifling
Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
Amanita	submembranacea	(Bon) Gröger	Grauhäutiger Scheidenstreifling
Clitocybe	gibba	(Pers.) Kumm.	Ockerbrauner Trichterling
Clitocybe	costata	Kühn. & Romagn.	Kerbrandiger Trichterling
Clitopilus	brunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
Inocybe	corydalina var. erinaceomorpha	Stangl & Veselsky	Günbuckliger Risspilz var.
Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
Marasmius	torquescens	Quél.	Ledergelber Schwindling
Oudemansiella	mucida	(Schrad. ex Fr.) v.H.	Beringter Schleimrübling
Pleurotus	cornucopiae	(Paul. ex Pers.) Roll.	Rillstieliger Seitling
Psathyrella	candolleana	(Fr.: Fr.) Maire	Behangener Faserling
Lactarius	acerrimus	Britz.	Queradriger Milchling
Lactarius	deliciosus	(L.): Fr.) Gray	Edelreizker
Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
Russula	aurea	Pers.	Goldtäubling
Russula	cyanoxantha	(Schäffer) Fr.	Violettgrüner Frauentäubling
Russula	cyanoxantha fo. pelter.	R. Maire.: Singer	Grüner Frauentäubling
Russula	delica	Fr.	Gemeiner Weisstäubling
Russula	faginea	Romagn.	Buchen-Heringstäubling
Russula	farinipes	Romell in Britz.	Mehlstieltäubling
Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
Russula	galochroa	(Fr.) Fr.	Elfenbeintäubling
Russula	integra	(L.:) Fr. ss. Mre.	Braunroter Ledertäubling
Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
Russula	rubra	(Lmck. Fr.) Fr.	Scharfer Zinnobertäubling



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 28

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling
Russula	zonatula	Ebbesen et J. Schäffer	Stachelbeerroter Täubling

Inocybe corydalina var. erinaceomorpha *Günbuckliger Risspilz var.*

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

.

PILZE DER WOCHE 29

Russula aeruginea *Grasgrüner Birkentäubling*

Standort: Besdonders bei Birken.
Fruchtkörper: Hut bis 100 mm.
Mikromerkmale: Sporen 6,5–9 x 5,5–6,5 µm, gratig verbunden. Spp. crème.
Bemerkungen: Eine Art, die hauptsächlich bei Birken wächst. Die Epikutis besteht aus langen, z.T. mehrfach verzweigten, dünnen Haaren. Die Sporen sind verhältnismässig klein, manchmal kleiner als oben angegeben. Auch die Pielozystiden sind oft apikal kurz dicker und dann zugespitzt (schlangenkopfartig).

Amanita phalloides *Grüner Knollenblätterpilz*

Standort: Laubbäume.
Fruchtkörper: Hut bis 150 mm.
Mikromerkmale: Sporen 7,5–10 x 7–8,5 µm, amyloid. Spp. weiss.
Bemerkungen: Auch der tödlich giftige Grüne Knollenblätterpilz ist bereits aufgetaucht. Speisepilzsammler sollten ihn ganz besonders beachten. Im Gegensatz zu den Egerlingsarten mit rosa Lamellen und dunklen Sporen hat er weisse Lamellen und weisse Sporen. Die Hutfarbe ist unterschiedlich, sie kann auch mehr Olivtöne, als die Abbildung zeigt, enthalten. Hingegen ist die abstehende Volva um die Knolle ein gutes Merkmal. Der Hutrand ist höchstens im Alter gerieft, die oberseits schwach geriefte Manchette ist vergänglich darum oft nicht mehr vorhanden. Der Geruch ist süsslich, honigartig. Es gibt noch eine weisse Form vom Grünen Knollenblätterpilz sowie ein Weisser Knollenblätterpilz (Amanita verna) und der Spitzhütige Knollenplätterpilz (Amanita virosa), der sich nicht flach aufschirmt und vorallem in Nadelwäldern, eher in Berglagen erscheint. Der grüne Knollenblätterpilz erscheint nicht nur in niedrigen Lagen, sondern kann auch über 1000 m (Valera GB) fruktifizieren, z.B. bei Haselsträuchern. Amanita verna und Amanita virosa haben nach Galli eine gelbe KOH-Reaktion.

Russula aeruginea *Grasgrüner Birkentäubling*

Amanita phalloides *Grüner Knollenblätterpilz*

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 29

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
Boletus	radicans	Pers.: Fr.	Bitter-Röhrling
Boletus	aestivalis	(Paul.) Fr.	Sommersteinpilz
Leccinum	crocipodium	(Letellier) Walting	Gelbporiger Rauhfuss
Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
Xerocomus	subtomentosus var. ferrugineus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe (Varietät)
Agaricus	semotus	Fr.	Weinrötlicher Zwerg-Champignon
Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
Amanita	porphyria	Alb. & Schw.: Fr.	Porphyrbrauner Wulstling
Clitocybe	gibba	(Pers.) Kumm.	Ockerbrauner Trichterling
Clitopilus	brunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
Coprinus	disseminatus	(Pers.: Fr.) S.F.Gray	Gesäter Tintling
Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
Gymnopus	dryophilus	(Bulliard: Fr.) Murrill	Waldfreund-Rübling
Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
Hydropus	subalpinus	(Höhnel) Singer	Buchenwald-Wasserfuss
Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
Pholiota	flammans	(Fr.:) Kummer	Feuerschüppling
Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
Pluteus	salicinus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Grauer Dachpilz
Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
Lactarius	acerrimus	Britz.	Queradriger Milchling
Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
Lactarius	glaucescens	Crossl.	Grünender Pfeffermilchling
Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
Lactarius	volemus	(Fr.: Fr.) Fr.	Brätling
Russula	adusta	(Pers.: Fr.)	Rauchbrauner Schwärztäubling
Russula	aeruginea	Lindblad in Fr.	Grasgrüner Birkentäubling
Russula	aurea	Pers.	Goldtäubling
Russula	carpini	Gir. & Hein.	Hainbuchentäubling



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 29

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Russula	densifolia	Gill.	Dichtblättriger Schwärztäubling
Russula	faginea	Romagn.	Buchen-Heringstäubling
Russula	farinipes	Romell in Britz.	Mehlstieltäubling
Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
Russula	grata (laurocerasi)	Melzer	Mandeltäubling
Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
Russula	lilacea	Quél.	Rotstieliger Reiftäubling
Russula	melliolens	Quél.	Honigtäubling
Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
Russula	olivascens	(Pers.: Fr.) Bres.	Olivgrüner Täubling
Russula	puellaris	Fr.	Milder Wachstäubling
Russula	raoultii	Quél.	Blassgeber Täubling
Russula	risigallina	(Batsch) Kuyp. & v. Vuu.	Wechselfarbiger Dottertäubling
Russula	romellii	Maire	Weissstieliger Ledertäubling
Russula	rubra	(Lmck. Fr.) Fr.	Scharfer Zinnobertäubling
Russula	rubroalba	(Sing.) Romagn.	Rotweisser Täubling
Russula	solaris	Ferd. et Winge	Sonnentäubling
Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling
Russula	vinosobrunnea	(Bres.) Rom.	Weinbrauner Täubling
Russula	roseipes	Bresadola	Rosastieliger Täubling
Ramaria	stricta	(Pers.: Fr.) Quél. s. str.	Steife Koralle
Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
Nidularia	deformis	(Willdenow: Pers.) Fr.	Vollgestopfter Nestling



Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

Xerocomus porosporus *Düsterer Rotfuss-Filzröhrling* Foto: *Markus Wilhelm*

PILZE DER WOCHE 30

Russula amarissima *Bitterster Täubling*

Standort: Laubbäume.
Fruchtkörper: Hut bis 120 mm.
Mikromerkmale: Sporen 7,5–9 x 6,5–7,5 µm, gratig verbunden. Spp. crème.
Bemerkungen: Ein Täubling mit sehr bitterem Geschmack, etwas an eine R. olivacea gleichend.

Russula insignis (livescens) *Milder Kammtäubling*

Standort: Laub- und Nadelbäume.
Fruchtkörper: Hut bis 80 mm.
Mikromerkmale: Sporen 5,5–8,5 x 5–6,5 µm, z.T. netzig verbunden. Spp. crème.
Bemerkungen: HDS mit inkrustierten Haaren. Stielbasis mit Ammoniak rot.

Lactarius flavidus *Violettmilchling*

Standort: Laubbäume.
Fruchtkörper: Hut bis 80 mm. Geschmack scharf. Latex weiss bis rötlich-lila.
Mikromerkmale: Sporen 9,5–10,5 x 7,5–8 µm, mit kurzen, isolierten Graten. HDS ist eine Ixocutis.
Bemerkungen: L. flavidus bei Hasel, Eiche, Buche, Birke; L. aspideus bei Weiden. Die Sp. bei L. flavidus sind grösser als bei L. aspideus.
Foto: *Markus Wilhelm*

Xerocomus porosporus *Düsterer Rotfuss-Filzröhrling*

Standort: Laubbäume.
Fruchtkörper: Hut bis 60 mm.
Mikromerkmale: Sporen 11,5–15 x 4,5–6 µm, apikal abgeflacht, glatt.
Bemerkungen: Röhrenmündung und Fleisch blauend. Stiel faserig.
Foto: *Markus Wilhelm*

Pulveropoletus lignicola *Nadelholz-Röhrling*

Standort: Moderiges Nadelholz.
Fruchtkörper: Hut bis 100 mm.
Mikromerkmale: Sporen 6–10 x 4–6 µm.
Bemerkungen: Fleisch schwach blauend. St. ohne Netz. Hut feucht kleberig.
Foto: *Markus Wilhelm*

Russula amarissima *Bitterster Täubling*

Russula insignis *Milder Kammtäubling*

Lactarius flavidus *Violettmilchling*

Xerocomus porosporus *Düsterer Rotfuss-Filzröhrling*

Pulveropoletus lignicola *Nadelholz-Röhrling*

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 30

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Boletus	luridus	Schäff.: Fr.	Netzstieliger Hexenröhrling
Chroogomphus	helveticus	(Singer) Moser	Filziger Gelbfuss
Leccinum	carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuss
Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
Pulveropoletus	lignicola	(Kall.) Pilát	Nadelholz-Röhrling
Strobilomyces	strobilaceus	(Scop.: Fr.) Berk.	Strubelkopfröhrling
Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
Xerocomus	communis	(Bulliard) Bon	Eichen-Filzröhrling
Xerocomus	porosporus	(Imler ex Romero et Bon) Contu	Düsterer Rotfuss-Filzröhrling
Xerocomus	rubellus	Krombholz) Quélet	Blutroter Filzröhrling
Amanita	fulva	(Schäffer) Fr.	Rotbrauner Scheidenstreifling
Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
Amanita	beckeri	Huijsman	Braunhäutiger Scheidenstreifling
Amanita	ceciliae	Berkeley et Broome) Bas	Riesen-Streifling
Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
Amanita	solitaria	(Vittadini) Quélet	Meergrüner Wulstling
Bolbitius	vitellinus	(Pers.: Fr.) Fr.	Gold-Mistpilz
Calocybe	carnea	(Bull.: Fr.) Kühn.: Donk	Fleischrosa-Schönkopf
Clitocybe	costata	Kühn. & Romagn.	Kerbrandiger Trichterling
Clitopilus	brunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
Coprinus	auricomus	Pat.	Braunhaariger Tintling
Coprinus	disseminatus	(Pers.: Fr.) S.F.Gray	Gesäter Tintling
Cortinarius	malicorius	Fr.	Orangerandiger Hautkopf
Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
Flammulaster	limulatus	(Weinm.: Fr.) Watl.	Gelbblättriger Flockenschüppling
Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
Gymnopus	dryophilus	(Bulliard: Fr.) Murrill	Waldfreund-Rübling
Gymnopus	fusipes	(Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling
Gymnopus	hariolorum	(Bull.: Fr.) Quél.	Striegeliger Rübling
Gymnopus	impudicus	(Fr.) Antonin Halling et Noordeloos	Unverschämter Blasssporrübling
Inocybe	fraudans	(Britz.) Sacc.	Birnen-Risspilz

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 30

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Inocybe	maculata	Boud.	Gefleckter Risspilz
Inocybe	riomosa	(Bull.: Fr.) Kummer	Kegeliger Risspilz
Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
Lacrymaria	lacrymabunda	(Bull.: Fr.) Pat.	Tränender Samumpilz
Lepiota	clypeolaria	(Bull.: Fr.) Kumm.	Wolliggestiefelter Schirmling
Marasmius	alliaceus	(Jacq.: Fr.) Fr.	Langstieliger Knoblauchschwindling
Marasmius	oreades	(Bolton.: Fr.) Fr.	Nelkenschwindling
Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
Pluteus	leonius	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Löwengelber Dachpilz
Pluteus	atromarginatus	(Sing.) Kühn.	Schwarzschneidiger Dachpilz
Psathyrella	leucotephra	(Berkeley et Broome) Orton	Beringter Mürbling
Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
Lactarius	volemus	(Fr.: Fr.) Fr.	Brätling
Lactarius	cremor	Fr.	Runzliger Zwergmilchling
Lactarius	flavidus	Boud.	Hellgelber Violettmilchling
Lactarius	fulvissimus	Rom. i. Kühn. & Rom.	Orangefuchsiger Milchling
Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
Lactarius	turpis	(Weinm.) Fr.	Olivbrauner Milchling
Russula	amarissima	Rom. & Gilb.	Bitterster Täubling
Russula	delica	Fr.	Gemeiner Weisstäubling
Russula	faginea	Romagn.	Buchen-Heringstäubling
Russula	farinipes	Romell in Britz.	Mehlstieltäubling
Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
Russula	fragrantissima	Rom.	Starkduftender Stinktäubling
Russula	insignis	Quél.	Milder Kammtäubling
Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 30

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Russula	olivascens	(Pers.: Fr.) Bres.	Olivgrüner Täubling
Russula	risigallina	(Batsch) Kuyp. & v. Vuu.	Wechselfarbiger Dottertäubling
Russula	rubra	(Lmck. Fr.) Fr.	Scharfer Zinnobertäubling
Russula	solaris	Ferd. et Winge	Sonnentäubling
Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
Russula	violeipes	Quélet	Violettstieliger Brätlingstäubling
Russula	grata (laurocerasi)	Melzer	Mandeltäubling
Russula	amethystina	Quélet	Amethysttäubling
Russula	emetica	(Schäff.: Fr.) Gray	Kirschroter Speitäubling
Russula	exalbicans	(Pers.) Melz. & Zvara	Verblassender Täubling
Russula	galochroa	(Fr.) Fr.	Elfenbeintäubling
Russula	heterophylla	(Fr.) Fr.	Grüner Speisetäubling
Russula	ionochlora	Romagn.	Cremeblättriger Bunttäubling
Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
Russula	cyanoxantha	(Schäffer) Fr.	Violettgrüner Frauentäubling
Russula	livescens (insignis Qu.)	(Batsch) Quél. ss. Bres.	Milder Kamm-Tääubling
Aportiporus	biennis	(Bull.: Fr.) Sing.	Rötender Saftwirrling
Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
Junghuhnia	nitida	(Pers.: Fr.) Ryv.	Schönfarbiger Resupinatporling
Laetiporus	sulfureus	Murr.	Schwefelporling
Meripilus	giganteus	(Pers.: Fr.) Karst.	Riesenporling
Onnia	triquetra	(Fr.) Imazeki	Kiefern-Filzporling
Phlebia	rufa	(Fr.) Christ.	Rötlicher Kammpilz
Ramaria	stricta	(Pers.: Fr.) Quél. s. str.	Steife Koralle
Ramaria	rubella	(Schäff.: Krombh.) Peter.	Rotbraune Koralle
Resinicium	bicolor	(Alb. & v. Schw.: Fr.) Parm.	Zweifarbiger Harzrindenpilz
Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
Scleroderma	bovista	Fr.	Rotbräunlicher Kartoffelbovist
Calocera	viscosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Klebriger Hörnling
Helvella	crispa	(Bull. ex St. Aman) Boud.	Herbstlorchel
Hymenoscyphus	albidus	(Roberge) Phill.	Weisses Stengelbecherchen

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

PILZE DER WOCHE 31

Russula decolorans *Orangeroter Graustieltäubling*

Standort: Nadelwald, montan.
Fruchtkörper: Hut bis 100 mm.
Mikromerkmale: Sporen 8,5–11,5 x 7–8 µm, isoliert warzig. Spp. crème. Mit Dermatocystiden.
Bemerkungen: Dieser Täubling verfärbt sich ziemlich schnell im Fleisch, an den Lamellen und am Stiel grau bis schwarz.

Psathyrella leucotephra *Beringter Mürbling*

Standort: Laubwald.
Fruchtkörper: Hut bis 70 mm.
Mikromerkmale: Sporen 8–10,5 x 5–6 µm ohne Keimporus, ohne Pleurozystiden.
Bemerkungen: Ein Faserling, der durch den Ring deutlich erkennbar ist. Gegenüber C. candolleana haben die Sporen keinen Keimporus.

Entoloma myrmecophilum *Dunkelhütiger Rötling*

Standort: Laubwald.
Fruchtkörper: Hut bis 60 mm.
Mikromerkmale: Sporen 7,5–9,5 x 6–7 µm, iso- bis heterodiametrisch. Huthyphen inkrustiert und intrazellulär. Septen mit Schnallen.
Bemerkungen: Ein häufiger, grosser Rötling mit dunkler Farbe und Ritterlings-Habitus. Ähnliche Arten haben Hut und Stiel mit rotpurpuren Farbanteilen, Stielbasis mit rotem Basalfilz oder Lamellen dunkelgrau.

Amanita pantherina *Pantherpilz*

Standort: Laub- und Nadelwald.
Fruchtkörper: Hut bis 100 mm.
Mikromerkmale: Sporen 9–11,5 x 7–8,5 µm. Melzer negativ. Marginalzellen zylindrisch.
Bemerkungen: Diesen sehr giftigen Pilz erkennt man an den weissen Flocken auf dem Hut, dem gerieften Hutrand, den weissen Lamellen, der nicht gerieften Manchette sowie dem eingepfropften Stiel in die rundliche Stielknolle.

Russula decolorans *Orangeroter Graustieltäubling*

Psathyrella leucotephra *Beringter Mürbling*

Entoloma myrmecophilum *Dunkelhütiger Rötling*

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 31

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
Boletus	luridus	Schäff.: Fr.	Netzstieliger Hexenröhrling
Boletus	pinophillus	Pil. & Dermek	Kiefernsteinpilz
Boletus	aestivalis	(Paul.) Fr.	Sommersteinpilz
Chalciporus	piperatus	(Bull.: Fr.) Bat.	Pfeffer-Röhrling
Leccinum	carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuss
Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
Xerocomus	dryophylus	(Thiers) Singer	Dunkelroter Filz-Röhrling
Agaricus	langei	(Möll.) Möll.	Grosssporgiger Blutchampignon
Agaricus	semotus	Fr.	Weinrötlicher Zwerg-Champignon
Agaricus	silvaticus	Schäff.: Fr.	Echter Wald-Champignon
Agaricus	silvicola	(Vittad.) Sacc.	Dünnfleischiger Anis-Egerling
Agarigus	excellens	(Moll.) Moll.	Schneeweisser Riesen-Champignon
Amanita	fulva	(Schäffer) Fr.	Rotbrauner Scheidenstreifling
Amanita	pantherina	(DC.: Fr.) Krombh.	Pantherpilz
Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
Amanita	vaginata	(Bull.) Vitt.	Grauer Scheidenstreifling
Clitocybe	gibba	(Pers.) Kumm.	Ockerbrauner Trichterling
Clitopilus	brunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
Coprinus	disseminatus	(Pers.: Fr.) S.F.Gray	Gesäter Tintling
Coprinus	micaceus	(Bull.: Fr.) Fr.	Glimmertintling
Cortinarius	semisanguineus	(Fr.)	Blutblättriger Hautkopf
Entoloma	myrmecophilum	(Romag.) Mos.	Dunkelhütiger Rötling
Gymnopus	fusipes	(Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling
Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
Lentinus	torulosus	(Pers.: Fr. Lloyd	Laubholz-Knäueling
Lepiota	cristata	(Bolton.: Fr.) Kummer	Stink-Schirmling
Lepiota	ventriosospora	Reid	Gelbwolliger Schirmling
Marasmiellus	ramealis	(Bull.: Fr.) Sing.	Ästchenschwindlng



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 31

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Marasmius	alliaceus	(Jacq.: Fr.) Fr.	Langstieliger Knoblauchschwindling
Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
Psathyrella	leucotephra	(Berkeley et Broome) Orton	Beringter Mürbling
Rickenella	fibula	(Bull.: Fr.) Raith.	Orangegelber Heftelnabeling
Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
Lactarius	acerrimus	Britz.	Queradriger Milchling
Lactarius	cremor	Fr.	Runzliger Zwergmilchling
Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
Lactarius	volemus	(Fr.: Fr.) Fr.	Brätling
Russula	adusta	(Pers.: Fr.)	Rauchbrauner Schwärztäubling
Russula	albonigra	(Krombh.) Fr.	Mentoltäubling
Russula	amethystina	Quélet	Amethysttäubling
Russula	chloroides	(Krombh.) Bres.	Schmalblättriger Weisstäubling
xRussula	emetica	(Schäff.: Fr.) Gray	Kirschroter Speitäubling
Russula	faginea	Romagn.	Buchen-Heringstäubling
Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
Russula	puellaris	Fr.	Milder Wachstäubling
Russula	risigallina	(Batsch) Kuyp. & v. Vuu.	Wechselfarbiger Dottertäubling
Russula	solaris	Ferd. et Winge	Sonnentäubling
Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
Russula	cyanoxantha	(Schäffer) Fr.	Violettgrüner Frauentäubling
Cantharellus	tubaeformis	Fr.	Durchbohrter Leistling
Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 31

Arten über 1200 m

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
Chalciporus	piperatus	(Bull.: Fr.) Bat.	Pfeffer-Röhrling
Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
Amanita	muscaria	(L.) Hook.	Fliegenpilz
Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
Amanita	vaginata	(Bull.) Vitt.	Grauer Scheidenstreifling
Clitocybe	catinus	(Fr.) Quél. ss. Harmaja, Moser	Alpiner Trichterling
Clitocybe	costata	Kühn. & Romagn.	Kerbrandiger Trichterling
Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
Clitocybe	phaeophthalma	(Pers.) Kp.	Ranziger Trichterling
Cortinarius	amurceus (subtortus)	(Pers.: Fr.) Fr.	Ockergelber Schleimkopf
Cortinarius	limonius	(Fr.: Fr.) Fr.	Löwengelber Rauhkopf
Cortinarius	stillatitus	Fr.	Honig-Schleimfuss
Cortinarius	variecolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf
Cortinarius	venetus	(Fr.). Fr.	Grüner Buchenwald-Rauhkopf
Gymnopus	fusipes	(Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling
Hygrophorus	erubescens	(Fr.: Fr.) Fr.	Rasiger Purpurschneckling
Hygrophorus	olivaceoalbus	(Fr.: Fr.) Fr.	Natterstieliger Schneckling
Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
Marasmius	oreades	(Bolton.: Fr.) Fr.	Nelkenschwindling
Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
Mycena	rosella	(Fr.: Fr.) Kumm.	Rosa-Helmling
Tricholoma	inamoenum	(Fr.) Quél.	Lästiger Ritterling
Tricholoma	sulphureum	(Bull.: Fr.) Kumm.	Schwefel-Ritterling
Lactarius	deterrimus	Gröger	Fichtenreizker
Russula	decolorans	(Fr.) Fr.	Orangeroter Graustieltäubling
Russula	emetica	(Schäff.: Fr.) Gray	Kirschroter Speitäubling
Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
Russula	puellaris	Fr.	Milder Wachstäubling
Russula	queletii	Fr. in Quél.	Stachelbeertäubling
Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 31

Pilzarten über 1200 m

Russula	vinosa	Lindblad	Weinroter Graustieltäubling
Gloeophyllum	abietinum	Fr. ex Fr.	Tannenblättling
Sarcodon	imbricatus	(L. ex Fr.) Karst.	Habichtspilz
Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling

Amanita pantherina *Pantherpilz*

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

Cortinarius acutus *Spitzgebuckelter Wasserkopf* Lamellenschneide steril

PILZE DER WOCHE 32

Macrolepiota puellaris *Jungfern-Riesenschirmling*

Standort: Nadelwald, montan.
Fruchtkörper: Hut bis 100 mm.
Mikromerkmale: Sporen 7–10,5 x 4,5–6,5 µm dickwandig. Cheilozystiden bauchig mit ausgezogenem Schnabel.
Bemerkungen: Der glatte Stiel, die regelmässig verteilten, weissen Schuppen, die kleinen Sporen und die geschnäbeleten Cheilozystiden sind die wichtigsten Merkmale dieser Art. Wahrscheinlich nur in höheren Lagen vorkommend.

Hebeloma stenocystis *Schmalbewimperter Fälbling*

Standort: Nadelwald, montan.
Fruchtkörper: Hut bis 60 mm.
Mikromerkmale: Sporen 9–13 x 6–7,5 µm schwach warzig. Cheilozystiden schlank und bis 130 µm lang.
Bemerkungen: Ein Fälbling, der etwas an H. crustuliforme erinnert. Er hat jedoch sehr lange Zystiden und schwach warzige Sporen. Man findet ihn hauptsächlich im montanen Nadelwald.

Clitocybe catinus *Alpiner Trichterling*

Standort: Nadelwald, montan.
Fruchtkörper: Hut bis 100 mm.
Mikromerkmale: Sporen 6,5–8,5 x 4,5–5,5 µm apfelkernartig.
Bemerkungen: Der Mönchskopf (C. geotropa) kann an gleichen Stellen wachsen. Dieser hat jedoch rundlichere Sporen, meistens einen Buckel in der Hutmitte und im Verhältnis zur Hutbreite einen dickeren Stiel.

Macrolepiota puellaris *Jungfern-Riesenschirmling*

Hebeloma stenocystis *Schmalbewimperter Fälbling*

Clitocybe catinus *Alpiner Trichterling*

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 32

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Boletus	appendiculatus	Schaeff.	Anhängsel-Röhrling
Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
Boletus	luridus	Schäff.: Fr.	Netzstieliger Hexenröhrling
Boletus	satanas	Lenz	Satansröhrling
Boletus	aestivalis	(Paul.) Fr.	Sommersteinpilz
Chroogomphus	rutilus	(Schaeff.: Fr.) O.K. Miller	Kupferroter Gelbfuss
Gomphidius	glutinosus	(Schäff.: Fr.) Fr.	Kuhmaul
Leccinum	carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuss
Leccinum	crocipodium	(Letellier) Walting	Gelbporiger Rauhfuss
Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
Paxillus	filamentosus	Fr.	Erlen-Krempling
Strobilomyces	strobilaceus	(Scop.: Fr.) Berk.	Strubelkopfröhrling
Tylopilus	felleus	(Bull.: Fr.) Karst.	Gallenröhrling
Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe
Agaricus	silvicola	(Vittad.) Sacc.	Dünnfleischiger Anis-Egerling
Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
Amanita	junquillea	Quélet	Narzissengelber Wulstling
Amanita	muscaria	(L.) Hook.	Fliegenpilz
Amanita	pantherina	(DC.: Fr.) Krombh.	Pantherpilz
Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
Amanita	vaginata	(Bull.) Vitt.	Grauer Scheidenstreifling
Amanita	muscaria	(L.) Pers.	Fliegenpilz
Clitocybe	gibba	(Pers.) Kumm.	Ockerbrauner Trichterling
Clitocybe	phaeophthalma	(Pers.) Kp.	Ranziger Trichterling
Clitocybe	fragrans	(With.) Kumm.	Dufttrichterling
Clitopilus	brunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
Coprinus	micaceus	(Bull.: Fr.) Fr.	Glimmertintling
Cortinarius	alboviolacea	(Pers.: Fr.) Fr.	Weissvioletter Dickfuss
Cortinarius	elegantior	(Fr.) Fr.	Strohgelber Klumpfuss

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 32

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Cortinarius	illibatus	Fr.	Fleischiger Schleimfuss
Cortinarius	junghuhnii	Fr. ss. Lge. Mos.	Breitsporiger Samt-Wasserkopf
Cortinarius	melanotus	Kalchbr.	Braunnetziger Rauhkopf
Cortinarius	nemorensis	(Fr.) Lge.	Verfärbender Schleimkopf
Cortinarius	pholideus	(Fr.: Fr.) Fr.	Braunschuppiger Dickfuss
Cortinarius	purpurascens	Fr.	Purpurfleckender Klumpfuss
Cortinarius	calochrous	Fr.	Amethystblättriger Klumpfuss
Cortinarius	jubarinus	Fr. ss. Chev. n. Mos.	Glänzender Wasserkopf
Entoloma	griseoluridum	(Kühn. ex Noord.	Olivgrauer Rötling
Entoloma	turbidum	(Fr.: Fr.) Quél.	Geradrandiger Rötling
Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
Gymnopus	fusipes	(Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling
Hebeloma	truncatum	(Fr.) Kumm.	Kakao-Fälbling
Hygrophorus	cossus (discoxanthus)	(Sow. ex Fr.) Fr.	Verfärbender Schneckling
Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
Inocybe	haemacta	(Berk. & Cke.) Sacc.	Grünroter Risspilz
Inocybe	riomosa	(Bull.: Fr.) Kummer	Kegeliger Risspilz
Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
Lepiota	cristata	(Bolton.: Fr.) Kummer	Stink-Schirmling
Lyophyllum	loricatum	(Fr.) Kühn.	Gepanzerter Rasling
Marasmius	alliaceus	(Jacq.: Fr.) Fr.	Langstieliger Knoblauchschwindling
Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
Mycena	arcangeliana	Bres.	Olivgelber Helmling
Mycena	haematopus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Bluthelmling
Mycena	rosea	(Bull.) Gramberg	Rosa-Rettichhelmling
Oudemansiella	mucida	(Schrad. ex Fr.) v.H.	Beringter Schleimrübling
Pholiota	adiposa	(Fr.) Kumm.	Schleimiger Schüppling
Pholiota	astragalina	(Fr.) Singer	Safranroter Schüppling
Pluteus	atromarginatus	(Sing.) Kühn.	Schwarzschneidiger Dachpilz
Rozites	caperatus	(Pers.: Fr.) P. Karst.	Zigeunerpilz
Tricholoma	batschii	Gulden ex Christ. et Noordeloons	Fastberingter Ritterling



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 32

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Tricholoma	scalpturatum	(Fr.) Quél.	Gilbender Erd-Ritterlig
Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
Lactarius	acris	(Bolt.: Fr.) Gray	Rosaanlaufender Milchling
Lactarius	azonites	(Bull.) Fr.	Rauchfarbener Rosamilchling
Lactarius	deterrimus	Gröger	Fichtenreizker
Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
Lactarius	rufus	(Scop.: Fr.) Fr.	Rotbrauner Milchling
Lactarius	volemus	(Fr.: Fr.) Fr.	Brätling
Russula	albonigra	(Krombh.) Fr.	Mentoltäubling
Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
Russula	delica	Fr.	Gemeiner Weisstäubling
Russula	farinipes	Romell in Britz.	Mehlstieltäubling
Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
Russula	luteotacta	Rea	Gelbfleckender Täubling
Russula	maculata	Quél. in Quél. & Roze	Gefleckter Täubling
Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
Russula	olivascens	(Pers.: Fr.) Bres.	Olivgrüner Täubling
Russula	queletii	Fr. in Quél.	Stachelbeertäubling
Russula	raoultii	Quél.	Blassgeber Täubling
Russula	risigallina	(Batsch) Kuyp. & v. Vuu.	Wechselfarbiger Dottertäubling
Russula	romellii	Maire	Weissstieliger Ledertäubling
Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
Russula	violeipes	Quélet	Violettstieliger Brätlingstäubling
Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling
Russula	cyanoxantha	(Schäffer) Fr.	Violettgrüner Frauentäubling
Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
Cantharellus	friesii	Quél.	Fries´scher Pfifferling
Craterellus	cornucopioides	Pers.	Totentrompete



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 32

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Gomphus	clavatus	(Pers.: Fr.) Gray	Schweinsohr
Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
Meripilus	giganteus	(Pers.: Fr.) Karst.	Riesenporling
Onnia	triquetra	(Fr.) Imazeki	Kiefern-Filzporling
Sparassis	crispa	(Wulf. in Jacq.) Fr.	Krause Glucke
Calocera	viscosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Klebriger Hörnling
Helvella	macropus	(Weber: Fr.) Fuckel	Langfuss-Lorchel
Pilzfunde über 1200 m			
Boletinus	cavipes	(Klotzsch) Kalchbrenner	Hohlfuss-Schuppenröhrling
Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
Chalciporus	piperatus	(Bull.: Fr.) Bat.	Pfeffer-Röhrling
Chroogomphus	helveticus	(Singer) Moser	Filziger Gelbfuss
Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
Suillus	granulatus	(L.: Fr.) Rouss.	Körnchenröhrling
Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
Agaricus	silvaticus	Schäff.: Fr.	Echter Wald-Champignon
Amanita	fulva	(Schäffer) Fr.	Rotbrauner Scheidenstreifling
Amanita	porphyria	Alb. & Schw.: Fr.	Porphyrbrauner Wulstling
Clitocybe	catinus	(Fr.) Quél. ss. Harmaja, Moser	Alpiner Trichterling
Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
Cortinarius	acutus	(Pers.: Fr.) Fr.	Spitzgebuckelter Wasserkopf
Cortinarius	amurceus (subtortus)	(Pers.: Fr.) Fr.	Ockergelber Schleimkopf
Cortinarius	calochrous var. conif.	Mos. Nezd.	Blassstieliger Amethyst-Klumfuss
Cortinarius	caninus	(Fr.: Fr.)	Rostfuchsiger Dickfuss
Cortinarius	decipiens	(Pers.: Fr.) Fr.	Lilastieliger Wasserkopf
Cortinarius	elegantior	(Fr.) Fr.	Messinggelber Klumpfuss
Cortinarius	flexipes var. inolens	Lindst.	Geruchloser Duft-Gürtelfuss
Cortinarius	glaucopus	(Schäff.: Fr.)	Reihiger Klumpfuss
Cortinarius	hysginus	(Mos.) Mos.	Kuhrötlicher Schleimkopf
Cortinarius	limonius	(Fr.: Fr.) Fr.	Löwengelber Rauhkopf
Cortinarius	odorifer	Britz	Anis-Klumpfuss



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 32

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Cortinarius	rubellus	Cooke	Spitzgebuckelter Rauhkoopf
Cortinarius	rubricosus	Fries ss. Moser	Schwärzender Wasserkopf
Cortinarius	salor	Fr.	Blauer Schleimfuss
Cortinarius	sanguineus	(Wulf.: Fr.) Gray	Blutroter Hautkopf
Cortinarius	stillatitus	Fr.	Honig-Schleimfuss
Cortinarius	subvalidus	Hry.	Geschmückter Schleimkopf
Cortinarius	traganus	Fr.	Lila-Dickfuss
Cortinarius	variecolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf
Corinarius	varius	(Schäffer: Fr.) Fr.	Ziegelgelber Schleimkopf
Cortinarius	venetus	(Fr.). Fr.	Grüner Buchenwald-Rauhkopf
Cortinarius	spilomeus	(Fr.: Fr.) Fr.	Kupferschuppiger Seidenkopf
Gymnopus	buthyracea var. asema	(Fr.: Fr.) Quél.	Horngrauer Butterrübling
Hebeloma	stenocystis	Favre ex Quadr.	Schmalbewimperter Fälbling
Hygrophorus	erubescens	(Fr.: Fr.) Fr.	Rasiger Purpurschneckling
Hygrophorus	olivaceoalbus	(Fr.: Fr.) Fr.	Natterstieliger Schneckling
Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
Inocybe	lanuguinosa	(Bull.: Fr.) Kummer	Wolliger Risspilz
Lepista	nuda	(Bull.: Fr.) Cooke	Violetter Rötelritterling
Macrolepiota	procera	(Scop.: Fr. Sg.	Parasol
Macrolepiota	puellaris	(Fr.) Moser	Jungfern-Riesenschirmling
Marasmiellus	perforans	(Hofmann: Fries) Antonin er Noord.	Nadel-Zwergschwindling
Marasmius	oreades	(Bolton.: Fr.) Fr.	Nelkenschwindling
Melanoleuca	stridula	(Fr.) Sing. ss. Kühn.	Wegrand-Weichritterling
Mycena	filopes	(Bull.:Fr.) Kumm.	Zerbrechlicher Fadenhelmling
Mycena	zephirus	(Fr.: Fr.) Kumm.	Rostfleckiger Helmling
Tricholoma	inamoenum	(Fr.) Quél.	Lästiger Ritterling
Tricholoma	sulphureum	(Bull.: Fr.) Kumm.	Schwefel-Ritterling
Lactarius	aurantiacus	(Pers.: Fr.) Gray	Echter Orange-Milchling
Lactarius	badiosanguineus	Kühn & Rom.	Braunroter Milchling
Lactarius	ligniotus	Fries in Lindb.	Mohrenkopf
Lactarius	picinus	Fr.	Pechschwarzer Milchling
Lactarius	zonaroides	Kühner et Romagn.	Montaner Zonen-Milchling
Russula	atropurpurea	(Krombh.) Britz.	Pupurschwarzer Täubling

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 32

Russula	decolorans	(Fr.) Fr.	Orangeroter Graustieltäubling
Russula	emetica	(Schäff.: Fr.) Gray	Kirschroter Speitäubling
Russula	puellaris	Fr.	Milder Wachstäubling
Russula	rhodopus	Zvára	Flammenstieltäubling
Russula	vinosa	Lindblad	Weinroter Graustieltäubling

Russula vinosa *Weinroter Graustieltäubling*



Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

PILZE DER WOCHE 33

Phaeocollybia jennyae *Feuerroter Wurzelschnitzling*

Standort: Nadelbäumen.
Fruchtkörper: Hut bis 30 mm.
Mikromerkmale: Sporen 4,5–6,5 x 3–4 µm, fein warzig. Hyphen ohne Schnallen.
Bemerkungen: Ein seltener Pilz im Nadelwald. Stiel tief wurzelnd und nach unten verjüngt. Einige Autoren stellen ihn mit Ph. arduennensis gleich. Unterschiede kann man jedoch bei den Schnallen und den Zystiden feststellen (Ph. arduennensis hat keine Schnallen).

Amanita lepiotoides *Braunscheidiger Wulstling*

Standort: Laubbäume.
Fruchtkörper: Hut bis 100 mm. Fleisch im Schnitt rötend.
Mikromerkmale: Sporen 9–11 x 5–6 µm (E. Horak Sp. 13–15 x 6–6,5 µm). Velum ohne rundliche Zellen.
Bemerkungen: Diese seltene Art ist nach zwei Jahren wieder am gleichen Standort aufgetacht. Es ist ein wärmeliebender Pilz, der hauptsächlich in Italien gefunden wird, soll aber auch dort selten sein.
Foto: Bernard Gsell.

Russula maculata *Gefleckter Täubling*

Standort: Laub- und Nadelbäume.
Fruchtkörper: Hut bis 130 mm. Geschmack scharf. Spp. ocker.
Mikromerkmale: Sporen 8–10,5 x 7–9 µm mit groben, verbundenen Warzen. Mit Dermatozystiden.
Bemerkungen: Eine Art aus der Sektion Maculatina (Scharfe Dottertäublinge). Hauptmerkmale sind die relativ grossen Pilze mit dottergelben, spröden Lamellen. Weitere Merkmale sind die rötliche Hutfarbe, die warzig verbundenen Sporen und dessen Grösse sowie die kräftigen Dermatozystiden. Weitere rote Arten aus diesem Formenkreis haben kleinere und nicht netzige Sporen.

Phaeocollybia jennyae *Feuerroter Wurzelschnitzling*

Russula maculata *Gefleckter Täubling*

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 33

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Boletus	appendiculatus	Schaeff.	Anhängsel-Röhrling
Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
Boletus	luridus	Schäff.: Fr.	Netzstieliger Hexenröhrling
Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
Boletus	lupinus	Fr., non ss. Bres.	Wolfs-Röhrling
Boletus	satanas	Lenz	Satansröhrling
Chalciporus	piperatus	(Bull.: Fr.) Bat.	Pfeffer-Röhrling
Leccinum	versipelle	(Fr.) Snell.	Birken-Rotkappe
Phylloporus	pelletieri	(Lév.) Quél.	Goldblatt
Porphyrellus	porphyrosporus	Fr.) Gilbert	Düsterer Röhrling
Tylopilus	felleus	(Bull.: Fr.) Karst.	Gallenröhrling
Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe
Agaricus	silvicola	(Vittad.) Sacc.	Dünnfleischiger Anis-Egerling
Agaricus	semotus	Fr.	Weinrötlicher Zwerg-Champignon
Agaricus	silvaticus	Schäff.: Fr.	Echter Wald-Champignon
Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
Amanita	magnivolvata	Aalto	Grossscheidiger Scheidenstreifling
Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
Amanita	lepiotoides	Barla	Braunscheidiger Wulstling
Amanita	muscaria	(L.) Hook.	Fliegenpilz
Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
Clitocybe	cerussata	(Fries) P. Kummer	Ähnlich Waldfreund Trichterling
Clitocybe	clavipes	(Pers.) Kumm.	Keulenfuss-Trichterling
Clitocybe	gibba	(Pers.) Kumm.	Ockerbrauner Trichterling
Clitocybe	odora	(Bulliard: Fr.) Kumm.	Grüner Anistrichterling
Clitocybula	lacerata	(Scropoli) Métrod	Fransiger Faserrübling
Coprinus	comatus	(Müll.: Fr.) Pers.	Schopf-Tintling
Cortinarius	infractus	(Pers.: Fr.) Fr.	Bitterer Schleimfuss
Cortinarius	melanotus	Kalchbr.	Braunnetziger Rauhkopf
Cortinarius	odorifer	Britz	Anis-Klumpfuss



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 33

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Cortinarius	purpurascens	Fr.	Purpurfleckender Klumpfuss
Cortinarius	variecolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf
Cortinarius	bolaris	(Pers.: Fr.) Fr.	Rotschuppiger Rauhkopf
Cortinarius	hinnuleus	(Sow.) Fr.	Erdigriechender Gürtelfuss
Cortinarius	pseudocrassus	Joss. ex Orton	Trockener Gebirg.-Schleimkopf
Cortinarius	rubicundulus	(Rea) Pears.	Rötlichfaseriger Rauhkopf
Cortinarius	salor	Fr.	Blauer Schleimfuss
Cortinarius	violaceus	(L.:Fr.) Fr.	Dunkelvioletter Schleierling
Cortinarius	velenovskyi	Henry	Ziegelrötlicher Duft-Wasserkopf
Crepidotus	applanatus	(Pers.) Kumm.	Gerieftes Stummelfüsschen
Crepidotus	mollis	(Schäff.L Fr.) Staude	Gallertfleischiges Stummelfüsschen
Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
Gymnopus	butyracea	(Bull.: Fr.) P. Kumm.	Butterrübling
Gymnopus	fusipes	(Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling
Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
Hygrophorus	cossus (discoxanthus)	(Sow. ex Fr.) Fr.	Verfärbender Schneckling
Hygrophorus	chrysodon	(Batsch.: Fr.) Fr	Goldzahn-Schneckling
Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
Hypholoma	radicosum	E.Lange	Wurzelnder Schwefelkopf
Inocybe	bongardii	(Weinmann) Quélet	Duftender Risspilz
Inocybe	fraudans	(Britz.) Sacc.	Birnen-Risspilz
Inocybe	maculata	Boud.	Gefleckter Risspilz
Inocybe	riomosa	(Bull.: Fr.) Kummer	Kegeliger Risspilz
Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
Lentinellus	cochleatus	(Pers.: Fr.) Karst.	Äniszähling
Lentinellus	cochleatus var. inolens	Konr. & Maubl.	Geruchloser Äniszähling
Lepiota	cristata	(Bolton.: Fr.) Kummer	Stink-Schirmling
Lepiota	ventriosospora	Reid	Gelbwolliger Schirmling
Lepista	flaccida	(Sowerby Fries) Patouillard	Fuchsiger Rötelritterling
Lyophyllum	loricatum	(Fr.) Kühn.	Gepanzerter Rasling



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 33

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Macrocystidia	cucumis	(Pers.: Fr.) Joss.	Gurkenschnitzling
Marasmius	torquescens	Quél.	Ledergelber Schwindling
Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
Mycena	haematopus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Bluthelmling
Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
Mycena	renati	Quélet	Gelbstieliger Nitrat-Helmling
Mycena	stipata	Maas Geester.& Schw.	Büscheliger Nitrat-Helmling
Phaeocollybia	jennyae	(Fr.) Heim	Feuerroter Wurzelschnitzling
Pholiota	astragalina	(Fr.) Singer	Safranroter Schüppling
Pholiota	flammans	(Fr.:) Kummer	Feuerschüppling
Psathyrella	candolleana	(Fr.: Fr.) Maire	Behangener Faserling
Stropharia	aeruginosa	(Curtis:) Fr./Quél.	Grünspansträuschling
Tricholoma	pseudonicticans	Bon	Blassfleischiger Fichtenritterling
Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
Lactarius	aurantiacus	(Pers.: Fr.) Gray	Echter Orange-Milchling
Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
Lactarius	camphoratus	(Bull.: Fr.) Fr.	Kamfermilchling
Lactarius	glaucescens	Crossl.	Grünender Pfeffermilchling
Lactarius	intermedius	(Krombh.) Cke.	Grubiger Weisstannenmilchling
Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
Lactarius	deterrimus	Gröger	Fichtenreizker
Lactarius	mitissimus	(Fr.: Fr.)	Milder Milchling
Lactarius	picinus	Fr.	Pechschwarzer Milchling
Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
Lactarius	volemus	(Fr.: Fr.) Fr.	Brätling
Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
Russula	farinipes	Romell in Britz.	Mehlstieltäubling

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 33

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
Russula	illota	Romagn.	Morsetäubling
Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
Russula	pseudointegra	Arn. & Gor.	Ockerblättriger Zinnobertäubling
Russula	puellaris	Fr.	Milder Wachstäubling
Russula	queletii	Fr. in Quél.	Stachelbeertäubling
Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling
Russula	amethystina	Quélet	Amethysttäubling
Russula	delica	Fr.	Gemeiner Weisstäubling
Russula	densifolia	Gill.	Dichtblättriger Schwärztäubling
Russula	emetica	(Schäff.: Fr.) Gray	Kirschroter Speitäubling
Russula	heterophylla	(Fr.) Fr.	Grüner Speisetäubling
Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
Russula	luteotacta	Rea	Gelbfleckender Täubling
Russula	maculata	Quél. in Quél. & Roze	Gefleckter Täubling
Russula	puellaris	Fr.	Milder Wachstäubling
Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
Russula	cyanoxantha	(Schäffer) Fr.	Violettgrüner Frauentäubling
Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
Cantharellus	cibarius var. pallidus	Schulz.	Blasser Pfifferling
Cantharellus	tubaeformis	Fr.	Durchbohrter Leistling
Cantharellus	tubaef. var. lutescens	(Fr.) Gill.	Gelbstieliger Trompetenpfifferling
Daedaleopsis	confragosa	(Bolt.: Fr.) Schröt. s. str.	Rötende Tramete
Fomitopsis	officinalis	(Villars: Fr.) Bond. et Sing.	Lärchen-Baumschwamm Engadin
Heterobasidion	annosum	(Fr.) Bref.	Wurzelschwamm
Hydnellum	concrescens	(Pers.: Schw.) Bank.	Gezonter Korkstacheling
Hydnellum	peckii	Banker in Peck	Scharfer Korkstacheling
Hydnellum	scrobiculatum	(Fr.) Karst.	Grubiger Korkstacheling
Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 33

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Laetiporus	sulfureus	Murr.	Schwefelporling
Onnia	triquetra	(Fr.) Imazeki	Kiefern-Filzporling
Polyporus	badius	(Pers.: Gray) v. Schw.	Kastanienbrauern Porling
Pycnoporellus	fulgens	(Fr.) Donk	Leuchtender Weichporling
Sarcodon	imbricatus	(L. ex Fr.) Karst.	Habichtspilz
Melanogaster	broomeianus	Berk. in Tul.	Schleimtrüffel

Melanogaster broomeianus *Bunte Schleimtrüffel*
Unterirdisch wachsender Pilz mit Basidien

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

PILZE DER WOCHE 34

Cortinarius laniger *Wolliger Gürtelfuss*

Standort: Nadelwald.
Fruchtkörper: Hut bis 70 mm. Hut und vor allem der Stiel mit weissem Velum besetzt.
Mikromerkmale: Sporen 9–11 x 5–6,5 µm.
Bemerkungen: Ein Pilz in der Sektion der grösseren Telamonien mit weissem Stiel. Innerhalb der Sektion zeichnet ihn das starke Velum auf dem Hut insbesondere jedoch am Stiel aus. Der Stiel ist oft mit einem oder mehreren Gürteln besetzt.
Foto: Marcel Minder.

Rhodocybe gemina *Würziger Tellerling*

Standort: Nadelwald.
Fruchtkörper: Hut bis 100 mm. Lamellen ausgebuchtet bis herablaufend, auf Druck leicht vom Trama lösbar.
Mikromerkmale: Sporen 5–6 x 4 µm, fein warzig. Septen ohne Schnallen. Mit Cheilozystiden. Spp. rosa.
Bemerkungen: Der Geruch ist mehlartig-würzig. Ein weiteres Gattungsmerkmal ist das leicht abtrennen der Lamellen von der Trama.

Lactarius repraesentaneus *Zottiger Violettmilchling*

Standort: Nadelwald.
Fruchtkörper: Hut bis 100 mm. Rand lange eingebogen und mit Velumresten besetzt. Milch in Verbindung mit dem Fleisch violett verfärbend.
Mikromerkmale: Sporen 9–11 x 7–8,5 µm, breitelliptisch, mit vielen Warzen und Rippen.
Bemerkungen: Der scharfe Geschmack ist erst im Hals spürbar.
Foto: Markus Wilhelm.

Cortinarius laniger *Wolliger Gürtelfuss*

Rhodocybe gemina Würziger Tellerling

Lactarius repraesentaneus - *Zottiger Violettmilchling*

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 34

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Boletus	luridus	Schäff.: Fr.	Netzstieliger Hexenröhrling
Boletus	satanas	Lenz	Satansröhrling
Chroogomphus	rutilus	(Schaeff.: Fr.) O.K. Miller	Kupferroter Gelbfuss
Leccinum	carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuss
Leccinum	scabrum	(Bull.: Fr.) Gray	Birkenpilz
Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
Pulveroboletus	gentilis	(Quél.) Pouzar	Goldporiger Röhrling
Strobilomyces	strobilaceus	(Scop.: Fr.) Berk.	Strubelkopfröhrling
Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
Tylopilus	felleus	(Bull.: Fr.) Karst.	Gallenröhrling
Xerocomus	communis	(Bulliard) Bon	Eichen-Filzröhrling
Agrocybe	erebia	(Fr.) Kühn.	Leberbrauner Ackerling
Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
Amanita	vaginata	(Bull.) Vitt.	Grauer Scheidenstreifling
Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
Clitocybe	clavipes	(Pers.) Kumm.	Keulenfuss-Trichterling
Clitocybe	gibba	(Pers.) Kumm.	Ockerbrauner Trichterling
Collybia	cookei	(Bres.) Arnold	Gelbknolliger Zwergrübling
Conocybe	vestita	(Fr. ap. Quélet) Kühner	Behangener Glockenschüppling
Cortinarius	hinnuleus	(Sow.) Fr.	Erdigriechender Gürtelfuss
Cortinarius	largus	Fr.	Blasser Schleimkopf
Cortinarius	variecolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf
Cortinarius	bataillei	(Favre es Mos.)	Orangefüssiger Hautkopf
Cortinarius	bolaris	(Pers.: Fr.) Fr.	Rotschuppiger Rauhkopf
Cortinarius	illibatus	Fr.	Fleischiger Schleimfuss
Cortinarius	laniger	Fr.	Wolliger Gürtelfuss
Cortinarius	sanguineus	(Wulf.: Fr.) Gray	Blutroter Hautkopf
Cortinarius	violaceus	(L.:Fr.) Fr.	Dunkelvioletter Schleierling
Cortinarius	vulpinus	(Vel.) Hry.	Gilbender Fuchs-Seidenkopf
Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
Hebeloma	truncatum	(Fr.) Kumm.	Kakao-Fälbling
Hohenbuhelia	mastrucata	(Fr.: Fr.) Sing.	Pelz-Muscheling



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 34

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
Hygrophorus	arbustivus	(Fr.) Fr.	Faserhütiger Schneckling
Hygrophorus	cossus (discoxanthus)	(Sow. ex Fr.) Fr.	Verfärbender Schneckling
Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
Inocybe	cookei	Bres.	Knolliger Risspilz
Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
Inocybe	geophylla var. lilacina	(Peck.) Gill.	Lilastieliger Risspilz
Inocybe	maculata	Boud.	Gefleckter Risspilz
Inocybe	riomosa	(Bull.: Fr.) Kummer	Kegeliger Risspilz
Inocybe	asterospora	Quélet	Sternsporiger Risspilz
Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
Lepiota	cristata	(Bolton.: Fr.) Kummer	Stink-Schirmling
Mycena	pelianthina	(Fr.: Fr.) Quél.	Schwarzgezähnelter Helmling
Oudemansiella	mucida	(Schrad. ex Fr.) v.H.	Beringter Schleimrübling
Pholiota	flammans	(Fr.:) Kummer	Feuerschüppling
Rhodocybe	gemina	(Fr.). Kuyp. & Noord.	Würziger Tellerling
Tricholoma	sulphureum	(Bull.: Fr.) Kumm.	Schwefel-Ritterling
Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
Lactarius	glaucescens	Crossl.	Grünender Pfeffermilchling
Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
Lactarius	acris	(Bolt.: Fr.) Gray	Rosaanlaufender Milchling
Lactarius	camphoratus	(Bull.: Fr.) Fr.	Kamfermilchling
Lactarius	glyciosmus	(Fr.: Fr.) Fr.	Blasser Duftmilchling
Lactarius	helvus	(Fr.: Fr.) Fr.	Maggipilz
Lactarius	ligniotus	Fries in Lindb.	Mohrenkopf
Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
Lactarius	repraesentaneus	Britz.	Zottiger Violettmilchling
Lactarius	romagnesii	Bon	Kerbrandiger Korallenmilchling
Lactarius	trivialis	(Fr.: Fr.) Fr.	Nordischer Milchling
Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
Russula	violeipes	Quélet	Violettstieliger Brätlingstäubling



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 34

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Russula	fragrantissima	Rom.	Starkduftender Stinktäubling
Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
Russula	pseudointegra	Arn. & Gor.	Ockerblättriger Zinnobertäubling
Russula	queletii	Fr. in Quél.	Stachelbeertäubling
Russula	raoultii	Quél.	Blassgeber Täubling
Russula	spagnophila	Kauffmann (ss. Bon)	Milder Tormoos-Täubling
Cantharellus	friesii	Quél.	Fries´scher Pfifferling
Craterellus	cornucopioides	Pers.	Totentrompete
Polyporus	badius	(Pers.: Gray) v. Schw.	Kastanienbrauern Porling
Sarcodon	imbricatus	(L.: Fr.) Karst.	Habichtsstacheling
Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
Helvella	crispa	(Bull. ex St. Aman) Boud.	Herbstlorchel
Helvella	elastica	Boud.	Elastische Lorchel

Russula queletii *Stachelbeertäubling*

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

Coltricia perennis | Brauner Dauerporling

PILZE DER WOCHE 35

Cortinarius reverendissimus

Standort:	Mischwald.
Fruchtkörper:	Hut bis 70 mm. Z.T. mit weissen Velumresten auf dem Hut. Die Lamellenfarbe ist etwa wie bei C, varius, bläulich an der Stielspitze. Geruch ein wenig nach getrockneten Steinpilzen. Mit KOH sofort gelb.
Mikromerkmale:	Sporen 8 x 6 µm (breitelliptisch).
Bemerkungen:	Ähnliche Arten sind: C. amicochrous (C. spadicellus) mit schmalen Sporen; C. patabilis mit mandel- bis zitronenförmigen Sporen und einem Geruch nach verbanntem Horn; C. varius mit schlankeren Sporen und mehr Rotanteile in der Hutfarbe.

Chamaemyces fracidus *Fleckender Schmierschirmling*

Standort:	Grasland.
Fruchtkörper:	Hut bis 80 mm, etwas schmierig, manchmal kaum wahrnehmbar.
Mikromerkmale:	Sporen 4,5–5 x 2,5–3 µm, Spp. gelb, mit Cheilo, Pleuro- und Pielozystiden. HDS hymeniform, mit Schnallen.
Bemerkungen:	Ein weiterer Vertreter dieser Gattung ist Ch. demisannula, Pleuro- und Pielozystiden fehlen jedoch. Das Foto zeigt eine etwas schmächtige Aufsammlung, aber die Mikromerkmale sind eindeutig. Fundort in einem grasigen Waldweg.

Cortinarius reverendissimus Sporen

Cortinarius reverendissimus

Chamaemyces fracidus *Fleckender Schmierschirmling*

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 35

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Boletus	appendiculatus	Schaeff.	Anhängsel-Röhrling
Boletus	legalie	(Pilat) Blum	
Boletus	luridus	Schäff.: Fr.	Netzstieliger Hexenröhrling
Boletus	radicans	Pers.: Fr.	Bitter-Röhrling
Chroogomphus	rutilus	(Schaeff.: Fr.) O.K. Miller	Kupferroter Gelbfuss
Strobilomyces	strobilaceus	(Scop.: Fr.) Berk.	Strubelkopfröhrling
Xerocomus	rubellus	Krombholz) Quélet	Blutroter Filzröhrling
Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
Amanita	solitaria	(Vittadini) Quélet	Meergrüner Wulstling
Bolbitius	vitellinus	(Pers.: Fr.) Fr.	Gold-Mistpilz
Chamaemyces	fracidus	(Fr.) Donk	Fleckender Schmierschirmling
Clitocybe	cerussata	(Fries) P. Kummer	Ähnlich Waldfreund Trichterling
Clitocybe	gibba	(Pers.) Kumm.	Ockerbrauner Trichterling
Clitocybe	phaeophthalma	(Pers.) Kp.	Ranziger Trichterling
Clitopilus	brunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
Coprinus	atramentarius	(Bull.:Fr.) Fr.	Falten-Tintling
Cortinarius	nemorensis	(Fr.) Lge.	Verfärbender Schleimkopf
Cortinarius	reverendissimus	Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux	
Cortinarius	variecolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf
Cortinarius	violaceus	(L.:Fr.) Fr.	Dunkelvioletter Schleierling
Cystoderma	amiantinum	(Scop.: Fr.) Fayod	Amiant-Körnchenschirmling
Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
Gymnopus	fusipes	(Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling
Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
Lepista	densifolia	(Favre) Sing.	Dichtblättriger Rötelritterling
Lyophyllum	deliberatum	(Britz.) Kreisel	Rautensporiger Raseling
Marasmiellus	ramealis	(Bull.: Fr.) Sing.	Ästchenschwindlng
Marasmius	rotula	(Scop.: Fr.) Fr.	Halsbandschwindling
Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
Pholiota	astragalina	(Fr.) Singer	Safranroter Schüppling
Pholiota	flammans	(Fr.:) Kummer	Feuerschüppling
Pluteus	atromarginatus	(Sing.) Kühn.	Schwarzschneidiger Dachpilz



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 35

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Psathyrella	candolleana	(Fr.: Fr.) Maire	Behangener Faserling
Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
Lactarius	azonites	(Bull.) Fr.	Rauchfarbener Rosamilchling
Lactarius	glaucescens	Crossl.	Grünender Pfeffermilchling
Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
Russula	anthracina	Romagn.	Lachsblättriger Schwärztäubling
Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
Russula	heterophylla	(Fr.) Fr.	Grüner Speisetäubling
Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
Russula	mairei	Singer	Buchen-Speitäubling
Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
Russula	puellaris	Fr.	Milder Wachstäubling
Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
Russuloa	laurocerasi	Melzer	Mandeltäubling
Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
Coltricia	perennis	(L.: Fr.) Murrill	Brauner Dauerporling
Fomitopsis	pinicola	(Fr.) Karst.	Rotbrauner Baumschwamm
Ganoderma	carnosum	Pat.	Dunkler Lackporling
Gloeophyllum	odoratum	(Wulf.: Fr.) Imyzeki	Fencheltramete
Hericium	coralloides	(Scop.) Pers.	Ästiger-Stachelbart
Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
Lenzites	betulina	(L. ex Fr.) Fr.	Birkenblättling
Polyporus	tuberaster	(Jacq.: Pers.) Fr.	Sklerotien-Porling
Pycnoporellus	fulgens	(Fr.) Donk	Leuchtender Weichporling
Trametes	versicolor	(L.: Fr.) Pilát	Schmetterlings-Tramete
Scleroderma	citrinum	Pers.	Dickschaliger Kartoffelbovist
Pseudohydnum	gelatinosum	(Scop.: Fr.) Karst.	Zitterzahn
Bulgaria	inquinans	(Prs.:) Fries	Gemeiner Schmutzbecherling



Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

PILZE DER WOCHE 38

Hydropus marginellus *Braunschneidiger Wasserfuss*

Standort:	Weisstannnen-Strünke.
Fruchtkörper:	Hut bis 15 mm. Lamellenschneide teilweise bräunlich.
Mikromerkmale:	Sporen 6–7 x 3–4,5 µm, mit Cheilozystiden. Terminalzellen der HDS aufstehend, keulig, ohne Schnallen.
Bemerkungen:	Dieser Pilz ähnelt etwas an einen Helmling, hat jedoch eine andere Huthaut. Er scheidet, im Gegensatz zu H. atramentosus auf Druck keinen wässerigen Saft aus.

Cortinarius vibratilis *Galliger Schleimfuss*

Standort:	Feuchter Nadelwald.
Fruchtkörper:	Hut bis 40 mm. Hut und Stiel schleimig.
Mikromerkmale:	Sporen 6–5 x 4–5 µm, schwach warzig. Huthaut eine Ixocutis.
Bemerkungen:	Dieser Schleimfuss fällt auf durch den gelborange gefärbten Hut, dessen Haut sehr bitter ist, ebenfalls das Fleisch. Weitere Unterscheidungsmerkmale sind die kleinen, schwach warzigen, nicht rundlichen Sporen.

Hydropus marginellus *Braunschneidiger Wasserfuss*

Cortinarius vibratilis *Galliger Schleimfuss*

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 38

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Boletus	aereus	Bull.: Fr.	Schwarzhütiger Steinpilz
Boletus	depilatus	Redeuilh	Gefleckthütiger Röhrling
Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
Boletus	impolitus	Fr.	Fahler Röhrling
Boletus	luridus	Schäff.: Fr.	Netzstieliger Hexenröhrling
Boletus	pulverlulentus	Opat.	Schwarzblauender Röhrling
Boletus	satanas	Lenz	Satansröhrling
Boletus	aestivalis	(Paul.) Fr.	Sommersteinpilz
Leccinum	quercinum	Pilát ex Pilát	Eichen-Rotkappe
Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
Pulveroboletus	gentilis	(Quél.) Pouzar	Goldporiger Röhrling
Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
Xerocomus	subtomentosus var. ferrugineus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe (Varietät)
Agaricus	macrocarpus	(Moeller) Moeller	Grosser Anis-Egerling
Agaricus	silvaticus	Schäff.: Fr.	Echter Wald-Champignon
Amanita	ceciliae	Berkeley et Broome) Bas	Riesen-Streifling
Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
Amanita	crocea	(Quél. in Boud.) Sing.	Orangebrauner Scheidenstreifling
Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
Amanita	fulva	(Schäffer) Fr.	Rotbrauner Scheidenstreifling
Amanita	muscaria	(L.) Hook.	Fliegenpilz
Amanita	pantherina	(DC.: Fr.) Krombh.	Pantherpilz
Amanita	porphyria	Alb. & Schw.: Fr.	Porphyrbrauner Wulstling
Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
Clitocybe	gibba	(Pers. Fr.) Kummer	Ockerbrauner Trichterling
Clitocybe	odora	(Bulliard: Fr.) Kumm.	Grüner Anistrichterling
Clitocybe	phaeophthalma	(Pers.) Kp.	Ranziger Trichterling
Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
Cortinarius	cinnamomeus	Fr.	Zimt-Hautkopf
Cortinarius	eburneus	(Vel.) Hry./Bon	Elfenbein-Schleimfuss
Cortinarius	nemorensis	(Fr.) Lge.	Verfärbender Schleimkopf
Cortinarius	salor	Fr.	Blauer Schleimfuss
Cortinarius	semisanguineus	(Fr.)	Blutblättriger Hautkopf



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 38

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Cortinarius	vibratilis	(Fr.) Fr.	Galliger Schleimfuss
Crepidotus	applanatus	(Pers.) Kumm.	Gerieftes Stummelfüsschen
Gymnopus	fusipes	(Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling
Hebeloma	radicosum	(Bull.: Fr.) Rick.	Wurzelnder Fälbling
Hydropus	marginellus	(Pers.: Fr.) Sing.	Braunschneidiger Wasserfuss
Lyophyllum	loricatum	(Fr.) Kühn.	Gepanzerter Rasling
Marasmius	alliaceus	(Jacq.: Fr.) Fr.	Langstieliger Knoblauchschwindling
Mycena	pelianthina	(Fr.: Fr.) Quél.	Schwarzgezähnelter Helmling
Psathyrella	candolleana	(Fr.: Fr.) Maire	Behangener Faserling
Psathyrella	leucotephra	(Berkeley et Broome) Orton	Beringter Mürbling
Stropharia	caerulea	Kreisel	Blauer Träuschling
Tricholoma	pseudonicticans	Bon	Blassfleischiger Fichtenritterling
Tricholoma	scalpturatum	(Fr.) Quél.	Gilbender Erd-Ritterlig
Tricholoma	sciodes	(Secr.) Martin	Schärflicher Ritterling
Tricholoma	sulphureum	(Bull.: Fr.) Kumm.	Schwefel-Ritterling
Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
Lactarius	camphoratus	(Bull.: Fr.) Fr.	Kamfermilchling
Lactarius	cremor	Fr.	Runzliger Zwergmilchling
Lactarius	deterrimus	Gröger	Fichtenreizker
Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
Lactarius	quietus	(Fr.) Fr.	Eichenmilchling
Lactarius	romagnesii	Bon	Kerbrandiger Korallenmilchling
Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
Lactarius	turpis	(Weinm.) Fr.	Olivbrauner Milchling
Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
Lactarius	zonarius	(Bulliard) Fr.	Echter Zonenmilchling
Russula	amethystina	Quélet	Amethysttäubling
Russula	aurea	Pers.	Goldtäubling
Russula	chloroides	(Krombh.) Bres.	Schmalblättriger Weisstäubling
Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 38

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
Russula	xerampelina	Schäff.: Fr.	Roter Heringstäubling
Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
Ischnoderma	trogii	(Fr.) Donk	Gestielter Tannen-Harzporling
Phaeolus	schweinitzii	(Fr.) Pat.	Kiefernbraunporling
Phellodon	melaleucus	(Sw. apud Fr.: Fr.) Karst.	Schwarzweisser Korkstacheling
Ramaria	stricta	(Pers.: Fr.) Quél. s. str.	Steife Koralle
Telephora	penicillata	Pers.: Fr.	Pinsel-Warzenpilz
Scleroderma	areolatum	Ehrenb.	Gefelderter Kartoffelbovist
Scleroderma	citrinum	Pers.	Dickschaliger Kartoffelbovist
Otidea	onotica	(Pers.) Fuck.	Eselsohr

Otidea onotica (Pers.) Fuck. *Eselsohr*



Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

PILZE DER WOCHE 39

Boletinus cavipes *Hohlfuss-Schuppenröhrling*

Standort: Bei Lärchen.
Fruchtkörper: Hut bis 120 mm. Mit vergänglichem Ring. Stiel von jung an hohl.
Mikromerkmale: Sporen 7,5–9,5 x 3–4 µm.
Bemerkungen: Das Hauptmerkmal dieser Art ist der von jung an hohle Stiel, der vom Velum behangene Hutrand und die längsgestreckten, gelben bis oliven Röhrenmündungen sowie der Standort bei Lärchen, hauptsächlich in Berglagen.

Russula viscida *Lederstieltäubling*

Standort: Nadel- und Mischwälder.
Fruchtkörper: Hut bis 120 mm, in feuchtem Zustand etwas schmierig, glänzig, in den Farben differenziert. Die Lamellen sind etwas scharf.
Mikromerkmale: Sporen 8–11 x 6–9 µm, netzig-warzig. Huthaut mit Dermatozystiden.
Bemerkungen: Ein grosser Täubling mit hellgelbem Sporenpulver, der etwas an die Ledertäublinge erinnert, die jedoch satt gelbes Sporenpulver haben. Ein gutes Merkmal ist das bräunen der Stielbasis. Eine weitere Art der Sektion Melliolens mit rundlichen, schwach ornamentierten Sporen und mit Honiggeruch, vorallem beim Trocknen, ist die R. melliolens.

Boletinus cavipes *Hohlfuss-Schuppenröhrling*

Russula viscida *Lederstieltäubling*

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 39

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Boletinus	cavipes	(Klotzsch) Kalchbrenner	Hohlfuss-Schuppenröhrling
Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
Boletus	depilatus	Redeuilh	Gefleckthütiger Röhrling
Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
Boletus	luridus	Schäff.: Fr.	Netzstieliger Hexenröhrling
Boletus	pulverlulentus	Opat.	Schwarzblauender Röhrling
Boletus	radicans	Pers.: Fr.	Bitter-Röhrling
Chalciporus	piperatus	(Bull.: Fr.) Bat.	Pfeffer-Röhrling
Chroogomphus	rutilus	(Schaeff.: Fr.) O.K. Miller	Kupferroter Gelbfuss
Gomphidius	glutinosus	(Schäff.: Fr.) Fr.	Kuhmaul
Gomphidius	roseus	(Schäff.: Fr.) Karsten	Rosaroter Schmierling
Leccinum	crocipodium	(Letellier) Walting	Gelbporiger Rauhfuss
Leccinum	duriusculum	(Schulz.) Sing.	Brauner Pappel-Rauhfuss
Leccinum	variicolor	Walting	Verschiedenfarbiger Rauhfuss
Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
Paxillus	filamentosus	Fr.	Erlen-Krempling
Porphyrellus	porphyrosporus	Fr.) Gilbert	Düsterer Röhrling
Pulveroboletus	gentilis	(Quél.) Pouzar	Goldporiger Röhrling
Strobilomyces	strobilaceus	(Scop.: Fr.) Berk.	Strubelkopfröhrling
Suillus	bovinus	(L.: Fr.) Rouss.	Kuhröhrling
Suillus	granulatus	(L.: Fr.) Rouss.	Körnchenröhrling
Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
Suillus	luteus	(L.: Fr.) Rouss.	Butterpilz
Suillus	placidus	(Bonord.) Singer	Elfenbein-Röhrling
Suillus	viscidus	(L.) Rouss.	Grauer Lärchenröhrling
Tylopilus	felleus	(Bull.: Fr.) Karst.	Gallenröhrling
Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
Xerocomus	subtomentosus var. ferrugineus		(L.: Fr.) Quél. Ziegenlippe (Varietät)
Agaricus	essettei	Bon	Schiefknolliger Anis-Champignon
Agaricus	macrosporus	(M□ll. & Schäff.) Pilát	Grosssporiger Anischampignion
Agaricus	silvaticus	Schäff.: Fr.	Echter Wald-Champignon

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 39

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Agaricus	silvicola	(Vittad.) Sacc.	Dünnfleischiger Anis-Egerling
Agaricus	xanthoderma	Genev.	Karbol-Egerling
Amanita	ceciliae	Berkeley et Broome) Bas	Riesen-Streifling
Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
Amanita	crocea	(Quél. in Boud.) Sing.	Orangebrauner Scheidenstreifling
Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
Amanita	franchetii	(Boud.) Fay.	Rauher Wulstling
Amanita	fulva	(Schäffer) Fr.	Rotbrauner Scheidenstreifling
Amanita	muscaria	(L.) Hook.	Fliegenpilz
Amanita	pantherina	(DC.: Fr.) Krombh.	Pantherpilz
Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
Amanita	porphyria	Alb. & Schw.: Fr.	Porphyrbrauner Wulstling
Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
Amanita	solitaria	(Vittadini) Quélet	Meergrüner Wulstling
Amanita	strobiliformis	(Paul.: Vitt.) Bertillon	Fransiger Wulstling
Amanita	vaginata	(Bull.) Vitt.	Grauer Scheidenstreifling
Amanita	virosa	(Fr.) Bertillon	Spitzhütiger Knollenblätterpilz
Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
Cortinarius	camphoratus	(Fr.) Fr.	Bocks-Dickfuss
Cortinarius	elegantissimus	Hry.	Prächtiger Klumpfuss
Cortinarius	hinnuleus	(Sow.) Fr.	Erdigriechender Gürtelfuss
Cortinarius	infractus	(Pers.: Fr.) Fr.	Bitterer Schleimfuss
Cortinarius	variegatus	Bresadola	Variabler Schleimkopf
Cortinarius	orellanus	(Fr.) Fr.	Orangefuchsiger Rauhkopf
Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
Entoloma	rhodop. v. nidorosum	(Fr.)Nordel./Kumm.	Alkalischer Rötling
Entoloma	sinuatum	(Bull.: Pers.: Fr.) Kumm.	Riesen-Rötling
Hebeloma	radicosum	(Bull.: Fr.) Rick.	Wurzelnder Fälbling
Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
Hygrophorus	penarius	Fr.	Trockener Schneckling
Inocybe	riomosa	(Bull.: Fr.) Kummer	Kegeliger Risspilz
Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 39

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
Lacrymaria	lacrymabunda	(Bull.: Fr.) Pat.	Tränender Samumpilz
Lepiota	ventriosospora	Reid	Gelbwolliger Schirmling
Lepista	flaccida	(Sowerby Fries) Patouillard	Fuchsiger Rötelritterling
Lepista	glaucocana	(Bres.) Sing.	Blassblauer Rötelritterling
Lepista	sordida	(Fr.) Sing.	Fleischbrauner Rötelritterling
Lyophyllum	loricatum	(Fr.) Kühn.	Gepanzerter Rasling
Macrolepiota	rhacodes var. hortensis	(Vittad.) Singer	Safranschirmling, Gartenform
Marasmius	alliaceus	(Jacq.: Fr.) Fr.	Langstieliger Knoblauchschwindling
Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
Mycena	crocata	(Schrad.: Fr.) Kumm.	Safranmilchender Helmling
Mycena	galericulata	(Scop.:Fr.) Gray	Rosablättriger Helmling
Mycena	renati	Quélet	Gelbstieliger Nitrat-Helmling
Mycena	zephirus	(Fr.: Fr.) Kumm.	Rostfleckiger Helmling
Oudemansiella	mucida	(Schrad. ex Fr.) v.H.	Beringter Schleimrübling
Psathyrella	leucotephra	(Berkeley et Broome) Orton	Beringter Mürbling
Psathyrella	cotonea	(Quél.) Kon. & Maub.	Schwefelfüssiger Faserling
Tricholoma	columbetta	(Fr.) Kumm.	Seidiger Ritterling
Tricholoma	equestre	(L.: Fr.) Kumm.	Grünling
Tricholoma	fulvum	(DC.: Fr.) Sacc.	Gelbblättriger Ritterling
Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
Tricholoma	sejunctum	(Sow.: Fr.) Quél.	Grüngelber Ritterling
Tricholoma	sulphureum	(Bull.: Fr.) Kumm.	Schwefel-Ritterling
Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
Lactarius	circellatus	Fr.	Gebänderter Hainbuchenmilchling
Lactarius	deliciosus	(L.): Fr.) Gray	Edelreizker
Lactarius	deterrimus	Gröger	Fichtenreizker
Lactarius	fulvissimus	Rom. i. Kühn. & Rom.	Orangefuchsiger Milchling
Lactarius	intermedius	(Krombh.) Cke.	Grubiger Weisstannenmilchling
Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
Lactarius	pyrogalus	(Bull.: Fr.) Fr.	Scharfer Hasel-Milchling

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 39

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
Lactarius	semisanguifluus	Helm & Lecl.	Spangrün-weinroter Kiefernreizker
Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
Russula	albonigra	(Krombh.) Fr.	Mentoltäubling
Russula	aurea	Pers.	Goldtäubling
Russula	badia	Quél.	Zedernholztäublig
Russula	chloroides	(Krombh.) Bres.	Schmalblättriger Weisstäubling
Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
Russula	grisea	Fr.	Grauvioletter Reiftäubling
Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
Russula	violeipes	Quélet	Violettstieliger Brätlingstäubling
Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling
Climacocystis	borealis	(Fr.) Kotl. & Pouz.	Nordischer Porling
Fomitopsis	pinicola	(Fr.) Karst.	Rotbrauner Baumschwamm
Ganoderma	lipsiense	(Batsch.: Pers.) Atkinson	Flacher Lackporling
Gloeophyllum	odoratum	(Wulf.: Fr.) Imyzeki	Fencheltramete
Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
Meripilus	giganteus	(Pers.: Fr.) Karst.	Riesenporling
Lycoperdon	mammaeforme	Pers.	Flocken-Stäubling
Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
Lycoperdon	pyriforme	Schäff.: Pers.	Birnen-Stäubling
Scleroderma	citrinum	Pers.	Dickschaliger Kartoffelbovist
Sarcoscypha	coccinea	(Beck ex Saccardo) Boudier	Zinnoberroter Prachtsbecherling

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

PILZE DER WOCHE 40

Lactarius pubescens *Flaumiger Birken-Milchling*

Standort:	Bei Birken.
Fruchtkörper:	Hut bis 80 mm.
Mikromerkmale:	Sporen 7 x 5,5 µm.
Bemerkungen:	Ein weisser Milchling mit eingerolltem Hutrand und dieser jung wollig mit Haaren besetzt. Milch weiss unveränderlich und scharf. Der ähnliche L. scoticus hat einen schlankeren Stiel und bevorzugt sumpfige Standorte bei Birken.

Russula pseudointegra Arn. & Gor. | Ockerblättriger Zinnobertäubling

Lactarius pubescens *Flaumiger Milchling*

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 40

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Boletus	satanas	Lenz	Satansröhrling
Gomphidius	roseus	(Schäff.: Fr.) Karsten	Rosaroter Schmierling
Leccinum	crocipodium	(Letellier) Walting	Gelbporiger Rauhfuss
Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
Suillus	bovinus	(L.: Fr.) Rouss.	Kuhröhrling
Suillus	collinitus	Fr. ss. Flury, Mos.	Ringloser Butterröhrling
Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
Suillus	viscidus	(L.) Rouss.	Grauer Lärchenröhrling
Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
Amanita	pantherina	(DC.: Fr.) Krombh.	Pantherpilz
Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
Cortinarius	bateatocumatilis	Hry. ex Ort.	Filziger Schleimkopf
Entoloma	sinuatum	(Bull.: Pers.: Fr.) Kumm.	Riesen-Rötling
Hebeloma	radicosum	(Bull.: Fr.) Rick.	Wurzelnder Fälbling
Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
Inocybe	riomosa	(Bull.: Fr.) Kummer	Kegeliger Risspilz
Inocybe	lanuginosa	(Bull. Fr.) Kumm.	Wolliger Risspilz
Omphalina	acerosa	(Fr.) Lange	Muschelnabeling
Oudemansiella	mucida	(Schrad. ex Fr.) v.H.	Beringter Schleimrübling
Pholiota	gummosa	(Lasch.: Fr.) Sing.	Strohblasser Schüppling
Pluteus	chrysophaeus	(Schäff.: Fr.) Quél.	Gelbbrauner Dachpilz
Pluteus	depauperatus	Romag.	Geriefter Dachpilz
Pluteus	diettrichii	Bresadola	Rissiger Dachpilz
Pluteus	umbrosus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Schwarzflockiger Dachpilz
Psathyrella	multipedata	(Peck) Sm.	Büscheliger Faserling
Rozites	caperatus	(Pers.: Fr.) P. Karst.	Zigeunerpilz
Tricholoma	bufonium	(Pers.: Fr.) Kumm.	Purpurbrauner Schwefel-Ritterling
Tricholoma	tigrinum	Kumm.	Tiger-Ritterling
Lactarius	hepaticus	Plowr. in Poud.	Leberbrauner Milchling
Lactarius	hortensis	Velen	Haselmilchling
Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 40

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Lactarius	pubescens	(Schrad.) Fries	Flaumiger Milchling
Lactarius	rubrocinctus	Fr.	Rotgegürtelter Runzelmilchling
Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
Russula	pseudointegra	Arn. & Gor.	Ockerblättriger Zinnobertäubling
Russula	violeipes	Quélet	Violettstieliger Brätlingstäubling
Laxitextum	bicolor	(Pers.: Fr.) Lentz	Zweifarbiger Schichtpilz
Oligoporus	stipticus	(Pers.: Fr.) Gilb. & Ryv.	Bitterer Saftporling
Perenniporia	medulla-panis	(Jacq.: Fr.) Donk	Ockerbrauner Dauerporling
Physisporinus	sanguinolentus	(Alb. & Schw.: Fr.) Pilát	Blutender Eisporling
Polyporus	badius	(Pers.: Gray) v. Schw.	Kastanienbrauern Porling
Schizopora	flavipora	(Cke) Ryv.	Gelblichporiger Spaltporling

Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

PILZE DER WOCHE 41

Cortinarius balteaus *Violettrandiger Schleimkopf*

Standort: Nadel- und Laubwald.
Fruchtkörper: Hut bis 100 mm.
Mikromerkmale: Sporen10–11 x 5,5–6 µm, mandel- bis zitronenförmig, schwach warzig. KOH-Reaktion negativ.
Bemerkungen: Ein gutes Merkmal ist die negative KOH-Reaktion. Weitere Arten des Formenkreises sind: C. balteatocumatilis im Hainbuchen-Eichen-Wald, C. balteatoalbus mit bräunlichen, helleren Fruchtkörpern, im Nadelwald, beide mit positiver KOH-Reaktion. Auch die Arten um C. variicolor haben eine positive KOH-Reaktion.

Boletus torosus *Ochsenröhrling*

Standort: Laubwald auf Kalk.
Fruchtkörper: Hut bis 180 mm.
Mikromerkmale: Sporen12–16 x 5–7 µm.
Bemerkungen: Neben B. xanthocyaneus und B. pulchrotinctus, beide südlich der Alpen in Italien bekannt, ist B. torosus eine weitere Art mit jung gelben Porenmündungen. Er unterscheidet sich zu den beiden vorgnannten Arten durch die dunklen Fruchtkörper.

Cortinarius balteaus *Violettrandiger Schleimkopf*

Boletus torosus *Ochsenröhrling*

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 41

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Boletus	aestivalis	(Paul.) Fr.	Sommersteinpilz
Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
Boletus	luridus	Schäff.: Fr.	Netzstieliger Hexenröhrling
Boletus	queletii	Schulzer	Glattstieliger Hexenröhrling
Boletus	rhodopurpureus	Smotlacha	Blaufleckender Purpurröhrling
Boletus	satanas	Lenz	Satansröhrling
Boletus	torosus	Fr.	Ochsenröhrling
Chroogomphus	helveticus	(Singer) Moser	Filziger Gelbfuss
Chroogomphus	rutilus	(Schaeff.: Fr.) O.K. Miller	Kupferroter Gelbfuss
Hygrophoropsis	aurantiaca	(Wulff.: Fr.) Maire	Falscher Pfifferling
Leccinum	carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuss
Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
Strobilomyces	strobilaceus	(Scop.: Fr.) Berk.	Strubelkopfröhrling
Suillus	granulatus	(L.: Fr.) Rouss.	Körnchenröhrling
Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
Suillus	placidus	(Bonord.) Singer	Elfenbein-Röhrling
Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
Agaricus	macrosporus	(Möll. & Schäff.) Pilát	Grosssporiger Anischampignion
Agaricus	silvaticus	Schäff.: Fr.	Echter Wald-Champignon
Amanita	ceciliae	Berkeley et Broome) Bas	Riesen-Streifling
Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
Amanita	mairei	Foley	Silbergrauer Scheidenstreifling
Amanita	muscaria	(L.) Hook.	Fliegenpilz
Amanita	porphyria	Alb. & Schw.: Fr.	Porphyrbrauner Wulstling
Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
Amanita	vaginata	(Bull.) Vitt.	Grauer Scheidenstreifling
Armillaria	mellea	(Val.: Fr.) Kummer	Honiggelber Hallimasch
Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 41

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Coprinus	atramentarius	(Bull.:Fr.) Fr.	Falten-Tintling
Coprinus	comatus	(Müll.: Fr.) Pers.	Schopf-Tintling
Coprinus	disseminatus	(Pers.: Fr.) S.F.Gray	Gesäter Tintling
Coprinus	micaceus	(Bull.: Fr.) Fr.	Glimmertintling
Cortinarius	balteaus	Fr.	Violettrandiger Schleimkopf
Cortinarius	caerulescens	(Schäff.) Fr.	Blauer Klumpfuss
Cortinarius	dibaphus	Fr.	Bunter Klumpfuss
Cortinarius	elegantior	(Fr.) Fr.	Strohgelber Klumpfuss
Cortinarius	infractus	(Pers.: Fr.) Fr.	Bitterer Schleimfuss
Cortinarius	largus	Fr.	Blasser Schleimkopf
Cortinarius	olidus	Lge.	Gelbgegürtelter Schleimkopf
Cortinarius	reverendissimus	Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux	
Cortinarius	stillatitus	Fr.	Honig-Schleimfuss
Cortinarius	varius	Fr.	Ziegelgelber Schleimkopf
Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
Entoloma	sinuatum	(Bull.: Pers.: Fr.) Kumm.	Riesen-Rötling
Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
Gymnopus	dryophilus	(Bulliard: Fr.) Murrill	Waldfreund-Rübling
Hebeloma	crustuliniforme	(Bull.: Fr.) Quél.	Tongrauer Fälbling
Hebeloma	hetierii		
Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
Hygrophorus	agathosmus	(Fr.) Fr.	Wohlriechender Schneckling
Hygrophorus	eburneus	(Bull:. Fr.) Fr.	Elfenbein-Schneckling
Hypholoma	sublateritium	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf
Hypholoma	marginatum	(Pers.: Fr.) Schroet.	Geselliger Schwefelkopf
Inocybe	fraudans	(Britz.) Sacc.	Birnen-Risspilz
Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
Inocybe	riomosa	(Bull.: Fr.) Kummer	Kegeliger Risspilz
Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
Lepiota	cristata	(Bolton.: Fr.) Kummer	Stink-Schirmling
Lepiota	ventriosospora	Reid	Gelbwolliger Schirmling



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 41

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Lepista	glaucocana	(Bres.) Sing.	Blassblauer Rötelritterling
Lyophyllum	decastes	(Fr.: Fr.) Singer	Brauner Büschelrasling
Lyophyllum	deliberatum	(Britz.) Kreisel	Rautensporiger Raseling
Macrocystidia	cucumis	(Pers.: Fr.) Joss.	Gurkenschnitzling
Macrolepiota	mastoidea	(Fr.) Sing.	Zitzenschirmling
Macrolepiota	procera	(Scop.: Fr. Sg.	Parasol
Marasmius	alliaceus	(Jacq.: Fr.) Fr.	Langstieliger Knoblauchschwindling
Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
Mycena	galericulata	(Scop.:Fr.) Gray	Rosablättriger Helmling
Mycena	haematopus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Bluthelmling
Mycena	renati	Quélet	Gelbstieliger Nitrat-Helmling
Mycena	zephirus	(Fr.: Fr.) Kumm.	Rostfleckiger Helmling
Oudemansiella	mucida	(Schrad. ex Fr.) v.H.	Beringter Schleimrübling
Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
Schizophyllum	commune	Fr.: Fr.	Gemeiner Spaltblättling
Tricholoma	atrosquamosum	(Chev.) Sacc.	Schwarzschuppiger Ritterling
Tricholoma	pseudonicticans	Bon	Blassfleischiger Fichtenritterling
Tricholoma	scalpturatum	(Fr.) Quél.	Gilbender Erd-Ritterlig
Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
Tricholomopsis	decora	(Fr.) Sing.	Olivgelber Holzritterling
Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
Lactarius	acris	(Bolt.: Fr.) Gray	Rosaanlaufender Milchling
Lactarius	aurantiacus	(Pers.: Fr.) Gray	Echter Orange-Milchling
Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
Lactarius	deliciosus	(L.): Fr.) Gray	Edelreizker
Lactarius	fulvissimus	Rom. i. Kühn. & Rom.	Orangefuchsiger Milchling
Lactarius	intermedius	(Krombh.) Cke.	Grubiger Weisstannenmilchling
Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
Lactarius	pubescens	(Schrad.) Fries	Flaumiger Milchling
Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 41

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Russula	pseudointegra	Arn. & Gor.	Ockerblättriger Zinnobertäubling
Russula	queletii	Fr. in Quél.	Stachelbeertäubling
Russula	sanguinea	(Bull. ex St. Am.) Fr.	Blutroter Täubling
Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling
Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
Cantharellus	cibarius var. amethyst.	Quél.	Lilahütiger Eierschwamm
Cantharellus	friesii	Quél.	Fries´scher Pfifferling
Climacocystis	borealis	(Fr.) Kotl. & Pouz.	Nordischer Porling
Fistulina	hepatica	Schäff. ex Fr.	Leberreischling
Fomitopsis	pinicola	(Fr.) Karst.	Rotbrauner Baumschwamm
Gloeophyllum	odoratum	(Wulf.: Fr.) Imyzeki	Fencheltramete
Heterobasidion	annosum	(Fr.) Bref.	Wurzelschwamm
Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
Laetiporus	sulfureus	Murr.	Schwefelporling
Polyporus	badius	(Pers.: Gray) v. Schw.	Kastanienbrauern Porling
Polyporus	varius	Pers.: Fr.	Löwengelber Schwarzfussporling
Pycnoporellus	fulgens	(Fr.) Donk	Leuchtender Weichporling
Sarcodon	imbricatus	(L.: Fr.) Karst.	Habichtsstacheling
Telephora	terrestris	Fr.	Fächerförmiger Erdwarzenpilz
Trametes	versicolor	(L.: Fr.) Pilát	Schmetterlings-Tramete
Calvatia	exipuliformis	(Schäff.: Pers.) Perd.	Beutelstäubling
Geastrum	sessile	(Sow.) Pouz.	Gewimperter Erdstern
Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
Lycoperdon	pyriforme	Schäff.: Pers.	Birnen-Stäubling
Daldinia	concentrica	(Bolt. ex Fr.) Ces. & de Not.	Kohliger Kugelpilz
Otidea	onotica	(Pers.) Fuck.	Eselsohr



Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

PILZE DER WOCHE 42 Pilzausstellung 2011

Boletus depilatus *Gefleckthütiger Röhrling*

Standort: Laubbäume.
Fruchtkörper: Hut bis 100 mm.
Mikromerkmale: Sporen12–14 x 5–5,5 µm. HDS mit rundlichen Zellen.
Bemerkungen: Neben Boletus impolitus hat er ebenfalls kein Netz am Stiel. Der Geruch an der Stielbasis ist ± jodartig. Hauptmerkmal ist jedoch die rundzellige Huthaut. Die orangen Röhrenmündung ist aussergewöhnlich, wahrscheinlich wetterbedingt.

Porboloma spinulosum *Borstiger Wiesenritterling*

Standort: Besonders bei Eschen.
Fruchtkörper: Hut bis 100 mm.
Mikromerkmale: Sporen 5–7 x 3,5–5 µm, breitelliptisch, amyloid.
Bemerkungen: Die Abbildung ähnelt einem Tigerritterling, jedoch der eigenartige Geruch, stimmt nicht überein. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zu den Ritterlingen sind die amyloiden Sporen.
Foto: René Naef-Biedert

Cortinarius xanthophyllus *Goldblättriger Klumpfuss*

Standort: Laubwald.
Fruchtkörper: Hut bis 80 mm.
Mikromerkmale: Sporen 10–13 x 6–7 µm, zitronenförmig.
Bemerkungen: Gute Merkmale sind: die jung schön gelben Lamellen; das violette Fleisch unter der Huthaut; die zitronenförmigen Sporen und die positive KOH-Reaktion.

Omphalotus illudens *Leuchtender Ölbaumpilz*

Standort: An Laubbäumen (Eiche).
Fruchtkörper: Hut bis 120 mm.
Mikromerkmale: Sporen 5–7 x 5–6 µm.
Bemerkungen: Die Fruchtkörper sind in allen Teilen orange-gelb.

Boletus depilatus *Gefleckthütiger Röhrling*

Porboloma spinulosum *Borstiger Wiesenritterling*

Cortinarius xanthophyllus *Goldblättriger Klumpfuss*

Omphalotus illudens *Leuchtender Ölbaumpilz*

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 42 Pilzausstellung 2011

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Boletinus	cavipes	(Klotzsch) Kalchbrenner	Hohlfuss-Schuppenröhrling
Boletus	aereus	Bull.: Fr.	Schwarzhütiger Steinpilz
Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
Boletus	depilatus	Redeuilh	Gefleckthütiger Röhrling
Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
Boletus	lupinus	Fr., non ss. Bres.	Wolfs-Röhrling
Boletus	queletii	Schulzer	Glattstieliger Hexenröhrling
Boletus	satanas	Lenz	Satansröhrling
Boletus	torosus	Fr.	Ochsenröhrling
Chalciporus	piperatus	(Bull.: Fr.) Bat.	Pfeffer-Röhrling
Chroogomphus	rutilus	(Schaeff.: Fr.) O.K. Miller	Kupferroter Gelbfuss
Gomphidius	glutinosus	(Schäff.: Fr.) Fr.	Kuhmaul
Gomphidius	roseus	(Schäff.: Fr.) Karsten	Rosaroter Schmierling
Leccinum	aurantiacum	(Bull.) Gray	Espen-Rotkappe
Leccinum	scabrum	(Bull.: Fr.) Gray	Birkenpilz
Leccinum	variicolor	Walting	Verschiedenfarbiger Rauhfuss
Omphalotus	illudens	(Schw.) Sacc.	Leuchtender Ölbaumpilz
Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
Paxillus	filamentosus	Fr.	Erlen-Krempling
Pulveroboletus	gentilis	(Quél.) Pouzar	Goldporiger Röhrling
Strobilomyces	strobilaceus	(Scop.: Fr.) Berk.	Strubelkopfröhrling
Suillus	bovinus	(L.: Fr.) Rouss.	Kuhröhrling
Suillus	granulatus	(L.: Fr.) Rouss.	Körnchenröhrling
Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
Suillus	luteus	(L.: Fr.) Rouss.	Butterpilz
Suillus	placidus	(Bonord.) Singer	Elfenbein-Röhrling
Suillus	tridentinus	(Bresad.) Singer	Rostroter Lärchenröhrling
Suillus	variegatus	Sw.: Fr. Kuntze	Sandröhrling
Suillus	viscidus	(L.) Rouss.	Grauer Lärchenröhrling
Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 42 Pilzausstellung 2011

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Agaricus	augustus	Fr.	Braunschuppiger Riesenegerling
Agaricus	macrosporus	(Möll. & Schäff.) Pilát	Grosssporiger Anischampignion
Agaricus	silvaticus	Schäff.: Fr.	Echter Wald-Champignon
Agrocybe	firma	(Peck) Kühn.	samtiger Ackerling
Amanita	ceciliae	Berkeley et Broome) Bas	Riesen-Streifling
Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
Amanita	fulva	(Schäffer) Fr.	Rotbrauner Scheidenstreifling
Amanita	junquillea	Quélet	Narzissengelber Wulstling
Amanita	pantherina	(DC.: Fr.) Krombh.	Pantherpilz
Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
Amanita	porphyria	Alb. & Schw.: Fr.	Porphyrbrauner Wulstling
Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
Amanita	solitaria	(Vittadini) Quélet	Meergrüner Wulstling
Amanita	vaginata	(Bull.) Vitt.	Grauer Scheidenstreifling
Armillaria	ostoyae	Romagn.	Dunkler Hallimasch
Bolbitius	vitellinus	(Pers.: Fr.) Fr.	Gold-Mistpilz
Calocybe	constricta	(Fr.: Fr.) Kühn. ex Bon	Gegürtelter Schönkopf
Calocybe	gambosa	(Fr.) Donk	Mairitterling
Clitocybe	fragrans	(With.) Kumm.	Dufttrichterling
Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
Clitocybe	odora	(Bulliard: Fr.) Kumm.	Grüner Anistrichterling
Clitocybula	lacerata	(Scropoli) Métrod	Fransiger Faserrübling
Clitopilus	brunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
Coprinus	atramentarius	(Bull.:Fr.) Fr.	Falten-Tintling
Cortinarius	alboviolacea	(Pers.: Fr.) Fr.	Weissvioletter Dickfuss
Cortinarius	argutus	Fr.	Spitzbasiger Schleimkopf
Cortinarius	atrovirens	Kalchbr.	Schwarzgrüner Klumpfuss
Cortinarius	bolaris	(Pers.: Fr.) Fr.	Rotschuppiger Rauhkopf
Cortinarius	brunneus	(Pers.: Fr.) Fr.	Dunkelbrauner Gürtelfuss
Cortinarius	caerulescens	(Schäff.) Fr.	Blauer Klumpfuss
Cortinarius	caesiocanescens	(Mos.) Kühm. & Rom.	Violettgrauer Klumpfuss



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 42 Pilzausstellung 2011

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Cortinarius	calochrous	Fr.	Amethystblättriger Klumpfuss
Cortinarius	camphoratus	(Fr.) Fr.	Bocks-Dickfuss
Cortinarius	caninus	(Fr.: Fr.)	Rostfuchsiger Dickfuss
Cortinarius	collinitus	(Sowerby: Fr.) Gray	Blaustiel-Schleimfuss
Cortinarius	croceocaeruleus	(Pers.: Fr.) Fr.	Safranblauer Schleimfuss
Cortinarius	damescens	Fr.	Büscheliger Wasserkopf
Cortinarius	delibutus	Fr.	Violettblättriger Schleimfuss
Cortinarius	dibaphus	Fr.	Bunter Klumpfuss
Cortinarius	dionysae	Hry.	Mehligriechender Klumpfuss
Cortinarius	elegantior	(Fr.) Fr.	Strohgelber Klumpfuss
Cortinarius	elegantissimus	Hry.	Prächtiger Klumpfuss
Cortinarius	glaucopus	(Schäff.: Fr.)	Reihiger Klumpfuss
Cortinarius	hinnuleus	(Sow.) Fr.	Erdigriechender Gürtelfuss
Cortinarius	infractus	(Pers.: Fr.) Fr.	Bitterer Schleimfuss
Cortinarius	largus	Fr.	Blasser Schleimkopf
Cortinarius	melanotus	Kalchbr.	Braunnetziger Rauhkopf
Cortinarius	multiformis	Fr.	Sägeblättriger Klumpfuss
Cortinarius	nanceiensis	Mr.	Gelbflockiger Schleimkopf
Cortinarius	nemorensis	(Fr.) Lge.	Verfärbender Schleimkopf
Cortinarius	odoratus	(Jog.: Mos.) Mos.	Hellgrüner Duft-Klumfuss
Cortinarius	olidus	Lge.	Gelbgegürtelter Schleimkopf
Cortinarius	percomis	Fr.	Würziger Schleimkopf
Cortinarius	praestans	(Cord.) Gill.	Schleiereule
Cortinarius	pulchellus	Lange	Kleinster Violett-Gürtelfuss
Cortinarius	purpurascens	Fr.	Purpurfleckender Klumpfuss
Cortinarius	rubellus	Cooke	Spitzgebuckelter Rauhkoopf
Cortinarius	salor	Fr.	Blauer Schleimfuss
Cortinarius	spilomeus	(Fr.: Fr.) Fr.	Kuperschuppiger Dickfuss
Cortinarius	torvus	(Bull.: Fr.) Fr.	Wohlriechender Gürtelfuss
Cortinarius	traganus	Fr.	Lila-Dickfuss
Cortinarius	triumphans	(Fr.) Fr.	Gelbgestiefelter Schleimkopf
Cortinarius	trivialis	Lge.	Natterstieliger Schleimfuss
Cortinarius	turmalis	Fr.	Rasiger Schleimkopf



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 42 Pilzausstellung 2011

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Cortinarius	variecolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf
Cortinarius	variegatus	Bresadola	Variabler Schleimkopf
Cortinarius	varius	Fr.	Ziegelgelber Schleimkopf
Cortinarius	venetus	(Fr.). Fr.	Grüner Buchenwald-Rauhkopf
Cortinarius	violaceus	(L.:Fr.) Fr.	Dunkelvioletter Schleierling
Cortinarius	xanthophyllus	(Cocke) Henry	Goldblättriger Klumpfuss
Crepidotus	mollis	(Schäff.L Fr.) Staude	Gallertfleischiges Stummelfüsschen
Dermoloma	cuneifolium	(Fr.: Fr.) Bon	Keilblättriger Samtritterling
Dermoloma	pseudocuneifolium	Herink ex Bon	Hygrophaner Samtritterling
Entoloma	excentricum	Bres.	Marmorierter Rötling
Entoloma	rhodopolium	(Fr.: Fr.) Kummer	Niedergedrückter Rötling
Entoloma	sericellum	(Fr.: Fr.) Kumm.	Mattweisser Rötling
Entoloma	sinuatum	(Bull.: Pers.: Fr.) Kumm.	Riesen-Rötling
Flammulaster	limulatus	(Weinm.: Fr.) Watl.	Gelbblättriger Flockenschüppling
Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
Gymnopus	butyracea	(Bull.: Fr.) P. Kumm.	Butterrübling
Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
Gymnopus	dryophylla	(Bull.: Fr.) Kumm.	Waldfreund-Rübling
Gymnopus	fusipes	(Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling
Gymnopus	maculata	(Alb. et Schw. Fr.)	Gefleckter Rübling
Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
Hebeloma	crustuliniforme	(Bull.: Fr.) Quél.	Tongrauer Fälbling
Hebeloma	radicosum	(Bull.: Fr.) Rick.	Wurzelnder Fälbling
Hebeloma	sacchariolens	Quél.	Süssriechender Fälbling
Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
Hemimycena	cucullata	(Pers.: Fr.) Sing.	Gipsweisser Scheinhelmling
Hygrocybe	chlorophana	(Fr.) Wünsche	Stumpfer Saftling
Hygrocybe	coccinea	(Schäff.: Fr.)	Kirschroter Saftling
Hygrocybe	irrigata	(Pers.: Fr. Bon)	Grauer Saftling
Hygrocybe	pratensis	(Pers.: Fr.) Murrill	Orangefarbener Wiesen-Ellerling
Hygrocybe	virginea	(Wulffen: Fr.) Orton et Watlin	Jungfern-Ellerling
Hygrocybe	insipida	(Lange) Moser	Gelbrandiger Saftling
Hygrocybe	psittacina	(Schäff.: Fr.) Wünsche	Papageigrüner Saftling



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 42 Pilzausstellung 2011

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Hygrophoropsis	aurantiaca	(Wulff.: Fr.) Maire	Falscher Pfifferling
Hygrophorus	capreolarius	(Kalchbr.) Sacc.	Weinroter Schneckling
Hygrophorus	chrysodon	(Batsch: Fr.) Fr.	Goldzahn-Schneckling
Hygrophorus	discoideus	(Pers.: Fr.) Fr.	Braunscheibiger Schneckling
Hygrophorus	eburneus	(Bull:. Fr.) Fr.	Elfenbein-Schneckling
Hygrophorus	erubescens	(Fr.: Fr.) Fr.	Rasiger Purpurschneckling
Hygrophorus	mesotephrus	Berk. & Br.	Olivgrauer Schneckling
Hygrophorus	nemoreus	(Pers.: Fr.) Fr.	Hain-Schneckling
Hygrophorus	penarius	Fr.	Trockener Schneckling
Hygrophorus	pudorinus	(Fr.) Fr.	Orange-Schneckling
Hygrophorus	pustulatus	(Fr.) Fr.	Schwarzpunktierter Schneckling
Hypholoma	capnoides	(Fr.: Fr.) Kummer	Rauchblättriger Schwefelkopf
Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
Hypholoma	lateritium	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf
Inocybe	adequata	(Britz.) Sacc.	Weinrötlicher Risspilz
Inocybe	bongardii	(Weinmann) Quélet	Duftender Risspilz
Inocybe	corydalina	Quél.	Grünbuckliger Risspilz
Inocybe	dulcamara	(Albert. et Schw.: Pers. Kumm.	Bittersüsser Risspilz
Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
Inocybe	geophylla var. lilacina	(Peck.) Gill.	Lilastieliger Risspilz
Inocybe	haemacta	(Berk. & Cke.) Sacc.	Grünroter Risspilz
Inocybe	queletii	Maire et Konr.	Weisstannen-Risspilz
Inocybe	riomosa	(Bull.: Fr.) Kummer	Kegeliger Risspilz
Inocybe	whitei	(Berk .et Br.) Sacc.	Weissrosa Risspilz
Inocybe	lanuguinosa	(Bulliard: Fr.) Kummer	Wolliger Risspilz
Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
Lentinellus	cochleatus	(Pers.: Fr.) Karst.	Äniszähling
Lentinus	adhaerens	(Alb. et Schw.: Fr.) Fr.	Harziger Sägeblättling
Lenzites	warnieri	Durieu et Montagne	Verkahlender Bätterporling
Lepiota	felina	(Pers.: Fr.) Karst.	Katzen-Schirmling
Lepista	flaccida	(Sowerby Fries) Patouillard	Fuchsiger Rötelritterling
Lepista	glaucocana	(Bres.) Sing.	Blassblauer Rötelritterling



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 42 Pilzausstellung 2011

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Lepista	splendens	(Pers.: Fr.) Konrad	Dichtblättriger Rötelritterling
Lyophyllum	connatum	(Schum.: Fr.) Sing.	Weisser Büschelrasling
Lyophyllum	decastes	(Fr.: Fr.) Singer	Brauner Büschelrasling
Lyophyllum	deliberatum	(Britz.) Kreisel	Rautensporiger Raseling
Lyophyllum	fumosum	(Pers.: Fr.) Ort.	Hellbrauner Büschelrasling
Marasmius	alliaceus	(Jacq.: Fr.) Fr.	Langstieliger Knoblauchschwindling
Marasmius	oreades	(Bolton.: Fr.) Fr.	Nelkenschwindling
Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.)Kotl. et Pouz.	Breitblattrübling
Mycena	crocata	(Schrad.: Fr.) Kumm.	Safranmilchender Helmling
Mycena	epipterygia	(Scop.: Fr.) Gray	Dehnbarer Helmling
Mycena	galericulata	(Scop.:Fr.) Gray	Rosablättriger Helmling
Mycena	galopes	(Peck: Fr.) Kumm.	Weissmilchender Helmling
Mycena	haematopus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Bluthelmling
Mycena	inclinata	(Fr.) Quél.	Buntstieliger Helmling
Mycena	maculata	Karst.	Gefleckter Helmling
Mycena	pelianthina	(Fr.: Fr.) Quél.	Schwarzgezähnelter Helmling
Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
Mycena	renati	Quélet	Gelbstieliger Nitrat-Helmling
Mycena	rosea	(Bull.) Gramberg	Rosa-Rettichhelmling
Mycena	stipata	Maas Geester.& Schw.	Büscheliger Nitrat-Helmling
Mycena	zephirus	(Fr.: Fr.) Kumm.	Rostfleckiger Helmling
Mycena (Roridella)	rorida	(Scop.: Fr.) Quél.	Schleimfuss-Helmling
Naucoria	melinoides	(Bull.: Fr.) Kühn.	Honiggelber Sumpfschnitzling
Omphalina	discorosea	(Pil.) Her. & Kotl.	Rosablättriger Holznabeling
Omphalina	pyxidata	(Bull.: Pers.) Quél.	Starkgeriefter Nabeling
Omphalina	rickenii	Sing. ex Hora	Mauer-Nabeling
Oudemansiella	mucida	(Schrad. ex Fr.) v.H.	Beringter Schleimrübling
Panellus	stypticus	(Bull.: Fr.) P.Karst.	Bitterer Muschelseitling
Pholiota	astragalina	(Fr.) Singer	Safranroter Schüppling
Pholiota	jahnii	Tjallingii-Beukers et Bas	Pinselschüppling
Pholiota	populnea	(Pers.: Fr.) Kuyp. & Tjall.	Pappel-Schüppling
Pholiota	scamba	(Fr.: Fr.) Moser	Seidiger Schüppling
Pholiota	squarrosa	(Pers.: Fr.) Kumm.	Sparriger Schüppling



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 42 Pilzausstellung 2011

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Pluteus	aurantiorugosus	(Trog.) Saccardo	Orangeroter Dachpilz
Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
Pluteus	exiguus	(Pat.) Sacc.	Kleinster Dachpilz
Porboloma	spinulosum	(Kühner et Romagnesi) Singer	Borstiger Wiesenritterling
Psathyrella	conopilus	(Fr.: Fr.) Pears. & Dennis	Huthaarfaserling
Pseudoclitocybe	cyathiformis	(Bull.) Sing.	Kaffebrauner Gabeltrichterling
Ripartites	tricholoma	(Alb. & v. Schw.)	Bewimperter Filzkrempling
Strobilurus	esculentus	(Wulf.: Fr) Sg.	Fichtenzapfenrübling
Stropharia	caerulea	Kreisel	Blauer Träuschling
Stropharia	coronilla	(Bull.: Fr.) Quél.	Krönchenträuschling
Stropharia	semiglobata	(Batsch.: Fr.) Quél.	Halbkugeliger Träuschling
Tricholoma	acerbum	(Bull.: Fr.) Quél.	Gerippter Ritterling
Tricholoma	atrosquamosum	(Chev.) Sacc.	Schwarzschuppiger Ritterling
Tricholoma	aurantium	(Schäff.: Fr.) Rick.	Orangeroter Ritterling
Tricholoma	lascivum	(Fr.) Gill. ss. Lge.	Unverschämter Ritterling
Tricholoma	portensosum	(Fr.) Quél.	Schwarzfaseriger Ritterling
Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
Tricholoma	scalpturatum	(Fr.) Quél.	Gilbender Erd-Ritterlig
Tricholoma	sciodes	(Secr.) Martin	Schärflicher Ritterling
Tricholoma	sejunctum	(Sow.: Fr.) Quél.	Grüngelber Ritterling
Tricholoma	sulphureum	(Bull.: Fr.) Kumm.	Schwefel-Ritterling
Tricholoma	terreum	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Erd-Ritterling
Tricholoma	ustale	(Fr.: Fr.) Kumm.	Brandiger Ritterling
Tricholoma	ustaloides	Romagn.	Fastberingter Ritterling
Tricholoma	vaccinum	(Pers.: Fr.) Kumm.	Zottiger Ritterling
Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
Tricholomopsis	decora	(Fr.) Sing.	Olivgelber Holzritterling
Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
Lactarius	acerrimus	Britz.	Queradriger Milchling
Lactarius	acris	(Bolt.: Fr.) Gray	Rosaanlaufender Milchling
Lactarius	aurantiacus	(Pers.: Fr.) Gray	Echter Orange-Milchling
Lactarius	badiosanguineus	Kühn & Rom.	Braunroter Milchling
Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 42 Pilzausstellung 2011

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Lactarius	deliciosus	(L.): Fr.) Gray	Edelreizker
Lactarius	deterrimus	Gröger	Fichtenreizker
Lactarius	fulvissimus	Rom. i. Kühn. & Rom.	Orangefuchsiger Milchling
Lactarius	helvus	(Fr.: Fr.) Fr.	Maggipilz
Lactarius	intermedius	(Krombh.) Cke.	Grubiger Weisstannenmilchling
Lactarius	luridus	(Pers.: Fr.) Gray	Gewöhnlicher Violettmilchling
Lactarius	musteus	Fr.	Heide-Milchling
Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
Lactarius	picinus	Fr.	Pechschwarzer Milchling
Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
Lactarius	pyrogalus	(Bull.: Fr.) Fr.	Scharfer Hasel-Milchling
Lactarius	quietus	(Fr.) Fr.	Eichenmilchling
Lactarius	romagnesii	Bon	Kerbrandiger Korallenmilchling
Lactarius	ruginosus	Rom.	Kleiner Korallenpilz
Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
Lactarius	scrobiculatus	(Scop.: Fr.) Fr.	Grubiger Fichtenmilchling
Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
Lactarius	trivialis	(Fr.: Fr.) Fr.	Nordischer Milchling
Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
Lactarius	vietus	(Fr.) Fr.	Grünfleckender Milchling
Lactarius	zonaroides	Kühner et Romagn.	Montaner Zonen-Milchling
Lactarius	albocarneus	Britzelmayr	Klebriger Milchling
Russula	anthracina	Romagn.	Lachsblättriger Schwärztäubling
Russula	atropurpurea	(Krombh.) Britz.	Pupurschwarzer Täubling
Russula	badia	Quél.	Zedernholztäublig
Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
Russula	chloroides	(Krombh.) Bres.	Schmalblättriger Weisstäubling
Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
Russula	decolorans	(Fr.) Fr.	Orangeroter Graustieltäubling
Russula	delica	Fr.	Gemeinder Weisstäubling
Russula	emetica	(Schäff.: Fr.) Gray	Kirschroter Speitäubling
Russula	faginea	Romagn.	Buchen-Heringstäubling
Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 42 Pilzausstellung 2011

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
Russula	illota	Romagn.	Morsetäubling
Russula	integra	(L.:) Fr. ss. Mre.	Braunroter Ledertäubling
Russula	laurocerasi	Melzer	Mandeltäubling
Russula	lilacea	Quél.	Rotstieliger Reiftäubling
Russula	luteotacta	Rea	Gelbfleckender Täubling
Russula	mairei	Singer	Buchen-Speitäubling
Russula	nauseosa	(Pers.) Fr..	Geriefter Weichtäubling
Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
Russula	paludosa	Britz.	Apfeltäubling
Russula	pseudointegra	Arn. & Gor.	Ockerblättriger Zinnobertäubling
Russula	queletii	Fr. in Quél.	Stachelbeertäubling
Russula	sanguinea	(Bull. ex St. Am.) Fr.	Blutroter Täubling
Russula	sardonia	Fr.	Zitronenblättriger Täubling
Russula	solaris	Ferd. et Winge	Sonnentäubling
Russula	torulosa	Bres.	Gedrungener Täubling
Russula	turci	Bres.	Jodoformtäubling
Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
Russula	violeipes	Quélet	Violettstieliger Brätlingstäubling
Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling
Russula	xerampelina	Schäff.: Fr.	Roter Heringstäubling
Albatrellus	subrubescens	Murrill	Rötender Schafeuter-Porling
Antrodia	serialis	(Fr.) Donk	Reihige Tramete
Auriscalpium	vulgare	Gray	Ohrlöffel-Stacheling
Boletopsis	leucomelaena	(Pers.) Fayod	Grauer Russporling
Cantharellus	auroa	(Batsch) Kuyp.	Duftender Gabeling, Goldfüsschen
Cantharellus	melanoxeros	Desm.	Gelbvioletter Pfifferling
Cerrena	unicolor	(Bull. ex Fr.) Murrill	Aschgrauer Wirrling
Clavaria	fragilis	Holmskjold: Fr.	Wurmförmige Keule

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 42 Pilzausstellung 2011

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Clavariadelphus	truncatus	(Quél.) Donk	Abgestutzte Herkuleskeule
Clavulinopsis	corniculata	(Fr.) Corner	Geweiförmige Wiesenkeule
Climacocystis	borealis	(Fr.) Kotl. & Pouz.	Nordischer Porling
Coltricia	perennis	(L.: Fr.) Murrill	Brauner Dauerporling
Craterellus	cornucopioides	Pers.	Totentrompete
Daedalea	quercina	(L. ex Fr.)	Eichenwirrling
Daedaleopsis	confragosa	(Bolt.: Fr.) Schröt. s. str.	Rötende Tramete
Daedaleopsis	tricolor	(Pers.) Bond. & Sing.	Purpurrote Tramete
Datronia	mollis	(Sommerf.: Fr.) Donk	Weicher Resupinatporling
Fomes	fomentarius	(L.: Fr.) Fr.	Echter Zunderschwamm
Fometopsis	officinalis	(Villars: Fr.) Bondarzew et Singer	Lärchen-Baumschwamm
Fomitopsis	pinicola	(Fr.) Karst.	Rotrandiger Baumschwamm
Ganoderma	pfeifferi	Bresadola	Kupfrroter Lackporling
Ganoderma	lipsiense	(Batsch: Pers.) Atkinson	Flacher Lackporling
Ganoderma	carnosum	Pat.	Dunkler Lackporling
Ganoderma	lucidum	(Curt.: Fr.) Karst.	Glänzender Lackporling
Gloeophyllum	odoratum	(Wulf.: Fr.) Imyzeki	Fencheltramete
Gloeoporus	dichrous	(Fr.: Fr.) Bresadola	Zweifarbiger Gloeoporling
Hapalopilus	rutilans	(Pers.: Fr.) Karst.	Zimtfarbener Weichporling
Hydnellum	peckii	Banker in Peck	Scharfer Korkstacheling
Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
Inonotus	nodulosus	(Fr.) Karst.	Buchen-Schillerporling
Ischnoderma	trogii	(Fr.) Donk	Gestielter Tannen-Harzporling
Laetiporus	sulphureus	(Fr.) Murr.	Schwefelporling
Meripilus	giganteus	(Pers.: Fr.) Karst.	Riesenporling
Merulius	tremellosus	Fr.	Gallertfleischiger Fältling
Oligoporus	caesius	(Schrad.: Fr.) Gilb. & Ryv.	Blauer Saftporling
Oligoporus	stipticus	(Pers.: Fr.) Gilb. & Ryv.	Bitterer Saftporling
Phellinus	conchatus	(Pers.: Fr.) Quél.	Muschelförmiger Feuerschwamm
Phellinus	hartigii	(All. & Schn.) Bond.	Tannen-Feuerschwamm
Phellinus	nigricans	(Fr.) Karst.	Schwarzer Birkenfeuerschwamm
Phellinus	robustus	(Karst.) Bourd. & Galz.	Eichen-Feuerschwamm
Phellinus	trivialis	(Bres.) Kreisel	Weiden-Feuerschwamm



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 42 Pilzausstellung 2011

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Phellinus	tuberculosus	(Baumg.) Niem.	Pflaumen-Feuerschwamm
Phylloporia	ribis	(Schumacher Fr.) Ryvarden	Beeren Strauchporling
Piptoporus	betulinus	(Bulliard) Karsten	Birken-Hautporling
Polyporus	badius	(Pers.: Gray) v. Schw.	Kastanienbrauern Porling
Polyporus	varius	Pers.: Fr.	Löwengelber Schwarzfussporling
Pycnoporellus	fulgens	(Fr.) Donk	Leuchtender Weichporling
Ramaria	myceliosa	(Peck) Corner	Mycel-Koralle
Ramaria	pallida	(Schäff. em. Bres.) Ricken	Bauchwehkoralle
Ramaria	stricta	(Pers.: Fr.) Quél. s. str.	Steife Koralle
Sarcodon	imbricatus	(L. ex Fr.) Karst.	Habichtspilz
Schizopora	paradoxa	(Schrad.: Fr.) Donk	Veränderlicher Spaltporling
Serpula	himatoides	(Fr.) Karst.	Wilder Hausschwamm
Sistotrema	confluens	Fr.	Gestielter Zahnling
Sparassis	crispa	(Wulf. in Jacq.) Fr.	Krause Glucke
Telephora	terrestris	Fr.	Fächerförmiger Erdwarzenpilz
Trametes	gibbosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Buckel-Tramete
Trametes	hirsuta	(Wulf.: Fr.) Pilát	Striegelige Tramete
Trametes	multicolor	(Schäff.) Jül.	Zonen-Tramete
Trametes	versicolor	(L.: Fr.) Pilát	Schmetterlings-Tramete
Trichaptum	abietinum	(Fr.) Ryv.	Tannentramete
Clathrus	archeri	(Berkeley Dring	Tintenfisch-Gitterling
Clathrus	ruber	Battarra: Pers.	Roter Gitterling
Cyathus	striatus	(Huds.) ex Pers.	Striegeliger Teuerling
Geastrum	fimbriatum	Fries	Gewimperter Erdstern
Geastrum	triplex	Jungh.	Halskrausen-Erdstern
Lycoperdon	echinatum	Pers.: Pers.	Igel-Stäubling
Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
Lycoperdon	pyriforme	Schäff.: Pers.	Birnen-Stäubling
Lycoperdon	umbrinum	Pers.: Pers.	Brauner Stäubling
Scleroderma	citrinum	Pers.	Dickschaliger Kartoffelbovist
Vascellum	pratense	Pers.: Pers.) Kreisel	Wiesen-Stäubling
Pseudohydnum	gelatinosum	(Scop.: Fr.) Karst.	Zitterzahn
Sebacina	inkrustans	(Pers.:Ffr.) Tul.	Erd-Wachskruste



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 42 Pilzausstellung 2011

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Bisporella	citrina	(Batsch ex Fr.) Korf & Carpenter	Zitronengelbes Holzbecherchen
Cordyceps	capitata	(Holmskjoid: Fr.) Link	Kopfige Kernkeule
Daldinia	concentrica	(Bolt. ex Fr.) Ces. & de Not.	Kohliger Kugelpilz
Helvella	crispa	(Bull. ex St. Aman) Boud.	Herbstlorchel
Helvella	lacunosa	(Pers.) O. Kuntze	Grubenlorchel
Hypoxylon	fragiforme	(Scopoli: Fr.) Kickx	Rötliche Kohlenbeere
Otidea	onotica	(Pers.) Fuck.	Eselsohr
Xylaria	longipes	(Pers. ex Mér.) Grev.	Langstielige Ahorn-Holzkeule



Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

PILZE DER WOCHE 43

Cortinarius trivialis *Natterstieliger Schleimfuss*

Standort: Laubwälder.
Fruchtkörper: Hut bis 70 mm.
Mikromerkmale: Sporen 10,5–15 x 6,5–7,5 µm.
Bemerkungen: Dieser Schleimfuss ist kaum zu verwechseln, fällt er doch durch die treppenartigen Velumgürteln am Stiel auf.
Foto: Markus Wilhelm.

Hygrocybe konradii *Breitsporiger Saftling*

Standort: Grasland.
Fruchtkörper: Hut bis 70 mm.
Mikromerkmale: Sporen 9–12 x 7–9 µm.
Bemerkungen: Diese Art gehört zum Formenkreis der grossen Saftlinge mit orangerotem Stiel und Hut, wo auch der Kirschrote und der Grösste Saftling dazu gehören. Mikroskopisch fallen die breitelliptischen Sporen auf.
Foto: Markus Wilhelm.

Marasmius undatus *Rotfleckender Schwindling*

Standort: Pteridium aquilinum (Adlerfarn).
Fruchtkörper: Hut bis 25 mm.
Mikromerkmale: Sporen 8–11 x 5–7 µm.
Bemerkungen: Der Stiel dieser Art kann bis 15 cm lang sein. Die Hutfarbe ist variabel ± rot fleckend. Weitere wichtige Hinweise sind die Pielozystiden sowie die etwas spezielle Form der Sporen.
Foto: Markus Wilhelm.

Lycoperdon lividum *Grauer Stäubling*

Standort: Auf Wiesen.
Fruchtkörper: Hut bis 25 mm hoch.
Mikromerkmale: Sporen 3,5–4,5 x 3,5–4 µm fein warzig, Sterigmen bis 20 µm.
Bemerkungen: Die Exoperidie ist wie mit Sand bestreut. Der Stiel ist nur kurz und konisch.
Foto: Markus Wilhelm.

Cortinarius trivialis *Natterstieliger Schleimfuss*

Hygrocybe konradii *Breitsporiger Saftling*

Marasmius undatus *Rotfleckender Schwindling*

Lycoperdon lividum *Grauer Stäubling*

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 43

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
Chroogomphus	rutilus	(Schaeff.: Fr.) O.K. Miller	Kupferroter Gelbfuss
Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
Amanita	junquillea	Quélet	Narzissengelber Wulstling
Amanita	muscaria	(L.) Hook.	Fliegenpilz
Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
Amanita	solitaria	(Vittadini) Quélet	Meergrüner Wulstling
Amanita	strobiliformis	(Paul.: Vitt.) Bertillon	Fransiger Wulstling
Baeospora	myriadophylla	(Peck) Singer	Tausendblatt Amyloidsporrübling
Clitocybe	clavipes	(Pers.) Kumm.	Keulenfuss-Trichterling
Clitocybe	senilis	(Fr.) Singer	Greisen-Trichterling
Clitopilus	brunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
Cortinarius	anserinus	(Vel.) Hry.	Buchen-Klumpfuss
Cortinarius	atrovirens	Kalchbr.	Schwarzgrüner Klumpfuss
Cortinarius	barbaricus		Formenkreis von C. calochrous
Cortinarius	brunneus	(Pers.: Fr.) Fr.	Dunkelbrauner Gürtelfuss
Cortinarius	caesiocanescens	(Mos.) Kühm. & Rom.	Violettgrauer Klumpfuss
Cortinarius	decipiens	(Pers.: Fr.) Fr.	Dunkelgebuckelter Wasserkopf
Cortinarius	elegantior	(Fr.) Fr.	Strohgelber Klumpfuss
Cortinarius	huronensis	Amm. & Sm.	Braunhütiger Sumpf-Hautkopf
Cortinarius	illibatus	Fr.	Fleischiger Schleimfuss
Cortinarius	infractus	(Pers.: Fr.) Fr.	Bitterer Schleimfuss
Cortinarius	malicorius	Fr.	Orangerandiger Hautkopf
Cortinarius	multiformis	Fr.	Sägeblättriger Klumpfuss
Cortinarius	nanceiensis	Mr.	Gelbflockiger Schleimkopf
Cortinarius	odorifer	Britz	Anis-Klumpfuss
Cortinarius	olidus	Lge.	Gelbgegürtelter Schleimkopf
Cortinarius	purpurascens	Fr.	Purpurfleckender Klumpfuss
Cortinarius	saturninus	Fr.	Blaufleischiger Gürtelfuss
Cortinarius	spilomeus	(Fr.: Fr.) Fr.	Kuperschuppiger Dickfuss



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 43

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Cortinarius	splendens	Hry.	Schöngelber Klumpfuss
Cortinarius	trivialis	Lge.	Natterstieliger Schleimfuss
Cortinarius	varius	Fr.	Ziegelgelber Schleimkopf
Cortinarius	venetus	(Fr.). Fr.	Grüner Buchenwald-Rauhkopf
Cortinarius	violaceus	(L.: Fr.) Gray	Dunkelvioletter Dickfuss
Cortinarius	vulpinus	(Vel.) Hry.	Gilbender Fuchs-Seidenkopf
Cortinarius	parafulmineus	Henry	Falscher Messing-Klumpfuss
Cortinarius	fluryi	(Moser) Moser	Unangenehmriechender Schleimkopf
Cystoderma	amiantinum	(Scop.: Fr.) Fayod	Amiant-Körnchenschirmling
Dermoloma	pseudocuneifolium	Her. ex Bon	Gefeldeter Samtritterling
Echinoderma	asperum	(Pers.: Fr.) Bon	Spitzschuppiger Stachelschirmling
Entoloma	incanum	(Fr.) Hes.	Braungrüner Rötling
Entoloma	prunuloides	(FR.) Quél.	Mehl-Rötling
Galerina	marginata	(Batsch) Kühn.	Gifthäubling
Gymnopus	butyracea	(Bull.: Fr.) P. Kumm.	Butterrübling
Hebeloma	crustuliniforme	(Bull.: Fr.) Quél.	Tongrauer Fälbling
Hebeloma	sacchariolens	Quél.	Süssriechender Fälbling
Hebeloma	senescens	(Batsch) Berk.	Bräunender Fälbling
Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
Hebeloma	sordescens	Vesterholt	Schwarzknolliger Fälbling
Hebeloma	truncatum	(Fr.) Kumm.	Kakao-Fälbling
Hemimycena	cucullata	(Pers.: Fr.) Sing.	Gipsweisser Scheinhelmling
Hygrocybe	konradii	Haller	Breitsporiger Saftling
Hygrocybe	obrussea	(Fr.: Fr.) Wünsche	Schnürsporiger Saftling
Hygrocybe	psittacina	(Schäff.: Fr.) Wünsche	Papageigrüner Saftling
Hygrophorus	agathosmus	(Fr.) Fr.	Wohlriechender Schneckling
Hygrophorus	cossus	(Sow. ex Fr.) Fr.	Verfärbender Schneckling
Hygrophorus	eburneus	(Bull:. Fr.) Fr.	Elfenbein-Schneckling
Hygrophorus	mesotephrus	Berk. & Br.	Olivgrauer Schneckling
Hygrophorus	penarius	Fr.	Trockener Schneckling
Inocybe	fuscidula	Vel.	Braunstreifiger Risspilz
Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
Inocybe	rimosa	(Bull.: Fr:) Kummer	Kegeliger Risspilz



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 43

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
Lentinus	adhaerens	(Alb. et Schw.: Fr.) Fr.	Harziger Sägeblättling
Lepiota	cristata	(Bolton.: Fr.) Kummer	Stink-Schirmling
Lepiota	subincarnata	Lge.	Fleischfarbener Schirmling
Leucoagaricus	leucothites	(Vitt.) Was.	Rosablättriger Egerlingsschirmling
Lyophyllum	connatum	(Schum.: Fr.) Sing.	Weisser Büschelrasling
Macrolepiota	mastoidea	(Fr.) Sing.	Zitzenschirmling
Marasmius	oreades	(Bolton.: Fr.) Fr.	Nelkenschwindling
Marasmius	undatus	(Berk.) Fr.	Rotfleckender Schwindling
Melanoleuca	excissa	(Fr.: Fr.) Sing.	Blassgrauer Weichritterling
Micromphale	foetidum	(Sow..: Fr.) Singer	Gemeiner Stinkschwindling
Mycena	abramsii	(Murr.) Murr.	Voreilender Helmling
Mycena	crocata	(Schrad.: Fr.) Kumm.	Safranmilchender Helmling
Mycena	epipterygia	(Scop.: Fr.) Gray	Dehnbarer Helmling
Mycena	rosea	(Bull.) Gramberg	Rosa-Rettichhelmling
Pholiota	astragalina	(Fr.) Singer	Safranroter Schüppling
Pholiota	cerifera	(Karst.) Karst.	Goldfell-Schüppling
Pholiota	squarrosa	(Pers.: Fr.) Kumm.	Sparriger Schüppling
Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
Psathyrella	multipedata	(Peck) Sm.	Büscheliger Faserling
Pseudoclitocybe	cyathiformis	(Bull.) Sing.	Kaffebrauner Gabeltrichterling
Rickenella	fibula	(Bull.: Fr.) Raith.	Orangegelber Heftelnabeling
Stropharia	caerulea	Kreisel	Blauer Träuschling
Tricholoma	atrosquamosum	(Chev.) Sacc.	Schwarzschuppiger Ritterling
Tricholoma	columbetta	(Fr.) Kumm.	Seidiger Ritterling
Tricholoma	pseudonicticans	Bon	Blassfleischiger Fichtenritterling
Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
Tricholoma	sciodes	(Secr.) Martin	Schärflicher Ritterling
Tricholoma	sulphureum	(Bull.: Fr.) Kumm.	Schwefel-Ritterling
Tricholoma	terreum	(Schäff.:) Fr.) Kumm.	Erdritterling
Tricholoma	vaccinum	(Pers.: Fr.) Kumm.	Zottiger Ritterling
Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 43

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Tricholomopsis	decora	(Fr.) Sing.	Olivgelber Holzritterling
Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
Lactarius	deliciosus	(L.): Fr.) Gray	Edelreizker
Lactarius	fuliginosus	(Fr.) Fr. (non ss. Bon)	Russfarbener Milchling
Lactarius	fulvissimus (subser.)	Rom. i. Kühn. & Rom.	Orangefuchsiger Milchling
Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
Lactarius	pubescens	(Schrad.) Fries	Flaumiger Milchling
Lactarius	pyrogalus	(Bull.: Fr.) Fr.	Scharfer Hasel-Milchling
Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
Lactarius	semisanguifluus	Helm & Lecl.	Spangrün-weinroter Kiefernreizker
Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling
Albatrellus	ovinus	(Schäff.: Fr.) Kotl. & Pouz.	Schafporling
Cantharellus	tubaeformis	Fr.	Durchbohrter Leistling
Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
Merulius	tremellosus	Fr.	Gallertfleischiger Fältling
Oligoporus (Ptychogaster)	ptychogaster	(Ludwig) Falck	Bauchpilz-Mehlstaubporling
Lycoperdon	lividum	Pers.	Grauer Stäubling
Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
Vascellum	pratense	Pers.: Pers.) Kreisel	Wiesen-Stäubling
Nectria	cinnabarina	(Tode ex Fr.) Fr.	Zinnoberroter Pustelpilz



Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

Cortinarius majusculus, Sporen

PILZE DER WOCHE 44 Schlussbummel

Clatrus ruber *Gitterling*

Standort:	Wärmebegünstigte Standorte, Erdboden.
Fruchtkörper:	Hut bis 30 mm.
Mikromerkmale:	Sporen 5–6 x 1,5–2 µm.
Bemerkungen:	Eine seltene, bei uns einzige Art der Gattung, die kaum verwechselt werden kann.
Foto:	Mauro Seggiani.

Cortinarius majusculus *Leoparden-Klumpfuss*

Standort:	Laubwälder.
Fruchtkörper:	Hut bis 150 mm.
Mikromerkmale:	Sporen 9,5–11 x 5,5–6,5 µm, mandelförmig.
Bemerkungen:	Die wichtigsten Merkmale sind: die tiefrote KOH-Reaktion auf dem Hut, die gelben Lamellen und die Hutoberfläche, die ewas an ein Leopardenfell erinnert.

Phlebia radiata *Orangefarbener Kammpilz*

Standort:	An totem Laubholz.
Fruchtkörper:	Rundliche Flecken bildend, die dann flächig zusammenwachsen und mehrere cm gross werden.
Mikromerkmale:	Sporen 4,5–5,5 x 2 µm, allantoid. Hyphen mit Schnallen, Leptozystiden keulig.
Bemerkungen:	Dieser Pilz ist in Form und Farbe verschieden. Wichtige Hinweise sind die Hutstruktur, radial-furchig, wellig, höckerig sowie die Farbe des Pilzes. Phlebia rufa ist in der Regel blasser und hat anders geformte Leptozystiden.
Foto:	Mauro Seggiani.

Clatrus ruber *Gitterling*

Cortinarius majusculus *Leoparden-Klumpfuss*

Phlebia radiata *Orangefarbener Kammpilz*

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 44 Schlussbummel

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Boletus	rhodopurpureus	Smotlacha	Blaufleckender Purpurröhrling
Chalciporus	piperatus	(Bull.: Fr.) Bat.	Pfeffer-Röhrling
Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
Porphyrellus	porphyrosporus	Fr.) Gilbert	Düsterer Röhrling
Suillus	granulatus	(L.: Fr.) Rouss.	Körnchenröhrling
Agaricus	silvicola	(Vittad.) Sacc.	Dünnfleischiger Anis-Egerling
Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
Amanita	muscaria	(L.) Hook.	Fliegenpilz
Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
Armillaria	mellea	(Val.: Fr.) Kummer	Honiggelber Hallimasch
Armillaria	ostoyae	Romagn.	Dunkler Hallimasch
Clitocybe	clavipes	(Pers.) Kumm.	Keulenfuss-Trichterling
Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
Clitocybe	metachroa	(Fr.) Kumm.	Staubfüssiger Trichterling
Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
Clitocybula	lacerata	(Scropoli) Métrod	Fransiger Faserrübling
Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
Coprinus	comatus	(Müll.: Fr.) Pers.	Schopf-Tintling
Coprinus	micaceus	(Bull.: Fr.) Fr.	Glimmertintling
Cortinarius	anomalus	(Fr.: Fr.) Fr.	Braunvioletter Dickfuss
Cortinarius	brunneus	(Pers.: Fr.) Fr.	Dunkelbrauner Gürtelfuss
Cortinarius	caesiocanescens	(Mos.) Kühm. & Rom.	Violettgrauer Klumpfuss
Cortinarius	calochrous	Fr.	Amethystblättriger Klumpfuss
Cortinarius	elegantior	(Fr.) Fr.	Strohgelber Klumpfuss
Cortinarius	elegantissimus	Hry.	Prächtiger Klumpfuss
Cortinarius	glaucopus	(Schäff.: Fr.)	Reihiger Klumpfuss
Cortinarius	hinnuleus	(Sow.) Fr.	Erdigriechender Gürtelfuss
Cortinarius	majusculus	Kühner	Leoparden-Klumpfuss
Cortinarius	multiformis	Fr.	Sägeblättriger Klumpfuss
Cortinarius	nanceiensis	Mr.	Gelbflockiger Schleimkopf
Cortinarius	praestans	(Cord.) Gill.	Schleiereule
Cortinarius	purpurascens	Fr.	Purpurfleckender Klumpfuss



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 44 Schlussbummel

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Cortinarius	splendens	Hry.	Schöngelber Klumpfuss
Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
Entoloma	nitidum	Quél.	Stahlblauer Rötling
Entoloma	rhodopolium var. nidr.	(Fr.)Nordel./Kumm.	Alkalischer Rötling
Galerina	marginata	(Batsch) Kühn.	Gifthäubling
Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
Gymnopus	butyracea	(Bull.: Fr.) P. Kumm.	Butterrübling
Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
Hebeloma	mesophaeum	(Pers.: Fr.) Quélet	Dunkelscheibiger Fälbling
Hebeloma	radicosum	(Bull.: Fr.) Rick.	Wurzelnder Fälbling
Hebeloma	senescens	(Batsch) Berk.	Bräunender Fälbling
Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
Hemimycena	cucullata	(Pers.: Fr.) Sing.	Gipsweisser Scheinhelmling
Hygrophorus	agathosmus	(Fr.) Fr.	Wohlriechender Schneckling
Hygrophorus	eburneus	(Bull:. Fr.) Fr.	Elfenbein-Schneckling
Hypholoma	capnoides	(Fr.: Fr.) Kummer	Rauchblättriger Schwefelkopf
Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
Hypholoma	marginatum	(Pers.: Fr.) Schroet.	Geselliger Schwefelkopf
Hypholoma	sublateritium	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf
Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
Inocybe	geophylla var. lilacina	(Peck.) Gill.	Lilastieliger Risspilz
Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
Lepiota	castanea	Quél. (inkl. L. ignipes Locq. ex Bon	Kastanienbrauner Schirmling
Lepista	flaccida	(Sowerby Fries) Patouillard	Fuchsiger Rötelritterling
Lepista	nuda	(Bull.: Fr.) Cooke	Violetter Rötelritterling
Lyophyllum	decastes	(Fr.: Fr.) Singer	Brauner Büschelrasling
Lyophyllum	rancidum	(Fr.: Fr.) Sing.	Wurzel-Graublatt
Macrocystidia	cucumis	(Pers.: Fr.) Joss.	Gurkenschnitzling
Macrolepiota	excoriata	Schäff.: Fr.) Wass.	Ackerschirmling
Macrolepiota	procera	(Scop.: Fr. Sg.	Parasol
Macrolepiota	rhacodes var. brunnea	(Vittad.) Singer	Brauner Safranschirmling



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 44 Schlussbummel

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Mycena	abramsii	(Murr.) Murr.	Voreilender Helmling
Mycena	acicula	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Orangeroter Helmling
Mycena	epipterygia	(Scop.: Fr.) Gray	Dehnbarer Helmling
Mycena	galericulata	(Scop.:Fr.) Gray	Rosablättriger Helmling
Mycena	haematopus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Bluthelmling
Mycena	polygramma	(Bull.: Fr.) Gray	Rillstieliger Helmling
Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
Mycena	rosea	(Bull.) Gramberg	Rosa-Rettichhelmling
Mycena	stipata	Maas Geester.& Schw.	Büscheliger Nitrat-Helmling
Mycena	acicula	(Schäffer: Fr.) Kummer	Orangeroter Helmling
Panellus	stypticus	(Bull.: Fr.) P.Karst.	Bitterer Muschelseitling
Pholiota	adiposa	(Fr.) Kumm.	Schleimiger Schüppling
Pholiota	jahnii	Tjallingii-Beukers et Bas	Pinselschüppling
Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
Pseudoclitocybe	cyathiformis	(Bull.) Sing.	Kaffebrauner Gabeltrichterling
Rickenella	fibula	(Bull.: Fr.) Raith.	Orangegelber Heftelnabeling
Stropharia	aeruginosa	(Curtis:) Fr./Quél.	Grünspansträuschling
Tricholoma	atrosquamosum	(Chev.) Sacc.	Schwarzschuppiger Ritterling
Tricholoma	fulvum	(DC.: Fr.) Sacc.	Gelbblättriger Ritterling
Tricholoma	orirubens	Quél.	Rötender Ritterling
Tricholoma	portentosum	(Fr.) Quél.	Schwarzfaseriger Ritterling
Tricholoma	pseudonicticans	Bon	Blassfleischiger Fichtenritterling
Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
Tricholoma	sulphureum	(Bull.: Fr.) Kumm.	Schwefel-Ritterling
Tricholoma	terreum	(Schäff.:) Fr.) Kumm.	Erdritterling
Tricholoma	vaccinum	(Pers.: Fr.) Kumm.	Zottiger Ritterling
Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
Tricholomopsis	decora	(Fr.) Sing.	Olivgelber Holzritterling
Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
Lactarius	albocarneus	Britzelmayr	Klebriger Milchlig
Lactarius	aurantiacus	(Pers.: Fr.) Gray	Echter Orange-Milchling
Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
Lactarius	deterrimus	Gröger	Fichtenreizker



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 44 Schlussbummel

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Lactarius	fulvissimus	Rom. i. Kühn. & Rom.	Orangefuchsiger Milchling
Lactarius	intermedius	(Krombh.) Cke.	Grubiger Weisstannenmilchling
Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
Lactarius	quietus	(Fr.) Fr.	Eichenmilchling
Lactarius	romagnesii	Bon	Kerbrandiger Korallenmilchling
Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
Russula	chloroides	(Krombh.) Bres.	Schmalblättriger Weisstäubling
Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
Russula	queletii	Fr. in Quél.	Stachelbeertäubling
Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling
Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
Cantharellus	tubaeformis	Fr.	Durchbohrter Leistling
Clavulina	cinereus	(Bull.: Fr.) Schröt.	Graue Koralle
Daedaleopsis	tricolor	(Pers.) Bond. & Sing.	Purpurrote Tramete
Fomitopsis	pinicola	(Fr.) Karst.	Rotbrauner Baumschwamm
Gloeophyllum	abietinum	Fr. ex Fr.	Tannenblättling
Gloeophyllum	odoratum	(Wulf.: Fr.) Imyzeki	Fencheltramete
Heterobasidion	annosum	(Fr.) Bref.	Wurzelschwamm
Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
Phlebia	radiata	Fr.	Orangefarbener Kammpilz
Pycnoporus	cinnabarinus	(Jacq.: Fr.) Karst.	Zinnoberrote Tramete
Sarcodon	imbricatus	(L.: Fr.) Karst.	Habichtsstacheling
Schizopora	paradoxa	(Schrad.: Fr.) Donk	Veränderlicher Spaltporling
Thelephora	palmata	Scop.: Fr.	Stinkender Warzenpilz
Trametes	gibbosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Buckel-Tramete
Trametes	hirsuta	(Wulf.: Fr.) Pilát	Striegelige Tramete
Trametes	versicolor	(L.: Fr.) Pilat	Schmetterlings-Tramete
Trichaptum	abietinum	(Fr.) Ryv.	Tannentramete



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 44 Schlussbummel

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Geastrum	sessile	(Sow.) Pouz.	Gewimperter Erdstern
Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
Lycoperdon	pyriforme	Schäff.: Pers.	Birnen-Stäubling
Phallus	impudicus	L. ex Pers.	Stinkmorchel
Helvella	crispa	(Bull. ex St. Aman) Boud.	Herbstlorchel



Mit «Pilze der Woche» möchten wir eine Auswahl Pilze vorstellen, die jeweils in der laufenden Woche gefunden wurden. Es handelt sich um solche Arten, die vielleicht, bedingt durch unsere tiefe Lage, früher oder später im Jahr fruktifizieren als in anderen Gegenden. Die Texte sollten, zusammen mit dem Bild, für die Beschreibung genügen. Am Schluss des Dokumentes befindet sich die Fundliste der jeweiligen Woche.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung oder die Internet-Seite von der: «VAPKO, Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane». Die Gattungshinweise (Systematik der Röhrlinge und Blätterpilze) befinden sich auf dieser HP.

PILZE DER WOCHE 45

Hericium coralloides *Ästiger-Stachelbart*

Standort:	An totem Nadelholz.
Fruchtkörper:	bis 200 mm.
Mikromerkmale:	Sporen 6–7 x 4,5–5,5 µm, amyloid. Hyphen mit Schnallen, monomitisch.
Bemerkungen:	Verwechslungen währen möglich mit Creolophus cirrhatus, dieser hat jedoch mehrhütige Fruchtkörper und kleinere Sporen.
Foto:	Mauro Seggiani.

Macrocystidia cucumis *Gurkenschnitzling*

Standort:	In Laub- und Nadelwäldern.
Fruchtkörper:	Hut bis 60 mm.
Mikromerkmale:	Sporen 7–8,5 x 4,5–4,5 µm, hellrötlich.
Bemerkungen:	Der aufdringliche Geruch nach Fischtran lässt diese Art gut erkennen.

Cortinarius cagei Melot | Zweifarbiger Wasserkopf

Hericium coralloides *Ästiger-Stachelbart*

Macrocystidia cucumis *Gurkenschnitzling*

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 45

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
Chalciporus	piperatus	(Bull.: Fr.) Bat.	Pfeffer-Röhrling
Chroogomphus	rutilus	(Schaeff.: Fr.) O.K. Miller	Kupferroter Gelbfuss
Gomphidius	glutinosus	(Schäff.: Fr.) Fr.	Kuhmaul
Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
Suillus	collinitus	Fr. ss. Flury, Mos.	Ringloser Butterröhrling
Suillus	luteus	(L.: Fr.) Rouss.	Butterpilz
Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
Agaricus	moelleri	Wasser	Perlhuhn-Egerling
Agaricus	xanthoderma	Genev.	Karbol-Egerling
Agarigus	excellens	(Moll.) Moll.	Schneeweisser Riesen-Champignon
Amanita	muscaria	(L.) Hook.	Fliegenpilz
Armillaria	mellea	(Val.: Fr.) Kummer	Honiggelber Hallimasch
Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
Clitocybe	metachroa	(Fr.) Kumm.	Staubfüssiger Trichterling
Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
Cortinarius	anserinus	(Vel.) Hry.	Buchen-Klumpfuss
Cortinarius	bivelus	(Fr.: Fr.) Fr.	Birken-Gürtelfuss
Cortinarius	brunneus	(Pers.: Fr.) Fr.	Dunkelbrauner Gürtelfuss
Cortinarius	bulliardii	(Pers.: Fr.) Fr.	Feuerfüssiger Gürtelfuss
Cortinarius	caesiocanescens	(Mos.) Kühm. & Rom.	Violettgrauer Klumpfuss
Cortinarius	cagei	Melot	Zweifarbiger Wasserkopf
Cortinarius	calochrous	Fr.	Amethystblättriger Klumpfuss
Cortinarius	caninus	(Fr.: Fr.)	Rostfuchsiger Dickfuss
Cortinarius	catharinae	Consiglio	Abgeflachtknolliger Klumpfuss
Cortinarius	decipiens	(Pers.: Fr.) Fr.	Lilastieliger Wasserkopf
Cortinarius	dibaphus	Fr.	Bunter Klumpfuss
Cortinarius	dionysae	Hry.	Mehligriechender Klumpfuss
Cortinarius	elegantior	(Fr.) Fr.	Strohgelber Klumpfuss
Cortinarius	epipoleus	Fr.	Stahlgrauer Kleinspor-Schleimfuss
Cortinarius	evernius	(Fr.: Fr.) Fr. ss. Mos.	Rettich-Gürtelfuss
Cortinarius	fraudolosus	Britzelmayr	Trügerischer Schleimkopf

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 45

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Cortinarius	glaucopus	(Schäff.: Fr.)	Reihiger Klumpfuss
Cortinarius	haasii	Moser	Violettstieliger Amethyst-Klumpfuss
Cortinarius	illibatus	Fr.	Fleischiger Schleimfuss
Cortinarius	nanceiensis	Mr.	Gelbflockiger Schleimkopf
Cortinarius	odorifer	Britz	Anis-Klumpfuss
Cortinarius	purpurascens	Fr.	Purpurfleckender Klumpfuss
Cortinarius	reverendissimus	Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux	
Cortinarius	rufoolivaceus	(Pers.: Fr.)	Violettroter Klumpfuss
Cortinarius	saturninus	Fr.	Blaufleischiger Gürtelfuss
Cortinarius	varius	Fr.	Ziegelgelber Schleimkopf
Cortinarius	venetus	(Fr.). Fr.	Grüner Buchenwald-Rauhkopf
Cortinarius	violaceus	(L.:Fr.) Fr.	Dunkelvioletter Schleierling
Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
Entoloma	rhodopolium var. nid.	(Fr.)Nordel./Kumm.	Alkalischer Rötling
Gymnopus	distorta	(Fr.) Quél.	Drehstieliger Rübling
Hebeloma	crustuliniforme	(Bull.: Fr.) Quél.	Tongrauer Fälbling
Hebeloma	hetierii		
Hebeloma	mesophaeum	(Pers.: Fr.) Quélet	Dunkelscheibiger Fälbling
Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
Hemimycena	cucullata	(Pers.: Fr.) Sing.	Gipsweisser Scheinhelmling
Hygrophorus	agathosmus	(Fr.) Fr.	Wohlriechender Schneckling
Hygrophorus	capreolarius	(Kalchbr.) Sacc.	Weinroter Schneckling
Hygrophorus	chrysodon	(Batsch.: Fr.) Fr	Goldzahn-Schneckling
Hygrophorus	discoideus	(Pers.: Fr.) Fr.	Braunscheibiger Schneckling
Hygrophorus	eburneus	(Bull:. Fr.) Fr.	Elfenbein-Schneckling
Hygrophorus	pudorinus	(Fr.) Fr.	Orange-Schneckling
Hygrophorus	pustulatus	(Fr.) Fr.	Schwarzpunktierter Schneckling
Inocybe	whitei	(Berk .et Br.) Sacc.	Weissrosa Risspilz
Lepiota	clypeolaria	(Bull.: Fr.) Kumm.	Wolliggestiefelter Schirmling
Lepiota	ventriosospora	Reid	Gelbwolliger Schirmling
Lepista	irina	(Fr.) Big.	Veilchen-Rötelritterling
Leucoagaricus	badhamii	(Berkeley et Broome) Singer	Anlaufender Egerlingsschirmling
Leucocortinarius	bulbiger	(A. & S.: Fr.) Sing.	Knolliger Schleierritterling



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 45

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Lyophyllum	loricatum	(Fr.) Kühn.	Gepanzerter Rasling
Macrolepiota	procera	(Scop.: Fr. Sg.	Parasol
Macrolepiota	rhacodes var. hortensis	(Vittad.) Singer	Safranschirmling, Gartenform
Marasmius	oreades	(Bolton.: Fr.) Fr.	Nelkenschwindling
Mycena	aetites	(Fr.) Quélet	Graublättriger Russ-Helmling
Mycena	epipterygia	(Scop.: Fr.) Gray	Dehnbarer Helmling
Mycena	flavescens	Velen.	Olivgelber Helmling
Mycena	maculata	Karst.	Gefleckter Helmling
Mycena	stipata	Maas Geester.& Schw.	Büscheliger Nitrat-Helmling
Mycena	crocata	(Schrad.: Fr.) Kumm.	Safranmilchender Helmling
Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
Stropharia	caerulea	Kreisel	Blauer Träuschling
Tricholoma	atrosquamosum	(Chev.) Sacc.	Schwarzschuppiger Ritterling
Tricholoma	basirubens	Bon	Rosafüssiger Ritterling
Tricholoma	imbricatum	(Fr.: Fr.) Kumm.	Feinschuppiger Ritterling
Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
Tricholoma	scalpturatum	(Fr.) Quél.	Gilbender Erd-Ritterlig
Tricholoma	terreum	(Schäff.:) Fr.) Kumm.	Erdritterling
Tricholoma	ustale	(Fr.: Fr.) Kumm.	Brandiger Ritterling
Tricholoma	vaccinum	(Pers.: Fr.) Kumm.	Zottiger Ritterling
Tricholomopsis	decora	(Fr.) Sing.	Olivgelber Holzritterling
Lactarius	badiosanguineus	Kühn & Rom.	Braunroter Milchling
Lactarius	intermedius	(Krombh.) Cke.	Grubiger Weisstannenmilchling
Lactarius	pyrogalus	(Bull.: Fr.) Fr.	Scharfer Hasel-Milchling
Lactarius	romagnesii	Bon	Kerbrandiger Korallenmilchling
Lactarius	scrobiculatus	(Scop.: Fr.) Fr.	Grubiger Fichtenmilchling
Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
Russula	anthracina	Romagn.	Lachsblättriger Schwärztäubling
Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
Russula	chloroides	(Krombh.) Bres.	Schmalblättriger Weisstäubling
Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
Russula	mairei	Singer	Buchen-Speitäubling

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 45

Gattung	Art	Autor	Deutsch
Russula	olivascens (postia)	(Pers.: Fr.) Bres.	Olivgrüner Täubling
Russula	queletii	Fr. in Quél.	Stachelbeertäubling
Russula	sanguinea	(Bull. ex St. Am.) Fr.	Blutroter Täubling
Russula	xerampelina	Schäff.: Fr.	Roter Heringstäubling
Russula	densifolia	Gill.	Dichtblättriger Schwärztäubling
Clavariadelphus	pistilaris	(Fr.) Donk	Herkuleskeule
Climacocystis	borealis	(Fr.) Kotl. & Pouz.	Nordischer Porling
Cotylidia	pannosa	(Sowerby: Fr.) Reid	Moos-Kreiselpilz
Hericium	coralloides	(Scop.) Pers.	Ästiger-Stachelbart
Sarcodon	imbricatus	(L.: Fr.) Karst.	Habichtsstacheling
Sparassis	crispa	(Wulf. in Jacq.) Fr.	Krause Glucke
Calvatia	exipuliformis	(Schäff.: Pers.) Perd.	Beutelstäubling
Lycoperdon	pyriforme	Schäff.: Pers.	Birnen-Stäubling
Gyromitra	Infula	(Bres.) Kreisel	Bischofsmütze
Helvella	crispa	(Bull. ex St. Aman) Boud.	Herbstlorchel
Helvella	lacunosa	(Pers.) O. Kuntze	Grubenlorchel

Anzahl Pilzarten pro Woche 2011



Woche 16: Frühlingspilzausstellung Woche 42: Pilzausstellung Woche 44: Schlussbummel

Total 781 Arten




Gempen Niederschlag
Tagessumme in mm / Tag
mm
80
60
40
20
0
Gempen
Precipitation (1.5m)
Dec 10
Jan 11
Feb 11
Mar 11
Apr 11
May 11
Jun 11
Jul 11
Aug 11
Sep 11
Oct 11


Temperaturen
30
20
10
0
-10
Air Temperature
Basel - Klingelbergstrasse (38m)
Basel - Lange Erlen (2m)
Gempen (2m)
Dec 10
Jan 11
Feb 11
Mar 11
Apr 11
May 11
Jun 11
Jul 11
Aug 11
Sep 11
Oct 11

PILZ-FUNDLISTE 2011

Total 781 Arten

Agaricus aestivalis (Moell.) Pil. Sommer-Egerling
Agaricus augustus Fr. Braunschuppiger Riesenegerling
Agaricus bitorquis (Quélet) Sacc. Trottoir-Champignon
Agaricus essettei Bon Schiefknolliger Anis-Champignon
Agaricus langei (Möll.) Möll. Grosssporgiger Blutchampignon
Agaricus macrocarpus (Moeller) Moeller Grosser Anis-Egerling
Agaricus moelleri Wasser Perlhuhn-Egerling
Agaricus pseudopratensis (Bohus) Wasser Falscher Wiesenegerling
Agaricus semotus Fr. Weinrötlicher Zwerg-Champignon
Agaricus silvaticus Schäff.: Fr. Echter Wald-Champignon
Agaricus silvicola (Vittad.) Sacc. Dünnfleischiger Anis-Egerling
Agaricus xanthoderma Genev. Karbol-Egerling
Agarigus excellens (Moll.) Moll. Schneeweisser Riesen-Champignon
Agrocybe cylindracea (DC: Fr.) Mre. Südlicher Ackerling
Agrocybe dura (Bolt.) Sing. Rasiger Ackerling
Agrocybe erebia (Fr.) Kühn. Leberbrauner Ackerling
Agrocybe firma (Peck) Kühn. samtiger Ackerling
Agrocybe praecox (Pers: Fr.) Fayod. Voreilender Ackerling
Agrocybe semiorbicularis (Bull.: St. Am.) Fay. Halbkugeliger Ackerling
Albatrellus ovinus (Schäff.: Fr.) Kotl. & Pouz. Schafporling
Albatrellus subrubescens Murrill Rötender Schafeuter-Porling
Amanita muscaria (L.) Pers. Fliegenpilz
Amanita beckeri Huijsman Braunhäutiger Scheidenstreifling
Amanita ceciliae Berkeley et Broome) Bas Riesen-Streifling
Amanita citrina (Schäff.) Pers. Gelber Knollenblätterpilz
Amanita crocea (Quél. in Boud.) Sing. Orangebrauner Scheidenstreifling
Amanita eliae Quél. Kammrandiger Wulstling
Amanita excelsa (Fr.) Bertillon Grauer Wulstling
Amanita franchetii (Boud.) Fay. Rauher Wulstling
Amanita fulva (Schäffer) Fr. Rotbrauner Scheidenstreifling
Amanita junquillea Quélet Narzissengelber Wulstling
Amanita lepiotoides Barla Braunscheidiger Wulstling
Amanita magnivolvata Aalto Grossscheidiger Scheidenstreifling
Amanita mairei Foley Silbergrauer Scheidenstreifling
Amanita muscaria (L.) Hook. Fliegenpilz
Amanita pantherina (DC.: Fr.) Krombh. Pantherpilz
Amanita phalloides (Fr.) Link Grüner Knollenblätterpilz
Amanita porphyria Alb. & Schw.: Fr. Porphyrbrauner Wulstling
Amanita rubescens (Pers.: Fr.) Gray Perlpilz
Amanita solitaria (Vittadini) Quélet Meergrüner Wulstling
Amanita strobiliformis (Paul.: Vitt.) Bertillon Fransiger Wulstling
Amanita submembranacea (Bon) Gröger Grauhäutiger Scheidenstreifling
Amanita vaginata (Bull.) Vitt. Grauer Scheidenstreifling
Amanita virosa (Fr.) Bertillon Spitzhütiger Knollenblätterpilz
Antrodia serialis (Fr.) Donk Reihige Tramete
Antrodiella hoehnelii (Bres.: Höhn.) Niemelä Spitzwarzige Tramete
Aportiporus biennis (Bull.: Fr.) Sing. Rötender Saftwirrling
Arachnopeziza aurata Fuckel Blassgoldenes Spinnwebebecherchen
Armillaria mellea (Val.: Fr.) Kummer Honiggelber Hallimasch
Auricularia mesenterica Dicks.: Fr. Gezonter Ohrlappenpilz
Auriscalpium vulgare Gray Ohrlöffel-Stacheling
Baeospora myriadophylla (Peck) Singer Tausendblatt Amyloidsporrübling
Bisporella citrina (Batsch ex Fr.) Korf & Carpenter Zitronengelbes Holzbecherchen
Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) Karst. Angebrannter Rauchporling
Bolbitius vitellinus (Pers.: Fr.) Fr. Gold-Mistpilz
Boletinus cavipes (Klotzsch) Kalchbrenner Hohlfuss-Schuppenröhrling
Boletopsis leucomelaena (Pers.) Fayod Grauer Russporling
Boletus aestivalis (Paul.) Fr. Sommersteinpilz
Boletus aereus Bull.: Fr. Schwarzhütiger Steinpilz
Boletus appendiculatus Schaeff. Anhängsel-Röhrling
Boletus calopus Pers.: Fr. Schönfuss-Röhrling
Boletus depilatus Redeuilh Gefleckthütiger Röhrling
Boletus edulis Bull.: Fr. Steinpilz
Boletus erythropus (Fr.: Fr.) Pers. Schusterpilz
Boletus impolitus Fr. Fahler Röhrling
Boletus legalie (Pilat) Blum
Boletus lupinus Fr., non ss. Bres. Wolfs-Röhrling
Boletus luridus Schäff.: Fr. Netzstieliger Hexenröhrling
Boletus pinophillus Pil. & Dermek Kiefernsteinpilz
Boletus pulverlulentus Opat. Schwarzblauender Röhrling

Boletus queletii Schulzer Glattstieliger Hexenröhrling
Boletus radicans Pers.: Fr. Bitter-Röhrling
Boletus rhodopurpureus Smotlacha Blaufleckender Purpurröhrling
Boletus satanas Lenz Satansröhrling
Boletus torosus Fr. Ochsenröhrling
Bulgaria inquinans (Prs.:) Fries Gemeiner Schmutzbecherling
Calocera viscosa (Pers.: Fr.) Fr. Klebriger Hörnling
Calocybe carnea (Bull.: Fr.) Kühn.: Donk Fleischrosa-Schönkopf
Calocybe constricta (Fr.: Fr.) Kühn. ex Bon Gegürtelter Schönkopf
Calocybe gambosa (Fr.) Donk Mairitterling
Calvatia exipuliformis (Schäff.: Pers.) Perd. Beutelstäubling
Cantharellus auroa (Batsch) Kuyp. Duftender Gabeling, Goldfüsschen
Cantharellus cibarius Fr. Eierschwamm
Cantharellus cibarius var. amethyst. Quél. Lilahütiger Eierschwamm
Cantharellus cibarius var. pallidus Schulz. Blasser Pfifferling
Cantharellus friesii Quél. Fries´scher Pfifferling
Cantharellus melanoxeros Desm. Gelbvioletter Pfifferling
Cantharellus tubaef. var. lutescens (Fr.) Gill. Gelbstieliger Trompetenpfifferling
Cantharellus tubaeformis Fr. Durchbohrter Leistling
Cerrena unicolor (Bull. ex Fr.) Murrill Aschgrauer Wirrling
Chaetocalathus craterellus (Dur. & Lv.) Sing. Trichteriger Muschelseitling
Chalciporus piperatus (Bull.: Fr.) Bat. Pfeffer-Röhrling
Chamaemyces fracidus (Fr.) Donk Fleckender Schmierschirmling
Chroogomphus helveticus (Singer) Moser Filziger Gelbfuss
Chroogomphus rutilus (Schaeff.: Fr.) O.K. Miller Kupferroter Gelbfuss
Clathrus archeri (Berkeley Dring Tintenfisch-Gitterling
Clathrus ruber Battarra: Pers. Roter Gitterling
Clavaria fragilis Holmskjold: Fr. Wurmförmige Keule
Clavariadelphus pistilaris (Fr.) Donk Herkuleskeule
Clavariadelphus truncatus (Quél.) Donk Abgestutzte Herkuleskeule
Clavulina cinereus (Bull.: Fr.) Schröt. Graue Koralle
Clavulinopsis corniculata (Fr.) Corner Geweiförmige Wiesenkeule
Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouz. Nordischer Porling
Clitocybe catinus (Fr.) Quél. ss. Harmaja, Moser Alpiner Trichterling
Clitocybe cerussata (Fries) P. Kummer Ähnlich Waldfreund Trichterling
Clitocybe clavipes (Pers.) Kumm. Keulenfuss-Trichterling
Clitocybe costata Kühn. & Romagn. Kerbrandiger Trichterling
Clitocybe fragrans (With.) Kumm. Dufttrichterling
Clitocybe geotropa (DC. & Lam) Quél. Mönchskopf
Clitocybe gibba (Pers. Fr.) Kummer Ockerbrauner Trichterling
Clitocybe metachroa (Fr.) Kumm. Staubfüssiger Trichterling
Clitocybe nebularis (Batsch. Fries) Kummer Nebelgrauer Trichterling
Clitocybe odora (Bulliard: Fr.) Kumm. Grüner Anistrichterling
Clitocybe phaeophthalma (Pers.) Kp. Ranziger Trichterling
Clitocybe senilis (Fr.) Singer Greisen-Trichterling
Clitocybula lacerata (Scropoli) Métrod Fransiger Faserrübling
Clitopilus brunulus (Scop. Fr.) Kumm. Mehlräsling
Collybia cookei (Bres.) Arnold Gelbknolliger Zwergrübling
Coltricia perennis (L.: Fr.) Murrill Brauner Dauerporling
Conocybe vestita (Fr. ap. Quélet) Kühner Behangener Glockenschüppling
Coprinus atramentarius (Bull.:Fr.) Fr. Falten-Tintling
Coprinus auricomus Pat. Braunhaariger Tintling
Coprinus comatus (Müll.: Fr.) Pers. Schopf-Tintling
Coprinus disseminatus (Pers.: Fr.) S.F.Gray Gesäter Tintling
Coprinus micaceus (Bull.: Fr.) Fr. Glimmertintling
Coprinus micaceus (Bull.: Fr.) Fr. Glimmertintling
Cordyceps capitata (Holmskjoid: Fr.) Link Kopfige Kernkeule
Coriolopsis gallica (Fr.) Ryv. Braune Borstentramete
Cortinarius collinitus (Sowerby: Fr.) Gray Blaustiel-Schleimfuss
Cortinarius fluryi (Moser) Moser Unangenehmriechender Schleimkopf
Cortinarius parafulmineus Henry Falscher Messing-Klumpfuss
Cortinarius spilomeus (Fr.: Fr.) Fr. Kupferschuppiger Seidenkopf
Cortinarius velenovskyi Henry Ziegelrötlicher Duft-Wasserkopf
Cortinarius xanthophyllus (Cocke) Henry Goldblättriger Klumpfuss
Cortinarius acutus (Pers.: Fr.) Fr. Spitzgebuckelter Wasserkopf
Cortinarius alboviolacea (Pers.: Fr.) Fr. Weissvioletter Dickfuss
Cortinarius amurceus (subtortus) (Pers.: Fr.) Fr. Ockergelber Schleimkopf
Cortinarius anomalus (Fr.: Fr.) Fr. Braunvioletter Dickfuss
Cortinarius anserinus (Vel.) Hry. Buchen-Klumpfuss
Cortinarius argutus Fr. Spitzbasiger Schleimkopf
Cortinarius atrovirens Kalchbr. Schwarzgrüner Klumpfuss
Cortinarius balteaus Fr. Violettrandiger Schleimkopf
Cortinarius barbaricus Formenkreis von C. calochrous
Cortinarius bataillei (Favre es Mos.) Orangefüssiger Hautkopf
Cortinarius bateatocumatilis Hry. ex Ort. Filziger Schleimkopf
Cortinarius bivelus (Fr.: Fr.) Fr. Birken-Gürtelfuss

Cortinarius bolaris (Pers.: Fr.) Fr. Rotschuppiger Rauhkopf
Cortinarius brunneus (Pers.: Fr.) Fr. Dunkelbrauner Gürtelfuss
Cortinarius bulliardii (Pers.: Fr.) Fr. Feuerfüssiger Gürtelfuss
Cortinarius caerulescens (Schäff.) Fr. Blauer Klumpfuss
Cortinarius caesiocanescens (Mos.) Kühm. & Rom. Violettgrauer Klumpfuss
Cortinarius cagei Melot Zweifarbiger Wasserkopf
Cortinarius calochrous Fr. Amethystblättriger Klumpfuss
Cortinarius camphoratus (Fr.) Fr. Bocks-Dickfuss
Cortinarius caninus (Fr.: Fr.) Rostfuchsiger Dickfuss
Cortinarius catharinae Consiglio Abgeflachtknolliger Klumpfuss
Cortinarius cinnamomeus Fr. Zimt-Hautkopf
Cortinarius croceocaeruleus (Pers.: Fr.) Fr. Safranblauer Schleimfuss
Cortinarius damescens Fr. Büscheliger Wasserkopf
Cortinarius decipiens (Pers.: Fr.) Fr. Dunkelgebuckelter Wasserkopf
Cortinarius delibutus Fr. Violettblättriger Schleimfuss
Cortinarius dibaphus Fr. Bunter Klumpfuss
Cortinarius dionysae Hry. Mehligriechender Klumpfuss
Cortinarius eburneus (Vel.) Hry./Bon Elfenbein-Schleimfuss
Cortinarius elegantior (Fr.) Fr. Messinggelber Klumpfuss
Cortinarius elegantissimus Hry. Prächtiger Klumpfuss
Cortinarius epipoleus Fr. Stahlgrauer Kleinspor-Schleimfuss
Cortinarius evernius (Fr.: Fr.) Fr. ss. Mos. Rettich-Gürtelfuss
Cortinarius flexipes var. inolens Lindst. Geruchloser Duft-Gürtelfuss
Cortinarius fraudolosus Britzelmayr Trügerischer Schleimkopf
Cortinarius glaucopus (Schäff.: Fr.) Reihiger Klumpfuss
Cortinarius haasii Moser Violettstieliger Amethyst-Klumpfuss
Cortinarius hinnuleus (Sow.) Fr. Erdigriechender Gürtelfuss
Cortinarius huronensis Amm. & Sm. Braunhütiger Sumpf-Hautkopf
Cortinarius hysginus (Mos.) Mos. Kuhrötlicher Schleimkopf
Cortinarius illibatus Fr. Fleischiger Schleimfuss
Cortinarius infractus (Pers.: Fr.) Fr. Bitterer Schleimfuss
Cortinarius jubarinus Fr. ss. Chev. n. Mos. Glänzender Wasserkopf
Cortinarius junghuhnii Fr. ss. Lge. Mos. Breitsporiger Samt-Wasserkopf
Cortinarius laniger Fr. Wolliger Gürtelfuss
Cortinarius largus Fr. Blasser Schleimkopf
Cortinarius limonius (Fr.: Fr.) Fr. Löwengelber Rauhkopf
Cortinarius majusculus Kühner Leoparden-Klumpfuss
Cortinarius malicorius Fr. Orangerandiger Hautkopf
Cortinarius melanotus Kalchbr. Braunnetziger Rauhkopf
Cortinarius multiformis Fr. Sägeblättriger Klumpfuss
Cortinarius nanceiensis Mr. Gelbflockiger Schleimkopf
Cortinarius nemorensis (Fr.) Lge. Verfärbender Schleimkopf
Cortinarius odoratus (Jog.: Mos.) Mos. Hellgrüner Duft-Klumfuss
Cortinarius odorifer Britz Anis-Klumpfuss
Cortinarius olidus Lge. Gelbgegürtelter Schleimkopf
Cortinarius orellanus (Fr.) Fr. Orangefuchsiger Rauhkopf
Cortinarius percomis Fr. Würziger Schleimkopf
Cortinarius pholideus (Fr.: Fr.) Fr. Braunschuppiger Dickfuss
Cortinarius praestans (Cord.) Gill. Schleiereule
Cortinarius pseudocrassus Joss. ex Orton Trockener Gebirg.-Schleimkopf
Cortinarius pulchellus Lange Kleinster Violett-Gürtelfuss
Cortinarius purpurascens Fr. Purpurfleckender Klumpfuss
Cortinarius reverendissimus Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux
Cortinarius rubellus Cooke Spitzgebuckelter Rauhkoopf
Cortinarius rubicundulus (Rea) Pears. Rötlichfaseriger Rauhkopf
Cortinarius rubricosus Fries ss. Moser Schwärzender Wasserkopf
Cortinarius rufoolivaceus (Pers.: Fr.) Violettroter Klumpfuss
Cortinarius salor Fr. Blauer Schleimfuss
Cortinarius sanguineus (Wulf.: Fr.) Gray Blutroter Hautkopf
Cortinarius saturninus Fr. Blaufleischiger Gürtelfuss
Cortinarius semisanguineus (Fr.) Blutblättriger Hautkopf
Cortinarius spilomeus (Fr.: Fr.) Fr. Kuperschuppiger Dickfuss
Cortinarius splendens Hry. Schöngelber Klumpfuss
Cortinarius stillatitus Fr. Honig-Schleimfuss
Cortinarius subvalidus Hry. Geschmückter Schleimkopf
Cortinarius torvus (Bull.: Fr.) Fr. Wohlriechender Gürtelfuss
Cortinarius traganus Fr. Lila-Dickfuss
Cortinarius triumphans (Fr.) Fr. Gelbgestiefelter Schleimkopf
Cortinarius trivialis Lge. Natterstieliger Schleimfuss
Cortinarius turmalis Fr. Rasiger Schleimkopf
Cortinarius variecolor (Pers.: Fr.) Fr. Erdigriechender Schleimkopf
Cortinarius variegatus Bresadola Variabler Schleimkopf
Cortinarius varius (Schäffer: Fr.) Fr. Ziegelgelber Schleimkopf
Cortinarius varius Fr. Ziegelgelber Schleimkopf
Cortinarius venetus (Fr.). Fr. Grüner Buchenwald-Rauhkopf
Cortinarius vibratilis (Fr.) Fr. Galliger Schleimfuss

Cortinarius violaceus (L.: Fr.) Gray Dunkelvioletter Dickfuss
Cortinarius vulpinus (Vel.) Hry. Gilbender Fuchs-Seidenkopf
Cotylidia pannosa (Sowerby: Fr.) Reid Moos-Kreiselpilz
Craterellus cornucopioides Pers. Totentrompete
Crepidotus applanatus (Pers.) Kumm. Gerieftes Stummelfüsschen
Crepidotus mollis (Schäff.L Fr.) Staude Gallertfleischiges Stummelfüsschen
Cyathus striatus (Huds.) ex Pers. Striegeliger Teuerling
Cystoderma amiantinum (Scop.: Fr.) Fayod Amiant-Körnchenschirmling
Daedalea quercina (L. ex Fr.) Eichenwirrling
Daedaleopsis confragosa (Bolt.: Fr.) Schröt. s. str. Rötende Tramete
Daedaleopsis confragosa (Bolt.: Fr.) Schröt. s. str. Rötende Tramete
Daedaleopsis tricolor (Pers.) Bond. & Sing. Purpurrote Tramete
Daldinia concentrica (Bolt. ex Fr.) Ces. & de Not. Kohliger Kugelpilz
Datronia mollis (Sommerf.: Fr.) Donk Weicher Resupinatporling
Dentropolyporus umbellatus (Pers.: Fr.) Jül. Eichhase
Dermoloma cuneifolium (Fr.: Fr.) Bon Keilblättriger Samtritterling
Dermoloma pseudocuneifolium Her. ex Bon Gefeldeter Samtritterling
Diplomitoporus lindbladii (Berk.) Gilb. & Ryv. Grauschillernder Resupinatporling
Disciotis venosa Fr. Morchelbecherling
Echinoderma asperum (Pers.: Fr.) Bon Spitzschuppiger Stachelschirmling
Entoloma asprellum (Fr.) Fayod Stahlblaustieliger Rötling
Entoloma excentricum Bres. Marmorierter Rötling
Entoloma griseoluridum (Kühn. ex Noord. Olivgrauer Rötling
Entoloma incanum (Fr.) Hes. Braungrüner Rötling
Entoloma myrmecophilum (Romag.) Mos. Dunkelhütiger Rötling
Entoloma nitidum Quél. Stahlblauer Rötling
Entoloma prunuloides (FR.) Quél. Mehl-Rötling
Entoloma rhodop. v. nidorosum (Fr.)Nordel./Kumm. Alkalischer Rötling
Entoloma rhodopolium (Fr.: Fr.) Kummer Niedergedrückter Rötling
Entoloma sericellum (Fr.: Fr.) Kumm. Mattweisser Rötling
Entoloma sinuatum (Bull.: Pers.: Fr.) Kumm. Riesen-Rötling
Entoloma turbidum (Fr.: Fr.) Quél. Geradrandiger Rötling
Fistulina hepatica Schäff. ex Fr. Leberreischling
Flammulaster carpophilus (Fr.) Earle Buchenwald-Flockenschüppling
Flammulaster limulatus (Weinm.: Fr.) Watl. Gelbblättriger Flockenschüppling
Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr. Echter Zunderschwamm
Fometopsis officinalis (Villars: Fr.) Bondarzew et Singer Lärchen-Baumschwamm
Fomitopsis pinicola (Fr.) Karst. Rotbrauner Baumschwamm
Galerina marginata (Batsch) Kühn. Gifthäubling
Ganoderma carnosum Pat. Dunkler Lackporling
Ganoderma lipsiense (Batsch: Pers.) Atkinson Flacher Lackporling
Ganoderma lucidum (Curt.: Fr.) Karst. Glänzender Lackporling
Ganoderma pfeifferi Bresadola Kupfrroter Lackporling
Geastrum fimbriatum Fries Gewimperter Erdstern
Geastrum quadrifidum Pers. ex Pers. Kleiner Neststern
Geastrum sessile (Sow.) Pouz. Gewimperter Erdstern
Geastrum sessile (Sow.) Pouz. Gewimperter Erdstern
Geastrum triplex Jungh. Halskrausen-Erdstern
Gloeophyllum abietinum Fr. ex Fr. Tannenblättling
Gloeophyllum odoratum (Wulf.: Fr.) Imyzeki Fencheltramete
Gloeoporus dichrous (Fr.: Fr.) Bresadola Zweifarbiger Gloeoporling
Gomphidius glutinosus (Schäff.: Fr.) Fr. Kuhmaul
Gomphidius roseus (Schäff.: Fr.) Karsten Rosaroter Schmierling
Gomphus clavatus (Pers.: Fr.) Gray Schweinsohr
Gymnopilus penetrans (Pers.: Fr.) Murrill Geflecktblättriger Flämmling
Gymnopus buthyracea var. asema (Fr.: Fr.) Quél. Horngrauer Butterrübling
Gymnopus confluens (Pers.: Fr.) Kumm. Knopfstieliger Rübling
Gymnopus distorta (Fr.) Quél. Drehstieliger Rübling
Gymnopus dryophylla (Bull.: Fr.) Kumm. Waldfreund-Rübling
Gymnopus hariolorum (Bull.: Fr.) Quél. Striegeliger Rübling
Gymnopus impudicus (Fr.) Antonin Halling et Noordeloos Unverschämter Blasssporrübling
Gymnopus maculata (Alb. et Schw. Fr.) Gefleckter Rübling
Gymnopus peronata (Bolt.: Fr.) Kumm. Brennender Rübling
Gyromitra parma* Breitenbach et Maas Geesteranus Schildförmige Lorchel
Gyromitra Infula (Bres.) Kreisel Bischofsmütze
Hapalopilus rutilans (Pers.: Fr.) Karst. Zimtfarbener Weichporling
Hebeloma crustuliniforme (Bull.: Fr.) Quél. Tongrauer Fälbling
Hebeloma hetierii
Hebeloma mesophaeum (Pers.: Fr.) Quélet Dunkelscheibiger Fälbling
Hebeloma radicosum (Bull.: Fr.) Rick. Wurzelnder Fälbling
Hebeloma sacchariolens Quél. Süssriechender Fälbling
Hebeloma senescens (Batsch) Berk. Bräunender Fälbling
Hebeloma sinapizans (Paul.: Fr.) Gill. Rettich-Fälbling
Hebeloma sordescens Vesterholt Schwarzknolliger Fälbling
Hebeloma stenocystis Favre ex Quadr. Schmalbewimperter Fälbling

Hebeloma truncatum (Fr.) Kumm. Kakao-Fälbling
Helvella macropus (Weber: Fr.) Fuckel Langfuss-Lorchel
Helvella crispa (Bull. ex St. Aman) Boud. Herbstlorchel
Helvella elastica Boud. Elastische Lorchel
Helvella lacunosa (Pers.) O. Kuntze Grubenlorchel
Helvella leucomelaena Schff. Schwarzweisse Becherlorchel
Hemimycena cucullata (Pers.: Fr.) Sing. Gipsweisser Scheinhelmling
Hericium coralloides (Scop.) Pers. Ästiger-Stachelbart
Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. Wurzelschwamm
Hohenbuhelia mastrucata (Fr.: Fr.) Sing. Pelz-Muscheling
Hydnellum concrescens (Pers.: Schw.) Bank. Gezonter Korkstacheling
Hydnellum peckii Banker in Peck Scharfer Korkstacheling
Hydnellum scrobiculatum (Fr.) Karst. Grubiger Korkstacheling
Hydnum repandum L.: Fr. Semmel-Stoppelpilz
Hydropus marginellus (Pers.: Fr.) Sing. Braunschneidiger Wasserfuss
Hydropus subalpinus (Höhnel) Singer Buchenwald-Wasserfuss
Hygrocybe insipida (Lange) Moser Gelbrandiger Saftling
Hygrocybe konradii Haller Breitsporiger Saftling
Hygrocybe obrussea (Fr.: Fr.) Wünsche Schnürsporiger Saftling
Hygrocybe psittacina (Schäff.: Fr.) Wünsche Papageigrüner Saftling
Hygrocybe chlorophana (Fr.) Wünsche Stumpfer Saftling
Hygrocybe coccinea (Schäff.: Fr.) Kirschroter Saftling
Hygrocybe irrigata (Pers.: Fr. Bon) Grauer Saftling
Hygrocybe pratensis (Pers.: Fr.) Murrill Orangefarbener Wiesen-Ellerling
Hygrocybe subpapillata Kühner Trockenfuss-Saftling
Hygrocybe virginea (Wulffen: Fr.) Orton et Watlin Jungfern-Ellerling
Hygrophoropsis aurantiaca (Wulff.: Fr.) Maire Falscher Pfifferling
Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr. Wohlriechender Schneckling
Hygrophorus arbustivus (Fr.) Fr. Faserhütiger Schneckling
Hygrophorus capreolarius (Kalchbr.) Sacc. Weinroter Schneckling
Hygrophorus chrysodon (Batsch.: Fr.) Fr Goldzahn-Schneckling
Hygrophorus cossus (discoxanthus) (Sow. ex Fr.) Fr. Verfärbender Schneckling
Hygrophorus discoideus (Pers.: Fr.) Fr. Braunscheibiger Schneckling
Hygrophorus eburneus (Bull:. Fr.) Fr. Elfenbein-Schneckling
Hygrophorus erubescens (Fr.: Fr.) Fr. Rasiger Purpurschneckling
Hygrophorus erubescens (Fr.: Fr.) Fr. Rasiger Purpurschneckling
Hygrophorus marzuolus (Fr.) Bres. Märzellerling
Hygrophorus mesotephrus Berk. & Br. Olivgrauer Schneckling
Hygrophorus nemoreus (Pers.: Fr.) Fr. Hain-Schneckling
Hygrophorus olivaceoalbus (Fr.: Fr.) Fr. Natterstieliger Schneckling
Hygrophorus penarius Fr. Trockener Schneckling
Hygrophorus pudorinus (Fr.) Fr. Orange-Schneckling
Hygrophorus pustulatus (Fr.) Fr. Schwarzpunktierter Schneckling
Hymenochaeta rubiginosa (Dicks.: Fr.) Lév. Rotbrauner Borstenscheibling
Hymenoscyphus albidus (Roberge) Phill. Weisses Stengelbecherchen
Hyphoderma radula (Fr.: Fr.) Donk Reibeisenpilz
Hypholoma capnoides (Fr.: Fr.) Kummer Rauchblättriger Schwefelkopf
Hypholoma fasciculare (Huds.:Fr.) Kumm. Grünblättriger Schwefelkopf
Hypholoma lateritium (Schäff.: Fr.) Kumm. Ziegelroter Schwefelkopf
Hypholoma marginatum (Pers.: Fr.) Schroet. Geselliger Schwefelkopf
Hypholoma polytrichi (Fr.: Fr.) Singer Moos-Schwefelkoopf
Hypholoma radicosum E.Lange Wurzelnder Schwefelkopf
Hypholoma sublateritium (Schäff.: Fr.) Kumm. Ziegelroter Schwefelkopf
Hypoxylon deustum Hoffmann: Fr.) Greville Brandfladen-Kohlenbeere
Hypoxylon fragiforme (Scopoli: Fr.) Kickx Rötliche Kohlenbeere
Inocybe asterospora Quélet Sternsporiger Risspilz
Inocybe corydalina var. erinaceomorpha Stangl & Veselsky Günbuckliger Risspilz var.
Inocybe lanuginosa (Bull. Fr.) Kumm. Wolliger Risspilz
Inocybe adequata (Britz.) Sacc. Weinrötlicher Risspilz
Inocybe bongardii (Weinmann) Quélet Duftender Risspilz
Inocybe cookei Bres. Knolliger Risspilz
Inocybe corydalina Quél. Grünbuckliger Risspilz
Inocybe dulcamara (Albert. et Schw.: Pers. Kumm. Bittersüsser Risspilz
Inocybe fraudans (Britz.) Sacc. Birnen-Risspilz
Inocybe fuscidula Vel. Braunstreifiger Risspilz
Inocybe geophylla (Sow.: Fr.) Kumm. Erdblättriger Risspilz
Inocybe geophylla var. lilacina (Peck.) Gill. Lilastieliger Risspilz
Inocybe haemacta (Berk. & Cke.) Sacc. Grünroter Risspilz
Inocybe lanuguinosa (Bull.: Fr.) Kummer Wolliger Risspilz
Inocybe leucoblema Kühner Silbrigbeschleierter Risspilz
Inocybe maculata Boud. Gefleckter Risspilz
Inocybe nitiduscula (Britz.) Sacc. Früher Risspilz
Inocybe queletii Maire et Konr. Weisstannen-Risspilz
Inocybe rimosa (Bull.: Fr:) Kummer Kegeliger Risspilz
Inocybe whitei (Berk .et Br.) Sacc. Weissrosa Risspilz
Inonotus nodulosus (Fr.) Karst. Buchen-Schillerporling

Ischnoderma trogii (Fr.) Donk Gestielter Tannen-Harzporling
Junghuhnia nitida (Pers.: Fr.) Ryv. Schönfarbiger Resupinatporling
Kuehneromyces lignicola (Peck) Redhead Glattstieliges Stockschwämmchen
Kuehneromyces mutabilis (Scopp.: Fr.) Sg. & Sm. Gemeines Stockschwämmchen
Laccaria amethystea (Bull.) Murill Violetter Lacktrichterling
Laccaria laccata (Scop.: Fr.) Berk. & Br. Rötlicher Lacktrichterling
Lacrymaria lacrymabunda (Bull.: Fr.) Pat. Tränender Samumpilz
Lactarius albocarneus Britzelmayr Klebriger Milchling
Lactarius acerrimus Britz. Queradriger Milchling
Lactarius acris (Bolt.: Fr.) Gray Rosaanlaufender Milchling
Lactarius albocarneus Britzelmayr Klebriger Milchlig
Lactarius aurantiacus (Pers.: Fr.) Gray Echter Orange-Milchling
Lactarius azonites (Bull.) Fr. Rauchfarbener Rosamilchling
Lactarius badiosanguineus Kühn & Rom. Braunroter Milchling
Lactarius blennius (Fr.: Fr.) Fr. Graugrüner Milchling
Lactarius camphoratus (Bull.: Fr.) Fr. Kamfermilchling
Lactarius circellatus Fr. Gebänderter Hainbuchenmilchling
Lactarius cremor Fr. Runzliger Zwergmilchling
Lactarius deliciosus (L.): Fr.) Gray Edelreizker
Lactarius deterrimus Gröger Fichtenreizker
Lactarius flavidus Boud. Hellgelber Violettmilchling
Lactarius fuliginosus (Fr.) Fr. (non ss. Bon) Russfarbener Milchling
Lactarius fulvissimus (subser.) Rom. i. Kühn. & Rom. Orangefuchsiger Milchling
Lactarius glaucescens Crossl. Grünender Pfeffermilchling
Lactarius glyciosmus (Fr.: Fr.) Fr. Blasser Duftmilchling
Lactarius helvus (Fr.: Fr.) Fr. Maggipilz
Lactarius hepaticus Plowr. in Poud. Leberbrauner Milchling
Lactarius hortensis Velen Haselmilchling
Lactarius intermedius (Krombh.) Cke. Grubiger Weisstannenmilchling
Lactarius ligniotus Fries in Lindb. Mohrenkopf
Lactarius luridus (Pers.: Fr.) Gray Gewöhnlicher Violettmilchling
Lactarius mitissimus (Fr.: Fr.) Milder Milchling
Lactarius musteus Fr. Heide-Milchling
Lactarius pallidus (Pers.: Fr.) Fr. Falber Milchling
Lactarius picinus Fr. Pechschwarzer Milchling
Lactarius piperatus (L. Fr.) Gray Pfeffermilchling
Lactarius pterosporus Romagnesi Flügelsporiger Milchling
Lactarius pubescens (Schrad.) Fries Flaumiger Milchling
Lactarius pyrogalus (Bull.: Fr.) Fr. Scharfer Hasel-Milchling
Lactarius queticolor Romagn. Ziegelroter Milchling
Lactarius quietus (Fr.) Fr. Eichenmilchling
Lactarius repraesentaneus Britz. Zottiger Violettmilchling
Lactarius romagnesii Bon Kerbrandiger Korallenmilchling
Lactarius rubrocinctus Fr. Rotgegürtelter Runzelmilchling
Lactarius rufus (Scop.: Fr.) Fr. Rotbrauner Milchling
Lactarius ruginosus Rom. Kleiner Korallenpilz
Lactarius salmonicolor Helm & Lecl. Lachsreizker
Lactarius scrobiculatus (Scop.: Fr.) Fr. Grubiger Fichtenmilchling
Lactarius semisanguifluus Helm & Lecl. Spangrün-weinroter Kiefernreizker
Lactarius subdulcis (Bull.: Fr.) Gray Süsslicher Buchenmilchling
Lactarius trivialis (Fr.: Fr.) Fr. Nordischer Milchling
Lactarius turpis (Weinm.) Fr. Olivbrauner Milchling
Lactarius vellerus (Fr.) Fr. Wolliger Milchling
Lactarius vietus (Fr.) Fr. Grünfleckender Milchling
Lactarius volemus (Fr.: Fr.) Fr. Brätling
Lactarius zonarius (Bulliard) Fr. Echter Zonenmilchling
Lactarius zonaroides Kühner et Romagn. Montaner Zonen-Milchling
Laetiporus sulfureus Murr. Schwefelporling
Laxitextum bicolor (Pers.: Fr.) Lentz Zweifarbiger Schichtpilz
Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray Espen-Rotkappe
Leccinum carpini (Schulz.) Mos. ex Reid Hainbuchen-Rauhfuss
Leccinum crocipodium (Letellier) Walting Gelbporiger Rauhfuss
Leccinum duriusculum (Schulz.) Sing. Brauner Pappel-Rauhfuss
Leccinum quercinum Pilát ex Pilát Eichen-Rotkappe
Leccinum scabrum (Bull.: Fr.) Gray Birkenpilz
Leccinum variicolor Walting Verschiedenfarbiger Rauhfuss
Leccinum versipelle (Fr.) Snell. Birken-Rotkappe
Lentinellus cochleatus (Pers.: Fr.) Karst. Äniszähling
Lentinus adhaerens (Alb. et Schw.: Fr.) Fr. Harziger Sägeblättling
Lentinus cyathiformis (Schäffer: Fr.) Bresadola Becherförmiger Sägeblättling
Lentinus tigrinus (Bull.: Fr.) Fr. Getiegerter Sägeblättling
Lentinus torulosus (Pers.: Fr. Lloyd Laubholz-Knäueling
Lenzites betulina (L. ex Fr.) Fr. Birkenblättling
Lenzites warnieri Durieu et Montagne Verkahlender Bätterporling
Lepiota castanea Quél. (inkl. L. ignipes Locq. ex Bon Kastanienbrauner Schirmling
Lepiota clypeolaria (Bull.: Fr.) Kumm. Wolliggestiefelter Schirmling

Lepiota cristata (Bolton.: Fr.) Kummer Stink-Schirmling
Lepiota felina (Pers.: Fr.) Karst. Katzen-Schirmling
Lepiota micropholis Berkeley et Broome) Saccardo Winziger Schirmling
Lepiota subincarnata Lge. Fleischfarbener Schirmling
Lepiota ventriosospora Reid Gelbwolliger Schirmling
Lepista densifolia (Favre) Sing. Dichtblättriger Rötelritterling
Lepista flaccida (Sowerby Fries) Patouillard Fuchsiger Rötelritterling
Lepista glaucocana (Bres.) Sing. Blassblauer Rötelritterling
Lepista irina (Fr.) Big. Veilchen-Rötelritterling
Lepista nuda (Bull.: Fr.) Cooke Violetter Rötelritterling
Lepista sordida (Fr.) Sing. Fleischbrauner Rötelritterling
Lepista splendens (Pers.: Fr.) Konrad Dichtblättriger Rötelritterling
Leptosphaeria acuta Zugespitzer Kugelpilz
Leucoagaricus badhamii (Berkeley et Broome) Singer Anlaufender Egerlingsschirmling
Leucoagaricus leucothites (Vitt.) Was. Rosablättriger Egerlingsschirmling
Leucocortinarius bulbiger (A. & S.: Fr.) Sing. Knolliger Schleierritterling
Lycoperdon echinatum Pers.: Pers. Igel-Stäubling
Lycoperdon lividum Pers. Grauer Stäubling
Lycoperdon mammaeforme Pers. Flocken-Stäubling
Lycoperdon perlatum Pers.: Pers. Flaschen-Stäubling
Lycoperdon pyriforme Schäff.: Pers. Birnen-Stäubling
Lycoperdon umbrinum Pers.: Pers. Brauner Stäubling
Lyophyllum connatum (Schum.: Fr.) Sing. Weisser Büschelrasling
Lyophyllum decastes (Fr.: Fr.) Singer Brauner Büschelrasling
Lyophyllum deliberatum (Britz.) Kreisel Rautensporiger Raseling
Lyophyllum fumosum (Pers.: Fr.) Ort. Hellbrauner Büschelrasling
Lyophyllum loricatum (Fr.) Kühn. Gepanzerter Rasling
Lyophyllum rancidum (Fr.: Fr.) Sing. Wurzel-Graublatt
Macrocystidia cucumis (Pers.: Fr.) Joss. Gurkenschnitzling
Macrolepiota excoriata Schäff.: Fr.) Wass. Ackerschirmling
Macrolepiota mastoidea (Fr.) Sing. Zitzenschirmling
Macrolepiota procera (Scop.: Fr. Sg. Parasol
Macrolepiota puellaris (Fr.) Moser Jungfern-Riesenschirmling
Macrolepiota rhacodes var. brunnea (Vittad.) Singer Brauner Safranschirmling
Macrolepiota rhacodes var. hortensis (Vittad.) Singer Safranschirmling, Gartenform
Marasmiellus perforans (Hofmann: Fries) Antonin er Noord. Nadel-Zwergschwindling
Marasmiellus ramealis (Bull.: Fr.) Sing. Ästchenschwindlng
Marasmius wettsteinii Sacc. & Syd. Wettsteins-Schwindling
Marasmius alliaceus (Jacq.: Fr.) Fr. Langstieliger Knoblauchschwindling
Marasmius oreades (Bolton.: Fr.) Fr. Nelkenschwindling
Marasmius rotula (Scop.: Fr.) Fr. Halsbandschwindling
Marasmius torquescens Quél. Ledergelber Schwindling
Marasmius undatus (Berk.) Fr. Rotfleckender Schwindling
Megacollybia platyphylla (Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar Gemeines Breitblatt
Melanogaster broomeianus Berk. in Tul. Schleimtrüffel
Melanoleuca excissa (Fr.: Fr.) Sing. Blassgrauer Weichritterling
Melanoleuca stridula (Fr.) Sing. ss. Kühn. Wegrand-Weichritterling
Melanoleuca subalpina (Britz.) Bresninsky & Stangl Alpen-Weichritterling
Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) Karst. Riesenporling
Merulius tremellosus Fr. Gallertfleischiger Fältling
Micromphale foetidum (Sow..: Fr.) Singer Gemeiner Stinkschwindling
Mitrophora semilibera Fr. Käppchen-Morchel
Morchella conica Pers. Ex St. Amans Spitzmorchel
Morchella esculenta (Tode ex Fr.) Fr. Speisemorchel
Mycena acicula (Schäffer: Fr.) Kummer Orangeroter Helmling
Mycena (Roridella) rorida (Scop.: Fr.) Quél. Schleimfuss-Helmling
Mycena abramsii (Murr.) Murr. Voreilender Helmling
Mycena acicula (Schäff.: Fr.) Kumm. Orangeroter Helmling
Mycena aetites (Fr.) Quélet Graublättriger Russ-Helmling
Mycena arcangeliana Bres. Olivgelber Helmling
Mycena crocata (Schrad.: Fr.) Kumm. Safranmilchender Helmling
Mycena epipterygia (Scop.: Fr.) Gray Dehnbarer Helmling
Mycena filopes (Bull.:Fr.) Kumm. Zerbrechlicher Fadenhelmling
Mycena flavescens Velen. Olivgelber Helmling
Mycena galericulata (Scop.:Fr.) Gray Rosablättriger Helmling
Mycena galopes (Peck: Fr.) Kumm. Weissmilchender Helmling
Mycena haematopus (Pers.: Fr.) Kumm. Bluthelmling
Mycena inclinata (Fr.) Quél. Buntstieliger Helmling
Mycena maculata Karst. Gefleckter Helmling
Mycena pelianthina (Fr.: Fr.) Quél. Schwarzgezähnelter Helmling
Mycena polygramma (Bull.: Fr.) Gray Rillstieliger Helmling
Mycena pura (Pers.: Fr) Kumm. Rettich-Helmling
Mycena renati Quélet Gelbstieliger Nitrat-Helmling
Mycena rosea (Bull.) Gramberg Rosa-Rettichhelmling
Mycena rosella (Fr.: Fr.) Kumm. Rosa-Helmling
Mycena stipata Maas Geester.& Schw. Büscheliger Nitrat-Helmling

Mycena stipata Maas Geester.& Schw. Büscheliger Nitrat-Helmling
Mycena zephirus (Fr.: Fr.) Kumm. Rostfleckiger Helmling
Naucoria melinoides (Bull.: Fr.) Kühn. Honiggelber Sumpfschnitzling
Nectria cinnabarina (Tode ex Fr.) Fr. Zinnoberroter Pustelpilz
Nidularia deformis (Willdenow: Pers.) Fr. Vollgestopfter Nestling
Oligoporus (Ptychogaster) ptychogaster (Ludwig) Falck Bauchpilz-Mehlstaubporling
Oligoporus caesius (Schrad.: Fr.) Gilb. & Ryv. Blauer Saftporling
Oligoporus stipticus (Pers.: Fr.) Gilb. & Ryv. Bitterer Saftporling
Omphalina acerosa (Fr.) Lange Muschelnabeling
Omphalina discorosea (Pil.) Her. & Kotl. Rosablättriger Holznabeling
Omphalina pyxidata (Bull.: Pers.) Quél. Starkgeriefter Nabeling
Omphalina rickenii Sing. ex Hora Mauer-Nabeling
Omphalotus illudens (Schw.) Sacc. Leuchtender Ölbaumpilz
Onnia triquetra (Fr.) Imazeki Kiefern-Filzporling
Otidea onotica (Pers.) Fuck. Eselsohr
Oudemansiella mucida (Schrad. ex Fr.) v.H. Beringter Schleimrübling
Panaeolus fimicola (Fr.) Gill. Mist-Düngerling
Panaeolus foeniseccii (Per.: Fr.) Schr. Heudüngerling
Panaeolus papilionaceus (Bull.: Fr.) Quél. Behangener Düngerling
Panellus stipticus (Bulliard: Fr.) Karsten Bitterscharfer Zwergknäueling
Paxillus atrotomentosus (Batsch.: Fr.) Fr. Samtfuss-Krempling
Paxillus filamentosus Fr. Erlen-Krempling
Paxillus involutus (Batsch: Fr.) Fr. Kahler Krempling
Perenniporia medulla-panis (Jacq.: Fr.) Donk Ockerbrauner Dauerporling
Peziza arvernensis Pers. Ex Mérat Buchenwaldbecherling
Peziza succuosa (Hedw.) Fr. Gelbmilchender Becherling
Phaeocollybia jennyae (Fr.) Heim Feuerroter Wurzelschnitzling
Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. Kiefernbraunporling
Phallus impudicus L. ex Pers. Stinkmorchel
Phellinus conchatus (Pers.: Fr.) Quél. Muschelförmiger Feuerschwamm
Phellinus ferruginosus (Schrad.: Fr.) Pat. Rostbrauner Feuerschwamm
Phellinus hartigii (All. & Schn.) Bond. Tannen-Feuerschwamm
Phellinus nigricans (Fr.) Karst. Schwarzer Birkenfeuerschwamm
Phellinus robustus (Karst.) Bourd. & Galz. Eichen-Feuerschwamm
Phellinus trivialis (Bres.) Kreisel Weiden-Feuerschwamm
Phellinus tuberculosus (Baumg.) Niem. Pflaumen-Feuerschwamm
Phellodon melaleucus (Sw. apud Fr.: Fr.) Karst. Schwarzweisser Korkstacheling
Phlebia radiata Fr. Orangefarbener Kammpilz
Phlebia rufa (Fr.) Christ. Rötlicher Kammpilz
Pholiota scamba (Fr.: Fr.) Moser Seidiger Schüppling
Pholiota adiposa (Fr.) Kumm. Schleimiger Schüppling
Pholiota astragalina (Fr.) Singer Safranroter Schüppling
Pholiota cerifera (Karst.) Karst. Goldfell-Schüppling
Pholiota flammans (Fr.:) Kummer Feuerschüppling
Pholiota gummosa (Lasch.: Fr.) Sing. Strohblasser Schüppling
Pholiota jahnii Tjallingii-Beukers et Bas Pinselschüppling
Pholiota populnea (Pers.: Fr.) Kuyp. & Tjall. Pappel-Schüppling
Pholiota squarrosa (Pers.: Fr.) Kumm. Sparriger Schüppling
Phylloporia ribis (Schumacher Fr.) Ryvarden Beeren Strauchporling
Phylloporus pelletieri (Lév.) Quél. Goldblatt
Physisporinus sanguinolentus (Alb. & Schw.: Fr.) Pilát Blutender Eisporling
Phytoconis (Gerronema) ericetorum (Pers.: Fr.) Red-
head et Kuyper Gefalteter Flechtennabeling
Piptoporus betulinus (Bulliard) Karsten Birken-Hautporling
Pleurotus cornucopiae (Paul. ex Pers.) Roll. Rillstieliger Seitling
Pluteus atromarginatus (Sing.) Kühn. Schwarzschneidiger Dachpilz
Pluteus aurantiorugosus (Trog.) Saccardo Orangeroter Dachpilz
Pluteus cervinus (Schäff.) P. Kumm. Rehbrauner Dachpilz
Pluteus chrysophaeus (Schäff.: Fr.) Quél. Gelbbrauner Dachpilz
Pluteus cinereofuscus Lge. Graubrauner Dachpilz
Pluteus depauperatus Romag. Geriefter Dachpilz
Pluteus diettrichii Bresadola Rissiger Dachpilz
Pluteus exiguus (Pat.) Sacc. Kleinster Dachpilz
Pluteus leonius (Schäff.: Fr.) Kumm. Löwengelber Dachpilz
Pluteus petasatus (Fr.) Gill Seidiger Dachpilz
Pluteus plautus (Weinmann) Schillet Verschiedenfarbiger Dachpilz
Pluteus pouzarianus Sing. Schnallen-Dachpilz
Pluteus salicinus (Pers.: Fr.) Kumm. Grauer Dachpilz
Pluteus umbrosus (Pers.: Fr.) Kumm. Schwarzflockiger Dachpilz
Polyporus badius (Pers.: Gray) v. Schw. Kastanienbrauern Porling
Polyporus brumalis Pers.: Fr. Winterporling
Polyporus ciliatus Fr. Bewimperter Porling
Polyporus mori Pollini: Fr. Wabenporling
Polyporus squamosus Fr. Schuppiger Porling
Polyporus tuberaster (Jacq.: Pers.) Fr. Sklerotien-Porling
Polyporus varius Pers.: Fr. Löwengelber Schwarzfussporling

Porboloma spinulosum (Kühner et Romagnesi) Singer Borstiger Wiesenritterling
Porphyrellus porphyrosporus Fr.) Gilbert Düsterer Röhrling
Psathyrella candolleana (Fr.: Fr.) Maire Behangener Faserling
Psathyrella conopilus (Fr.: Fr.) Pears. & Dennis Huthaarfaserling
Psathyrella cotonea (Quél.) Kon. & Maub. Schwefelfüssiger Faserling
Psathyrella leucotephra (Berkeley et Broome) Orton Beringter Mürbling
Psathyrella leucotephra (Berkeley et Broome) Orton Beringter Mürbling
Psathyrella marcescibilis (Britz.) Sg. Grauweisser Faserling
Psathyrella melanthina (Fr.) K.v.Wav. Rosagrauer Faserling
Psathyrella multipedata (Peck) Sm. Büscheliger Faserling
Psathyrella sacchariolens Enderle Süssriechender Faserling
Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull.) Sing. Kaffebrauner Gabeltrichterling
Pseudohydnum gelatinosum (Scop.: Fr.) Karst. Zitterzahn
Pulveroboletus gentilis (Quél.) Pouzar Goldporiger Röhrling
Pulveropoletus lignicola (Kall.) Pilát Nadelholz-Röhrling
Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk Leuchtender Weichporling
Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.: Fr.) Karst. Zinnoberrote Tramete
Ramaria myceliosa (Peck) Corner Mycel-Koralle
Ramaria pallida (Schäff. em. Bres.) Ricken Bauchwehkoralle
Ramaria rubella (Schäff.: Krombh.) Peter. Rotbraune Koralle
Ramaria stricta (Pers.: Fr.) Quél. s. str. Steife Koralle
Ramaria testaceoflava (Bresadola) Corner Ziegelgelbe Koralle
Resinicium bicolor (Alb. & v. Schw.: Fr.) Parm. Zweifarbiger Harzrindenpilz
Rhodocybe gemina (Fr.). Kuyp. & Noord. Würziger Tellerling
Rickenella fibula (Bull.: Fr.) Raith. Orangegelber Heftelnabeling
Ripartites tricholoma (Alb. & v. Schw.) Bewimperter Filzkrempling
Rozites caperatus (Pers.: Fr.) P. Karst. Zigeunerpilz
Russula cyanoxantha (Schäff.) Fr. Frauentäubling
Russula livescens (insignis Qu.) (Batsch) Quél. ss. Bres. Milder Kamm-Tääubling
Russula roseipes Bresadola Rosastieliger Täubling
Russula spagnophila Kauffmann (ss. Bon) Milder Tormoos-Täubling
Russula vinosa Lindblad Weinroter Graustieltäubling
Russula zonatula Ebbesen et J. Schäffer Stachelbeerroter Täubling
Russula adusta (Pers.: Fr.) Rauchbrauner Schwärztäubling
Russula aeruginea Lindblad in Fr. Grasgrüner Birkentäubling
Russula albonigra (Krombh.) Fr. Mentoltäubling
Russula amarissima Rom. & Gilb. Bitterster Täubling
Russula amethystina Quélet Amethysttäubling
Russula anthracina Romagn. Lachsblättriger Schwärztäubling
Russula atropurpurea (Krombh.) Britz. Pupurschwarzer Täubling
Russula aurea Pers. Goldtäubling
Russula badia Quél. Zedernholztäublig
Russula carpini Gir. & Hein. Hainbuchentäubling
Russula cavipes Britz. Weisstannentäubling
Russula chloroides (Krombh.) Bres. Schmalblättriger Weisstäubling
Russula cyanoxantha (Schäff.) Fr. Frauentäubling
Russula cyanoxantha fo. pelt. R. Maire.: Singer Grüner Frauentäubling
Russula cyanoxantha fo. pelter. R. Maire.: Singer Grüner Frauentäubling
Russula decolorans (Fr.) Fr. Orangeroter Graustieltäubling
Russula delica Fr. Gemeinder Weisstäubling
Russula densifolia Gill. Dichtblättriger Schwärztäubling
Russula emetica (Schäff.: Fr.) Gray Kirschroter Speitäubling
Russula exalbicans (Pers.) Melz. & Zvara Verblassender Täubling
Russula faginea Romagn. Buchen-Heringstäubling
Russula farinipes Romell in Britz. Mehlstieltäubling
Russula fellea (Fr.: Fr.) Fr. Gallentäubling
Russula foetens (Pers.: Fr.) Fr. Stinktäubling
Russula fragrantissima Rom. Starkduftender Stinktäubling
Russula galochroa (Fr.) Fr. Elfenbeintäubling
Russula grata (laurocerasi) Melzer Mandeltäubling
Russula grisea Fr. Grauvioletter Reiftäubling
Russula heterophylla (Fr.) Fr. Grüner Speisetäubling
Russula illota Romagn. Morsetäubling
Russula insignis Quél. Milder Kammtäubling
Russula integra (L.:) Fr. ss. Mre. Braunroter Ledertäubling
Russula ionochlora Romagn. Cremeblättriger Bunttäubling
Russula lepida Fr. Harter Zinnobertäubling
Russula lilacea Quél. Rotstieliger Reiftäubling
Russula luteotacta Rea Gelbfleckender Täubling
Russula maculata Quél. in Quél. & Roze Gefleckter Täubling
Russula mairei Singer Buchen-Speitäubling
Russula melliolens Quél. Honigtäubling
Russula nauseosa (Pers.) Fr.. Geriefter Weichtäubling
Russula nigricans (Bull.) Fr. Dickblättriger Schwärztäubling
Russula ochroleuca (Pers.: Fr.) Ockertäubling
Russula olivacea (Schäf.) Fr. Rotstieliger Ledertäubling

Russula paludosa Britz. Apfeltäubling
Russula pectinata (Bull.: St. Am.) Fr. Stinkender Kammtäubling
Russula pseudointegra Arn. & Gor. Ockerblättriger Zinnobertäubling
Russula puellaris Fr. Milder Wachstäubling
Russula queletii Fr. in Quél. Stachelbeertäubling
Russula raoultii Quél. Blassgeber Täubling
Russula rhodopus Zvára Flammenstieltäubling
Russula risigallina (Batsch) Kuyp. & v. Vuu. Wechselfarbiger Dottertäubling
Russula romellii Maire Weissstieliger Ledertäubling
Russula rubra (Lmck. Fr.) Fr. Scharfer Zinnobertäubling
Russula rubroalba (Sing.) Romagn. Rotweisser Täubling
Russula sanguinea (Bull. ex St. Am.) Fr. Blutroter Täubling
Russula sardonia Fr. Zitronenblättriger Täubling
Russula solaris Ferd. et Winge Sonnentäubling
Russula torulosa Bres. Gedrungener Täubling
Russula turci Bres. Jodoformtäubling
Russula velutipes Velenovsky Rosa-Täubling
Russula vesca Fr. Fleischroter Speisetäubling
Russula vinosobrunnea (Bres.) Rom. Weinbrauner Täubling
Russula violeipes Quélet Violettstieliger Brätlingstäubling
Russula virescens (Schäff.: Pers.:) Fr. Gefeldeter Grüntäubling
Russula viscida Kudrna Lederstieltäubling
Russula xerampelina Schäff.: Fr. Roter Heringstäubling
Sarcodon imbricatus (L. ex Fr.) Karst. Habichtspilz
Sarcoscypha coccinea (Beck ex Saccardo) Boudier Zinnoberroter Prachtsbecherling
Sarcospaera crassa (Santi ex Steudel.) Pouz. Kronenbecherling
Schizophyllum commune Fr.: Fr. Gemeiner Spaltblättling
Schizopora flavipora (Cke) Ryv. Gelblichporiger Spaltporling
Schizopora paradoxa (Schrad.: Fr.) Donk Veränderlicher Spaltporling
Scleroderma areolatum Ehrenb. Gefelderter Kartoffelbovist
Scleroderma bovista Fr. Rotbräunlicher Kartoffelbovist
Scleroderma citrinum Pers. Dickschaliger Kartoffelbovist
Sebacina inkrustans (Pers.:Ffr.) Tul. Erd-Wachskruste
Serpula himatoides (Fr.) Karst. Wilder Hausschwamm
Sistotrema confluens Fr. Gestielter Zahnling
Sparassis crispa (Wulf. in Jacq.) Fr. Krause Glucke
Steccherinum bourdotii Saliba & David Rundsporiger Resupinatstacheling
Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) S.F. Gray Zottiger Schichtpilz
Stereum subtomentosum Pouzar Samtiger Schichtpilz
Strobilomyces strobilaceus (Scop.: Fr.) Berk. Strubelkopfröhrling
Strobilurus esculentus (Wulf.: Fr) Sg. Fichtenzapfenrübling
Strobilurus tenacellus (Pers.:Fr.) Sing. Bitterer Nagelschwamm
Stropharia aeruginosa (Curtis:) Fr./Quél. Grünspansträuschling
Stropharia caerulea Kreisel Blauer Träuschling
Stropharia coronilla (Bull.: Fr.) Quél. Krönchenträuschling
Stropharia semiglobata (Batsch.: Fr.) Quél. Halbkugeliger Träuschling
Suillus bovinus (L.: Fr.) Rouss. Kuhröhrling
Suillus collinitus Fr. ss. Flury, Mos. Ringloser Butterröhrling
Suillus granulatus (L.: Fr.) Rouss. Körnchenröhrling
Suillus grevillei (Klotzsch: Fr.) Sing. Goldröhrling
Suillus luteus (L.: Fr.) Rouss. Butterpilz
Suillus placidus (Bonord.) Singer Elfenbein-Röhrling
Suillus tridentinus (Bresad.) Singer Rostroter Lärchenröhrling
Suillus variegatus Sw.: Fr. Kuntze Sandröhrling
Suillus viscidus (L.) Rouss. Grauer Lärchenröhrling
Telephora penicillata Pers.: Fr. Pinsel-Warzenpilz
Telephora terrestris Fr. Fächerförmiger Erdwarzenpilz
Thelephora palmata Scop.: Fr. Stinkender Warzenpilz
Trametes gibbosa (Pers.: Fr.) Fr. Buckel-Tramete
Trametes hirsuta (Wulf.: Fr.) Pilát Striegelige Tramete
Trametes hirsuta (Wulf.: Fr.) Pilát Striegelige Tramete
Trametes multicolor (Schäff.) Jül. Zonen-Tramete
Trametes versicolor (L.: Fr.) Pilat Schmetterlings-Tramete
Trichaptum abietinum (Fr.) Ryv. Tannentramete
Tricholoma acerbum (Bull.: Fr.) Quél. Gerippter Ritterling
Tricholoma atrosquamosum (Chev.) Sacc. Schwarzschuppiger Ritterling
Tricholoma aurantium (Schäff.: Fr.) Rick. Orangeroter Ritterling
Tricholoma basirubens Bon Rosafüssiger Ritterling
Tricholoma batschii Gulden ex Christ. et Noordeloons Fastberingter Ritterling
Tricholoma bufonium (Pers.: Fr.) Kumm. Purpurbrauner Schwefel-Ritterling
Tricholoma columbetta (Fr.) Kumm. Seidiger Ritterling
Tricholoma equestre (L.: Fr.) Kumm. Grünling
Tricholoma fulvum (DC.: Fr.) Sacc. Gelbblättriger Ritterling
Tricholoma imbricatum (Fr.: Fr.) Kumm. Feinschuppiger Ritterling
Tricholoma inamoenum (Fr.) Quél. Lästiger Ritterling
Tricholoma lascivum (Fr.) Gill. ss. Lge. Unverschämter Ritterling

Tricholoma orirubens Quél. Rötender Ritterling
Tricholoma portensosum (Fr.) Quél. Schwarzfaseriger Ritterling
Tricholoma pseudonicticans Bon Blassfleischiger Fichtenritterling
Tricholoma saponaceum (Fr.) Kumm. Seifen-Ritterling
Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quél. Gilbender Erd-Ritterlig
Tricholoma sciodes (Secr.) Martin Schärflicher Ritterling
Tricholoma sejunctum (Sow.: Fr.) Quél. Grüngelber Ritterling
Tricholoma sulphureum (Bull.: Fr.) Kumm. Schwefel-Ritterling
Tricholoma terreum (Schäff.: Fr.) Kumm. Erd-Ritterling
Tricholoma tigrinum Kumm. Tiger-Ritterling
Tricholoma ustale (Fr.: Fr.) Kumm. Brandiger Ritterling
Tricholoma ustaloides Romagn. Fastberingter Ritterling
Tricholoma vaccinum (Pers.: Fr.) Kumm. Zottiger Ritterling
Tricholomopsis decora (Fr.) Sing. Olivgelber Holzritterling
Tricholomopsis rutilans (Schaeff.: Fr.) Singer Purpurfilziger Holzritterling
Tylopilus felleus (Bull.: Fr.) Karst. Gallenröhrling
Ustulina deusta Swartz ex Pers. Brandiger Krustenpilz
Vascellum pratense Pers.: Pers.) Kreisel Wiesen-Stäubling
Xerocomus badius (Fr.) Kühn. ex Gilb. Maronenröhrling
Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quel. Rotfuss-Röhrling
Xerocomus communis (Bulliard) Bon Eichen-Filzröhrling
Xerocomus dryophylus (Thiers) Singer Dunkelroter Filz-Röhrling
Xerocomus porosporus (Imler ex Romero et Bon) Contu Düsterer Rotfuss-Filzröhrling
Xerocomus rubellus Krombholz) Quélet Blutroter Filzröhrling
Xerocomus subtomentosus (L.: Fr.) Quél. Ziegenlippe
Xerula radicata (Relhan.: Fr.) Dörfelt Wurzel-Schleimrübling
Xylaria carpophila (Pers.) Fr. Buchenfruchtschalen-Holzkeule
Xylaria longipes (Pers. ex Mér.) Grev. Langstielige Ahorn-Holzkeule
Xylaria polymorpha (Pers.: Fr.) Greville Vielgestaltige Holzkeule



VEREIN FÜR PILZKUNDE BASEL

PILZE DER JAHRE 2006/2007/2010/2011/2012

Das nachfolgende Dokument beinhaltet die Jahresarbeit des Vereins für Pilzkunde Basel der Jahre 2006, 2007, 2010, 2011und 2012.
Die gefundenen Pilze wurden jede Woche bestimmt, einige illustriert, dokumentiert und im Internet hochgeladen. Der Text auf der ersten, linken Seite wiederholt sich deswegen wöchentlich.

PILZE 2012

Idee und Realisation: Kurt Minder

Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

.

PILZE DER WOCHE 16

Clitocybe fragrans *Langstieliger Dufttrichterling*

Sektion:	Hygrophane Arten mit Anis- oder Cumarin-Geruch.
Formenkreis:	Geruch nach Anis.
Art:	Hut 20 - 40 mm, beige bis ockerbräunlich, Lamellen weisslich, Stiel gleichfarbig wie Hut, bis 75 mm lang und 3-6 mm dick. Sporen 7-9x4-5 µm, elliptisch.
Ökologie:	Feuchte Standorte Grasland, Nadelstreu.
Bemerkungen:	C. suaveolens hat etwas kleinere, ovale Sporen, wir jedoch von div. Autoren mit Cl fragrans gleichgestellt..

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 16

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Calocybe	gambosa	(Fr.) Donk	Mairitterling
2	Clitocybe	fragrans	(With.) Kumm.	Dufttrichterling
2	Coprinus	cinereus	(Schäff. Fr.) Gray	Wollstieliger Misttintling
2	Coprinus	disseminatus	(Pers.: Fr.) S.F.Gray	Gesäter Tintling
2	Coprinus	kuehneri	Uljé & Bas.	Kleinsporiger Scheibchentintling
2	Crepidotus	mollis	(Schäff.L Fr.) Staude	Gallertfleischiges Stummelfüsschen
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Lentinus	adhaerens	(Alb. et Schw.: Fr.) Fr.	Harziger Sägeblättling
2	Panellus	stypticus	(Bull.: Fr.) P.Karst.	Bitterer Muschelseitling
2	Strobilurus	esculentus	(Wulf.: Fr) Sg.	Fichtenzapfenrübling
2	Tubaria	hiemalis	Romagn. ex Bon	Winter-Trompetenschnitzling
2	Xeromphalina	fellea	Mre. & Mal.	Bitterer Glöckchennabeling
4	Cerocorticum	confluens	(Fr.): Fr.) Jül & Stalp.	Zusammenfliesender Reibeisenpilz
4	Coriolopsis	gallica	(Fr.) Ryv.	Braune Borstentramete
4	Cylindrobasidium	evolvens	(Fr.: Fr.) Jül.	Ablösender Rindenpilz
4	Daedalea	quercina	(L. ex Fr.)	Eichenwirrling
4	Daedaleopsis	confragosa	(Bolton: Fr.) Schröter	Rötender Blätterwirrling
4	Fomes	fomentarius	(L.: Fr.) Fr.	Echter Zunderschwamm
4	Fomitopsis	pinicola	(Fr.) Karst.	Rotbrauner Baumschwamm
4	Ganoderma	lipsiense	(Batsch.: Pers.) Atkinson	Flacher Lackporling
4	Gleozystidiellum	porosum	(Bk. & Ct.) Donk	Strohfarbener Saftzystidling
4	Heterobasidion	annosum	(Fr.) Bref.	Wurzelschwamm
4	Hymenochaeta	rubiginosa	(Dicks.: Fr.) Lév.	Rotbrauner Borstenscheibling
4	Hyphodontia	sambuci	(Pers.) Eriks.	Holunder-Rindenpilz
4	Lenzites	betulina	(L. ex Fr.) Fr.	Birkenblättling
4	Phellinus	hartigii	(All. & Schn.) Bond.	Tannen-Feuerschwamm
4	Phellinus	ferruginosus	(Schrad.: Fr.) Pat.	Rostbrauner Feuerschwamm
4	Phyllotopsis	nidulans	(Pers.: Fr.) Singer	Gemeinder Orangeseitling
4	Polyporus	brumalis	Pers.: Fr.	Winterporling
4	Polyporus	ciliatus	Fr.	Bewimperter Porling
4	Polyporus	mori	Pollini: Fr.	Wabenporling
4	Pulcherricium (Tevana)	caeruleum	(Fr.) Parm.	Blauer Rindenpilz
4	Pycnoporellus	fulgens	(Fr.) Donk	Leuchtender Weichporenschwamm

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 16

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
4	Schizophyllum	commune	Fr. ex Fr.	Spaltblättling
4	Schizopora	paradoxa	(Schrad.: Fr.) Donk	Veränderlicher Spaltporling
4	Skeletocutis	nivea	(Jungh.) Keller	Schneeweisser Feinporling
4	Stereum	hirsutum	(Willd.: Fr.) S.F. Gray	Zottiger Schichtpilz
4	Stereum	subtomentosum	Pouzar	Samtiger Schichtpilz
4	Trametes	gibbosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Buckel-Tramete
4	Trametes	hirsuta	(Wulf.: Fr.) Pilát	Striegelige Tramete
4	Trametes	multicolor	(Schäff.) Jül.	Zonen-Tramete
4	Trametes	versicolor	(L.: Fr.) Pilát	Schmetterlings-Tramete
4	Trichaptum	abietinum	(Fr.) Ryv.	Tannentramete
4	Vuilleminia	comedens	(Nees: Fr.) Maire	Rindensprenger
6	Auricularia	mesenterica	Dicks.: Fr.	Gezonter Ohrlappenpilz
6	Exidia	truncata	Fr.: Fr.	Becherförmiger Drüsling
7	Chlorosplenium	aeruginascens	(Nyl.) Karst.	Grünspanbecherling
7	Daldinia	concentrica	(Bolt. ex Fr.) Ces. & de Not.	Kohliger Kugelpilz
7	Diatrypella	favacea	(Fr. : Fr.) Ces. & De Not.	
7	Hypoxylon	fuscum	(Pers. ex Fr.) Kickx	Rotbraune Kohlenbeere
7	Hypoxylon	serpens	(Pers.ex Fries) Fr.	Gewundene Kohlenbeere
7	Hypoxylon	multiforme	(Willd. Ex Fr.) Dharne	Vielgestaltige Kohlenbeere
7	Hypoxylon	fragiforme	(Fr.) Fr.	Rötliche Kohlenbeere
7	Morchella	esculenta	(Tode ex Fr.) Fr.	Speisemorchel
7	Ustulina	deusta	Swartz ex Pers.	Brandiger Krustenpilz

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

PILZE DER WOCHE 17

Peziza vesiculosa *Blasenförmiger Becherling*

Discomycetes:	Zu ihnen gehören Schlauchpilze mit einem z.T. ausgeprägten Kopf- und Stielteil, aber auch viele gestielte und ungestiele Becherlinge. Die Asci öffnen sich mit einem Deckel.
Pezizales:	Fruchtkörper gestielt oder ungestielt, becherförmig. Sporen glatt oder mit Höckern.
Pezizazeae:	Asci an der Spitze mit Jod blau oder nicht blau oberirdisch auf Erde oder Pflanzenresten.
Peziza:	Asci an der Spitze blau.
Art:	Fruchtkörper bis 100 mm gross. Fruchtschicht und Aussenseite glatt. Ohne Saftausscheidung. Sporen hyalin, elliptisch, glatt. 18-23x10-13 µm. Paraphysen septiert, etwas kopfig.
Ökologie:	Auf Misthaufen, mistähnlichem Substrat.

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 17

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Agaricus	aestivalis var. veneris	(Heim & Beck) Wass.	Frühlingschampignon
2	Agrocybe	praecox	(Pers: Fr.) Fayod.	Voreilender Ackerling
2	Calocybe	gambosa	(Fr.) Donk	Mairitterling
2	Crepidotus	cesatii	(Rabenh.) Sacc.	Entfernblättriges Stummelfüsschen
2	Crepidotus	mollis	(Schäff.L Fr.) Staude	Gallertfleischiges Stummelfüsschen
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Mycena	renati	Quélet	Gelbstieliger Nitrat-Helmling
2	Psathyrella	spadiceogrisea	(Schäff.) Fr. Maire	Dungbewohnender Faserling
2	Strobilurus	esculentus	(Wulf.: Fr) Sg.	Fichtenzapfenrübling
2	Tubaria	hiemalis	Romagn. ex Bon	Winter-Trompetenschnitzling
4	Stereum	subtomentosum	Pouzar	Samtiger Schichtpilz
4	Trametes	gibbosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Buckel-Tramete
6	Auricularia	auricula-judae	(Bull. ex St. Am.) Wettst.	Judasohr
7	Morchella	esculenta	(Tode ex Fr.) Fr.	Speisemorchel
7	Peziza	vesiculosa	Pers.	Blasiger Becherling
7	Xylaria	polymorpha	(Pers.: Fr.) Greville	Vielgestaltige Holzkeule

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

PILZE DER WOCHE 18

Coprinus cinereus *Wollstieliger Misttintling*

Sektion Lanatuli: Velumresten aus kettenähnlichen, elliptischen bis rundlichen Zellen.

Art: Velumresten weiss, Basidien 4-sporig, Sporen 9,5-11x5x6,5 µm, Keimporus zentral.

Ökologie: Auf Misthaufen, mistähnlichem Substrat.

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 18

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Leccinum	scabrum	(Bull.: Fr.) Gray	Birkenpilz
2	Agrocybe	praecox	(Pers: Fr.) Fayod.	Voreilender Ackerling
2	Calocybe	gambosa	(Fr.) Donk	Mairitterling
2	Coprinus	cinereus	(Schäff. Fr.) Gray	Wollstieliger Misttintling
2	Entoloma	clypeatum	(L.: Fr.) Kumm.	Schild-Rötling
2	Entoloma	sericeoides	(Lange) Noordeloos	Trichterlings-Rötling
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Inocybe	cervicolor	(Pers.) Quél.	Hirschbrauner Risspilz
2	Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2	Lacrymaria	lacrymabunda	(Bull.: Fr.) Pat.	Tränender Samumpilz
2	Lyophyllum	decastes	(Fr.: Fr.) Singer	Brauner Büschelrasling
2	Mycena	galericulata	(Scop.:Fr.) Gray	Rosablättriger Helmling
2	Mycena	renati	Quélet	Gelbstieliger Nitrat-Helmling
4	Polyporus	badius	(Pers.: Gray) v. Schw.	Kastanienbrauern Porling
4	Polyporus	brumalis	Pers.: Fr.	Winterporling
4	Polyporus	ciliatus	Fr.	Bewimperter Porling
4	Polyporus	squamosus	Fr.	Schuppiger Porling
4	Trametes	multicolor	(Schäff.) Jül.	Zonen-Tramete
5	Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
7	Disciotis	venosa	Fr.	Morchelbecherling
7	Morchella	esculenta	(Tode ex Fr.) Fr.	Speisemorchel

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

PILZE DER WOCHE 19

Coprinus hemerobius *Vergänglicher Scheibentintling*

Sekt. hemerobii:	Stiel und Hut glatt, Sporen mit excentrischem KP, Ausnahme C. hemerobius.
Art:	Sporen 8,8-13x5,8-7,4 µm, Keimporus zentral, Q-Wert unterschiedlich. Hut bis 20 mm, ohne Velum. Jung ei- bis walzenförmig. Stiel -50xbis2 mm. HDS mit rundlichen Zellen, ohne Pileozystiden.
Ökologie:	Grasige Stellen, inner- und ausserhalb von Wäldern.
Bemerkung:	Die Bestimmung stützt sich nach der Auffassung von Horak und Breitenbach.

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 19

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Agaricus	bitorquis	(Quélet) Sacc.	Trottoir-Champignon
2	Agrocybe	praecox	(Pers: Fr.) Fayod.	Voreilender Ackerling
2	Bolbitius	titubans	(Bull.) Fr.	Gold-Mistpilz
2	Calocybe	gambosa	(Fr.) Donk	Mairitterling
2	Coprinus	hemerobius	Fr.	Vergänglichere Scheibentintling
2	Entoloma	clypeatum	(L.: Fr.) Kumm.	Schild-Rötling
2	Gymnopus	dryophilus	(Bulliard: Fr.) Murrill	Waldfreund-Rübling
2	Hydropus	subalpinus	(Höhnel) Singer	Buchenwald-Wasserfuss
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Hypholoma	capnoides	(Fr.: Fr.) Kummer	Rauchblättriger Schwefelkopf
2	Inocybe	nitiduscula	(Britz.) Sacc.	Früher Risspilz
2	Lentinus	adhaerens	(Alb. et Schw.: Fr.) Fr.	Harziger Sägeblättling
2	Lepista	nuda	(Bull.: Fr.) Cooke	Violetter Rötelritterling
2	Marasmius	oreades	(Bolton.: Fr.) Fr.	Nelkenschwindling
2	Mycena	galericulata	(Scop.:Fr.) Gray	Rosablättriger Helmling
2	Mycena	renati	Quélet	Gelbstieliger Nitrat-Helmling
2	Psathyrella	spadiceogrisea	(Schäff.) Fr. Maire	Dungbewohnender Faserling
2	Stropharia	rugosoannulata	Farl. ex Murr.	Rotbrauner Riesenträuschling
2	Tubaria	dispersa	(Pers.) Sing.	Gelbblättriger Trompetenschnitzling
3	Russula	exalbicans	(Pers.) Melz. & Zvara	Verblassender Täubling
4	Daedaleopsis	confragosa	(Bolt.: Fr.) Schröt. s. str.	Rötende Tramete
4	Polyporus	ciliatus	Fr.	Bewimperter Porling
4	Polyporus	mori	Pollini: Fr.	Wabenporling
4	Polyporus	squamosus	Fr.	Schuppiger Porling
4	Polyporus	tuberaster	(Jacq.: Pers.) Fr.	Sklerotien-Porling
4	Trametes	hirsuta	(Wulf.: Fr.) Pilát	Striegelige Tramete
6	Exidia	plana / glandulosa	Fr.	Hexenbutter
6	Tremella	mesenterica	(Tretzius ex Hooker) Fr.	Goldgelber Zitterling
7	Daldinia	concentrica	(Bolt. ex Fr.) Ces. & de Not.	Kohliger Kugelpilz
7	Disciotis	venosa	Fr.	Morchelbecherling
7	Peziza	arvernensis	Pers. Ex Mérat	Buchenwaldbecherling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

PILZE DER WOCHE 20

Peziza badia *Kastanienbrauner Becherling*

Fam. Pezizaceae:	Asci operculat, an der Spitze mit Jod blau. Sporen elliptisch. Fruchtkörper oberirdisch wachsend.
Art:	Fruchtkörper bis 70 mm, schüsselförmig. Sporen 17-18x10-11 µm mit zwei Tropfen, netzig ornamentiert. Paraphysen zylindrisch.
Ökologie:	Auf nackter Erde in Wäldern.
Bemerkung:	Die Art sitzt stiellos auf der Erde. Sie unterscheidet sich von anderen Peziza-Arten durch die dunkelbraune Farbe mit Olivtönen, besonders auf der Unterseite und den fein netzigen Sporen.



Pilz-Fundliste der Woche 20

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1	Boletus	satanas	Lenz	Satansröhrling
2	Agrocybe	praecox	(Pers: Fr.) Fayod.	Voreilender Ackerling
2	Bolbitius	vitellinus	(Pers.: Fr.) Fr.	Gold-Mistpilz
2	Calocybe	gambosa	(Fr.) Donk	Mairitterling
2	Gymnopus	dryophilus	(Bulliard: Fr.) Murrill	Waldfreund-Rübling
2	Hydropus	subalpinus	(Höhnel) Singer	Buchenwald-Wasserfuss
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Inocybe	queletii	Maire et Konr.	Weisstannen-Risspilz
2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2	Mycena	galericulata	(Scop.:Fr.) Gray	Rosablättriger Helmling
2	Mycena	renati	Quélet	Gelbstieliger Nitrat-Helmling
2	Tubaria	hiemalis	Romagn. ex Bon	Winter-Trompetenschnitzling
3	Russula	grisea	Fr.	Grauvioletter Reiftäubling
4	Fomes	fomentarius	(L.: Fr.) Fr.	Echter Zunderschwamm
4	Gloeophyllum	odoratum	(Wulf.: Fr.) Imyzeki	Fencheltramete
4	Polyporus	ciliatus	Fr.	Bewimperter Porling
4	Polyporus	squamosus	Fr.	Schuppiger Porling
4	Polyporus	tuberaster	(Jacq.: Pers.) Fr.	Sklerotien-Porling
7	Morchella	esculenta	(Tode ex Fr.) Fr.	Speisemorchel
7	Peziza	badia	Pers. ex Fries	Kastanienbrauner Becherling
7	Peziza	vesiculosa	Pers.	Blasiger Becherling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

.

PILZE DER WOCHE 21

Agrocybe dura *Weisser Ackerling*

Gattung:	Agrocybe, Ackerlinge, Erdschüpplinge. Huthaut zellig, (aber nicht bei allen Arten deutlich). Spp. tabakbraun, Sp. meist mit Keimporus oder abgestutzt, seltener ohne, glatt. Cheilozystiden und/oder Pleurozystiden vorhanden oder fehlend. Mit Schnallen. Tc., Pc., Hc.
Art:	Hut bis 75 mm. Stiel mit Ring, Geruch unbedeutend. Sporen 11-14x7-8 µm.
Ökologie:	Im Grasland.
Bemerkung:	Unterschiede zum A. praecox sind: die weisse Hutfarbe, der Ring, der sich am Stiel oft ganz auflöst sowie die grösseren Sporen und der unbedeutende Geruch.

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 21

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1	Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
2	Agaricus	arvensis	Schäff.: Fr.	Schaf-Champignon
2	Agrocybe	dura	(Bolt.) Sing.	Rasiger Ackerling
2	Agrocybe	praecox	(Pers: Fr.) Fayod.	Voreilender Ackerling
2	Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
2	Gymnopus	dryophilus	(Bulliard: Fr.) Murrill	Waldfreund-Rübling
2	Inocybe	squamata	Lge.	Schuppiger Risspilz
2	Lentinus	tigrinus	(Bull.: Fr.) Fr.	Getiegerter Sägeblättling
2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2	Panaeolus	foeniseccii	(Per.: Fr.) Schr.	Heudüngerling
4	Bjerkandera	fumosa	(Pers.: Fr.) Karst.	Graugelber Rauchporling
4	Polyporus	ciliatus	Fr.	Bewimperter Porling
7	Peziza	arvernensis	Pers. Ex Mérat	Buchenwaldbecherling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

PILZE DER WOCHE 24 (BOLLENBERG)

Phylloporia ribis *Beeren-Strauchporling*

Gattung:	Fruchtkörper auf Holz, pileat, mehrjährig, poroid. Contex braun, schwarz mit KOH. Hyphensystem monomitisch. Hyphen hyalin bis bräunlich, dünn- bis dickwand, ohne Schallen. Setae nicht vorhanden. Sp. hyalin, elliptisch. Weissfäule.
Art:	Hut bis 155 mm, Fruchtschicht feinporig, 5-6 pro mm. Sp. 3-4 x 2,5-3 µm, ohne Setae. Hyphensystem monomitisch., dünn bis dickwandig, hyalin bis bräunlich.
Ökologie:	An der Basis von verschiedenen Laubhölzern.
Bemerkung:	Früher wurde diese Art in der Gattung Phellinus aufgeführt. weil das Hyphensystem monomitisch ist, wurde eine neue Gattung gemacht.
Photos:	Markus Wilhelm

Phylloporia ribis
Photo: Markus Wilhelm

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 24 (FRÜHLINGSBUMMEL BOLLENBERG)

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	aereus	Bull.: Fr.	Schwarzhütiger Steinpilz
1	Boletus	aestivalis	(Paulet) Fr.	Sommer-Steinpilz
1	Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
1	Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe
1	Xerocomus	subtomentosus var. ferrugineus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe (Varietät)
2	Agrocybe	praecox	(Pers: Fr.) Fayod.	Voreilender Ackerling
2	Amanita	pantherina	(DC.: Fr.) Krombh.	Pantherpilz
2	Gymnopus	fusipes	(Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
2	Panaeolus	foeniseccii	(Per.: Fr.) Schr.	Heudüngerling
3	Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
3	Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
4	Daedalea	quercina	(L. ex Fr.)	Eichenwirrling
4	Phylloporia	ribis	(Schumacher: Fr.) Ryvarden	Beeren Strauchporling
5	Anthrus	archeri	(Berk.) E. Fischer	Tintenfischpilz
5	Vascellum	pratense	Pers.: Pers.) Kreisel	Wiesen-Stäubling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Funde ausserhalb des Frühlingsbummels

1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
2	Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Conocybe	lactea	(Lange) Métrod	Milchweisses Samthäubchen
2	Hygrocybe	conica	(Scopp.: Fr.) Kumm.	Kegeliger Saftling
2	Marasmius	oreades	(Bolton.: Fr.) Fr.	Nelkenschwindling
2	Marasmius	rotula	(Scop.: Fr.) Fr.	Halsbandschwindling
2	Pluteus	cinereofuscus	Lge.	Graubrauner Dachpilz
2	Rickenella	fibula	(Bull.: Fr.) Raith.	Orangegelber Heftelnabeling
4	Bjerkandera	adusta	(Willd.: Fr.) Karst.	Angebrannter Rauchporling
4	Polyporus	badius	(Pers.: Gray) v. Schw.	Kastanienbrauern Porling



Pilz-Fundliste der Woche 24

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
4	Polyporus	squamosus	Fr.	Schuppiger Porling
4	Pycnoporus	cinnabarinus	(Jacq.: Fr.) Karst.	Zinnoberrote Tramete
4	Stereum	gausapatum	(Fr.) Fr.	Eichen-Schichtpilz
4	Stereum	hirsutum	(Willd.: Fr.) S.F. Gray	Zottiger Schichtpilz
4	Stereum	subtomentosum	Pouzar	Samtiger Schichtpilz
5	Phallus	impudicus	L. ex Pers.	Stinkmorchel

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

PILZE DER WOCHE 25

Lentinus lepideus *Schuppiger Sägeblättling*

Gattung: Fruchtkörper 20 bis 100 mm, Lamellen herablaufend, Schneide grob gesägt. Stiel oft excentrisch, Laub- oder Nadelholz, Spp. weisslich, Zystiden vorhanden oder nicht.

Art: Lamellenschneide deutlich schartig, gesägt, Hutrand nicht gefurcht, bis 120 mm mit groben, bräunlichen Schuppen. Stiel weiss mit braunen Schüppchen. Geruch schwach nach Anis. Sp. 8-12x3-4,5 µm. Marginalzellen dünn, zylindrisch.

Ökologie: An Nadelholz, vorallem Lärche.

Lentinus lepideus (Schuppiger-Sägeblättling)

Pilz-Fundliste der Woche 25

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1	Boletus	luridus	Schäff.: Fr.	Netzstieliger Hexenröhrling
1	Boletus	aestivalis	(Paul.) Fr.	Sommersteinpilz
1	Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
2	Agaricus	xanthoderma	Genev.	Karbol-Egerling
2	Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Amanita	strobiliformis	(Paul.: Vitt.) Bertillon	Fransiger Wulstling
2	Bolbitius	vitellinus	(Pers.: Fr.) Fr.	Gold-Mistpilz
2	Clitocybe	gibba	(Pers.) Kumm.	Ockerbrauner Trichterling
2	Cortinarius	cinnamomeus	Fr.	Zimt-Hautkopf
2	Lentinus	lepideus	(Buxb. ex Fr.) Fr.	Schuppiger Sägeblättling
2	Lentinus	torulosus	(Pers.: Fr. Lloyd	Laubholz-Knäueling
2	Leucoagaricus	leucothites	(Vitt.) Was.	Rosablättriger Egerlingsschirmling
2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2	Mycena	acicula	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Orangeroter Helmling
2	Psathyrella	candolleana	(Fr.: Fr.) Maire	Behangener Faserling
3	Lactarius	cremor	Fr.	Runzliger Zwergmilchling
3	Russula	grisea	Fr.	Grauvioletter Reiftäubling
3	Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
3	Russula	minutula	Velen.	Kleiner Rosa-Täubling
3	Russula	romellii	Maire	Weissstieliger Ledertäubling
3	Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
3	Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
4	Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
4	Ganoderma	adspersum	(Schulz.) Donk	Wulstiger Lackporling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

PILZE DER WOCHE 26

Inonotus hispidus *Zottiger Schillerporling*

Gattung: Frk. auf Holz, resupinat, effuso-reflex od. pileat, sitzend, einjährig, gelblich bis braun, ohne harte Kruste auf der Oberfläche, Hymenium poroid. Oberfläche kahl bis behaart. Context braun, frisch rel. weich, trocken hart u. brüchig, schwarz in KOH. Röhren nicht geschichtet. Monomitisch od. pseudodimitisch durch setale Hyphen. Generative Hyphen hyalin bis braun, ohne Schnallen. Cystiden fehlen. Setae vorhanden., selten fehlend. Sp. bräunlich bis hyalin.

Art: Fk. bis 300 mm. Oberseite jung filzig-haarig. Unterseite porig, jung schwefelgelb, 2-3 pro mm. Sp. 7-10x6-7,5 µm, bräunlich. Setae bis 30 µm.

Ökologie: An Apfelbäumen. Laubbäumen.

Inonotus hispidus *Zottiger Schillerporling*

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 26

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	aestivalis	(Paulet) Fr.	Sommer-Steinpilz
1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1	Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
1	Leccinum	carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuss
1	Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
2	Agaricus	bitorquis	(Quélet) Sacc.	Trottoir-Champignon
2	Agaricus	vaporarius	(Vitt.) Mos.	Kompost-Champignon
2	Amanita	junquillea	Quélet	Narzissengelber Wulstling
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
2	Clitocybe	gibba	(Pers. Fr.) Kummer	Ockerbrauner Trichterling
2	Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Conocybe	lactea	(Lange) Métrod	Milchweisses Samthäubchen
2	Cortinarius	bolaris	(Pers.: Fr.) Fr.	Rotschuppiger Rauhkopf
2	Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
2	Inocybe	napipes	Lge.	Rübenstieliger Risspilz
2	Lentinus	torulosus	(Pers.: Fr. Lloyd	Laubholz-Knäueling
2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2	Psathyrella	candolleana	(Fr.: Fr.) Maire	Behangener Faserling
3	Lactarius	glaucescens	Crossl.	Grünender Pfeffermilchling
4	Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
4	Inonotus	hispidus	(Fr.) Karst.	Zottiger Schillerporling
4	Polyporus	ciliatus	Fr.	Bewimperter Porling
7	Otidea	alutacea	(Pers.: Fr.) Sacc.	Lederbrauner Öhrling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

PILZE DER WOCHE 27

Xerocomus ferrugineus *Ziegenlippe (Varietät)*

Gattung:	Mit dünnem, selten etwas knolligem Stiel, Hymenium gelb, grüngelb. Poren relativ weit. Hut trocken, samtig-filzig (nur bei wenigen Arten alt oder nass etwas schmierig). Röhren-Trama bilateral divergierend. Hyphen der Huthaut inkrustiert.
Art:	Huthaut trocken, Stiel apikal mit Netz. Poren und Fleisch nicht blauend. Fleisch weisslich. Hut 30-120 mm. Stiel 30-100x5-30 mm.
Ökologie:	Nadelbäume, saure Standorte.
Bemerkung:	X. subtomentosus hat mehr Olivtöne auf dem Hut, und das Fleisch blaut im Schnitt schwach, bei Laubbäumen.

Xerocomus ferrugineus *Ziegenlippe (Varietät)*

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 27

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	aereus	Bull.: Fr.	Schwarzhütiger Steinpilz
1	Boletus	aestivalis	(Paulet) Fr.	Sommer-Steinpilz
1	Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1	Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
1	Gomphidius	glutinosus	(Schäff.: Fr.) Fr.	Kuhmaul
1	Leccinum	carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuss
1	Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
1	Xerocomus	ferrugineus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe (Varietät)
2	Agaricus	augustus	Fr.	Braunschuppiger Riesenegerling
2	Agaricus	campester	Fr.: Fr.	Wiesen-Champignon
2	Amanita	ceciliae	Berkeley et Broome) Bas	Riesen-Streifling
2	Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
2	Amanita	muscaria	(L.) Hook.	Fliegenpilz
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Amanita	strobiliformis	(Paul.: Vitt.) Bertillon	Fransiger Wulstling
2	Clitocybe	gibba	(Pers. Fr.) Kummer	Ockerbrauner Trichterling
2	Cortinarius	bolaris	(Pers.: Fr.) Fr.	Rotschuppiger Rauhkopf
2	Cortinarius	bulbosus	(Sow.: Fr.) Fr.	Knolliger Gürtelfuss
2	Lentinus	torulosus	(Pers.: Fr. Lloyd	Laubholz-Knäueling
2	Marasmiellus	ramealis	(Bull.: Fr.) Sing.	Ästchenschwindlng
2	Marasmius	alliaceus	(Jacq.: Fr.) Fr.	Langstieliger Knoblauchschwindling
2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2	Pluteus	leonius	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Löwengelber Dachpilz
2	Psathyrella	candolleana	(Fr.: Fr.) Maire	Behangener Faserling
2	Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3	Lactarius	deterrimus	Gröger	Fichtenreizker
3	Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
3	Lactarius	volemus	(Fr.: Fr.) Fr.	Brätling
3	Russula	aurea	Pers.	Goldtäubling
3	Russula	heterophylla	(Fr.) Fr.	Grüner Speisetäubling
3	Russula	risigallina	(Batsch) Kuyp. & v. Vuu.	Wechselfarbiger Dottertäubling
3	Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 27

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
3	Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
3	Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
4	Ganoderma	lipsiense	(Batsch.: Pers.) Atkinson	Flacher Lackporling
4	Gloeophyllum	odoratum	(Wulf.: Fr.) Imyzeki	Fencheltramete
4	Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
4	Laetiporus	sulfureus	Murr.	Schwefelporling
4	Phyllotopsis	nidulans	(Pers.: Fr.) Singer	Gemeinder Orangeseitling
4	Polyporus	tuberaster	(Jacq.: Pers.) Fr.	Sklerotien-Porling
4	Stereum	hirsutum	(Willd.: Fr.) S.F. Gray	Zottiger Schichtpilz
4	Trametes	gibbosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Buckel-Tramete
7	Choiromyces	venosus	(Fr.) Th. Fries	Stachelsporiger Mäandertrüffel

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

PILZE DER WOCHE 28

Amanita junquillea *Narzissengelber Wulstling*

Gattung:	H. u. St. fleischig, leicht trennbar. L. frei. St. mit häutigem, hängendem Ring oder wenn dieser fehlend, mit deutlicher Volva, oder stiefelig beringt. Volva kann auch oft in Form von flockigen Zonen oder Flocken an der St.-Basis (auch auf dem H.) ausgebildet sein, oder H. mit ± kegeligen Schuppen. Spp. grünlich, meistens jedoch weiß, amyloid oder nicht.
Art:	Hut bis 100 mm, Rand gerieft, mit weissen Velumflocken. Stiel mit vergänglichem, hängendem Ring, Knolle weiss gegürtelt. Sp. weiss. Melzer negativ wie alle gerieften Wulstlinge.
Ökologie:	Nadel- und Laubwälder, schwach im Boden eingesenkt.

Amanita junquillea *Narzissengelber Wulstling*

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 28

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
1	Leccinum	carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuss
1	Leccinum	scabrum	(Bull.: Fr.) Gray	Birkenpilz
1	Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
1	Strobilomyces	strobilaceus	(Scop.: Fr.) Berk.	Strubelkopfröhrling
1	Xerocomus	subtomentosus v.fer.	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe (Varietät)
2	Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
2	Amanita	junquillea	Quélet	Narzissengelber Wulstling
2	Amanita	pantherina	(DC.: Fr.) Krombh.	Pantherpilz
2	Clitocybe	gibba	(Pers. Fr.) Kummer	Ockerbrauner Trichterling
2	Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Conocybe	lactea	(Lange) Métrod	Milchweisses Samthäubchen
2	Cortinarius	bolaris	(Pers.: Fr.) Fr.	Rotschuppiger Rauhkopf
2	Cortinarius	malicorius	Fr.	Orangerandiger Hautkopf
2	Cortinarius	melanotus	Kalchbr.	Braunnetziger Rauhkopf
2	Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
2	Gymnopus	dryophilus	(Bulliard: Fr.) Murrill	Waldfreund-Rübling
2	Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
2	Hygrocybe	conica	(Scopp.: Fr.) Kumm.	Kegeliger Saftling
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Inocybe	maculata	Boud.	Gefleckter Risspilz
2	Marasmiellus	ramealis	(Bull.: Fr.) Sing.	Ästchenschwindlng
2	Marasmius	rotula	(Scop.: Fr.) Fr.	Halsbandschwindling
2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2	Mycena	pelianthina	(Fr.: Fr.) Quél.	Schwarzgezähnelter Helmling
2	Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
2	Mycena	vitilis	(Fr.) Quél.	Zäher Fadenhelmling
2	Psathyrella	candolleana	(Fr.: Fr.) Maire	Behangener Faserling
2	Rhodocybe	gemina	(Fr.). Kuyp. & Noord.	Würziger Tellerling
2	Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3	Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
3	Lactarius	camphoratus	(Bull.: Fr.) Fr.	Kamfermilchling
3	Lactarius	cremor	Fr.	Runzliger Zwergmilchling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 28

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
3	Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
3	Lactarius	volemus	(Fr.: Fr.) Fr.	Brätling
3	Russula	alutacea	(Pers.: Fr.) ss. restr. Melz. & Zvára	Ledertäubling
3	Russula	faginea	Romagn.	Buchen-Heringstäubling
3	Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
3	Russula	grisea	Fr.	Grauvioletter Reiftäubling
3	Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3	Russula	olivascens (postia)	(Pers.: Fr.) Bres.	Olivgrüner Täubling
3	Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
4	Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
6	Calocera	viscosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Klebriger Hörnling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Cortinarius ectypus

Düsterer Gürtelfuss

Sporen 6x4 µm, schwach warzig





Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

PILZE DER WOCHE 29

Amanita lividopallescens *Ockergrauer Riesen-Streifling*

Gattung:	H. u. St. fleischig, leicht trennbar. L. frei. St. mit häutigem, hängendem Ring oder wenn dieser fehlend, mit deutlicher Volva, oder stiefelig beringt. Volva kann auch oft in Form von flockigen Zonen oder Flocken an der St.-Basis (auch auf dem H.) ausgebildet sein, oder H. mit ± kegeligen Schuppen. Spp. grünlich, meistens jedoch weiß, amyloid oder nicht.
Art:	Hut bis 150 mm, Rand gerieft. Stiel genattert. Sp. 10-12 x 8-11 µm. Marginalzellen zylindrisch, apikal kopfig. Velumhyphen mehrheitlich fädig.
Ökologie:	Laubbäume.

Amanita lividopallescens
Ockergrauer Riesen-Streifling

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 29

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	aestivalis	(Paulet) Fr.	Sommer-Steinpilz
1	Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
1	Chalciporus	piperatus	(Bull.: Fr.) Bat.	Pfeffer-Röhrling
1	Gomphidius	glutinosus	(Schäff.: Fr.) Fr.	Kuhmaul
1	Leccinum	carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuss
1	Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
1	Strobilomyces	strobilaceus	(Scop.: Fr.) Berk.	Strubelkopfröhrling
1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
1	Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe
2	Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
2	Amanita	junquillea	Quélet	Narzissengelber Wulstling
2	Amanita	lividopallescens	(Gill.) Seyot	Ockergrauer Riesen-Streifling
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Amanita	umbrinolutea	Secr.: Gill.) Bat.)	Verfärbender Scheidenstreifling
2	Clitocybe	costata	Kühn. & Romagn.	Kerbrandiger Trichterling
2	Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Cortinarius	bolaris	(Pers.: Fr.) Fr.	Rotschuppiger Rauhkopf
2	Cortinarius	cinnamomeus	Fr.	Zimt-Hautkopf
2	Crepidotus	applanatus	(Pers.) Kumm.	Gerieftes Stummelfüsschen
2	Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
2	Hydropus	subalpinus	(Höhnel) Singer	Buchenwald-Wasserfuss
2	Inocybe	erubescens	Blytt	Ziegelroter Risspilz
2	Inocybe	fibrosa	(Sow.) Gill.	Grosser Faser-Risspilz
2	Inocybe	fuscidula	Vel.	Braunstreifiger Risspilz
2	Inocybe	decipiens	Bresadola	Graubrauner Risspilz
2	Inocybe	riomosa	(Bull.: Fr.) Kummer	Kegeliger Risspilz
2	Marasmius	alliaceus	(Jacq.: Fr.) Fr.	Langstieliger Knoblauchschwindling
2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2	Tricholomopsis	flammula	Métrod	Kleiner Holzritterling
2	Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3	Lactarius	camphoratus	(Bull.: Fr.) Fr.	Kamfermilchling
3	Lactarius	cremor	Fr.	Runzliger Zwergmilchling
3	Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 29

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
3	Lactarius	volemus	(Fr.: Fr.) Fr.	Brätling
3	Russula	alutacea	(Pers.: Fr.) ss. restr. Melz. & Zvára	Ledertäubling
3	Russula	amethystina	Quélet	Amethysttäubling
3	Russula	grisea	Fr.	Grauvioletter Reiftäubling
3	Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
3	Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
3	Russula	pectinata	(Bull.: St. Am.) Fr.	Stinkender Kammtäubling
3	Russula	puellaris	Fr.	Milder Wachstäubling
3	Russula	queletii	Fr.	Stachelbeer-Täubling
3	Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
3	Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
3	Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
3	Russula	melliolens	Quélet	Honig-Täubling
4	Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
4	Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
4	Polyporus	tuberaster	(Jacq.: Pers.) Fr.	Sklerotien-Porling
6	Calocera	viscosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Klebriger Hörnling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

PILZE DER WOCHE 30

Amanita pantherina *Pantherpilz*

Gattung: Hut und Stiel fleischig, leicht trennbar. Lamellen frei. Stiel mit häutigem, hängendem Ring oder wenn dieser fehlend, mit deutlicher Volva oder stiefelig beringt. Volva kann auch in Form von flockigen Zonen oder Flocken an der St.-Basis (auch auf dem Hut) ausgebildet sein, oder Hut mit ± kegeligen Schuppen. Spp. grünlich, meistens jedoch weiß, amyloid oder nicht.

Art: Hut bis 100 mm, Rand gerieft, Schuppen weiss. Stiel mit Ring, dieser nicht gerieft. Stielbasis knollig, gerandet. Siel in die Knolle engepfropft. Sp. 9-11 x 7-8 µm. Marginalzellen kurz zylindrisch. Melzer neg.

Ökologie: Laub- und Nadelwälder.

Amanita pantherina
Pantherpilz

Pilz-Fundliste der Woche 30

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	aestivalis	(Paulet) Fr.	Sommer-Steinpilz
1	Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
1	Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1	Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
1	Boletus	rubrosanguineus	Walty ex Cheype	Falscher Satans-Röhrling
1	Chalciporus	piperatus	(Bull.: Fr.) Bat.	Pfeffer-Röhrling
1	Gomphidius	glutinosus	(Schäff.: Fr.) Fr.	Kuhmaul
1	Leccinum	carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuss
1	Leccinum	crocipodium	(Letellier) Walting	Gelbporiger Rauhfuss
1	Leccinum	versipelle	(Fr.) Snell.	Birken-Rotkappe
1	Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
1	Strobilomyces	strobilaceus	(Scop.: Fr.) Berk.	Strubelkopfröhrling
1	Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
1	Suillus	variegatus	Sw.: Fr. Kuntze	Sandröhrling
1	Suillus	viscidus	(L.) Rouss.	Grauer Lärchenröhrling
1	Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
1	Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe
2	Amanita	ceciliae	Berkeley et Broome) Bas	Riesen-Streifling
2	Agaricus	essettei	Bon	Schiefknolliger Anis-Champignon
2	Agrocybe	cylindracea	(DC: Fr.) Mre.	Südlicher Ackerling
2	Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
2	Amanita	pantherina	(DC.: Fr.) Krombh.	Pantherpilz
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Clitocybe	gibba	(Pers. Fr.) Kummer	Ockerbrauner Trichterling
2	Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Cortinarius	bolaris	(Pers.: Fr.) Fr.	Rotschuppiger Rauhkopf
2	Cortinarius	pseudocrassus	Joss. ex Orton	Trockener Gebirg.-Schleimkopf
2	Cortinarius	renidens	Fr.	Quitten-Wasserkopf
2	Cortinarius	bulliardii	(Pers.: Fr.) Fr.	Feuerfüssiger Gürtelfuss
2	Cortinarius	rubellus	Cooke	Spitzgebuckelter Rauhkoopf

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 30

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Cortinarius	stillatitus	Fr.	Honig-Schleimfuss
2	Agrocybe	cylindracea	(DC: Fr.) Mre.	Südlicher Ackerling
2	Entoloma	rhodopolium	(Fr.: Fr.) Kummer	Niedergedrückter Rötling
2	Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
2	Gymnopus	maculata	(Alb. et Schw. Fr.)	Gefleckter Rübling
2	Hydropus	subalpinus	(Höhnel) Singer	Buchenwald-Wasserfuss
2	Hygrocybe	conica	(Scopp.: Fr.) Kumm.	Kegeliger Saftling
2	Hypholoma	radicosum	E.Lange	Wurzelnder Schwefelkopf
2	Inocybe	riomosa	(Bull.: Fr.) Kummer	Kegeliger Risspilz
2	Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2	Lepiota	clypeolaria	(Bull.: Fr.) Kumm.	Wolliggestiefelter Schirmling
2	Lepiota	ventriosospora	Reid	Gelbwolliger Schirmling
2	Macrolepiota	procera	(Scop.: Fr. Sg.	Parasol
2	Marasmiellus	ramealis	(Bull.: Fr.) Sing.	Ästchenschwindlng
2	Marasmius	wettsteinii	Sacc. & Syd.	Wettsteins-Schwindling
2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2	Mycena	renati	Quélet	Gelbstieliger Nitrat-Helmling
2	Pluteus	leonius	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Löwengelber Dachpilz
2	Rickenella	fibula	(Bull.: Fr.) Raith.	Orangegelber Heftelnabeling
2	Ripartites	tricholoma	(Alb. & v. Schw.)	Bewimperter Filzkrempling
2	Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3	Lactarius	camphoratus	(Bull.: Fr.) Fr.	Kamfermilchling
3	Lactarius	deterrimus	Gröger	Fichtenreizker
3	Lactarius	glaucescens	Crossl.	Grünender Pfeffermilchling
3	Lactarius	ligniotus	Fries in Lindb.	Mohrenkopf
3	Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
3	Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
3	Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
3	Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
3	Lactarius	torminosus	(Schäf.: Fr.) Fr.	Zottiger Birkenreizker
3	Lactarius	volemus	(Fr.: Fr.) Fr.	Brätling
3	Russula	acrifolia	Romagn.	Scharfblättriger Schwärztäubling
3	Russula	adulterina	Fr. ss. Rom.	Scharfer Brauntäubling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 30

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
3	Russula	anthracina	Romagn.	Lachsblättriger Schwärztäubling
3	Russula	carpini	Gir. & Hein.	Hainbuchentäubling
2	Agrocybe	cylindracea	(DC: Fr.) Mre.	Südlicher Ackerling
3	Russula	curtipes	Moell. & Schaeff.	Kurzstieliger Ledertäubling
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
3	Russula	cyanoxantha f. pelter.	R. Maire.: Singer	Grüner Frauentäubling
3	Russula	densifolia	Gill.	Dichtblättriger Schwärztäubling
3	Russula	emetica	(Schäff.: Fr.) Gray	Kirschroter Speitäubling
3	Russula	faginea	Romagn.	Buchen-Heringstäubling
3	Russula	farinipes	Romell in Britz.	Mehlstieltäubling
3	Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
3	Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
3	Russuloa	laurocerasi	Melzer	Mandeltäubling
3	Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3	Russula	raoultii	Quél.	Blassgeber Täubling
3	Russula	risigallina	(Batsch) Kuyp. & v. Vuu.	Wechselfarbiger Dottertäubling
3	Russula	romellii	Maire	Weissstieliger Ledertäubling
3	Russula	rubra	(Lmck. Fr.) Fr.	Scharfer Zinnobertäubling
3	Russula	sanguinea	(Bull. ex St. Am.) Fr.	Blutroter Täubling
3	Russula	solaris	Ferd. et Winge	Sonnentäubling
3	Russula	turci	Bres.	Jodoformtäubling
3	Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
3	Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
4	Albatrellus	ovinus	(Schäff.: Fr.) Kotl. & Pouz.	Schafporling
4	Bondarzewia	montana	(Quél.) Singer	Bergporling
4	Cantharellus	auroa	(Batsch) Kuyp.	Duftender Gabeling, Goldfüsschen
4	Clavulina	cristata	(Holmskj.: Fr.) Schröt.	Kammförmige Koralle
4	Ganoderma	lucidum	(Curt.: Fr.) Karst.	Glänzender Lackporling
4	Hapalopilus	rutilans	(Pers.: Fr.) Karst.	Zimtfarbener Weichporling
4	Hydnellum	peckii	Banker in Peck	Scharfer Korkstacheling
4	Hydnum	repandum var. rufesc.	(Fr.) Barla	Rotgelber Stoppelpilz
4	Phaeolus	schweinitzii	(Fr.) Pat.	Kiefernbraunporling
4	Polyporus	tuberaster	(Jacq.: Pers.) Fr.	Sklerotien-Porling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilz-Fundliste der Woche 30

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
4	Skeletocutis	carneogrisea	David	Fleischgrauer Knorpelporling
4	Thelephora	penicillata	Pers.: Fr.	Pinsel-Warzenpilz
4	Telephora	terrestris	Fr.	Fächerförmiger Erdwarzenpilz
5	Lycoperdon	echinatum	Pers.: Pers.	Igel-Stäubling
5	Lycoperdon	pyriforme	Schäff.: Pers.	Birnen-Stäubling
6	Calocera	viscosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Klebriger Hörnling
7	Choiromyces	venosus	(Fr.) Th. Fries	Stachelsporiger Mäandertrüffel
7	Hymenoscyphus	albidus	(Roberge) Phill.	Weisses Stengelbecherchen

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Thelephora penicillata
Pinsel-Warzenpilz



Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

PILZE DER WOCHE 31

Paxillus filamentosus *Erlen-Krempling*

Gattung:	Fruchtkörper fleischig, Hutrand jung eingerollt. Lamellen gelbbraun, herablaufend. vom Hut-Fleisch leicht abtrennbar. Lamellen-Trama ± bilateral divergierend. Sporenpulver ton- bis hell-rostbraun, glatt, ohne Keimporus.
Art:	bis 150 mm. Sporen 5,5-7,5 x 3,5-4,5 µm.
Ökologie:	Bei Erlen.
Bemerkung:	Dunklere Verfärbung auf Druck als bei P. involutus und kleinere Sporen.

Paxillus filamentosus
Erlen-Krempling

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 31

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	aestivalis	(Paulet) Fr.	Sommer-Steinpilz
1	Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
1	Gomphidius	glutinosus	(Schäff.: Fr.) Fr.	Kuhmaul
1	Paxillus	filamentosus	Fr.	Erlen-Krempling
1	Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
1	Strobilomyces	strobilaceus	(Scop.: Fr.) Berk.	Strubelkopfröhrling
1	Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
1	Suillus	variegatus	Sw.: Fr. Kuntze	Sandröhrling
1	Suillus	placidus	(Bonord.) Singer	Elfenbein-Röhrling
1	Tylopilus	felleus	(Bull.: Fr.) Karst.	Gallenröhrling
1	Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
1	Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe
2	Amanita	citrina var. alba	(Schäff.) Pers.	Weisser Gilbwulstling
2	Amanita	pantherina	(Gilb. in Konr. & Maubl.)	Pantherpilz
2	Amanita	vaginata	(Bull.) Vitt.	Grauer Scheidenstreifling
2	Amanita	strobiliformis	(Paul.: Vitt.) Bertillon	Fransiger Wulstling
2	Cortinarius	bolaris	(Pers.: Fr.) Fr.	Rotschuppiger Rauhkopf
2	Cortinarius	pseudocrassus	Joss. ex Orton	Trockener Gebirg.-Schleimkopf
2	Cortinarius	purpureus	(Bulliard ex Pers.: Fr.) Fuckel	Purpurroter Hautkopf
2	Crepidotus	applanatus	(Pers.) Kumm.	Gerieftes Stummelfüsschen
2	Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
2	Gymnopus	maculata	(Alb. et Schw. Fr.)	Gefleckter Rübling
2	Inocybe	petiginosa	(Fr.: Fr.) Gillet	Graugezonter Zwergrisspilz
2	Lentinellus	cochleatus	(Pers.: Fr.) Karst.	Äniszähling
2	Marasmiellus	ramealis	(Bull.: Fr.) Sing.	Ästchenschwindlng
2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2	Pleurotus	cornucopiae	(Paul. ex Pers.) Roll.	Rillstieliger Seitling
2	Pluteus	leonius	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Löwengelber Dachpilz
2	Pluteus	nanus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Zwerg-Dachpilz
2	Tricholomopsis	decora	(Fr.) Sing.	Olivgelber Holzritterling
2	Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3	Lactarius	azonites	(Bull.) Fr.	Rauchfarbener Rosamilchling
3	Lactarius	cremor	Fr.	Runzliger Zwergmilchling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 31

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
3	Lactarius	deterrimus	Gröger	Fichtenreizker
3	Lactarius	hortensis	Velen	Haselmilchling
3	Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
3	Lactarius	volemus	(Fr.: Fr.) Fr.	Brätling
3	Russula	acrifolia	Romagn.	Scharfblättriger Schwärztäubling
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
3	Russula	cyanoxantha fo. pelt.	R. Maire.: Singer	Grüner Frauentäubling
3	Russula	densifolia	Gill.	Dichtblättriger Schwärztäubling
3	Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
3	Russula	fragilis	(Pers.: Fr.) Fr.	Wechselfarbiger Speitäubling
3	Russula	grata (laurocerasi)	Melzer	Mandeltäubling
3	Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
3	Russuloa	laurocerasi	Melzer	Mandeltäubling
3	Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3	Russula	puellaris	Fr.	Milder Wachstäubling
3	Russula	romellii	Maire	Weissstieliger Ledertäubling
3	Russula	rosea (=lepida)	Pers.	Harter Zinnober-Täubling
3	Russula	rubra	(Lmck. Fr.) Fr.	Scharfer Zinnobertäubling
3	Russula	solaris	Ferd. et Winge	Sonnentäubling
3	Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
3	Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
3	Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
4	Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
4	Cantharellus	friesii	Quél.	Fries´scher Pfifferling
4	Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
5	Phallus	impudicus	L. ex Pers.	Stinkmorchel
7	Xylaria	polymorpha	(Pers.: Fr.) Greville	Vielgestaltige Holzkeule

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

PILZE DER WOCHE 32

Leucopaxillus compactus *Dreifarbiger Krempentrichterling*

Gattung:	Mittelgroße bis sehr große, fleischige Arten mit herablaufenden bis ausgebuchtet angewachsenen Lamellen. Hutrand jung ± eingerollt. Spp. weiss bis creme. Sp. glatt bis warzig, schwach bis stark amyloid.
Art:	bis 150 mm. Sporen 5,5-7,5 x 3,5-5 µm.
Ökologie:	Bei Laubbäumen.
Bemerkung:	Diese Art erinnert etwas an Schleimköpfe, hat jedoch keinen schmierige Hut. Die Sporen sind stachelig, hyalin und amyloid.

Leucopaxillus compactus
Dreifarbiger Krempentrichterling

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 32

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
1	Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
1	Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
1	Boletus	radicans	Pers.: Fr.	Bitter-Röhrling
2	Agaricus	silvicola	(Vittad.) Sacc.	Dünnfleischiger Anis-Egerling
2	Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
2	Amanita	fulva	(Schff.) Fr.	Rotbrauer Streifling
2	Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
2	Amanita	phalloides var. alba	(Fr.) Link	Weisser Knollenblätter-Pilz (weisse Form)
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Clitocybe	gibba	(Pers. Fr.) Kummer	Ockerbrauner Trichterling
2	Clitopilus	hobsonii	(Berk. & Br.) Ort.	Seitlings-Mehlräsling
2	Cortinarius	argutus	Fr.	Spitzbasiger Schleimkopf
2	Cortinarius	delibutus	Fr.	Violettblättriger Schleimfuss
2	Cortinarius	infractus	(Pers.: Fr.) Fr.	Bitterer Schleimfuss
2	Cortinarius	pseudocrassus	Joss. ex Orton	Trockener Gebirg.-Schleimkopf
2	Cortinarius	venetus	(Fr.). Fr.	Grüner Buchenwald-Rauhkopf
2	Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
2	Gymnopus	fusipes	(Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling
2	Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
2	Hygrophorus	penarius	Fr.	Trockener Schneckling
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
2	Leucopaxillus	compactus	(Fr.) Neuhf.	Dreifarbiger Krempentrichterling
2	Marasmius	torquescens	Quél.	Ledergelber Schwindling
2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2	Mycena	pelianthina	(Fr.: Fr.) Quél.	Schwarzgezähnelter Helmling
2	Pholiota	flammans	(Fr.:) Kummer	Feuerschüppling
2	Psathyrella	candolleana	(Fr.: Fr.) Maire	Behangener Faserling
2	Simocybe	centunculus	(Fr.: Fr.) Karst.	Kleinsporiger Olivschnitzling
2	Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3	Lactarius	glaucescens	Crossl.	Grünender Pfeffermilchling
3	Lactarius	intermedius	(Krombh.) Cke.	Grubiger Weisstannenmilchling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 32

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
3	Lactarius	azonites	(Bull.) Fr.	Rauchfarbener Rosamilchling
3	Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
3	Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
3	Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
3	Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
3	Lactarius	romagnesii	Bon	Kerbrandiger Korallenmilchling
3	Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3	Lactarius	volemus	(Fr.: Fr.) Fr.	Brätling
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
3	Russula	emetica	(Schäff.: Fr.) Gray	Kirschroter Speitäubling
3	Russula	farinipes	Romell in Britz.	Mehlstieltäubling
3	Russula	grata (laurocerasi)	Melzer	Mandeltäubling
3	Russula	grisea	Fr.	Grauvioletter Reiftäubling
3	Russuloa	laurocerasi	Melzer	Mandeltäubling
3	Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3	Russula	pseudointegra	Arn. & Gor.	Ockerblättriger Zinnobertäubling
3	Russula	puellaris	Fr.	Milder Wachstäubling
3	Russula	rubra	(Lmck. Fr.) Fr.	Scharfer Zinnobertäubling
3	Russula	turci	Bres.	Jodoformtäubling
3	Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
3	Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
4	Albatrellus	cristatus	(Schäff.: Fr.) Kotl. & Pouz.	Grüner Kammporling
4	Polyporus	ciliatus	Fr.	Bewimperter Porling
4	Polyporus	varius	Pers.: Fr.	Löwengelber Schwarzfussporling
5	Scleroderma	areolatum	Ehrenb.	Gefelderter Kartoffelbovist
5	Scleroderma	citrinum	Pers.	Dickschaliger Kartoffelbovist
5	Scleroderma	verrucosum	(Bull.: Pers.) Pers.	Dünnschaliger Kartoffelbovist
6	Calocera	viscosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Klebriger Hörnling
6	Sebacina	incrustans	(Pers.:Fr.) Tul.	Erd-Wachskruste
7	Helvella	macropus	(Pers.: Fr.) Karsten	Langfuss-Lorchel

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

PILZE DER WOCHE 33

Sebacina incrustans *Erd-Wachskruste*

Gattung: Fruchtkörper resupinat und flach asusgebreitet oder unregelmässig und das Substrat überziehend. Hymenim glatt bis wellig. Monomitisch oder selten dimitisch mit hyalinen Skelethyphen. Generative Hyphen hyalin, dünn- bis dickwandig ohne Schnallen Basidien hyalin, mit Längssepten ohne Schnallen.

Art: Sporen 14-18 x 9-10 µm mit körnigem Inhalt. Monomitisch, selten dimitisch, dann mit hyalinen Skeletthyphen, Generative Hyphen ebenfalls hyalin, dünn- bis dickwandig. Hyphidia vorhanden, hyalin.

Ökologie: Auf nackter Erde, Pflanzenresten. Fruchtkörper eng mit dem Substrat verwachsen.

Sebacina incrustans
Erd-Wachskruste

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 33

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	aestivalis	(Paul.) Fr.	Sommersteinpilz
1	Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1	Boletus	luridus	Schäff.: Fr.	Netzstieliger Hexenröhrling
1	Boletus	pulverlulentus	Opat.	Schwarzblauender Röhrling
1	Boletus	queletii	Schulzer	Glattstieliger Hexenröhrling
1	Boletus	regius	Krombh.	Königs-Röhrling
1	Leccinum	crocipodium	(Letellier) Walting	Gelbporiger Rauhfuss
1	Suillus	bovinus	(L.: Fr.) Rouss.	Kuhröhrling
1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
2	Agaricus	bitorquis	(Quélet) Sacc.	Trottoir-Champignon
2	Amanita	crocea	(Quél. in Boud.) Sing.	Orangebrauner Scheidenstreifling
2	Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Amanita	strobiliformis	(Paul.: Vitt.) Bertillon	Fransiger Wulstling
2	Chamaemyces	fracidus	(Fr.) Donk	Fleckender Schmierschirmling
2	Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Cortinarius	argutus	Fr.	Spitzbasiger Schleimkopf
2	Cortinarius	bolaris	(Pers.: Fr.) Fr.	Rotschuppiger Rauhkopf
2	Cortinarius	pseudocrassus	Joss. ex Orton	Trockener Gebirg.-Schleimkopf
2	Hohenbuhelia	geogenia	(DC.: Fr.) Sing.	Trichterförmiger Muscheling
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Inocybe	cookei	Bres.	Knolliger Risspilz
2	Inocybe	fraudans	(Britz.) Sacc.	Birnen-Risspilz
2	Inocybe	maculata	Boud.	Gefleckter Risspilz
2	Lyophyllum	connatum	(Schum.: Fr.) Sing.	Weisser Büschelrasling
2	Pholiota	astragalina	(Fr.) Singer	Safranroter Schüppling
2	Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
2	Pluteus	leonius	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Löwengelber Dachpilz
2	Stropharia	rugosoannulata	Farl. ex Murr.	Rotbrauner Riesenträuschling
2	Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
2	Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3	Lactarius	acris	(Bolt.: Fr.) Gray	Rosaanlaufender Milchling
3	Lactarius	aurantiacus	(Pers.: Fr.) Gray	Echter Orange-Milchling
3	Lactarius	glaucescens	Crossl.	Grünender Pfeffermilchling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 33

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
3	Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
3	Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
3	Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
3	Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
3	Russula	faginea	Romagn.	Buchen-Heringstäubling
3	Russula	farinipes	Romell in Britz.	Mehlstieltäubling
3	Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
3	Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
3	Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
3	Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3	Russula	risigallina	(Batsch) Kuyp. & v. Vuu.	Wechselfarbiger Dottertäubling
3	Russula	romellii	Maire	Weissstieliger Ledertäubling
3	Russula	solaris	Ferd. et Winge	Sonnentäubling
3	Russula	turci	Bres.	Jodoformtäubling
3	Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
3	Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling
4	Albatrellus	ovinus	(Schäff.: Fr.) Kotl. & Pouz.	Schafporling
4	Boletopsis	leucomelaena	(Pers.) Fayod	Grauer Russporling
4	Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
4	Craterellus	cornucopioides	Pers.	Totentrompete
4	Dentropolyporus	umbellatus	(Pers.: Fr.) Jül.	Eichhase
4	Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
4	Meripilus	giganteus	(Pers.: Fr.) Karst.	Riesenporling
4	Phaeolus	schweinitzii	(Fr.) Pat.	Kiefernbraunporling
4	Polyporus	tuberaster	(Jacq.: Pers.) Fr.	Sklerotien-Porling
4	Ramaria	formosa	(Pers.: Fr.) Quél.	Dreifarbene Koralle
4	Ramaria	stricta	(Pers.: Fr.) Quél. s. str.	Steife Koralle
4	Thelephora	penicillata	Pers.: Fr.	Pinsel-Warzenpilz
5	Anthrus	archeri	(Berk.) E. Fischer	Tintenfischpilz
5	Scleroderma	citrinum	Pers.	Dickschaliger Kartoffelbovist
6	Sebacina	incrustans	(Pers.:Fr.) Tul.	Erd-Wachskruste
7	Bisporella	citrina	(Batsch ex Fr.) Korf & Carpenter	Zitronengelbes Holzbecherchen
7	Dasyscyphus	niveus	(Hedw. ex Fr.) Sacc.	Schneeweisses Haarbecherchen

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

PILZE DER WOCHE 34

Tricholoma umbonatum *Buckliger Ritterling*

Gattung:	Fleischige, meist mittelgroße bis große Arten, nie hygrophan. Lamellen ausgebuchtet oder abgerundet angewachsen. Stiel nicht berindet, mit oder ohne Velum, (bisw. ringförmig). Fast stets ohne Schnallen. Huthaut hyphig. Auf Erde. Spp. weiß, nicht amyloid, acyanophil oder schwach cyanophil.
Art:	Hut bis 65 mm gross, schwach schmierig. Lamellen jung weiss. Fleisch weiss. Geruch nach Mehl. Sporen 6-7 x 4-5 µm. Hyphen ohne Schnallen. Ökologie: bei Laubbäumen.
Bemerkung:	Diese Art gehört wohl in den Formenkreis der Sejunctum-gruppe, jedoch meist mit spitzbuckligem Hut und mit etwas grösserem Q-Wert der Sporen.
Foto:	Markus Wilhelm

Tricholoma umbonatum
Buckliger Ritterling

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 34

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	luridus	Schäff.: Fr.	Netzstieliger Hexenröhrling
1	Boletus	radicans	Pers.: Fr.	Bitter-Röhrling
2	Amanita	nivalis*	(Greville) Saccardo	Alpiner-Streifling
2	Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Cortinarius	alpinus*	Boudier	Alpiner Weiden-Schleimfuss
2	Cortinarius	delibutus	Fr.	Violettblättriger Schleimfuss
2	Cortinarius	sanguineus	(Wulf.: Fr.) Gray	Blutroter Hautkopf
2	Hemimycena	cucullata	(Pers.: Fr.) Sing.	Gipsweisser Scheinhelmling
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Inocybe	fraudans	(Britz.) Sacc.	Birnen-Risspilz
2	Inocybe	riomosa	(Bull.: Fr.) Kummer	Kegeliger Risspilz
2	Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2	Omphalina	velutipes	Ort.	Samtfuss-Nabeling
2	Pholiota	astragalina	(Fr.) Singer	Safranroter Schüppling
2	Tricholoma	umbonatum	Lge. ex Clç. & Bon	Buckliger Ritterling
3	Lactarius	dryadophilus*	Kühner	Silberwurz-Milchling
3	Lactarius	robertianus*	Bon	Violettbrauner Milchling
3	Lactarius	volemus	(Fr.: Fr.) Fr.	Brätling
3	Russula	chamiteae*	Kühner	Purpurlicher Weiden-Täubling
3	Russula	chloroides	(Krombh.) Bres.	Schmalblättriger Weisstäubling
3	Russula	farinipes	Romell in Britz.	Mehlstieltäubling
3	Russula	felleaecolor*	Jamoni et Bon	Hochgebirgstäubling
3	Russula	fragrantissima	Rom.	Starkduftender Stinktäubling
3	Russula	norvegica*	Reid	Nordischer Täubling
3	Russula	nana*	Killermann	Hochgebirgs-Speitäubling
3	Russula	pallescens	Karsten	Verblassender Kiefern-Täubling
3	Russula	pascua*	Møller et Schäffer	Dryas-Heringstäubling
3	Russula	raoultii	Quél.	Blassgeber Täubling
3	Russula	rubra	(Lmck. Fr.) Fr.	Scharfer Zinnobertäubling
3	Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
4	Antrodia	serialis	(Fr.) Donk	Reihige Tramete
4	Daedalea	quercina	(L. ex Fr.)	Eichenwirrling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 34

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
4	Ganoderma	lipsiense	(Batsch.: Pers.) Atkinson	Flacher Lackporling
4	Gomphus	clavatus	(Pers.: Fr.) Gray	Schweinsohr
4	Oligoporus	subcaesius	(David) Dung.	Fastblauer Saftporling
4	Polyporus	melanopus	(Pers.: Sw.) Fr.	Braunfuss-Porling
4	Ramaria	stricta	(Pers.: Fr.) Quél. s. str.	Steife Koralle
6	Tremiscus	helveloides	(DC: Pers.) Donk	Roter Gallerttrichterling

* Pilze in alpiner Zone

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Amanita nivalis*
Alpiner-Streifling
Foto: Markus Wilhelm

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 34

Russula chamiteae* Purpurlicher Weiden-Täubling
Foto: Markus Wilhelm

Pilz-Fundliste der Woche 34

Russula nana*
Hochgebirgs-Speitäubling
Foto: Markus Wilhelm

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 34

Russula norvegica*
Nordischer Täubling
Foto: Markus Wilhelm

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 34

Russula pascua*
Dryas-Heringstäubling
Foto: Markus Wilhelm

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 34

Russula fragrantissima Stark-duftender Stinktäubling
Foto: Markus Wilhelm

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 34

Lactarius dryadophilus*
Silberwurz-Milchling
Foto: Markus Wilhelm

Pilz-Fundliste der Woche 34

Polyporus melanopus
Braunfuss-Porling
Foto: Markus Wilhelm

Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

PILZE DER WOCHE 37 PILZAUSSTELLUNG

Boletus regius *Königsröhrling*

Gattung Boletus: Hymenophor mit roten, orange, orangegelben Farben. (Ausnahme B. torosus Hymenophor jung gelb). Frkp. fleischig, St. meist dickbauchig mit feinflockiger oder netziger Oberfläche. H. sehr bald trocken, fein filzig oder kahl. Spp. oliv bis olivbraun. Sp. spindelig oder fast spindelig, glatt.

Art: Hut bis 150 mm gross. Poren goldgelb. Stiel mit Netz. Fleisch im Schnitt nicht blauend. Sporen 12,5-16 x 4-5 µm. Bei Laubbäumen.

Bemerkung: Beim ähnlichen B. pseudoregius blaut das Fleisch beim Durchschneiden.

Boletus regius *Königsröhrling*

IMPRESSIONEN VON DER PILZAUSSTEL-LUNG 2012

Fotos von Mauro Seggiani

Verein für Pilzkunde
Basel

Sporadisch werden Führungen
durch die Ausstellung angeboten

IMPRESSIONEN VON DER PILZAUSSTEL-LUNG 2012

Verein für Pilzkunde
Basel

Drei Stunden stehen der Crew für das Einrichten am Morgen zur Verfügung

Impressionen von der Pilzausstellung 2012

Verein für Pilzkunde
Basel

Ein beliebtes Gebiet: Pilze an Holz

Impressionen von der Pilzausstellung 2012

Verein für Pilzkunde
Basel

Bewunderung findet die
Vielfalt der Röhrlinge

Impressionen von der Pilzausstellung 2012

Verein für Pilzkunde
Basel

Wiederkehrende Gäste an
unserer Ausstellung

Impressionen von der Pilzausstellung 2012

Verein für Pilzkunde
Basel

Thomas beim Pilzprotokoll
nachfolgend aufgelistet

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 37 PILZAUSSTELLUNG

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	aereus	Bull.: Fr.	Schwarzhütiger Steinpilz
1	Boletus	aestivalis	(Paulet) Fr.	Sommer-Steinpilz
1	Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
1	Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1	Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger He0en-Röhrling
1	Boletus	radicans	Pers.: Fr.	Bitter-Röhrling
1	Boletus	regius	Krombh.	Königs-Röhrling
1	Boletus	satanas	Lenz	Satansröhrling
1	Chalciporus	piperatus	(Bull.: Fr.) Bat.	Pfeffer-Röhrling
1	Chroogomphus	helveticus	(Singer) Moser	Filziger Gelbfuss
1	Chroogomphus	rutilus	(Schaeff.: Fr.) O.K. Miller	Kupferroter Gelbfuss
1	erocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe
1	Gomphidius	glutinosus	(Schäff.: Fr.) Fr.	Kuhmaul
1	Gyroporus	cyanescens	(Bull.: Fr.) Quél.	Kornblumen-Röhrling
1	Hygrophoropsis	aurantiaca	(Wulff.: Fr.) Maire	Falscher Pfifferling
1	Leccinum	crocipodium	(Letellier) Walting	Gelbporiger Rauhfuss
1	Leccinum	duriusculum	(Schulz.) Sing.	Brauner Pappel-Rauhfuss
1	Leccinum	quercinum	Pilát ex Pilát	Eichen-Rotkappe
1	Leccinum	versipelle	(Fr.) Snell.	Birken-Rotkappe
1	Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
1	Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
1	Strobilomyces	strobilaceus	(Scop.: Fr.) Berk.	Strubelkopfröhrling
1	Suillus	granulatus	(L.: Fr.) Rouss.	Körnchenröhrling
1	Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
1	Tylopilus	felleus	(Bull.: Fr.) Karst.	Gallenröhrling
1	Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. e0 Gilb.	Maronenröhrling
1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
1	Xerocomus	communis	(Bulliard) Bon	Eichen-Filzröhrling
2	Agaricus	arvensis	Schäff.: Fr.	Schaf-Champignon
2	Agaricus	augustus	Fr.	Braunschuppiger Riesenegerling
2	Agaricus	semotus	Fr.	Weinrötlicher Zwerg-Champignon
2	Agaricus	xanthoderma	Genev.	Karbol-Egerling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 37 PILZAUSSTELLUNG

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Agrocybe	cylindracea	(DC: Fr.) Mre.	Südlicher Ackerling
2	Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
2	Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
2	Amanita	fulva	(Schff.) Fr.	Rotbrauer Streifling
2	Amanita	magnivolvata	Aalto	Grossscheidiger Scheidenstreifling
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Amanita	vaginata	(Bull.) Vitt.	Grauer Scheidenstreifling
2	Amanita	virosa	(Fr.) Bertillon	Spitzhütiger Knollenblätterpilz
2	Clitocybe	candicans	(Pers.) Kumm.	Wachsstieliger Trichterling
2	Clitocybe	gibba	(Pers. Fr.) Kummer	Ockerbrauner Trichterling
2	Clitocybe	odora	(Bulliard: Fr.) Kumm.	Grüner Anistrichterling
2	Clitocybe	phaeophthalma	(Pers.) Kp.	Ranziger Trichterling
2	Clitopilus	hobsonii	(Berk. & Br.) Ort.	Seitlings-Mehlräsling
2	Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Coprinus	disseminatus	(Pers.: Fr.) S.F.Gray	Gesäter Tintling
2	Coprinus	micaceus	(Bull.: Fr.) Fr.	Glimmertintling
2	Cortinarius	argutus	Fr.	Spitzbasiger Schleimkopf
2	Cortinarius	armillatus	(Fr.: Fr.) Fr.	Geschmückter Gürtelfuss
2	Cortinarius	bolaris	(Pers.: Fr.) Fr.	Rotschuppiger Rauhkopf
2	Cortinarius	cinnamomeus	Fr.	Zimt-Hautkopf
2	Cortinarius	fle0ipes	(Pers.: Fr.) Fr.	Duftender Gürtelfuss
2	Cortinarius	largus	Fr.	Blasser Schleimkopf
2	Cortinarius	nemorensis	(Fr.) Lge.	Verfärbender Schleimkopf
2	Cortinarius	rubellus	Cooke	Spitzgebuckelter Rauhkoopf
2	Cortinarius	rubicundulus	(Rea) Pears.	Rötlichfaseriger Rauhkopf
2	Cortinarius	sanguineus	(Wulf.: Fr.) Gray	Blutroter Hautkopf
2	Cortinarius	variecolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf
2	Crepidotus	applanatus	(Pers.) Kumm.	Gerieftes Stummelfüsschen
2	Crepidotus	autochthonus	Lge.	Erdbewohnendes Stummelfüsschen
2	Crepidotus	cesatii	(Rabenh.) Sacc.	Entfernblättriges Stummelfüsschen
2	Crepidotus	mollis	(Schäff. L Fr.) Staude	Gallertfleischiges Stummelfüsschen
2	Cystolepiota	seminuda	(Lasch) Bon	Behangener Mehlschirmling
2	Entoloma	undatum	(Fr.) Mos.	Dunkelblättriger Rötling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 37 PILZAUSSTELLUNG

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Flammulaster	limulatus	(Weinm.: Fr.) Watl.	Gelbblättriger Flockenschüppling
2	Gymnopilus	satur	Kühn.	Dunkelstieliger Flämmling
2	Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
2	Gymnopus	dryophilus	(Bulliard: Fr.) Murrill	Waldfreund-Rübling
2	Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
2	Hebeloma	crustuliniforme	(Bull.: Fr.) Quél.	Tongrauer Fälbling
2	Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
2	Hemimycena	cucullata	(Pers.: Fr.) Sing.	Gipsweisser Scheinhelmling
2	Hohenbuhelia	geogenia	(DC.: Fr.) Sing.	Trichterförmiger Muscheling
2	Hydropus	marginellus	(Pers.: Fr.) Sing.	Braunschneidiger Wasserfuss
2	Hydropus	subalpinus	(Höhnel) Singer	Buchenwald-Wasserfuss
2	Hygrophorus	cossus (disco0anthus)	(Sow. e0 Fr.) Fr.	Verfärbender Schneckling
2	Hygrophorus	nemoreus	(Pers.: Fr.) Fr.	Hain-Schneckling
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.: Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Hypholoma	radicosum	E.Lange	Wurzelnder Schwefelkopf
2	Inocybe	corydalina	Quél.	Grünbuckliger Risspilz
2	Inocybe	fraudans	(Britz.) Sacc.	Birnen-Risspilz
2	Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
2	Inocybe	petiginosa	(Fr.: Fr.) Gillet	Graugezonter Zwergrisspilz
2	Inocybe	terrigena	(Fr.) Kuyp.	Schuppenstieliger Risspilz
2	Inocybe	lanuginosa	(Bull. Fr.) Kumm.	Wolliger Risspilz
2	Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2	Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
2	Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
2	Lacrymaria	lacrymabunda	(Bull.: Fr.) Pat.	Tränender Samumpilz
2	Lentinellus	cochleatus	(Pers.: Fr.) Karst.	Äniszähling
2	Lentinus	torulosus	(Pers.: Fr. Lloyd	Laubholz-Knäueling
2	Lepiota	clypeolaria	(Bull.: Fr.) Kumm.	Wolliggestiefelter Schirmling
2	Lepiota	cristata	(Bolton.: Fr.) Kummer	Stink-Schirmling
2	Lepista	sordida	(Fr.) Sing.	Fleischbrauner Rötelritterling
2	Leucoagaricus	leucothites	(Vitt.) Was.	Rosablättriger Egerlingsschirmling
2	Lyophyllum	connatum	(Schum.: Fr.) Sing.	Weisser Büschelrasling
2	Lyophyllum	paelochroum	Clmç.	Lemfarbener Schwärzling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 37 PILZAUSSTELLUNG

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Macrolepiota	procera	(Scop.: Fr. Sg.	Parasol
2	Macrolepiota	rhacodes var. brun.	(Vittad.) Singer	Brauner Safranschirmling
2	Marasmiellus	ramealis	(Bull.: Fr.) Sing.	Ästchenschwindlng
2	Marasmiellus	vaillantii	(Pers.: Fr.) Sing.	Matter Zwergschwindling
2	Marasmiellus (=Micro.)	foetidus	(Sow.:Fr.) Ant. et Noord.	Stinkender Zwergschwindling
2	Marasmius	alliaceus	(Jacq.: Fr.) Fr.	Langstieliger Knoblauchschwindling
2	Marasmius	oreades	(Bolton.: Fr.) Fr.	Nelkenschwindling
2	Marasmius	torquescens	Quél.	Ledergelber Schwindling
2	Mycena	crocata	(Schrad.: Fr.) Kumm.	Safranmilchender Helmling
2	Mycena	pelianthina	(Fr.: Fr.) Quél.	Schwarzgezähnelter Helmling
2	Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
2	Mycena	renati	Quélet	Gelbstieliger Nitrat-Helmling
2	Panellus	stypticus	(Bull.: Fr.) P.Karst.	Bitterer Muschelseitling
2	Pholiota	astragalina	(Fr.) Singer	Safranroter Schüppling
2	Pholiota	flammans	(Fr.:) Kummer	Feuerschüppling
2	Pholiota	gummosa	(Lasch.: Fr.) Sing.	Strohblasser Schüppling
2	Phyllotlus	porrigens	(Pers.: Fr.) Karsten.	Ohrförmiger Weissseitling
2	Pluteus	atromarginatus	(Sing.) Kühn.	Schwarzschneidiger Dachpilz
2	Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
2	Pluteus	leonius	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Löwengelber Dachpilz
2	Pluteus	salicinus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Grauer Dachpilz
2	Psathyrella	conopilus	(Fr.: Fr.) Pears. & Dennis	Huthaarfaserling
2	Psathyrella	piluliformis	(Bull.: Fr.) Ort.	Wässeriger Faserling
2	Rhodocollybia	maculata	(Alb. et Schw. Fr.)	Gefleckter Rübling
2	Rickenella	fibula	(Bull.: Fr.) Raith.	Orangegelber Heftelnabeling
2	Ripartites	tricholoma	(Alb. & v. Schw.)	Bewimperter Filzkrempling
2	Simocybe	sumtuosa	(Ort.) Sing.	Üppiger Olivschnitzling
2	Tricholoma	sulfureum	(Bull.: Fr.) Kumm.	Schwefel-Ritterling
2	Tricholoma	ustale	(Fr.: Fr.) Kumm.	Brandiger Ritterling
2	Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
2	Tricholomopsis	decora	(Fr.) Sing.	Olivgelber Holzritterling
2	Xerula	melanotricha	Dörfelt	Weisstannen-Wurzelrübling
3	Lactarius	camphoratus	(Bull.: Fr.) Fr.	Kamfermilchling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 37 PILZAUSSTELLUNG

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
3	Lactarius	deterrimus	Gröger	Fichtenreizker
3	Lactarius	evosmus	Kühner et Romagnesi	Blasser Zonen-Milchling
3	Lactarius	helvus	(Fr.: Fr.) Fr.	Maggipilz
3	Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
3	Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
3	Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
3	Lactarius	pyrogalus	(Bull.: Fr.) Fr.	Scharfer Hasel-Milchling
3	Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
3	Lactarius	trivialis	(Fr.: Fr.) Fr.	Nordischer Milchling
3	Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
3	Lactarius	vietus	(Fr.) Fr.	Grünfleckender Milchling
3	Lactarius	volemus	(Fr.: Fr.) Fr.	Brätling
3	Russula	badia	Quél.	Zedernholztäublig
3	Russula	chloroides	(Krombh.) Bres.	Schmalblättriger Weisstäubling
3	Russula	curtipes	Moell. & Schaeff.	Kurzstieliger Ledertäubling
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
3	Russula	delica	Fr.	Gemeiner Weisstäubling
3	Russula	densifolia	Gill.	Dichtblättriger Schwärztäubling
3	Russula	emetica	(Schäff.: Fr.) Gray	Kirschroter Speitäubling
3	Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
3	Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
3	Russula	fragilis	(Pers.: Fr.) Fr.	Wechselfarbiger Speitäubling
3	Russula	fragrantissima	Rom.	Starkduftender Stinktäubling
3	Russula	grisea	Fr.	Grauvioletter Reiftäubling
3	Russula	heterophylla	(Fr.) Fr.	Grüner Speisetäubling
3	Russula	luteotacta	Rea	Gelbfleckender Täubling
3	Russula	mairei	Singer	Buchen-Speitäubling
3	Russula	nauseosa	(Pers.) Fr..	Geriefter Weichtäubling
3	Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3	Russula	olivascens (postia)	(Pers.: Fr.) Bres.	Olivgrüner Täubling
3	Russula	paludosa	Britz.	Apfeltäubling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 37 PILZAUSSTELLUNG

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
3	Russula	pseudointegra	Arn. & Gor.	Ockerblättriger Zinnobertäubling
3	Russula	rosea (=lepida)	Pers.	Harter Zinnober-Täubling
3	Russula	spagnophila	Kauffmann (ss. Bon)	Milder Tormoos-Täubling
3	Russula	sororia	Fr.	Grosser Kammtäubling
3	Russula	turci	Bres.	Jodoformtäubling
3	Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
3	Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
3	Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
3	Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling
3	Russula	xerampelina	Schäff.: Fr.	Roter Heringstäubling
3	Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
4	Albatrellus	confluens	(A. & S.: Fr.) Kotl. & Pouz.	Semmelporling
4	Antrodia	serialis	(Fr.) Donk	Reihige Tramete
4	Aportiporus	biennis	(Bull.: Fr.) Sing.	Rötender Saftwirrling
4	Boletopsis	leucomelaena	(Pers.) Fayod	Grauer Russporling
4	Bondarzewia	montana	(Quél.) Singer	Bergporling
4	Cantharellus	auroa	(Batsch) Kuyp.	Duftender Gabeling, Goldfüsschen
4	Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
4	Cantharellus	cinereus	Pers. ex Fr.	Grauer Leistling
4	Cantharellus	friesii	Quél.	Fries´scher Pfifferling
4	Cantharellus	melanoxeros	Desm.	Gelbvioletter Pfifferling
4	Cerocorticum	confluens	(Fr.): Fr.) Jül & Stalp.	Zusammenfliesender Reibeisenpilz
4	Cerrena	unicolor	(Bulliard: Fr.) Murrill	Aschgrauer Langporenpilz
4	Clavariadelphus	pistilaris	(Fr.) Donk	Herkuleskeule
4	Climacocystis	borealis	(Fr.) Kotl. & Pouz.	Nordischer Porling
4	Coltricia	perennis	(L.: Fr.) Murrill	Brauner Dauerporling
4	Craterellus	cornucopioides	Pers.	Totentrompete
4	Creolophus	cirrhatus	(Pers.: Fr.) Karst.	Dorniger Stachelbart
4	Daedalea	quercina	(L. ex Fr.)	Eichenwirrling
4	Daedaleopsis	confragosa	(Bolton: Fr.) Schröter	Rötender Blätterwirrling
4	Datronia	mollis	(Sommerf.: Fr.) Donk	Weicher Resupinatporling
4	Dichomitus	campestris	(Quél.) Dom. & Orl.	Haselporling
4	Fomes	fomentarius	(L.: Fr.) Fr.	Echter Zunderschwamm

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 37 PILZAUSSTELLUNG

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
4	Fomitopsis	pinicola	(Fr.) Karst.	Rotbrauner Baumschwamm
4	Fomitopsis	officinalis	(Villars: Fr.) Bond. et Sing.	Lärchen-Baumschwamm
4	Fomitopsis	rosea	(Albertini et Schweiniz: Fr.) Karsten	Rosenroter Baumschwamm
4	Ganoderma	adspersum	(Schulz.) Donk	Wulstiger Lackporling
4	Ganoderma	carnosum	Pat.	Dunkler Lackporling
4	Ganoderma	lipsiense	(Batsch.: Pers.) Atkinson	Flacher Lackporling
4	Ganoderma	pfeifferi	Bresadola	Kupferroter Lackporling
4	Ganoderma	lucidum	(Curt.: Fr.) Karst.	Glänzender Lackporling
4	Gloeophyllum	odoratum	(Wulf.: Fr.) Imyzeki	Fencheltramete
4	Gloeoporus	dichrous	(Frie.: Fries.) Bres.	Zweifarbiger Gloeoporling
4	Hapalopilus	rutilans	(Pers.: Fr.) Karst.	Zimtfarbener Weichporling
4	Heterobasidion	annosum	(Fr.) Bref.	Wurzelschwamm
4	Hydnellum	peckii	Banker in Peck	Scharfer Korkstacheling
4	Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
4	Hydnum	repandum var. rufesc.	(Fr.) Barla	Rotgelber Stoppelpilz
4	Hymenochaeta	rubiginosa	(Dicks.: Fr.) Lév.	Rotbrauner Borstenscheibling
4	Inomidotis	fulvotingens	(Berk. et Curt.) Cash.	Braunschwarzer Rindenbecher
4	Inonotus	triqueter	(Fr.) Karsten	Kiefern-Schillerporling
4	Ischnoderma	trogii	(Fr.) Donk	Gestielter Tannen-Harzporling
4	Ischnoderma	benzoinum	(Wahl.: Fr.) Karst.	Schwarzgebänderter Harzporling
4	Ischnoderma	trogii	(Fr.) Donk	Gestielter Tannen-Harzporling
4	Laetiporus	sulfureus	Murr.	Schwefelporling
4	Lenzites	warnieri	Dur. & Mont.	Pappelblättling
4	Lenzites	betulina	(L. e0 Fr.) Fr.	Birkenblättling
4	Oligoporus	caesius	(Schrad.: Fr.) Gilb. & Ryv.	Blauer Saftporling
4	Oxiporus	populinus	(Schum.: Fr.) Donk.	Treppenförmiger Steifporling
4	Phaeolus	schweinitzii	(Fr.) Pat.	Kiefernbraunporling
4	Phellinus	nigricans	(Fries) Karst.	Schwarzer Birkenfeuerschwamm
4	Phellinus	ferruginosus	(Schrad.: Fr.) Pat.	Rostbrauner Feuerschwamm
4	Phellinus	conchatus	(Pers.: Fr.) Quél.	Muschelförmiger Feuerschwamm
4	Phellinus	hartigii	(All. & Schn.) Bond.	Tannen-Feuerschwamm
4	Phellinus	hippophaëcola	Jahn	Sanddorn-Feuerschwamm
4	Phellinus	igniarius	(L.: Fr.) Quél.	Falscher Zunderschwamm
4	Phellinus	robustus	(Karst.) Bourd. & Galz.	Eichen-Feuerschwamm

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 37 PILZAUSSTELLUNG

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
4	Phellinus	tremulae	(Bond.) Bond. & Boriss.	Espen-Feuerschwamm
4	Phellinus	trivialis	(Bres.) Kreisel	Weiden-Feuerschwamm
4	Phellinus	tuberculosus	(Baumg.) Niem.	Pflaumen-Feuerschwamm
4	Phylloporia	ribis	(Schumacher: Fr.) Ryvarden	Beeren Strauchporling
4	Physisporinus	vitreus	(Pers.: Fr.) Donk	Wässriger Eisporling
4	Piptoporus	betulinus	(Bulliard) Karsten	Birken-Hautporling
4	Polyporus	ciliatus	Fr.	Bewimperter Porling
4	Polyporus	badius	(Pers.) Schweiniz	Schwarzroter Stielporling
4	Polyporus	melanopus	(Pers.: Sw.) Fr.	Braunfuss-Porling
4	Polyporus	tuberaster	(Jacq.: Pers.) Fr.	Sklerotien-Porling
4	Pseudocraterellus	sinuosus	(Fr.: Fr.) Reid.	Krauser Leistling
4	Pycnoporellus	fulgens	(Fr.) Donk	Leuchtender Weichporling
4	Pycnoporus	cinnabarinus	(Jacq.: Fr.) Karst.	Zinnoberrote Tramete
4	Ramaria	botrytis	(Pers.: Fr.) Ricken	Hahnenkamm
4	Ramaria	flava	(Schäff.: Fr.) Quél.	Schwefelgebe Koralle
4	Ramaria	formosa	(Pers.: Fr.) Quél.	Dreifarbene Koralle
4	Ramaria	gracilis	(Pers.: Fr.) Quél.	Zierliche Koralle
4	Ramaria	stricta	(Pers.: Fr.) Quél. s. str.	Steife Koralle
4	Schizophyllum	commune	Fr. ex Fr.	Spaltblättling
4	Skeletocutis	nivea	(Jungh.) Keller	Schneeweisser Feinporling
4	Steccherinum	robustius	Dst. Bour.	Kleinsporiger Resupinatstacheling
4	Stereum	hirsutum	(Willd.: Fr.) S.F. Gray	Zottiger Schichtpilz
4	Stereum	subtomentosum	Pouzar	Samtiger Schichtpilz
4	Stereum	rameale	(Pers.: Fr.) Burt	Ästchen-Schichtpilz
4	Thelephora	palmata	Scop.: Fr.	Stinkender Warzenpilz
4	Trametes	gibbosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Buckel-Tramete
4	Trametes	versicolor	(L.: Fr.) Pilát	Schmetterlings-Tramete
4	Trichaptum	abietinum	(Fr.) Ryv.	Tannentramete
4	Trichaptum	abietinum	(Fr.) Ryv.	Tannentramete
5	Calvatia	gigantea	(Batsch:Pers.) Lloyd	Riesenbovist
5	Clathrus	ruber	Battarra: Pers.	Roter Gitterling
5	Crucibulum	laeve	(Huds.: Relh.) Kambly et al.	Tiegelteuerling
5	Geastrum	fimbriatum	Fries	Gewimperter Erdstern

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 37 PILZAUSSTELLUNG

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
5	Handkea	exipuliformis	(Scop.: Fr.) Kreisel	Beutel-Spaltporenstäubling
5	Handkea	utriformis	(Bull.: Pers.) Kreisel	Hasenstäubling
5	Lycoperdon	ericaeum	Bonorden	Heide-Stäubling
5	Lycoperdon	mammaeforme	Pers.	Flocken-Stäubling
5	Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
5	Lycoperdon	pyriforme	Schäff.: Pers.	Birnen-Stäubling
5	Phallus	impudicus	L. e0 Pers.	Stinkmorchel
5	Scleroderma	citrinum	Pers.	Dickschaliger Kartoffelbovist
5	Scleroderma	verrucosum	(Bull.: Pers.) Pers.	Dünnschaliger Kartoffelbovist
5	Vascellum	pratense	Pers.: Pers.) Kreisel	Wiesen-Stäubling
5	Vascellum	pratense	Pers.: Pers.) Kreisel	Wiesen-Stäubling
6	Calocera	viscosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Klebriger Hörnling
6	Calocera	viscosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Klebriger Hörnling
6	Pseudohydnum	gelatinosum	(Scop.: Fr.) Karst.	Zitterzahn
6	Tremiscus	helveloides	(DC: Pers.) Donk	Roter Gallerttrichterling
7	Cordyceps	ophioglossoides	(Erh. ex Fr.) Link	Zungen-Kernkeule
7	Daldinia	concentrica	(Bolt. e0 Fr.) Ces. & de Not.	Kohliger Kugelpilz
7	Diatrypella	favacea	(Fr. : Fr.) Ces. & De Not.	
7	Geoglossum	cookeianum	Nannfeld	Trockene Erdzunge
7	Hypoxylon	serpens	(Pers.ex Fries) Fr.	Gewundene Kohlenbeere
7	Hypoxylon	fragiforme	(Fr.) Fr.	Rötliche Kohlenbeere
7	Hypoxylon	multiforme	(Willd. ex Fr.) Dharne	Vielgestaltige Kohlenbeere
7	Ustulina	deusta	Swartz ex Pers.	Brandiger Krustenpilz
7	Xylaria	polymorpha	(Pers.: Fr.) Greville	Vielgestaltige Holzkeule

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

PILZE DER WOCHE 38

Russula firmula *Scharfer Glanz-Täubling*

Gattung Russula: Verletzt nicht milchend. L.-Tr. auch in der vorderen Hälfte, (gegen Schn.) mit Sphaerozysten-Nestern. Pigment oft intrazellulär. Sp. warzig, warzig-gratig, Spp. von weiss, gelb bis ocker. Mit oder ohne Dermatozystiden, z.T. mit Primordialhyphen. Hutdeckschicht ein Trichoderm, Ixotrichoderm.

Art: Hut bis 70 mm gross. Sporenpulver ocker (Sektion maculatina). Sporen 8-10 x 7-8,5 µm, isoliert stark warzig. (Einhellinger). Bei Nadelbäumen.

Bemerkung: Diese, etwas an einen Frauentäubling erinnernde Art, jedoch mit brüchigen, ockerfarbenen Lamellen und scharfem Geschmack, wir unterschiedlich punkto Sporen dokumentiert.

Russula firmula *Scharfer Glanz-Täubling*

Pilz-Fundliste der Woche 38

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	aereus	Bull.: Fr.	Schwarzhütiger Steinpilz
1	Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
1	Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1	Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
1	Boletus	radicans	Pers.: Fr.	Bitter-Röhrling
1	Boletus	satanas	Lenz	Satansröhrling
1	Chalciporus	piperatus	(Bull.: Fr.) Bat.	Pfeffer-Röhrling
1	Chroogomphus	rutilus	(Schaeff.: Fr.) O.K. Miller	Kupferroter Gelbfuss
1	Leccinum	scabrum	(Bull.: Fr.) Gray	Birkenpilz
1	Leccinum	variicolor	Walting	Verschiedenfarbiger Rauhfuss
1	Paxillus	filamentosus	Fr.	Erlen-Krempling
1	Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
1	Pulveroboletus	gentilis	(Quél.) Pouzar	Goldporiger Röhrling
1	Strobilomyces	strobilaceus	(Scop.: Fr.) Berk.	Strubelkopfröhrling
1	Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
1	Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
2	Agaricus	silvicola	(Vittad.) Sacc.	Dünnfleischiger Anis-Egerling
2	Agaricus	xanthoderma	Genev.	Karbol-Egerling
2	Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
2	Amanita	virosa	(Fr.) Bertillon	Spitzhütiger Knollenblätterpilz
2	Clitocybe	odora	Lge.	Weisser Anistrichterling
2	Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Coprinus	micaceus	(Bull.: Fr.) Fr.	Glimmertintling
2	Cortinarius	largus	Fr.	Blasser Schleimkopf
2	Cortinarius	percomis	Fr.	Würziger Schleimkopf
2	Cortinarius	purpurascens	Fr.	Purpurfleckender Klumpfuss
2	Cortinarius	semisanguineus	(Fr.)	Blutblättriger Hautkopf
2	Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2	Marasmius	alliaceus	(Jacq.: Fr.) Fr.	Langstieliger Knoblauchschwindling
2	Marasmius	oreades	(Bolton.: Fr.) Fr.	Nelkenschwindling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilz-Fundliste der Woche 38

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2	Rhodocybe	gemina	(Fr.). Kuyp. & Noord.	Würziger Tellerling
2	Rozites	caperatus	(Pers.: Fr.) P. Karst.	Zigeunerpilz
2	Tricholoma	inamoenum	(Fr.) Quél.	Lästiger Ritterling
2	Tricholoma	tigrinum	Kumm.	Tiger-Ritterling
2	Tricholoma	ustale	(Fr.: Fr.) Kumm.	Brandiger Ritterling
3	Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
3	Lactarius	quietus	(Fr.) Fr.	Eichenmilchling
3	Russula	firmula	Schäffer	Scharfer Glanz-Täubling
3	Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
4	Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
4	Cantharellus	cibarius var. amethyst.	Quél.	Lilahütiger Eierschwamm
4	Clavulina	cinereus	(Bull.: Fr.) Schröt.	Graue Koralle

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

PILZE DER WOCHE 39

Entoloma sinuatum *Riesen-Rötling*

Gattung Entoloma: Hut gewölbt, glockig bis genabelt, seltener unregelmäßig und exzentrisch, bisw. Rand eingerollt, 0,5-15 cm, sehr verschiedenfarbig, oft lebhaft (ritterlings- trichterlings-, helmlings-, seitlingsartig) Lamellen angeheftet bis breit angewachsen und herablaufend, nie ganz frei. Stiel zentral, selten exzentrisch bis lateral oder fehlend. Spp. rosa. Sp. vieleckig, isodiametrisch bis länglich, symmetrisch bis asymmetrisch.

Art: Hut bis 110 mm. Geruch mehlartig. Sporenpulver orangebraun Sporen 8-10 x 6-10 µm, 5- 6-eckig.

Bemerkung: Einer der grössten Rötlinge, mit blassoragefarbenen Lamellenschneiden. Habitus ritterlingsartig. Stark giftig.

Entoloma sinuatum *Riesen-Rötling*

Pilz-Fundliste der Woche 39

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	aereus	Bull.: Fr.	Schwarzhütiger Steinpilz
1	Boletus	appendiculatus	Schaeff.	Anhängsel-Röhrling
1	Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1	Boletus	fechtneri	Velen.	Silber-Röhrling
1	Boletus	luridus	Schäff.: Fr.	Netzstieliger Hexenröhrling
1	Boletus	queletii	Schulzer	Glattstieliger Hexenröhrling
1	Boletus	rhodopurpureus	Smotlacha	Blaufleckender Purpurröhrling
1	Boletus	satanas	Lenz	Satansröhrling
1	Chroogomphus	rutilus	(Schaeff.: Fr.) O.K. Miller	Kupferroter Gelbfuss
1	Gyroporus	castaneus	(Bull.: Fr.)	Hasen-Röhrling
1	Leccinum	scabrum	(Bull.: Fr.) Gray	Birkenpilz
1	Suillus	bovinus	(L.: Fr.) Rouss.	Kuhröhrling
1	Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
1	Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
1	Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe
2	Agaricus	silvicola	(Vittad.) Sacc.	Dünnfleischiger Anis-Egerling
2	Amanita	ceciliae	Berkeley et Broome) Bas	Riesen-Streifling
2	Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
2	Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
2	Amanita	muscaria	(L.) Hook.	Fliegenpilz
2	Amanita	porphyria	Alb. & Schw.: Fr.	Porphyrbrauner Wulstling
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Amanita	solitaria	(Vittadini) Quélet	Meergrüner Wulstling
2	Amanita	strobiliformis	(Paul.: Vitt.) Bertillon	Fransiger Wulstling
2	Armillaria	borealis	Marxm. & Korth.	Nordischer Hallimasch
2	Clitocybe	clavipes	(Pers.) Kumm.	Keulenfuss-Trichterling
2	Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
2	Clitocybe	gibba	(Pers. Fr.) Kummer	Ockerbrauner Trichterling
2	Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
2	Clitocybe	phaeophthalma	(Pers.) Kp.	Ranziger Trichterling
2	Cortinarius	camphoratus	(Fr.) Fr.	Bocks-Dickfuss
2	Cortinarius	cinnamomeus	Fr.	Zimt-Hautkopf

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 39

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Cortinarius	glaucopus	(Schäff.: Fr.)	Reihiger Klumpfuss
2	Cortinarius	hinnuleus	(Sow.) Fr.	Erdigriechender Gürtelfuss
2	Cortinarius	largus	Fr.	Blasser Schleimkopf
2	Cortinarius	praestans	(Cord.) Gill.	Schleiereule
2	Cortinarius	purpurascens	Fr.	Purpurfleckender Klumpfuss
2	Cortinarius	venetus	(Fr.). Fr.	Grüner Buchenwald-Rauhkopf
2	Cortinarius	violaceus	(L.:Fr.) Fr.	Dunkelvioletter Schleierling
2	Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
2	Entoloma	sinuatum	(Bull.: Pers.: Fr.) Kumm.	Riesen-Rötling
2	Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
2	Hygrocybe	conica	(Scopp.: Fr.) Kumm.	Kegeliger Saftling
2	Hygrophorus	eburneus	(Bulliard: Fr.) Fr.	Elfenbein-Schneckling
2	Inocybe	fraudans	(Britz.) Sacc.	Birnen-Risspilz
2	Inocybe	mixtilis	(Britz.) Sacc.	Gerandetknolliger Risspilz
2	Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2	Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
2	Leucocortinarius	bulbiger	(A. & S.: Fr.) Sing.	Knolliger Schleierritterling
2	Leucopaxillus	compactus	(Fr.) Neuhf.	Dreifarbiger Krempentrichterling
2	Macrolepiota	mastoidea	(Fr.) Sing.	Zitzenschirmling
2	Marasmius	torquescens	Quél.	Ledergelber Schwindling
2	Marasmius	wynnei	Berk. & Br.	Violetlicher Schwindling
2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2	Mycena	galericulata	(Scop.:Fr.) Gray	Rosablättriger Helmling
2	Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
2	Mycena	renati	Quélet	Gelbstieliger Nitrat-Helmling
2	Mycena	rosea	(Bull.) Gramberg	Rosa-Rettichhelmling
2	Mycena	zephirus	(Fr.: Fr.) Kumm.	Rostfleckiger Helmling
2	Rozites	caperatus	(Pers.: Fr.) P. Karst.	Zigeunerpilz
2	Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
2	Tricholoma	scalpturatum	(Fr.) Quél.	Gilbender Erd-Ritterlig
2	Tricholoma	sulphureum	(Bull.: Fr.) Kumm.	Schwefel-Ritterling
2	Tricholoma	ustale	(Fr.: Fr.) Kumm.	Brandiger Ritterling
2	Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
2	Tricholomopsis	decora	(Fr.) Sing.	Olivgelber Holzritterling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilz-Fundliste der Woche 39

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
3	Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
3	Lactarius	deterrimus	Gröger	Fichtenreizker
3	Lactarius	fulvissimus	Rom. i. Kühn. & Rom.	Orangefuchsiger Milchling
3	Lactarius	glyciosmus	(Fr.: Fr.) Fr.	Blasser Duftmilchling
3	Lactarius	hepaticus	Plowr. in Poud.	Leberbrauner Milchling
3	Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
3	Lactarius	pubescens	(Schrad.) Fries	Flaumiger Milchling
3	Lactarius	quietus	(Fr.) Fr.	Eichenmilchling
3	Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3	Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
3	Russula	aeruginea	Lindblad in Fr.	Grasgrüner Birkentäubling
3	Russula	atropurpurea	(Krombh.) Britz.	Pupurschwarzer Täubling
3	Russula	cyanoxantha fo. pel.	R. Maire.: Singer	Grüner Frauentäubling
3	Russula	decolorans	(Fr.) Fr.	Orangeroter Graustieltäubling
3	Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
3	Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
3	Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
3	Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3	Russula	puellaris	Fr.	Milder Wachstäubling
3	Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
3	Russula	violeipes	Quélet	Violettstieliger Brätlingstäubling
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
4	Clavariadelphus	pistilaris	(Fr.) Donk	Herkuleskeule
4	Cantharellus	cibarius var. ameth.	Quél.	Lilahütiger Eierschwamm
4	Cantharellus	melanoxeros	Desm.	Gelbvioletter Pfifferling
4	Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
4	Hydnum	repandum var. rufesc.	(Fr.) Barla	Rotgelber Stoppelpilz
4	Sarcodon	imbricatus	(L.: Fr.) Karst.	Habichtsstacheling
5	Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
5	Lycoperdon	pyriforme	Schäff.: Pers.	Birnen-Stäubling
5	Phallus	impudicus	L. ex Pers.	Stinkmorchel
7	Aleuria	aurantia	(Fr.) Fuckel	Gemeiner Orangebecher

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 40 PILZ-WK DER PILZKONTROLLEURINNEN UND PILZKONTROLLEURE BL

Am 1. Oktober um 8.15 Uhr trafen sich die Pilzkontrolleure vom Kanton Baselland zu ihrem alljährlichen Wiederholungskurs. Nach der Begrüssung durch den Kantonschemiker-Stellvertreter, Paul Svoboda und seine Vertreter Hansjörg Hirschi und Fritz Kumschick begann das Tagesprogramm. Dieses beinhaltete einen Pilztest, Bestimmungsübungen sowie eine Gruppe, die noch weitere Pilze suchen ging. Ein sehr gutes Mittagessen bereitete uns das Kochteam zu. Um ca. 15.30 Uhr fand die Test- und Tischbesprechung von fast 150 Pilzarten (siehe Auflistung auf den folgenden Seiten) durch Peter Baumann, Peter Buser und Kurt Minder statt.

Foto: René Naef-Biedert



PILZ-WK DER PILZKONTROLLEURINNEN UND PILZKONTROLLEURE BL

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
1	Chroogomphus	helveticus	(Singer) Moser	Filziger Gelbfuss
1	Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
1	Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
1	Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
2	Agaricus	silvicola	(Vittad.) Sacc.	Dünnfleischiger Anis-Egerling
2	Agaricus	silvaticus	Schäff.: Fr.	Echter Wald-Champignon
2	Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
2	Amanita	muscaria var. forosa	(L.) Hook.	Fliegenpilz
2	Amanita	pantherina	(DC.: Fr.) Krombh.	Pantherpilz
2	Amanita	pantherina var. abiet.	(Gilb. in Konr. & Maubl.)	Tannen-Pantherpilz
2	Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Amanita	virosa	(Fr.) Bertillon	Spitzhütiger Knollenblätterpilz
2	Clitocybe	cerussata	(Fries) P. Kummer	Ähnlich Waldfreund Trichterling
2	Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
2	Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
2	Clitocybe	odora	(Bulliard: Fr.) Kumm.	Grüner Anistrichterling
2	Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Coprinus	comatus	(Müll.: Fr.) Pers.	Schopf-Tintling
2	Coprinus	micaceus	(Bull.: Fr.) Fr.	Glimmertintling
2	Cortinarius	alboviolacea	(Pers.: Fr.) Fr.	Weissvioletter Dickfuss
2	Cortinarius	anserinus	(Vel.) Hry.	Buchen-Klumpfuss
2	Cortinarius	bolaris	(Pers.: Fr.) Fr.	Rotschuppiger Rauhkopf
2	Cortinarius	brunneus	(Pers.: Fr.) Fr.	Dunkelbrauner Gürtelfuss
2	Cortinarius	cinnamomeus	Fr.	Zimt-Hautkopf
2	Cortinarius	croceocaeruleus	(Pers.: Fr.) Fr.	Safranblauer Schleimfuss
2	Cortinarius	elegantissimus	Hry.	Prächtiger Klumpfuss
2	Cortinarius	hinnuleus	(Sow.) Fr.	Erdigriechender Gürtelfuss
2	Cortinarius	infractus	(Pers.: Fr.) Fr.	Bitterer Schleimfuss
2	Cortinarius	largus	Fr.	Blasser Schleimkopf
2	Cortinarius	malicorius	Fr.	Orangerandiger Hautkopf

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

PILZ-WK DER PILZKONTROLLEURINNEN UND PILZKONTROLLEURE BL

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Cortinarius	nanceiensis	Mr.	Gelbflockiger Schleimkopf
2	Cortinarius	odorifer	Britz	Anis-Klumpfuss
2	Cortinarius	percomis	Fr.	Würziger Schleimkopf
2	Cortinarius	rubellus	Cooke	Spitzgebuckelter Rauhkoopf
2	Cortinarius	sanguineus	(Wulf.: Fr.) Gray	Blutroter Hautkopf
2	Cortinarius	spilomeus	(Fr.: Fr.) Fr.	Kupferschuppiger Seidenkopf
2	Cortinarius	splendens	Hry.	Schöngelber Klumpfuss
2	Cortinarius	trivialis	Lge.	Natterstieliger Schleimfuss
2	Cortinarius	variecolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf
2	Cortinarius	venetus	(Fr.). Fr.	Grüner Buchenwald-Rauhkopf
2	Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
2	Entoloma	rhodopolium	(Fr.: Fr.) Kummer	Niedergedrückter Rötling
2	Entoloma	sinuatum	(Bull.: Pers.: Fr.) Kumm.	Riesen-Rötling
2	Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
2	Gymnopilus	spectabilis	(Weinm.: Fr.)	Beringter Flämmling
2	Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
2	Gymnopus	distorta	(Fr.) Quél.	Drehstieliger Rübling
2	Gymnopus	oreadoides	(Pass.) Orton	Flattriger Rübling
2	Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
2	Hebeloma	senescens	(Batsch) Berk.	Bräunender Fälbling
2	Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
2	Hygrophorus	agathosmus	(Fr.) Fr.	Wohlriechender Schneckling
2	Hygrophorus	eburneus	(Bull:. Fr.) Fr.	Elfenbein-Schneckling
2	Hygrophorus	nemoreus	(Pers.: Fr.) Fr.	Hain-Schneckling
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Inocybe	corydalina	Quél.	Grünbuckliger Risspilz
2	Inocybe	fraudans	(Britz.) Sacc.	Birnen-Risspilz
2	Inocybe	riomosa	(Bull.: Fr.) Kummer	Kegeliger Risspilz
2	Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2	Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
2	Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
2	Lentinellus	cochleatus	(Pers.: Fr.) Karst.	Äniszähling
2	Lepiota	clypeolaria	(Bull.: Fr.) Kumm.	Wolliggestiefelter Schirmling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

PILZ-WK DER PILZKONTROLLEURINNEN UND PILZKONTROLLEURE BL

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Lepiota	cristata	(Bolton.: Fr.) Kummer	Stink-Schirmling
2	Lepiota	ventriosospora	Reid	Gelbwolliger Schirmling
2	Lyophyllum	decastes	(Fr.: Fr.) Singer	Brauner Büschelrasling
2	Lyophyllum	connatum	(Schum.: Fr.) Sing.	Weisser Büschelrasling
2	Macrolepiota	mastoidea	(Fr.) Sing.	Zitzenschirmling
2	Macrolepiota	procera	(Scop.: Fr. Sg.	Parasol
2	Macrolepiota	rhacodes var.hort.	(Vittad.) Singer	Safranschirmling, Gartenform
2	Marasmius	torquescens	Quél.	Ledergelber Schwindling
2	Marasmius	wynnei	Berk. & Br.	Violetlicher Schwindling
2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2	Melanoleuca	div.		Weichritterling (div.)
2	Mycena	galericulata	(Scop.:Fr.) Gray	Rosablättriger Helmling
2	Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
2	Mycena	zephirus	(Fr.: Fr.) Kumm.	Rostfleckiger Helmling
2	Phaeolepiota	aurea	(Matt.: Fr.) Mre. ex Konr. & Maubl.	Goldfarbener Glimmerschüppling
2	Pholiota	jahnii	Tjallingii-Beukers et Bas	Pinselschüppling
2	Pholiota	lucifera	(Lasch) Quél.	Fettiger Schüppling
2	Pholiota	squarrosa	(Pers.: Fr.) Kumm.	Sparriger Schüppling
2	Rhodocollybia	butyracea	(Bull.: Fr.) Lennox	Butterrübling
2	Rhodocybe	gemina	(Fr.). Kuyp. & Noord.	Würziger Tellerling
2	Rhodocybe	melleopallens	P.D. Ort.	Honigbrauner Tellerling
2	Rozites	caperatus	(Pers.: Fr.) P. Karst.	Zigeunerpilz
2	Tricholoma	fulvum	(DC.: Fr.) Sacc.	Gelbblättriger Ritterling
2	Tricholoma	lascivum	(Fr.) Gill. ss. Lge.	Unverschämter Ritterling
2	Tricholoma	pseudonicticans	Bon	Blassfleischiger Fichtenritterling
2	Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
2	Tricholoma	scalpturatum	(Fr.) Quél.	Gilbender Erd-Ritterlig
2	Tricholoma	sciodes	(Secr.) Martin	Schärflicher Ritterling
2	Tricholoma	sejunctum	(Sow.: Fr.) Quél.	Grüngelber Ritterling
2	Tricholoma	sulphureum	(Bull.: Fr.) Kumm.	Schwefel-Ritterling
2	Tricholoma	terreum	(Schäff.:) Fr.) Kumm.	Erdritterling
2	Tricholoma	tigrinum	Kumm.	Tiger-Ritterling
2	Tricholoma	ustale	(Fr.: Fr.) Kumm.	Brandiger Ritterling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

PILZ-WK DER PILZKONTROLLEURINNEN UND PILZKONTROLLEURE BL

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Tricholoma	vaccinum	(Pers.: Fr.) Kumm.	Zottiger Ritterling
2	Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
2	Tricholomopsis	decora	(Fr.) Sing.	Olivgelber Holzritterling
2	Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3	Lactarius	aurantiacus	(Pers.: Fr.) Gray	Echter Orange-Milchling
3	Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
3	Lactarius	deterrimus	Gröger	Fichtenreizker
3	Lactarius	fulvissimus	Rom. i. Kühn. & Rom.	Orangefuchsiger Milchling
3	Lactarius	hepaticus	Plowr. in Poud.	Leberbrauner Milchling
3	Lactarius	intermedius	(Krombh.) Cke.	Grubiger Weisstannenmilchling
3	Lactarius	luridus	(Pers.: Fr.) Gray	Gewöhnlicher Violettmilchling
3	Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
3	Lactarius	pyrogalus	(Bull.: Fr.) Fr.	Scharfer Hasel-Milchling
3	Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3	Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
3	Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
3	Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3	Russula	chloroides	(Krombh.) Bres.	Schmalblättriger Weisstäubling
3	Russula	cutefracta	Cke.	Rissigrandiger Täubling
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
3	Russula	cyanoxantha fo. pel.	R. Maire.: Singer	Grüner Frauentäubling
3	Russula	delica	Fr.	Gemeiner Weisstäubling
3	Russula	emetica	(Schäff.: Fr.) Gray	Kirschroter Speitäubling
3	Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
3	Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3	Russula	queletii	Fr. in Quél.	Stachelbeertäubling
3	Russula	torulosa	Bres.	Gedrungener Täubling
4	Clavariadelphus	pistilaris	(Fr.) Donk	Herkuleskeule
4	Ganoderma	lucidum	(Curt.: Fr.) Karst.	Glänzender Lackporling
4	Hydnum	repandum var. rufesc.	(Fr.) Barla	Rotgelber Stoppelpilz
4	Laetiporus	sulfureus	Murr.	Schwefelporling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

PILZ-WK DER PILZKONTROLLEURINNEN UND PILZKONTROLLEURE BL

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
4	Piptoporus	betulinus	(Bulliard) Karsten	Birken-Hautporling
4	Ramaria	rubella	(Schäff.: Krombh.) Peter.	Rotbraune Koralle
4	Sarcodon	imbricatus	(L.: Fr.) Karst.	Habichtsstacheling
4	Sparassis	crispa	(Wulf. in Jacq.) Fr.	Krause Glucke
4	Trametes	versicolor	(L.: Fr.) Pilát	Schmetterlings-Tramete
5	Cyathus	striatus	(Huds.) ex Pers.	Striegeliger Teuerling
5	Geastrum	triplex	Jungh.	Halskrausen-Erdstern
5	Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
5	Lycoperdon	pyriforme	Schäff.: Pers.	Birnen-Stäubling
6	Tremella	mesenterica	Retz. ex Hook.	Goldgelber Zitterling
6	Tremiscus	helveloides	(DC: Pers.) Donk	Roter Gallerttrichterling
7	Bulgaria	inquinans	(Prs.:) Fries	Gemeiner Schmutzbecherling
7	Helvella	crispa	(Bull. ex St. Aman) Boud.	Herbstlorchel
7	Otidea	concinna	(L.: Fr.) Fuckel	Zitronengelber Öhrling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

PILZE DER WOCHE 41

Cortinarius variegatus *Variabler Schleimkopf*

Gattung Cortinarius, Untergattung Phlegmacium, Sektion Phlegmacium:

Art: Hut bis 100 mm. Stiel mit weissem Velum gestiefelt. Velum an der Basis nach einiger Zeit rosalila, später schwindend. Sporen 7,5-10 x 3,5-4 µm, kaum warzig.

Bemerkung: C. corruscans, C. roseolimbatus, C. variegatus haben manchmal Rosalila-Velumresten an der Stielbasis. Unterschiede bestehen durch Farbe und Sporengrösse. Die Arten dieser Sektion werden jedoch unterschiedlich interpretiert.

Cortinarius variecatus *Variabler Schleimkopf*

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 41

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	appendiculatus	Schaeff.	Anhängsel-Röhrling
1	Boletus	pulverlulentus	Opat.	Schwarzblauender Röhrling
1	Paxillus	filamentosus	Fr.	Erlen-Krempling
1	Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe
2	Clitocybula	lacerata	(Scropoli) Métrod	Fransiger Faserrübling
2	Coprinus	auricomus	Pat.	Braunhaariger Tintling
2	Cortinarius	anomalus	(Fr.: Fr.) Fr.	Braunvioletter Dickfuss
2	Cortinarius	anserinus	(Vel.) Hry.	Buchen-Klumpfuss
2	Cortinarius	atrovirens	Kalchbr.	Schwarzgrüner Klumpfuss
2	Cortinarius	camphoratus	(Fr.) Fr.	Bocks-Dickfuss
2	Cortinarius	cinnabarinus	Fr.	Zinnoberroter Wasserkopf
2	Cortinarius	cotoneus	Fr.	Olivbrauner Rauhkopf
2	Cortinarius	decipiens	(Pers.: Fr.) Fr.	Lilastieliger Wasserkopf
2	Cortinarius	delibutus	Fr.	Violettblättriger Schleimfuss
2	Cortinarius	disjungendus	Karsten	Holzfarbener Wasserkopf
2	Cortinarius	infractus	(Pers.: Fr.) Fr.	Bitterer Schleimfuss
2	Cortinarius	nanceiensis	Mr.	Gelbflockiger Schleimkopf
2	Cortinarius	olivaceofuscus	Kühn.	Hainbuchen-Hautkopf
2	Cortinarius	pseudocrassus	Joss. ex Orton	Trockener Gebirg.-Schleimkopf
2	Cortinarius	purpurascens	Fr.	Purpurfleckender Klumpfuss
2	Cortinarius	urbicus	(Fr.: Fr.) Fr.	Weiden-Dickfuss
2	Cortinarius	variecolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf
2	Cortinarius	variegatus	Bresadola	Variabler Schleimkopf
2	Cortinarius	violaceus	(L.:Fr.) Fr.	Dunkelvioletter Schleierling
2	Cortinarius	sebaceus	Fr. (= seicellus Mos. = turmalis auct. p.p.)	evtl. id. mit C. turmalis
2	Entoloma	chalylbaeum	(Pers.: Fr.) Noord.	Schwarzblauer Rötling
2	Entoloma	euchroum	(Pers.: Fr.) Donk.	Violetter Rötling
2	Entoloma	excentricum	Bres.	Marmorierter Rötling
2	Entoloma	incanum	(Fr.) Hes.	Braungrüner Rötling
2	Entoloma	indutoides var. grise.	(Ort.) Noord.	Olivrötlicher Rötling
2	Entoloma	placidum	(Fr.: Fr.) Noord.	Milder Rötling
2	Entoloma	prunuloides	(FR.) Quél.	Mehl-Rötling
2	Entoloma	rhodopolium	(Fr.: Fr.) Kummer	Niedergedrückter Rötling
2	Entoloma	serrulatum	(Fr.: Fr.) Hes.	Gesägtblättriger Rötling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 41

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Gymnopus	acervatus	(Fr.) Murrill	Büscheliger Blasssporrübling
2	Hebeloma	crustuliniforme	(Bull.: Fr.) Quél.	Tongrauer Fälbling
2	Hemimycena	mairei	(Gilb.) Sing.	Gras-Scheinhelmling
2	Hygrocybe	acutoconica	(Clements) Sing.	Spitzgebuckelter Saftling
2	Hygrocybe	calciphila	Arnolds	Kalk-Mennigsaftling
2	Hygrocybe	conica	(Scopp.: Fr.) Kumm.	Kegeliger Saftling
2	Hygrocybe	psittacina	(Schäff.: Fr.) Wünsche	Papageigrüner Saftling
2	Hypholoma	sublateritium	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf
2	Inocybe	riomosa	(Bull.: Fr.) Kummer	Kegeliger Risspilz
2	Lepiota	alba	(Bres.) Sacc.	Weisser Schirmling
2	Lepiota	cristata	(Bolton: Fr.) Kummer	Stink-Schirmling
2	Lepiota	echinella	Quél. & Bernard	Striegeliger Schirmling
2	Lepista	flaccida	(Sowerby Fries) Patouillard	Fuchsiger Rötelritterling
2	Lepista	glaucocana	(Bres.) Sing.	Blassblauer Rötelritterling
2	Leucoagaricus	leucothites	(Vitt.) Was.	Rosablättriger Egerlingsschirmling
2	Leucopaxillus	mirabilis	(Bres.) Konr. & Mbl.	Dunkler Krempenritterling
2	Macrolepiota	rhacodes var. hort.	(Vitt.) Singer	Safranschirmling, Gartenform
2	Marasmius	oreades	(Bolton.: Fr.) Fr.	Nelkenschwindling
2	Melanoleuca	grammopus	(Bulliard: Fr.) Patouillard	Rillstieliger Weichritterling
2	Mycena	aetites	(Fr.) Quélet	Graublättriger Russ-Helmling
2	Mycena	inclinata	(Fr.) Quél.	Buntstieliger Helmling
2	Nyctalis	asterophora	Fr.	Stäubender Zwitterling
2	Phaeomarasmius	erinaceus	(Fr.) Küh.	Igel-Schüppling
2	Psathyrella	multipedata	(Peck) Sm.	Büscheliger Faserling
2	Rhodocybe	melleopallens	P.D. Ort.	Honigbrauner Tellerling
2	Simocybe	rubi	(Berk.) Sing.	Breitsporiger Olivschnitzling
2	Tricholoma	batschii	Gulden ex Christ. et Noordeloons	Fastberingter Ritterling
2	Tricholoma	columbetta	(Fr.) Kumm.	Seidiger Ritterling
2	Tricholoma	fulvum	(DC.: Fr.) Sacc.	Gelbblättriger Ritterling
2	Tricholoma	lascivum	(Fr.) Gill. ss. Lge.	Unverschämter Ritterling
2	Tricholoma	pseudonictitans	Bon	Blassfleischiger Fichten-Ritterling
2	Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
2	Tricholoma	scalpturatum	(Fr.) Quél.	Gilbender Erd-Ritterlig

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 41

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Tricholoma	sulfureum	(Bull.: Fr.) Kumm.	Schwefel-Ritterling
2	Xerula	radicata	(Relhan: Fr.) Dörfelt	Schleimiger Wurzelrübling
3	Lactarius	decipiens	Quél.	Ungezonter Schwefelmilchling
3	Lactarius	fulvissimus	Rom. i. Kühn. & Rom.	Orangefuchsiger Milchling
3	Lactarius	pubescens	(Schrad.) Fries	Flaumiger Milchling
3	Lactarius	pyrogalus	(Bull.: Fr.) Fr.	Scharfer Hasel-Milchling
3	Russula	amoeolens	Romagn.	Brauner Camemberttäubling
3	Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3	Russula	cessans	Pears.	Kiefern-Weichtäubling
3	Russula	gracillima	J. Schäffer	Zierlicher Birken-Täubling
3	Russula	pectinata	(Bull.: St. Am.) Fr.	Stinkender Kammtäubling
3	Russula	queletii	Fr.	Stachelbeer-Täubling
4	Artomyces	pyxidatus	(Pers.: Fr.) Jül.	Becherkoralle
4	Boletopsis	grisea	(Peck) Boud.	Bitterer Russporling
5	Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
6	Phleogena	faginea	(Fr.: Fr.) Link	Buchen-Köpfchenträgera

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

PILZE DER WOCHE 42

Lactarius controversus *Rosascheckiger Milchling*

Gattung Lactarius: Habitus ähnlich eines Täublings, jedoch mit Milchsaft. Pigment oft membranär oder interzellular. Die Huthaut ist unterschiedlich aufgebaut. Die Hüte sind trocken oder schmierig. Die Sporen sind warzig-gratig, manchmal zebriert, rundlich oder oval. Sporenfarben von weiss bis ocker.

Art: Hut bis 200 mm. Stiel verhältnismässig sehr kurz. Sporen 5,5-7,5 x 4,5-5,5 µm, warzig-rippig.

Bemerkung: Die Art gleicht etwas an L. vellerus, hat jedoch scharfe Milch und im alter rosa getönte Lamellen. Der Aufbau der Huthaut ist ebenfalls anders. L. vellerus hat ein Trichoderm, L. controversus hat eine Ixocutis.0

Lactarius controversus *Rosascheckiger Milchling*
Foto: Markus Wilhelm

Pilz-Fundliste der Woche 42

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1	Chroogomphus	rutilus	(Schaeff.: Fr.) O.K. Miller	Kupferroter Gelbfuss
1	Gomphidius	glutinosus	(Schäff.: Fr.) Fr.	Kuhmaul
1	Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
1	Suillus	bovinus	(L.: Fr.) Rouss.	Kuhröhrling
1	Suillus	fluryi (=collinitus)	Huijsm.	Ringloser Butterpilz
1	Suillus	granulatus	(L.: Fr.) Rouss.	Körnchenröhrling
1	Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
1	Suillus	luteus	(L.: Fr.) Rouss.	Butterpilz
1	Suillus	variegatus	Sw.: Fr. Kuntze	Sandröhrling
1	Suillus	viscidus	(L.) Rouss.	Grauer Lärchenröhrling
2	Agaricus	arvensis	Schäff.: Fr.	Schaf-Champignon
2	Agaricus	silvaticus	Schäff.: Fr.	Echter Wald-Champignon
2	Agaricus	xanthoderma	Genev.	Karbol-Egerling
2	Agrocybe	cylindracea	(DC: Fr.) Mre.	Südlicher Ackerling
2	Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
2	Armillaria	ostoyae	Romagn.	Dunkler Hallimasch
2	Clitocybe	clavipes	(Pers.) Kumm.	Keulenfuss-Trichterling
2	Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
2	Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
2	Clitopilus	hobsonii	(Berk. & Br.) Ort.	Seitlings-Mehlräsling
2	Clitopilus	scyphoides	(Fr.) Sing.	Kreidiger Mehlräsling
2	Cortinarius	azureus	Fr.	Violettblauer Seidenkopf
2	Cortinarius	bataillei	(Favre es Mos.)	Orangefüssiger Hautkopf
2	Cortinarius	decipiens	(Pers.: Fr.) Fr.	Lilastieliger Wasserkopf
2	Cortinarius	evernius	(Fr.: Fr.) Fr. ss. Mos.	Rettich-Gürtelfuss
2	Cortinarius	flexipes	(Pers.: Fr.) Fr.	Duftender Gürtelfuss
2	Cortinarius	glaucopus	(Schäff.: Fr.)	Reihiger Klumpfuss
2	Cortinarius	malicorius	Fr.	Orangerandiger Hautkopf
2	Cortinarius	multiformis	Fr.	Sägeblättriger Klumpfuss
2	Cortinarius	olidus	Lge.	Gelbgegürtelter Schleimkopf
2	Cortinarius	percomis	Fr.	Würziger Schleimkopf
2	Cortinarius	praestans	(Cord.) Gill.	Schleiereule
2	Cortinarius	purpurascens	Fr.	Purpurfleckender Klumpfuss

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 42

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Cortinarius	salor	Fr.	Blauer Schleimfuss
2	Cortinarius	spilomeus	(Fr.: Fr.) Fr.	Kupferschuppiger Seidenkopf
2	Cortinarius	splendens	Hry.	Schöngelber Klumpfuss
2	Cortinarius	torvus	(Bull.: Fr.) Fr.	Wohlriechender Gürtelfuss
2	Cortinarius	traganus	Fr.	Lila-Dickfuss
2	Cortinarius	turmalis	Fr.	Rasiger Schleimkopf
2	Cortinarius	venetus	(Fr.). Fr.	Grüner Buchenwald-Rauhkopf
2	Cortinarius	violaceus	(L.:Fr.) Fr.	Dunkelvioletter Schleierling
2	Crepidotus	ehrendorferi	Hauskn. & Kris.	Aprikosenfarbenes Stummelfüsschen
2	Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
2	Entoloma	euchroum	(Pers.: Fr.) Donk.	Violetter Rötling
2	Entoloma	mougeotii	(Fr.) Hes.	Lilablauer Nabelrötling
2	Entoloma	turci	(Bres.) Mos.	Zimtbrauner Rötling
2	Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
2	Gymnopus	butyracea	(Bull.: Fr.) P. Kumm.	Butterrübling
2	Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
2	Hebeloma	sordescens	Vesterholt	Schwarzknolliger Fälbling
2	Hohenbuhelia	mastrucata	(Fr.: Fr.) Sing.	Pelz-Muscheling
2	Hygrocybe	conica	(Scopp.: Fr.) Kumm.	Kegeliger Saftling
2	Hygrocybe	fuscescens	(Bres.) Ort. & Watl.	Bräunlicher Ellerling
2	Hygrophorus	agathosmus	(Fr.) Fr.	Wohlriechender Schneckling
2	Hygrophorus	cossus (discoxanthus)	(Sow. ex Fr.) Fr.	Verfärbender Schneckling
2	Hygrophorus	eburneus	(Bull:. Fr.) Fr.	Elfenbein-Schneckling
2	Hygrophorus	poetarum	Heim	Isabell-Schneckling
2	Hygrophorus	pudorinus	(Fr.) Fr.	Orange-Schneckling
2	Hygrophorus	pustulatus	(Fr.) Fr.	Schwarzpunktierter Schneckling
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Inocybe	cincinnata	(Fr.:Fr.) Quel.	Braunvioletter Risspilz
2	Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
2	Inocybe	geophylla var. lilacina	(Peck.) Gill.	Lilastieliger Risspilz
2	Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
2	Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
2	Lepiota	rufipes	Morgan	Glatthütiger Schirmling
2	Lepista	densifolia	(Favre) Sing.	Dichtblättriger Rötelritterling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilz-Fundliste der Woche 42

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Lepista	flaccida	(Sowerby Fries) Patouillard	Fuchsiger Rötelritterling
2	Lepista	glaucocana	(Bres.) Sing.	Blassblauer Rötelritterling
2	Lepista	nuda	(Bull.: Fr.) Cooke	Violetter Rötelritterling
2	Lyophyllum	loricatum	(Fr.) Kühn.	Gepanzerter Rasling
2	Macrolepiota	rhacodes var. brunnea	(Vittad.) Singer	Brauner Safranschirmling
2	Marasmius	wynnei	Berk. & Br.	Violetlicher Schwindling
2	Mycena	pseudopicta	(Lge) Kühn.	Rauchgrauer Gras-Helmling
2	Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
2	Mycena	rosea	(Bull.) Gramberg	Rosa-Rettichhelmling
2	Mycena	rosella	(Fr.: Fr.) Kumm.	Rosa-Helmling
2	Mycena	leptophylla	(Peck) Sacc.	Aprikosenfarbener Helmling
2	Mycenella	bryophylla	(Vogl.) Sing.	Wurzelnder Samthelmling
2	Mycenella	rubropunctata	Boekh.	Heller Samthelmling
2	Omphalina	discorosea	(Pil.) Her. & Kotl.	Rosablättriger Holznabeling
2	Ossicaulis	lignatilis	(Pers.: Fr.) Redh.	Bepuderter Weinfass-Holzritterling
2	Pholiota	adiposa	(Fr.) Kumm.	Schleimiger Schüppling
2	Pluteus	aurantiorugosus	(Trog) Saccardo	Orangeroter Dachpilz
2	Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
2	Pluteus	umbrosus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Schwarzflockiger Dachpilz
2	Psathyrella	spadicea	(Schäff.) Sing.	Schockoladenbrauner Faserling
2	Pseudoclitocybe	cyathiformis	(Bull.) Sing.	Kaffebrauner Gabeltrichterling
2	Rozites	caperatus	(Pers.: Fr.) P. Karst.	Zigeunerpilz
2	Simocybe	coniophora	(Romagn.) Walt.	Kellerschwamm-Olivschnitzling
2	Stropharia	caerulea	Kreisel	Blauer Träuschling
2	Tricholoma	atrosquamosum	(Chev.) Sacc.	Schwarzschuppiger Ritterling
2	Tricholoma	columbetta	(Fr.) Kumm.	Seidiger Ritterling
2	Tricholoma	lascivum	(Fr.) Gill. ss. Lge.	Unverschämter Ritterling
2	Tricholoma	pseudonicticans	Bon	Blassfleischiger Fichtenritterling
2	Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
2	Tricholoma	scalpturatum	(Fr.) Quél.	Gilbender Erd-Ritterlig
2	Tricholoma	sejunctum	(Sow.: Fr.) Quél.	Grüngelber Ritterling
2	Tricholoma	terreum	(Schäff.:) Fr.) Kumm.	Erdritterling
2	Tricholoma	vaccinum	(Pers.: Fr.) Kumm.	Zottiger Ritterling
2	Tricholoma	virgatum	(Fr.: Fr.) Kumm.	Brennender Ritterling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilz-Fundliste der Woche 42

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
3	Lactarius	controversus	(Pers.: Fr.) Fr.	Rosascheckiger Milchling
3	Lactarius	glyciosmus	(Fr.: Fr.) Fr.	Blasser Duftmilchling
3	Lactarius	picinus	Fr.	Pechschwarzer Milchling
3	Lactarius	pubescens	(Schrad.) Fries	Flaumiger Milchling
3	Lactarius	rufus	(Scop.: Fr.) Fr.	Rotbrauner Milchling
3	Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3	Lactarius	scrobiculatus	(Scop.: Fr.) Fr.	Grubiger Fichtenmilchling
3	Russula	badia	Quél.	Zedernholztäublig
3	Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3	Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	queletii	Fr.	Stachelbeer-Täubling
4	Cantharellus	friesii	Quél.	Fries´scher Pfifferling
4	Cantharellus	melanoxeros	Desm.	Gelbvioletter Pfifferling
4	Cantharellus	tubaeformis	Fr.	Durchbohrter Leistling
4	Clavariadelphus	pistilaris	(Fr.) Donk	Herkuleskeule
4	Craterellus	cornucopioides	Pers.	Totentrompete
4	Daedalea	quercina	(L. ex Fr.)	Eichenwirrling
4	Meripilus	giganteus	(Pers.: Fr.) Karst.	Riesenporling
4	Polyporus	brumalis	Pers.: Fr.	Winterporling
5	Handkea	exipuliformis	(Scop.:Fr.) Kreisel	Beutel-Spaltporenstäubling
5	Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
5	Lycoperdon	pyriforme	Schäff.: Pers.	Birnen-Stäubling
6	Pseudohydnum	gelatinosum	(Scop.: Fr.) Karst.	Zitterzahn
7	Gyromitra	Infula	(Bres.) Kreisel	Bischofsmütze
7	Helvella	atra	Holmsk.: Fr.	Schwarze Lorchel
7	Helvella	crispa	(Bull. ex St. Aman) Boud.	Herbstlorchel
7	Helvella	elastica	Boud.	Elastische Lorchel
7	Helvella	lacunosa	(Pers.) O. Kuntze	Grubenlorchel
7	Leotia	lubrica	(Fr.) Karst.	Gemeines Gallertkäppchen
7	Xylaria	polymorpha	(Pers.: Fr.) Greville	Vielgestaltige Holzkeule

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

PILZE DER WOCHE 43

Clitocybe inornata *Spindelsporiger Trichterling*

Gattung Clitocybe: Fruchtkörper ± fleischig, Lamellen dünn, breit angewachsen bis stark herablaufend. Hut von konvex bis alt oft stark trichterig niedergedrückt, bisw. fast genabelt. Stiel nicht knorpelig (wie etwa Collybia), aber oft ± berindet (grobfaserig). Ohne Velum und Ring. Auf Erde. Mindestens 10 Arten ± giftig (Muscarin). Spp. weiß bis crème oder rosa, glatt, nicht amyloid, nicht cyanophil.

Art: Hut bis 100 mm, nicht hygrophan. Fleisch weiss, Geruch unangenehm, ranzig. Sporen 7-9 x 2,5-3,5 µm.

Bemerkung: Dieser Trichterling kennt man an der Grösse, den jung konvexem Hut, dem gerippten Hutrand und die spindelige Form der Sporen.

Clitocybe inornata *Spindelsporiger Trichterling*



Pilz-Fundliste der Woche 43

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Gomphidius	glutinosus	(Schäff.: Fr.) Fr.	Kuhmaul
1	Strobilomyces	strobilaceus	(Scop.: Fr.) Berk.	Strubelkopfröhrling
1	Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
2	Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
2	Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
2	Amanita	junquillea	Quélet	Narzissengelber Wulstling
2	Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
2	Amanita	vaginata	(Bull.) Vitt.	Grauer Scheidenstreifling
2	Armillaria	borealis	Marxm. & Korth.	Nordischer Hallimasch
2	Armillaria	tabescens	(Scopoli Fries) Dennis et al.	Ringloser Hallimasch
2	Calocybe	constricta	(Fr.: Fr.) Kühn. ex Bon	Gegürtelter Schönkopf
2	Chamaemyces	fracidus	(Fr.) Donk	Fleckender Schmierschirmling
2	Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
2	Clitocybe	inornata	(Sow.) Gill.	Spindelsporiger Trichterling
2	Clitocybe	metachroa	(Fr.) Kumm.	Staubfüssiger Trichterling
2	Coprinus	comatus	(Müll.: Fr.) Pers.	Schopf-Tintling
2	Cortinarius	anserinus	(Vel.) Hry.	Buchen-Klumpfuss
2	Cortinarius	azureovelatus	Orton	Blauberandeter Seidenkopf
2	Cortinarius	caesiocanescens	(Mos.) Kühm. & Rom.	Violettgrauer Klumpfuss
2	Cortinarius	caninus	(Fr.: Fr.)	Rostfuchsiger Dickfuss
2	Cortinarius	cinnabarinus	Fr.	Zinnoberroter Wasserkopf
2	Cortinarius	cinnamomeus	Fr.	Zimt-Hautkopf
2	Cortinarius	cotoneus	Fr.	Olivbrauner Rauhkopf
2	Cortinarius	delibutus	Fr.	Violettblättriger Schleimfuss
2	Cortinarius	elegantissimus	Hry.	Prächtiger Klumpfuss
2	Cortinarius	emolitus	Fr. (s.str.)	Weichstieliger Schleimfuss
2	Cortinarius	epipoleus	Fr.	Stahlgrauer Kleinspor-Schleimfuss
2	Cortinarius	evernius	(Fr.: Fr.) Fr. ss. Mos.	Rettich-Gürtelfuss
2	Cortinarius	haasii	Moser	Violettstieliger Amethyst-Klumpfuss
2	Cortinarius	hinnuleus	(Sow.) Fr.	Erdigriechender Gürtelfuss
2	Cortinarius	infractus	(Pers.: Fr.) Fr.	Bitterer Schleimfuss
2	Cortinarius	melanotus	Kalchbr.	Braunnetziger Rauhkopf
2	Cortinarius	odorifer	Britz	Anis-Klumpfuss

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilz-Fundliste der Woche 43

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Cortinarius	olidus	Lge.	Gelbgegürtelter Schleimkopf
2	Cortinarius	percomis	Fr.	Würziger Schleimkopf
2	Cortinarius	pseudosulphureus	Hry. ex Ort.	Grünlings-Klumpfuss
2	Cortinarius	purpureus	(Bulliard ex Pers.: Fr.) Fuckel	Purpurroter Hautkopf
2	Cortinarius	russeus	Henry ex. Henry	Rötlicher Schleimkopf
2	Cortinarius	semisanguineus	(Fr.)	Blutblättriger Hautkopf
2	Cortinarius	torvus	(Bull.: Fr.) Fr.	Wohlriechender Gürtelfuss
2	Cortinarius	traganus	Fr.	Lila-Dickfuss
2	Cortinarius	varius	Fr.	Ziegelgelber Schleimkopf
2	Cortinarius	venetus	(Fr.). Fr.	Grüner Buchenwald-Rauhkopf
2	Cystoderma	amiantinum	(Scop.: Fr.) Fayod	Amiant-Körnchenschirmling
2	Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
2	Gymnopus	buthyracea v. asema	(Fr.: Fr.) Quél.	Horngrauer Butterrübling
2	Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
2	Gymnopus	distorta	(Fr.) Quél.	Drehstieliger Rübling
2	Gymnopus	erytropus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Rotstieliger Rübling
2	Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
2	Hebeloma	sordescens	Vesterholt	Schwarzknolliger Fälbling
2	Hohenbuhelia	geogenia	(DC.: Fr.) Sing.	Trichterförmiger Muscheling
2	Hygrophorus	chrysodon	(Batsch.: Fr.) Fr	Goldzahn-Schneckling
2	Hygrophorus	cossus (discoxanthus)	(Sow. ex Fr.) Fr.	Verfärbender Schneckling
2	Hygrophorus	eburneus	(Bull:. Fr.) Fr.	Elfenbein-Schneckling
2	Hygrophorus	eburneus	(Bulliard: Fr.) Fr.	Elfenbein-Schneckling
2	Hygrophorus	penarius	Fr.	Trockener Schneckling
2	Hygrophorus	poetarum	Heim	Isabell-Schneckling
2	Hygrophorus	pudorinus	(Fr.) Fr.	Orange-Schneckling
2	Hygrophorus	pustulatus	(Fr.) Fr.	Schwarzpunktierter Schneckling
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Hypholoma	capnoides	(Fr.: Fr.) Kummer	Rauchblättriger Schwefelkopf
2	Hypholoma	sublateritium	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf
2	Inocybe	fraudans	(Britz.) Sacc.	Birnen-Risspilz
2	Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2	Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
2	Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilz-Fundliste der Woche 43

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Lacrymaria	lacrymabunda	(Bull.: Fr.) Pat.	Tränender Samumpilz
2	Lepista	flaccida	(Sowerby Fries) Patouillard	Fuchsiger Rötelritterling
2	Lepista	glaucocana	(Bres.) Sing.	Blassblauer Rötelritterling
2	Lepista	nuda	(Bull.: Fr.) Cooke	Violetter Rötelritterling
2	Lepista	sordida	(Fr.) Sing.	Fleischbrauner Rötelritterling
2	Leucoagaricus	badhamii	(Berkeley et Broome) Singer	Anlaufender Egerlingsschirmling
2	Lyophyllum	decastes	(Fr.: Fr.) Singer	Brauner Büschelrasling
2	Lyophyllum	loricatum	(Fr.) Kühn.	Gepanzerter Rasling
2	Macrolepiota	mastoidea	(Fr.) Sing.	Zitzenschirmling
2	Lyophyllum	paelochroum	Clmç.	Lemfarbener Schwärzling
2	Macrolepiota	rhacodes v. brunnea	(Vittad.) Singer	Brauner Safranschirmling
2	Macrolepiota	rickenii	rickenii	Spitzwarziger Riesenschirmling
2	Melanoleuca	pseudorasilis	(Bon) Bon	Trichterlings- Weichritterling
2	Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
2	Mycena	polygramma	(Bull.: Fr.) Gray	Rillstieliger Helmling
2	Rhodocollybia	butyracea	(Bull.: Fr.) Lennox	Butterrübling
2	Rozites	caperatus	(Pers.: Fr.) P. Karst.	Zigeunerpilz
2	Tricholoma	atrosquamosum	(Chev.) Sacc.	Schwarzschuppiger Ritterling
2	Tricholoma	batschii	Gulden ex Christ. et Noordeloons	Fastberingter Ritterling
2	Tricholoma	columbetta	(Fr.) Kumm.	Seidiger Ritterling
2	Tricholoma	lascivum	(Fr.) Gill. ss. Lge.	Unverschämter Ritterling
2	Tricholoma	orirubens	Quél.	Rötender Ritterling
2	Tricholoma	portensosum	(Fr.) Quél.	Schwarzfaseriger Ritterling
2	Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
2	Tricholoma	scalpturatum	(Fr.) Quél.	Gilbender Erd-Ritterlig
2	Tricholoma	sulphureum	(Bull.: Fr.) Kumm.	Schwefel-Ritterling
2	Tricholoma	umbonatum	Lge. ex Clç. & Bon	Buckliger Ritterling
2	Tricholomopsis	decora	(Fr.) Sing.	Olivgelber Holzritterling
2	Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
3	Lactarius	acris	(Bolt.: Fr.) Gray	Rosaanlaufender Milchling
3	Lactarius	aurantiacus	(Pers.: Fr.) Gray	Echter Orange-Milchling
3	Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
3	Lactarius	deterrimus	Gröger	Fichtenreizker
3	Lactarius	intermedius	(Krombh.) Cke.	Grubiger Weisstannenmilchling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilz-Fundliste der Woche 43

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
3	Lactarius	picinus	Fr.	Pechschwarzer Milchling
3	Lactarius	quietus	(Fr.) Fr.	Eichenmilchling
3	Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3	Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
3	Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
3	Russula	faginea	Romagn.	Buchen-Heringstäubling
3	Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
3	Russula	illota	Romagn.	Morsetäubling
3	Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	queletii	Fr. in Quél.	Stachelbeertäubling
3	Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
3	Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
4	Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
4	Cantharellus	tubaeformis	Fr.	Durchbohrter Leistling
4	Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
4	Ramaria	sanguinea	(Pers.) Quélet	Blutrotfleckende Koralle
4	Ramaria	stricta	(Pers.: Fr.) Quél. s. str.	Steife Koralle
4	Telephora	terrestris	Fr.	Fächerförmiger Erdwarzenpilz
5	Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
5	Lycoperdon	pyriforme	Schäff.: Pers.	Birnen-Stäubling
7	Otidea	alutacea	(Pers.: Fr.) Sacc.	Lederbrauner Öhrling
7	Geoglossum	cookeianum	Nanfeldt	Trockenen Erdzunge

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

SCHLUSSBUMMEL

Das Ziel, den Schlussbummel auf einer Höhe von 600 m durchzuführen ging dieses Jahr gänzlich daneben. Ausgerechnet am 28. Oktober (Winterbeginn) meldete sich dieser mit ganzer Kraft, hatte es doch in unserem Zielgebiet über 20 cm Schnee. Das neue Ziel, der Birs entlang ca. auf 300 m Höhe ohne Schnee, jedoch mit starker Bise überraschte uns doch noch mit einigen Pilzen. Nach einem Zwischenstopp, der hauptsächlich zur Aufwärmung diente, kehrten wir zum Ausgangspunkt zurück, wo uns Markus Wilhelm die Pilzfunde erklärte. Das anschliessende Nachtessen im Nepomuk in Dornach rundete den traditionellen Anlass doch noch zu einem guten Abschluss. Der Organisator dankt allen TelnemerInnen für das Mitmachen. Die Pilzliste befindet sich auf der Folgeseite.

Galerina clavata
Entferntblättriger Moos-Häubling



PILZE DER WOCHE 44 SCHLUSSBUMMEL

Galerina clavata *Entferntblättriger Moos-Häubling*

Gattung Galerina: Kleine, meist zarte, ocker- bis rostbraune Frkp. mit glockigem, kegeligem bis flach kegelig- oder halbkugelig-konvexem Hut, Rand und oft bis zur Mitte durchscheinend gerieft, trocken bis schmierig. Mit oder ohne Velum (bisw. ringartig faserig bis häutig). Huthaut aus radial angeordneten Hyphen. Sp. glatt bis warzig (und dann meist mit Plage), selten mit Keimporus, dextrinoid, cyanophil. Mit Cheilo- und bisw. auch Pleurozystiden (schlauchförmig, bauchig, spindelig, wenige metuloid, häufig mit schnabelartigem Fortsatz, der bisw. kopfig endet). Manche Arten auch mit ähnlichen Dermato- und Caulozystiden Spp. rostgelb bis rostbraun.

Art: Hut bis 20 mm. Stiel bis 7 x 1-2 mm. Im moosigen Grasland. Sporen 10-15 x 6-7 µm, 4-sporig, schwach warzig. Cheiozystiden kopfig. Kopf bis 10 µm, mit Caulozystiden.

Bemerkung: Die schwach warzigen Sporen und dessen Grösse sowie die stark kopfigen Cheilozystiden bilden wichtige Hinweise für die Bestimmung.

PILZ-FUNDLISTE DER WOCHE 44 SCHLUSSBUMMEL

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Armillaria	mellea	(Val.: Fr.) Kummer	Honiggelber Hallimasch
2	Clitocybe	glareosa	Röllin et Monthoux	Kiesliebender Trichterlin
2	Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
2	Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
2	Coprinus	comatus	(Müll.: Fr.) Pers.	Schopf-Tintling
2	Coprinus	micaceus	(Bull.: Fr.) Fr.	Glimmertintling
2	Coprinus	picaceus	(Bull.: Fr.) Gray	Specht-Tintling
2	Galerina	clavata	(Velen.) Kühner	Entferntblättriger Moos-Häubling
2	Hebeloma	longicaudum	(Pers.: Fr.) Kumm.	Langstieliger Fälbling
2	Hebeloma	mesophaeum	(Pers.: Fr.) Quélet	Dunkelscheibiger Fälbling
2	Hygrocybe	conica	(Scopp.: Fr.) Kumm.	Kegeliger Saftling
2	Hygrocybe	virginea	(Wulfen: Fr.) Orton et Watling	Jungfern-Ellerling
2	Hygrophorus	eburneus	(Bulliard: Fr.) Fr.	Elfenbein-Schneckling
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Hypholoma	sublateritium	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf
2	Inocybe	fuscidula	Vel.	Braunstreifiger Risspilz
2	Inocybe	geophylla var. lilacina	(Peck.) Gill.	Lilastieliger Risspilz
2	Lepista	sordida	(Fr.) Sing.	Fleischbrauner Rötelritterling
2	Mycena	flavoalba	(Fr.) Quél.	Zitronengelber Helmling
2	Panellus	stypticus	(Bull.: Fr.) P.Karst.	Bitterer Muschelseitling
2	Schizophyllum	commune	Fr.: Fr.	Gemeiner Spaltblättling
2	Stropharia	coronilla	(Bull.: Fr.) Quél.	Krönchenträuschling
2	Tricholoma	cingulatum	(Ahnfelt) Jacobatsch	Beringter Erdritterling
2	Tricholoma	terreum	(Schäff.:) Fr.) Kumm.	Erdritterling
3	Lactarius	pubescens	(Schrad.) Fries	Flaumiger Milchling
3	Lactarius	pyrogalus	(Bull.: Fr.) Fr.	Scharfer Hasel-Milchling
4	Fomitopsis	pinicola	(Fr.) Karst.	Rotbrauner Baumschwamm
4	Hapalopilus	rutilans	(Pers.: Fr.) Karst.	Zimtfarbener Weichporling
4	Schizophyllum	commune	Fr. ex Fr.	Spaltblättling
4	Stereum	hirsutum	(Willd.: Fr.) S.F. Gray	Zottiger Schichtpilz
6	Auricularia	auricula-judae	(Bull. ex St. Am.) Wettst.	Judasohr
6	Auricularia	mesenterica	Dicks.: Fr.	Gezonter Ohrlappenpilz
7	Daldinia	concentrica	(Bolt. ex Fr.) Ces. & de Not.	Kohliger Kugelpilz

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



Cheilozystiden von Galerina clavate

Sporen von Calerina clavata



Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

PILZE DER WOCHE 45

Tricholoma aurantium *Orangeroter Ritterling*

Gattung Tricholoma: Fleischige, meist mittelgroße bis große Arten, nie hygrophan. Lamellen ausgebuchtet oder abgerundet angewachsen. Stiel nicht berindet, mit oder ohne Velum, (bisw. ringförmig). Fast stets mit Schnallen. Huthaut hyphig. Auf Erde. Spp. weiß, nicht amyloid, acyanophil oder schwach cyanophil.

Art: Hut bis 100 mm, die Huthaut ist feucht deutlich schmierig. Der Stiel hat keinen Ring, jedoch orange flockig gegürtelt. Fleisch weiss, Geruch nach Mehl, Sporen 4,5-5,5 x 4-5 µm.

Bemerkung: Die Hutfarbe, der Mehlgeruch und den orange genatterten Stiel kennzeichnen diesen Pilz gut.

Tricholoma aurantium *Orangeroter Ritterling*
Foto: Markus Wilhelm

Pilz-Fundliste der Woche 45

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1	Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
2	Amanita	muscaria	(L.) Hook.	Fliegenpilz
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Armillaria	mellea	(Val.: Fr.) Kummer	Honiggelber Hallimasch
2	Camarophyllus	pratensis	(Pers.: Fries) Kumm.	Wiesen-Ellerling
2	Clitocybe	cerussata	(Fries) P. Kummer	Ähnlich Waldfreund Trichterling
2	Clitocybe	metachroa	(Fr.) Kumm.	Staubfüssiger Trichterling
2	Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
2	Clitocybe	fragrans	(With.) Kumm.	Dufttrichterling
2	Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
2	Clitocybe	phyllophila	(Pers.) Kumm.	Bleiweisser Trichterling
2	Coprinus	atramentarius	(Bull.:Fr.) Fr.	Falten-Tintling
2	Cortinarius	torvus	(Bull.: Fr.) Fr.	Wohlriechender Gürtelfuss
2	Cortinarius	brunneus	(Pers.: Fr.) Fr.	Dunkelbrauner Gürtelfuss
2	Cortinarius	cagei	Melot	Zweifarbiger Wasserkopf
2	Cortinarius	cereifolius	(Moser) Moser	Wachsblättriger Klumfuss
2	Cortinarius	disjungendus	Karsten	Holzfarbener Wasserkopf
2	Cortinarius	emolitus	Fr. (s.str.)	Weichstieliger Schleimfuss
2	Cortinarius	hinnuleus	(Sow.) Fr.	Erdigriechender Gürtelfuss
2	Cortinarius	variecolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf
2	Cortinarius	caninus	(Fr.: Fr.)	Rostfuchsiger Dickfuss
2	Cystoderma	amiantinum	(Scop.: Fr.) Fayod	Amiant-Körnchenschirmling
2	Cystoderma	granulosum	(Batsch) Fayod	Rostroter Körnchenschirmling
2	Entoloma	rhodopolium	(Fr.: Fr.) Kummer	Niedergedrückter Rötling
2	Gymnopus	maculata	(Alb. et Schw. Fr.)	Gefleckter Rübling
2	Hygrocybe	virginea	(Wulfen: Fr.) Orton et Watling	Jungfern-Ellerling
2	Hygrophorus	agathosmus	(Fr.) Fr.	Wohlriechender Schneckling
2	Hygrophorus	chrysodon	(Batsch.: Fr.) Fr	Goldzahn-Schneckling
2	Hygrophorus	hyacinthinus	Quél.	Hyazinthen-Schneckling
2	Hygrophorus	pustulatus	(Fr.) Fr.	Schwarzpunktierter Schneckling
2	Hypholoma	capnoides	(Fr.: Fr.) Kummer	Rauchblättriger Schwefelkopf
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Hypholoma	sublateritium	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilz-Fundliste der Woche 45

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
2	Inocybe	terrigena	(Fr.) Kuyp.	Schuppenstieliger Risspilz
2	Inocybe	whitei	(Berk .et Br.) Sacc.	Weissrosa Risspilz
2	Lentinellus	cochleatus	(Pers.: Fr.) Karst.	Äniszähling
2	Lepista	nuda	(Bull.: Fr.) Cooke	Violetter Rötelritterling
2	Lyophyllum	connatum	(Schum.: Fr.) Sing.	Weisser Büschelrasling
2	Marasmiellus	perforans	(Hofmann: Fries) Antonin er Noord.	Nadel-Zwergschwindling
2	Marasmius	oreades	(Bolton.: Fr.) Fr.	Nelkenschwindling
2	Mycena	flavoalba	(Fr.) Quél.	Zitronengelber Helmling
2	Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
2	Pseudoclitocybe	cyathiformis	(Bull.) Sing.	Kaffebrauner Gabeltrichterling
2	Stropharia	aeruginosa	(Curtis:) Fr./Quél.	Grünspansträuschling
2	Tricholoma	aurantium	(Schäff.: Fr.) Rick.	Orangeroter Ritterling
2	Tricholoma	atrosquamosum	(Chev.) Sacc.	Schwarzschuppiger Ritterling
2	Tricholoma	scalpturatum	(Fr.) Quél.	Gilbender Erd-Ritterlig
2	Tricholoma	caligatum	(Viv.) Rick.	Krokodil-Ritterling
2	Tricholoma	columbetta	(Fr.) Kumm.	Seidiger Ritterling
2	Tricholoma	sciodes	(Secr.) Martin	Schärflicher Ritterling
2	Tricholoma	sulphureum	(Bull.: Fr.) Kumm.	Schwefel-Ritterling
2	Tricholoma	terreum	(Schäff.:) Fr.) Kumm.	Erdritterling
3	Lactarius	badiosanguineus	Kühn & Rom.	Braunroter Milchling
3	Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
3	Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	queletii	Fr. in Quél.	Stachelbeertäubling
3	Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
4	Cantharellus	tubaeformis	Fr.	Durchbohrter Leistling
4	Oligoporus	floriformis	(Quél.) Gilb & Ryv.	Fächerförmiger Saftporling
4	Ramaria	sanguinea	(Pers.) Quélet	Blutrotfleckende Koralle
4	Sarcodon	imbricatus	(L.: Fr.) Karst.	Habichtsstacheling
5	Calvatia	utriformis	(Bul.: Pers.:) Jaap	Hasenbovist
5	Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
5	Vascellum	pratense	Pers.: Pers.) Kreisel	Wiesen-Stäubling
7	Bulgaria	inquinans	(Prs.:) Fries	Gemeiner Schmutzbecherling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

PILZE DER WOCHE 46

Psathyrella multipedata *Büscheliger Faserling*

Gattung psathyrella: Meist gebrechliche Arten mit halbkugeligem bis kegelig-glockigem, seltener konvexem, faserschuppigem bis kahlem Hut, mit oder ohne Velum (behangen oder nicht). Lamellen nicht fleckig (Sporen gleichzeitig reifend!). Mit Keimporus. Zystiden ballon-, birnen-, flaschenförmig bis lanzettlich, bisw. dickwandig und mit Kristallen. Spp. schwarzbraun bis schwarz oder mit fleischbräunlichem Ton. Sp. meist glatt, nur Sektion Lacrimaria rauh.

Art: Hut bis 25 mm, hygrophan, geruchlos. Sporen 7-8,5 x 4-5 µm. mit Keimporus, Cheilocystiden flaschenförmig mit langem Hals, HDS hymeniform.

Bemerkung: Kaum eine andere Psathyrella hat eine derart büschelige Wachstumsform. Vorkommen oft in Parks und Gärten.

Psathyrella multipedata *Büscheliger Faserling*

Pilz-Fundliste der Woche 46

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Chroogomphus	rutilus	(Schaeff.: Fr.) O.K. Miller	Kupferroter Gelbfuss
1	Suillus	collinitus	Fr. ss. Flury, Mos.	Ringloser Butterröhrling
2	Armillaria	mellea	(Val.: Fr.) Kummer	Honiggelber Hallimasch
2	Clitocybe	fragrans	(With.) Kumm.	Dufttrichterling
2	Clitocybe	georgiana	Clem.	Moderigriechender Trichterling
2	Coprinus	comatus	(Müll.: Fr.) Pers.	Schopf-Tintling
2	Cortinarius	decipiens	(Pers.: Fr.) Fr.	Lilastieliger Wasserkopf
2	Cystoderma	amiantinum	(Scop.: Fr.) Fayod	Amiant-Körnchenschirmling
2	Flammulina	velutipes	(Curtis.:Fr.) Singer	Samtfussrübling
2	Galerina	clavata	(Velen.) Kühner	Entferntblättriger Moos-Häubling
2	Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
2	Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
2	Hebeloma	crustuliniforme	(Bull.: Fr.) Quél.	Tongrauer Fälbling
2	Hebeloma	mesophaeum	(Pers.: Fr.) Quélet	Dunkelscheibiger Fälbling
2	Hebeloma	senescens	(Batsch) Berk.	Bräunender Fälbling
2	Hemimycena	cucullata	(Pers.: Fr.) Sing.	Gipsweisser Scheinhelmling
2	Hygrocybe	psittacina	(Schäff.: Fr.) Wünsche	Papageigrüner Saftling
2	Hygrocybe	virginea	(Wulfen: Fr.) Orton et Watling	Jungfern-Ellerling
2	Hygrophorus	chrysodon	(Batsch.: Fr.) Fr	Goldzahn-Schneckling
2	Hygrophorus	lucorum	Kalchbr.	Lärchen-Schneckling
2	Hygrophorus	pustulatus	(Fr.) Fr.	Schwarzpunktierter Schneckling
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Inocybe	geophylla var. lilacina	(Peck.) Gill.	Lilastieliger Risspilz
2	Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
2	Lepiota	boudieri	Bres.	Fuchsbräunlicher Schirmling
2	Lepista	sordida	(Fr.) Sing.	Fleischbrauner Rötelritterling
2	Lyophyllum	fumosum	(Pers.: Fr.) Ort.	Hellbrauner Büschelrasling
2	Lyophyllum	rancidum	(Fr.: Fr.) Sing.	Wurzel-Graublatt
2	Pholiota	populnea	(Pers.: Fr.) Kuyp. & Tjall.	Pappel-Schüppling
2	Psathyrella	multipedata	(Peck) Sm.	Büscheliger Faserling
2	Psathyrella	spadiceogrisea	(Schäff.) Fr. Maire	Dungbewohnender Faserling
2	Tricholoma	atrosquamosum	(Chev.) Sacc.	Schwarzschuppiger Ritterling
2	Tricholoma	cingulatum	(Ahnfelt) Jacobatsch	Beringter Erdritterling
2	Tricholoma	scalpturatum	(Fr.) Quél.	Gilbender Erd-Ritterlig

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilz-Fundliste der Woche 46

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Tricholoma	terreum	(Schäff.:) Fr.) Kumm.	Erdritterling
3	Lactarius	intermedius	(Krombh.) Cke.	Grubiger Weisstannenmilchling
3	Russula	delica	Fr.	Gemeiner Weisstäubling
4	Aportiporus	biennis	(Bull.: Fr.) Sing.	Rötender Saftwirrling
4	Bjerkandera	adusta	(Willd.: Fr.) Karst.	Angebrannter Rauchporling
4	Bjerkandera	fumosa	(Pers.: Fr.) Karst.	Graugelber Rauchporling
4	Clavulina	cinereus	(Bull.: Fr.) Schröt.	Graue Koralle
4	Clavulina	rugosa	(Bull.: Fr.) Schröt.	Runzlige Koralle
4	Coriolopsis	gallica	(Fr.) Ryv.	Braune Borstentramete
4	Oligoporus	floriformis	(Quél.) Gilb & Ryv.	Fächerförmiger Saftporling
4	Plicaturopsis	crispa	(Pers.: Fr.) Rea	Buchen-Aderzähling
4	Polyporus	ciliatus	Fr.	Bewimperter Porling
4	Pycnoporellus	fulgens	(Fr.) Donk	Leuchtender Weichporenschwamm
4	Stereum	subtomentosum	Pouzar	Samtiger Schichtpilz
4	Trametes	versicolor	(L.: Fr.) Pilát	Schmetterlings-Tramete
5	Tulostoma	brumale	Pers.: Pers.	Zizen-Stielbovist
6	Auricularia	mesenterica	Dicks.: Fr.	Gezonter Ohrlappenpilz
7	Ascocoryne	cylichnium	(Tulasne) Korf	Grosssporiger Gallertbecher
7	Bisporella	citrina	(Batsch ex Fr.) Korf & Carpenter	Zitronengelbes Holzbecherchen
7	Helvella	crispa	(Bull. ex St. Aman) Boud.	Herbstlorchel
7	Helvella	elastica	Boud.	Elastische Lorchel

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Junge Sporen von Ascocoryne cylichnium 25 x 6 µm

Ascocoryne cylichnium (Tulasne) Korf
Grosssporiger Gallertbecher
Foto: Mauro Secciani

Coriolopsis gallica (Fr.) Ryv.
Braune Borstentramete

Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk
Leuchtender Weichporenschwamm



Woche 24: Frühlingsbummel Woche 37: Pilzausstellung Woche 44: Schlussbummel



Basel - Lange Erlen Niederschlag

PILZ-FUNDLISTE 2012

Total verschiedene 723 Arten Total Funde: 1771

	Gattung	Art	Autor	Name deutsch
1	Boletus	aereus	Bull.: Fr.	Schwarzhütiger Steinpilz
1	Boletus	aestivalis	(Paulet) Fr.	Sommer-Steinpilz
1	Boletus	appendiculatus	Schaeff.	Anhängsel-Röhrling
1	Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
1	Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1	Boletus	fechtneri	Velen.	Silber-Röhrling
1	Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
1	Boletus	pulverlulentus	Opat.	Schwarzblauender Röhrling
1	Boletus	queletii	Schulzer	Glattstieliger Hexenröhrling
1	Boletus	radicans	Pers.: Fr.	Bitter-Röhrling
1	Boletus	regius	Krombh.	Königs-Röhrling
1	Boletus	rhodopurpureus	Smotlacha	Blaufleckender Purpurröhrling
1	Boletus	rubrosanguineus	Walty ex Cheype	Falscher Satans-Röhrling
1	Boletus	satanas	Lenz	Satansröhrling
1	Boletus	aestivalis	(Paul.) Fr.	Sommersteinpilz
1	Chalciporus	piperatus	(Bull.: Fr.) Bat.	Pfeffer-Röhrling
1	Chroogomphus	helveticus	(Singer) Moser	Filziger Gelbfuss
1	Chroogomphus	rutilus	(Schaeff.: Fr.) O.K. Miller	Kupferroter Gelbfuss
1	Gomphidius	glutinosus	(Schäff.: Fr.) Fr.	Kuhmaul
1	Gyroporus	castaneus	(Bull.: Fr.)	Hasen-Röhrling
1	Gyroporus	cyanescens	(Bull.: Fr.) Quél.	Kornblumen-Röhrling
1	Hygrophoropsis	aurantiaca	(Wulff.: Fr.) Maire	Falscher Pfifferling
1	Leccinum	carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuss
1	Leccinum	crocipodium	(Letellier) Walting	Gelbporiger Rauhfuss
1	Leccinum	duriusculum	(Schulz.) Sing.	Brauner Pappel-Rauhfuss
1	Leccinum	quercinum	Pilát ex Pilát	Eichen-Rotkappe
1	Leccinum	scabrum	(Bull.: Fr.) Gray	Birkenpilz
1	Leccinum	variicolor	Walting	Verschiedenfarbiger Rauhfuss
1	Leccinum	versipelle	(Fr.) Snell.	Birken-Rotkappe
1	Paxillus	filamentosus	Fr.	Erlen-Krempling
1	Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
1	Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
1	Pulveroboletus	gentilis	(Quél.) Pouzar	Goldporiger Röhrling
1	Strobilomyces	strobilaceus	(Scop.: Fr.) Berk.	Strubelkopfröhrling
1	Suillus	bovinus	(L.: Fr.) Rouss.	Kuhröhrling
1	Suillus	fluryi (=collinitus)	Huijsm.	Ringloser Butterpilz
1	Suillus	granulatus	(L.: Fr.) Rouss.	Körnchenröhrling
1	Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
1	Suillus	luteus	(L.: Fr.) Rouss.	Butterpilz
1	Suillus	placidus	(Bonord.) Singer	Elfenbein-Röhrling
1	Suillus	variegatus	Sw.: Fr. Kuntze	Sandröhrling
1	Suillus	viscidus	(L.) Rouss.	Grauer Lärchenröhrling
1	Tylopilus	felleus	(Bull.: Fr.) Karst.	Gallenröhrling
1	Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
1	Xerocomus	communis	(Bulliard) Bon	Eichen-Filzröhrling
1	Xerocomus	ferrugineus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe (Varietät)
1	Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe
2	Agaricus	aestivalis var. veneris	(Heim & Beck) Wass.	Frühlingschampignon
2	Agaricus	arvensis	Schäff.: Fr.	Schaf-Champignon
2	Agaricus	augustus	Fr.	BraunschuppigerRiesenegerling
2	Agaricus	bitorquis	(Quélet) Sacc.	Trottoir-Champignon
2	Agaricus	campester	Fr.: Fr.	Wiesen-Champignon
2	Agaricus	essettei	Bon	Schiefknolliger Anis-Champ.
2	Agaricus	macrosporus	(Möll. & Schäff.) Pilát	Grosssporiger Anischampignion
2	Agaricus	silvaticus	Schäff.: Fr.	Echter Wald-Champignon
2	Agaricus	silvicola	(Vittad.) Sacc.	Dünnfleischiger Anis-Egerling
2	Agaricus	vaporarius	(Vitt.) Mos.	Kompost-Champignon
2	Agaricus	xanthoderma	Genev.	Karbol-Egerling
2	Agrocybe	cylindracea	(DC: Fr.) Mre.	Südlicher Ackerling
2	Agrocybe	dura	(Bolt.) Sing.	Rasiger Ackerling
2	Agrocybe	praecox	(Pers: Fr.) Fayod.	Voreilender Ackerling
2	Amanita	ceciliae	Berkeley et Broome) Bas	Riesen-Streifling
2	Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
2	Amanita	citrina var. alba	(Schäff.) Pers.	Weisser Gilbwulstling

	Gattung	Art	Autor	Name deutsch
2	Amanita	crocea	(Quél. in Boud.) Sing.	Orangebrauner Streifling
2	Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
2	Amanita	fulva	(Schff.) Fr.	Rotbrauer Streifling
2	Amanita	junquillea	Quélet	Narzissengelber Wulstling
2	Amanita	lividopallescens	(Gill.) Seyot	Ockergrauer Riesen-Streifling
2	Amanita	magnivolvata	Aalto	Grossscheidiger Streifling
2	Amanita	muscaria	(L.) Hook.	Fliegenpilz
2	Amanita	muscaria var. forosa	(L.) Hook.	Fliegenpilz
2	Amanita	nivalis*	(Greville) Saccardo	Alpiner-Streifling
2	Amanita	pantherina	(DC.: Fr.) Krombh.	Pantherpilz
2	Amanita	pantherina var. abiet.	(Gilb. in Konr. & Maubl.)	Tannen-Pantherpilz
2	Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
2	Amanita	phalloides var. alba	(Fr.) Link	Weisser Knollenblätter-Pilz
2	Amanita	porphyria	Alb. & Schw.: Fr.	Porphyrbrauner Wulstling
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Amanita	solitaria	(Vittadini) Quélet	Meergrüner Wulstling
2	Amanita	strobiliformis	(Paul.: Vitt.) Bertillon	Fransiger Wulstling
2	Amanita	umbrinolutea	Secr.: Gill.) Bat.)	Verfärbender Scheidenstreifling
2	Amanita	vaginata	(Bull.) Vitt.	Grauer Scheidenstreifling
2	Amanita	virosa	(Fr.) Bertillon	Spitzhütiger Knollenblätterpilz
2	Armillaria	borealis	Marxm. & Korth.	Nordischer Hallimasch
2	Armillaria	mellea	(Val.: Fr.) Kummer	Honiggelber Hallimasch
2	Armillaria	ostoyae	Romagn.	Dunkler Hallimasch
2	Armillaria	tabescens	(Scopoli Fries) Dennis et al.	Ringloser Hallimasch
2	Bolbitius	vitellinus	(Pers.: Fr.) Fr.	Gold-Mistpilz
2	Calocybe	constricta	(Fr.: Fr.) Kühn. ex Bon	Gegürtelter Schönkopf
2	Calocybe	gambosa	(Fr.) Donk	Mairitterling
2	Camarophyllus	pratensis	(Pers.: Fries) Kumm.	Wiesen-Ellerling
2	Chamaemyces	fracidus	(Fr.) Donk	Fleckender Schmierschirmling
2	Clitocybe	candicans	(Pers.) Kumm.	Wachsstieliger Trichterling
2	Clitocybe	cerussata	(Fries) P. Kummer	Ähnlich Waldfreund Trichterling
2	Clitocybe	clavipes	(Pers.) Kumm.	Keulenfuss-Trichterling
2	Clitocybe	costata	Kühn. & Romagn.	Kerbrandiger Trichterling
2	Clitocybe	fragrans	(With.) Kumm.	Dufttrichterling
2	Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
2	Clitocybe	gibba	(Pers.) Kumm.	Ockerbrauner Trichterling
2	Clitocybe	glareosa	Röllin et Monthoux	Kiesliebender Trichterlin

	Gattung	Art	Autor	Name deutsch
2	Clitocybe	inornata	(Sow.) Gill.	Spindelsporiger Trichterling
2	Clitocybe	metachroa	(Fr.) Kumm.	Staubfüssiger Trichterling
2	Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
2	Clitocybe	odora	(Bulliard: Fr.) Kumm.	Grüner Anistrichterling
2	Clitocybe	phaeophthalma	(Pers.) Kp.	Ranziger Trichterling
2	Clitocybe	phyllophila	(Pers.) Kumm.	Bleiweisser Trichterling
2	Clitocybula	lacerata	(Scropoli) Métrod	Fransiger Faserrübling
2	Clitopilus	hobsonii	(Berk. & Br.) Ort.	Seitlings-Mehlräsling
2	Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Clitopilus	scyphoides	(Fr.) Sing.	Kreidiger Mehlräsling
2	Conocybe	lactea	(Lange) Métrod	Milchweisses Samthäubchen
2	Coprinus	atramentarius	(Bull.:Fr.) Fr.	Falten-Tintling
2	Coprinus	auricomus	Pat.	Braunhaariger Tintling
2	Coprinus	cinereus	(Schäff. Fr.) Gray	Wollstieliger Misttintling
2	Coprinus	comatus	(Müll.: Fr.) Pers.	Schopf-Tintling
2	Coprinus	disseminatus	(Pers.: Fr.) S.F.Gray	Gesäter Tintling
2	Coprinus	kuehneri	Uljé & Bas.	KleinsporigerScheibchentintling
2	Coprinus	micaceus	(Bull.: Fr.) Fr.	Glimmertintling
2	Coprinus	picaceus	(Bull.: Fr.) Gray	Specht-Tintling
2	Cortinarius	alboviolacea	(Pers.: Fr.) Fr.	Weissvioletter Dickfuss
2	Cortinarius	alpinus*	Boudier	Alpiner Weiden-Schleimfuss
2	Cortinarius	anomalus	(Fr.: Fr.) Fr.	Braunvioletter Dickfuss
2	Cortinarius	anserinus	(Vel.) Hry.	Buchen-Klumpfuss
2	Crepidotus	applanatus	(Pers.) Kumm.	Gerieftes Stummelfüsschen
2	Cortinarius	argutus	Fr.	Spitzbasiger Schleimkopf
2	Cortinarius	armillatus	(Fr.: Fr.) Fr.	Geschmückter Gürtelfuss
2	Cortinarius	atrovirens	Kalchbr.	Schwarzgrüner Klumpfuss
2	Crepidotus	autochthonus	Lge.	Erdbewohnendes Stummelfüss.
2	Cortinarius	azureovelatus	Orton	Blauberandeter Seidenkopf
2	Cortinarius	azureus	Fr.	Violettblauer Seidenkopf
2	Cortinarius	bataillei	(Favre es Mos.)	Orangefüssiger Hautkopf
2	Cortinarius	bolaris	(Pers.: Fr.) Fr.	Rotschuppiger Rauhkopf
2	Cortinarius	brunneus	(Pers.: Fr.) Fr.	Dunkelbrauner Gürtelfuss
2	Cortinarius	bulbosus	(Sow.: Fr.) Fr.	Knolliger Gürtelfuss
2	Cortinarius	bulliardii	(Pers.: Fr.) Fr.	Feuerfüssiger Gürtelfuss
2	Cortinarius	caesiocanescens	(Mos.) Kühm. & Rom.	Violettgrauer Klumpfuss
2	Cortinarius	cagei	Melot	Zweifarbiger Wasserkopf

	Gattung	Art	Autor	Name deutsch
2	Cortinarius	camphoratus	(Fr.) Fr.	Bocks-Dickfuss
2	Cortinarius	caninus	(Fr.: Fr.)	Rostfuchsiger Dickfuss
2	Cortinarius	cereifolius	(Moser) Moser	Wachsblättriger Klumfuss
2	Crepidotus	cesatii	(Rabenh.) Sacc.	Entfernblättriges Stummelfüss.
2	Entoloma	chalylbaeum	(Pers.: Fr.) Noord.	Schwarzblauer Rötling
2	Cortinarius	cinnabarinus	Fr.	Zinnoberroter Wasserkopf
2	Cortinarius	cinnamomeus	Fr.	Zimt-Hautkopf
2	Cortinarius	cotoneus	Fr.	Olivbrauner Rauhkopf
2	Cortinarius	croceocaeruleus	(Pers.: Fr.) Fr.	Safranblauer Schleimfuss
2	Cortinarius	decipiens	(Pers.: Fr.) Fr.	Lilastieliger Wasserkopf
2	Cortinarius	delibutus	Fr.	Violettblättriger Schleimfuss
2	Cortinarius	disjungendus	Karsten	Holzfarbener Wasserkopf
2	Cortinarius	disjungendus	Karsten	Holzfarbener Wasserkopf
2	Crepidotus	ehrendorferi	Hauskn. & Kris.	AprikosenfarbenesStummelfüss.
2	Cortinarius	elegantissimus	Hry.	Prächtiger Klumpfuss
2	Cortinarius	emolitus	Fr. (s.str.)	Weichstieliger Schleimfuss
2	Cortinarius	epipoleus	Fr.	Stahlgrauer Kleinspor-Schleimf.
2	Cortinarius	evernius	(Fr.: Fr.) Fr. ss. Mos.	Rettich-Gürtelfuss
2	Cortinarius	flexipes	(Pers.: Fr.) Fr.	Duftender Gürtelfuss
2	Cortinarius	glaucopus	(Schäff.: Fr.)	Reihiger Klumpfuss
2	Cortinarius	haasii	Moser	Violettst. Amethyst-Klumpfuss
2	Cortinarius	hinnuleus	(Sow.) Fr.	Erdgriechender Gürtelfuss
2	Cortinarius	infractus	(Pers.: Fr.) Fr.	Bitterer Schleimfuss
2	Cortinarius	largus	Fr.	Blasser Schleimkopf
2	Cortinarius	malicorius	Fr.	Orangerandiger Hautkopf
2	Cortinarius	melanotus	Kalchbr.	Braunnetziger Rauhkopf
2	Crepidotus	mollis	(Schäff.L Fr.) Staude	Gallertfleischiges Stummelfüss.
2	Cortinarius	multiformis	Fr.	Sägeblättriger Klumpfuss
2	Cortinarius	nanceiensis	Mr.	Gelbflockiger Schleimkopf
2	Cortinarius	nemorensis	(Fr.) Lge.	Verfärbender Schleimkopf
2	Cortinarius	odorifer	Britz	Anis-Klumpfuss
2	Cortinarius	olidus	Lge.	Gelbgegürtelter Schleimkopf
2	Cortinarius	olivaceofuscus	Kühn.	Hainbuchen-Hautkopf
2	Cortinarius	percomis	Fr.	Würziger Schleimkopf
2	Cortinarius	praestans	(Cord.) Gill.	Schleiereule
2	Cortinarius	pseudocrassus	Joss. ex Orton	Trockener Gebirg.-Schleimkopf
2	Cortinarius	pseudosulphureus	Hry. ex Ort.	Grünlings-Klumpfuss
2	Cortinarius	purpureus	(Bulliard ex Pers.: Fr.) F.	Purpurroter Hautkopf
2	Cortinarius	renidens	Fr.	Quitten-Wasserkopf
2	Cortinarius	rubellus	Cooke	Spitzgebuckelter Rauhkoopf
2	Cortinarius	rubicundulus	(Rea) Pears.	Rötlichfaseriger Rauhkopf
2	Cortinarius	russeus	Henry ex. Henry	Rötlicher Schleimkopf
2	Cortinarius	salor	Fr.	Blauer Schleimfuss
2	Cortinarius	sanguineus	(Wulf.: Fr.) Gray	Blutroter Hautkopf
2	Cortinarius	sebaceus	Fr.	Büscheliger Schleimkopf
2	Cortinarius	semisanguineus	(Fr.)	Blutblättriger Hautkopf
2	Cortinarius	spilomeus	(Fr.: Fr.) Fr.	Kupferschuppiger Seidenkopf
2	Cortinarius	splendens	Hry.	Schöngelber Klumpfuss
2	Cortinarius	stillatitus	Fr.	Honig-Schleimfuss
2	Cortinarius	torvus	(Bull.: Fr.) Fr.	Wohlriechender Gürtelfuss
2	Cortinarius	traganus	Fr.	Lila-Dickfuss
2	Cortinarius	trivialis	Lge.	Natterstieliger Schleimfuss
2	Cortinarius	turmalis	Fr.	Rasiger Schleimkopf
2	Cortinarius	urbicus	(Fr.: Fr.) Fr.	Weiden-Dickfuss
2	Cortinarius	variecolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf
2	Cortinarius	variegatus	Bresadola	Variabler Schleimkopf
2	Cortinarius	varius	Fr.	Ziegelgelber Schleimkopf
2	Cortinarius	venetus	(Fr.). Fr.	Grüner Buchenwald-Rauhkopf
2	Cortinarius	violaceus	(L.:Fr.) Fr.	Dunkelvioletter Schleierling
2	Cystoderma	amiantinum	(Scop.: Fr.) Fayod	Amiant-Körnchenschirmling
2	Cystoderma	granulosum	(Batsch) Fayod	Rostroter Körnchenschirmling
2	Cystolepiota	seminuda	(Lasch) Bon	Behangener Mehlschirmling
2	Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
2	Entoloma	clypeatum	(L.: Fr.) Kumm.	Schild-Rötling
2	Entoloma	euchroum	(Pers.: Fr.) Donk.	Violetter Rötling
2	Entoloma	excentricum	Bres.	Marmorierter Rötling
2	Entoloma	incanum	(Fr.) Hes.	Braungrüner Rötling
2	Entoloma	indutoides var. griseol.	(Ort.) Noord.	Olivrötlicher Rötling
2	Entoloma	mougeotii	(Fr.) Hes.	Lilablauer Nabelrötling
2	Entoloma	placidum	(Fr.: Fr.) Noord.	Milder Rötling
2	Entoloma	prunuloides	(FR.) Quél.	Mehl-Rötling
2	Entoloma	rhodopolium	(Fr.: Fr.) Kummer	Niedergedrückter Rötling
2	Entoloma	sericeoides	(Lange) Noordeloos	Trichterlings-Rötling
2	Entoloma	serrulatum	(Fr.: Fr.) Hes.	Gesägtblättriger Rötling

	Gattung	Art	Autor	Name deutsch
2	Entoloma	sinuatum	(Bull.: Pers.: Fr.) Kumm.	Riesen-Rötling
2	Entoloma	turci	(Bres.) Mos.	Zimtbrauner Rötling
2	Entoloma	undatum	(Fr.) Mos.	Dunkelblättriger Rötling
2	Flammulaster	limulatus	(Weinm.: Fr.) Watl.	Gelbblättri. Flockenschüppling
2	Galerina	clavata	(Velen.) Kühner	Entferntblättr. Moos-Häubling
2	Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
2	Gymnopilus	satur	Kühn.	Dunkelstieliger Flämmling
2	Gymnopilus	spectabilis	(Weinm.: Fr.)	Beringter Flämmling
2	Gymnopus	acervatus	(Fr.) Murrill	Büscheliger Blasssporrübling
2	Gymnopus	buthyracea var. asema	(Fr.: Fr.) Quél.	Horngrauer Butterrübling
2	Gymnopus	butyracea	(Bull.: Fr.) P. Kumm.	Butterrübling
2	Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
2	Gymnopus	distorta	(Fr.) Quél.	Drehstieliger Rübling
2	Gymnopus	dryophilus	(Bulliard: Fr.) Murrill	Waldfreund-Rübling
2	Gymnopus	erytropus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Rotstieliger Rübling
2	Gymnopus	fusipes	(Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling
2	Gymnopus	maculata	(Alb. et Schw. Fr.)	Gefleckter Rübling
2	Gymnopus	oreadoides	(Pass.) Orton	Flattriger Rübling
2	Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
2	Hebeloma	crustuliniforme	(Bull.: Fr.) Quél.	Tongrauer Fälbling
2	Hebeloma	longicaudum	(Pers.: Fr.) Kumm.	Langstieliger Fälbling
2	Hebeloma	mesophaeum	(Pers.: Fr.) Quélet	Dunkelscheibiger Fälbling
2	Hebeloma	senescens	(Batsch) Berk.	Bräunender Fälbling
2	Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
2	Hebeloma	sordescens	Vesterholt	Schwarzknolliger Fälbling
2	Hemimycena	cucullata	(Pers.: Fr.) Sing.	Gipsweisser Scheinhelmling
2	Hemimycena	mairei	(Gilb.) Sing.	Gras-Scheinhelmling
2	Hohenbuhelia	geogenia	(DC.: Fr.) Sing.	Trichterförmiger Muscheling
2	Hohenbuhelia	mastrucata	(Fr.: Fr.) Sing.	Pelz-Muscheling
2	Hydropus	marginellus	(Pers.: Fr.) Sing.	Braunschneidiger Wasserfuss
2	Hydropus	subalpinus	(Höhnel) Singer	Buchenwald-Wasserfuss
2	Hygrocybe	acutoconica (=persist.)	(Clements) Sing.	Spitzgebuckelter Saftling
2	Hygrocybe	calciphila	Arnolds	Kalk-Mennigsaftling
2	Hygrocybe	conica	(Scopp.: Fr.) Kumm.	Kegeliger Saftling
2	Hygrocybe	fuscescens	(Bres.) Ort. & Watl.	Bräunlicher Ellerling
2	Hygrocybe	psittacina	(Schäff.: Fr.) Wünsche	Papageigrüner Saftling
2	Hygrocybe	virginea	(Wulfen: Fr.) Orton et Watling	Jungfern-Ellerling

	Gattung	Art	Autor	Name deutsch
2	Hygrophorus	agathosmus	(Fr.) Fr.	Wohlriechender Schneckling
2	Hygrophorus	chrysodon	(Batsch.: Fr.) Fr	Goldzahn-Schneckling
2	Hygrophorus	cossus (disco0anthus)	(Sow. e0 Fr.) Fr.	Verfärbender Schneckling
2	Hygrophorus	eburneus	(Bulliard: Fr.) Fr.	Elfenbein-Schneckling
2	Hygrophorus	hyacinthinus	Quél.	Hyazinthen-Schneckling
2	Hygrophorus	nemoreus	(Pers.: Fr.) Fr.	Hain-Schneckling
2	Hygrophorus	penarius	Fr.	Trockener Schneckling
2	Hygrophorus	poetarum	Heim	Isabell-Schneckling
2	Hygrophorus	pudorinus	(Fr.) Fr.	Orange-Schneckling
2	Hygrophorus	pustulatus	(Fr.) Fr.	Schwarzpunktierter Schneckling
2	Hypholoma	capnoides	(Fr.: Fr.) Kummer	Rauchblättriger Schwefelkopf
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Hypholoma	radicosum	E.Lange	Wurzelnder Schwefelkopf
2	Hypholoma	sublateritium	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf
2	Inocybe	cervicolor	(Pers.) Quél.	Hirschbrauner Risspilz
2	Inocybe	cincinnata	(Fr.:Fr.) Quel.	Braunvioletter Risspilz
2	Inocybe	cookei	Bres.	Knolliger Risspilz
2	Inocybe	corydalina	Quél.	Grünbuckliger Risspilz
2	Inocybe	decipiens	Bresadola	Graubrauner Risspilz
2	Inocybe	erubescens	Blytt	Ziegelroter Risspilz
2	Inocybe	fibrosa	(Sow.) Gill.	Grosser Faser-Risspilz
2	Inocybe	fraudans	(Britz.) Sacc.	Birnen-Risspilz
2	Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
2	Inocybe	geophylla var. lilacina	(Peck.) Gill.	Lilastieliger Risspilz
2	Inocybe	lanuginosa	(Bull. Fr.) Kumm.	Wolliger Risspilz
2	Inocybe	maculata	Boud.	Gefleckter Risspilz
2	Inocybe	mixtilis	(Britz.) Sacc.	Gerandetknolliger Risspilz
2	Inocybe	napipes	Lge.	Rübenstieliger Risspilz
2	Inocybe	petiginosa	(Fr.: Fr.) Gillet	Graugezonter Zwergrisspilz
2	Inocybe	queletii	Maire et Konr.	Weisstannen-Risspilz
2	Inocybe	riomosa	(Bull.: Fr.) Kummer	Kegeliger Risspilz
2	Inocybe	squamata	Lge.	Schuppiger Risspilz
2	Inocybe	terrigena	(Fr.) Kuyp.	Schuppenstieliger Risspilz
2	Inocybe	whitei	(Berk .et Br.) Sacc.	Weissrosa Risspilz
2	Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2	Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
2	Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling

	Gattung	Art	Autor	Name deutsch
2	Lacrymaria	lacrymabunda	(Bull.: Fr.) Pat.	Tränender Samumpilz
2	Lentinellus	cochleatus	(Pers.: Fr.) Karst.	Äniszähling
2	Lentinus	adhaerens	(Alb. et Schw.: Fr.) Fr.	Harziger Sägeblättling
2	Lentinus	lepideus	(Buxb. ex Fr.) Fr.	Schuppiger Sägeblättling
2	Lentinus	tigrinus	(Bull.: Fr.) Fr.	Getiegerter Sägeblättling
2	Lentinus	torulosus	(Pers.: Fr. Lloyd	Laubholz-Knäueling
2	Lepiota	alba	(Bres.) Sacc.	Weisser Schirmling
2	Lepiota	clypeolaria	(Bull.: Fr.) Kumm.	Wolliggestiefelter Schirmling
2	Lepiota	echinella	Quél. & Bernard	Striegeliger Schirmling
2	Lepiota	rufipes	Morgan	Glatthütiger Schirmling
2	Lepiota	ventriosospora	Reid	Gelbwolliger Schirmling
2	Lepista	densifolia	(Favre) Sing.	Dichtblättriger Rötelritterling
2	Lepista	flaccida	(Sowerby Fries) Pat.	Fuchsiger Rötelritterling
2	Lepista	glaucocana	(Bres.) Sing.	Blassblauer Rötelritterling
2	Lepista	nuda	(Bull.: Fr.) Cooke	Violetter Rötelritterling
2	Lepista	sordida	(Fr.) Sing.	Fleischbrauner Rötelritterling
2	Leucoagaricus	badhamii	(Berkeley et Broome) S.	Anlaufender Egerlingssch
2	Leucoagaricus	leucothites	(Vitt.) Was.	Rosablättriger Egerlingssch.
2	Leucocortinarius	bulbiger	(A. & S.: Fr.) Sing.	Knolliger Schleierritterling
2	Leucopaxillus	compactus	(Fr.) Neuhf.	Dreifarbiger Krempentrichterl.
2	Leucopaxillus	mirabilis	(Bres.) Konr. & Mbl.	Dunkler Krempenritterling
2	Lyophyllum	connatum	(Schum.: Fr.) Sing.	Weisser Büschelrasling
2	Lyophyllum	decastes	(Fr.: Fr.) Singer	Brauner Büschelrasling
2	Lyophyllum	loricatum	(Fr.) Kühn.	Gepanzerter Rasling
2	Lyophyllum	paelochroum	Clmç.	Lemfarbener Schwärzling
2	Macrolepiota	mastoidea	(Fr.) Sing.	Zitzenschirmling
2	Macrolepiota	procera	(Scop.: Fr. Sg.	Parasol
2	Macrolepiota	rhacodes var. brunnea	(Vittad.) Singer	Brauner Safranschirmling
2	Macrolepiota	rhacodes var.hortensis	(Vittad.) Singer	Safranschirmling, Gartenform
2	Macrolepiota	rickenii	rickenii	Spitzwarziger Riesenschirmling
2	Marasmiellus	perforans	(Hofmann: Fries) A. er N.	Nadel-Zwergsch.
2	Marasmiellus	ramealis	(Bull.: Fr.) Sing.	Ästchenschwindlng
2	Marasmiellus	vaillantii	(Pers.: Fr.) Sing.	Matter Zwergschwindling
2	Marasmiellus	foetidus	(Sow.:Fr.) Ant. et Noord.	Stinkender Zwergschwindling
2	Marasmius	alliaceus	(Jacq.: Fr.) Fr.	Langstieliger Knoblauchschwi.
2	Marasmius	oreades	(Bolton.: Fr.) Fr.	Nelkenschwindling
2	Marasmius	rotula	(Scop.: Fr.) Fr.	Halsbandschwindling
2	Marasmius	torquescens	Quél.	Ledergelber Schwindling
2	Marasmius	wynnei	Berk. & Br.	Violetlicher Schwindling
2	Marasmius	wettsteinii	Sacc. & Syd.	Wettsteins-Schwindling
2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouz.	Gemeines Breitblatt
2	Melanoleuca	grammopus	(Bulliard: Fr.) Patouillard	Rillstieliger Weichritterling
2	Melanoleuca	pseudorasilis	(Bon) Bon	Trichterlings- Weichritterling
2	Mycena	acicula	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Orangeroter Helmling
2	Mycena	aetites	(Fr.) Quélet	Graublättriger Russ-Helmling
2	Mycena	crocata	(Schrad.: Fr.) Kumm.	Safranmilchender Helmling
2	Mycena	flavoalba	(Fr.) Quél.	Zitronengelber Helmling
2	Mycena	galericulata	(Scop.:Fr.) Gray	Rosablättriger Helmling
2	Mycena	inclinata	(Fr.) Quél.	Buntstieliger Helmling
2	Mycena	leptophylla	(Peck) Sacc.	Aprikosenfarbener Helmling
2	Mycena	pelianthina	(Fr.: Fr.) Quél.	Schwarzgezähnelter Helmling
2	Mycena	polygramma	(Bull.: Fr.) Gray	Rillstieliger Helmling
2	Mycena	pseudopicta	(Lge) Kühn.	Rauchgrauer Gras-Helmling
2	Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
2	Mycena	renati	Quélet	Gelbstieliger Nitrat-Helmling
2	Mycena	rosea	(Bull.) Gramberg	Rosa-Rettichhelmling
2	Mycena	vitilis	(Fr.) Quél.	Zäher Fadenhelmling
2	Mycena	zephirus	(Fr.: Fr.) Kumm.	Rostfleckiger Helmling
2	Mycenella	bryophylla	(Vogl.) Sing.	Wurzelnder Samthelmling
2	Mycenella	rubropunctata (trachyspora)		Boekh. Heller Samthelmling
2	Nyctalis	asterophora	Fr.	Stäubender Zwitterling
2	Omphalina	discorosea	(Pil.) Her. & Kotl.	Rosablättriger Holznabeling
2	Omphalina	velutipes	Ort.	Samtfuss-Nabeling
2	Ossicaulis	lignatilis	(Pers.: Fr.) Redh.	Bepuderter Weinfass-Holzritterll.
2	Panaeolus	foeniseccii	(Per.: Fr.) Schr.	Heudüngerling
2	Panellus	stypticus	(Bull.: Fr.) P.Karst.	Bitterer Muschelseitling
2	Phaeolepiota	aurea	(Matt.: Fr.) Mre. ex K.. & M.	Goldfarbener Glimmersch.
2	Pholiota	adiposa	(Fr.) Kumm.	Schleimiger Schüppling
2	Pholiota	astragalina	(Fr.) Singer	Safranroter Schüppling
2	Phaeomarasmius	erinaceus	(Fr.) Küh.	Igel-Schüppling
2	Pholiota	flammans	(Fr.:) Kummer	Feuerschüppling
2	Pholiota	gummosa	(Lasch.: Fr.) Sing.	Strohblasser Schüppling
2	Pholiota	jahnii	Tjallingii-Beukers et Bas	Pinselschüppling
2	Pholiota	lucifera	(Lasch) Quél.	Fettiger Schüppling

	Gattung	Art	Autor	Name deutsch
2	Pholiota	squarrosa	(Pers.: Fr.) Kumm.	Sparriger Schüppling
2	Phyllotlus	porrigens	(Pers.: Fr.) Karsten.	Ohrförmiger Weissseitling
2	Pleurotus	cornucopiae	(Paul. ex Pers.) Roll.	Rillstieliger Seitling
2	Pluteus	atromarginatus	(Sing.) Kühn.	Schwarzschneidiger Dachpilz
2	Pluteus	aurantiorugosus	(Trog) Saccardo	Orangeroter Dachpilz
2	Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
2	Pluteus	cinereofuscus	Lge.	Graubrauner Dachpilz
2	Pluteus	leonius	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Löwengelber Dachpilz
2	Pluteus	nanus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Zwerg-Dachpilz
2	Pluteus	salicinus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Grauer Dachpilz
2	Pluteus	umbrosus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Schwarzflockiger Dachpilz
2	Psathyrella	candolleana	(Fr.: Fr.) Maire	Behangener Faserling
2	Psathyrella	conopilus	(Fr.: Fr.) Pears. & Dennis	Huthaarfaserling
2	Psathyrella	multipedata	(Peck) Sm.	Büscheliger Faserling
2	Psathyrella	piluliformis	(Bull.: Fr.) Ort.	Wässeriger Faserling
2	Psathyrella	spadicea	(Schäff.) Sing.	Schockoladenbrauner Faserling
2	Psathyrella	spadiceogrisea	(Schäff.) Fr. Maire	Dungbewohnender Faserling
2	Pseudoclitocybe	cyathiformis	(Bull.) Sing.	Kaffebrauner Gabeltrichterling
2	Rhodocollybia	butyracea	(Bull.: Fr.) Lennox	Butterrübling
2	Rhodocybe	gemina	(Fr.). Kuyp. & Noord.	Würziger Tellerling
2	Rhodocybe	melleopallens	P.D. Ort.	Honigbrauner Tellerling
2	Rickenella	fibula	(Bull.: Fr.) Raith.	Orangegelber Heftelnabeling
2	Ripartites	tricholoma	(Alb. & v. Schw.)	Bewimperter Filzkrempling
2	Rozites	caperatus	(Pers.: Fr.) P. Karst.	Zigeunerpilz
2	Schizophyllum	commune	Fr.: Fr.	Gemeiner Spaltblättling
2	Simocybe	centunculus	(Fr.: Fr.) Karst.	Kleinsporiger Olivschnitzling
2	Simocybe	coniophora	(Romagn.) Walt.	Kellerschwamm-Olivschnitzling
2	Strobilurus	esculentus	(Wulf.: Fr) Sg.	Fichtenzapfenrübling
2	Simocybe	rubi	(Berk.) Sing.	Breitsporiger Olivschnitzling
2	Simocybe	sumtuosa	(Ort.) Sing.	Üppiger Olivschnitzling
2	Stropharia	aeruginosa	(Curtis:) Fr./Quél.	Grünspansträuschling
2	Stropharia	caerulea	Kreisel	Blauer Träuschling
2	Stropharia	coronilla	(Bull.: Fr.) Quél.	Krönchenträuschling
2	Stropharia	rugosoannulata	Farl. ex Murr.	Rotbrauner Riesenträuschling
2	Tricholoma	atrosquamosum	(Chev.) Sacc.	Schwarzschuppiger Ritterling
2	Tricholoma	aurantium	(Schäff.: Fr.) Rick.	Orangeroter Ritterling
2	Tricholoma	batschii	Gulden ex Christ. et Noor.	Fastberingter Ritterling
2	Tricholoma	caligatum	(Viv.) Rick.	Krokodil-Ritterling
2	Tricholoma	cingulatum	(Ahnfelt) Jacobatsch	Beringter Erdritterling
2	Tricholoma	columbetta	(Fr.) Kumm.	Seidiger Ritterling
2	Tricholoma	fulvum	(DC.: Fr.) Sacc.	Gelbblättriger Ritterling
2	Tricholoma	inamoenum	(Fr.) Quél.	Lästiger Ritterling
2	Tricholoma	lascivum	(Fr.) Gill. ss. Lge.	Unverschämter Ritterling
2	Tricholoma	orirubens	Quél.	Rötender Ritterling
2	Tricholoma	portensosum	(Fr.) Quél.	Schwarzfaseriger Ritterling
2	Tricholoma	pseudonictitans	Bon	Blassfleischiger Fichten-Ritterl.
2	Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
2	Tricholoma	scalpturatum	(Fr.) Quél.	Gilbender Erd-Ritterlig
2	Tricholoma	sciodes	(Secr.) Martin	Schärflicher Ritterling
2	Tricholoma	sejunctum	(Sow.: Fr.) Quél.	Grüngelber Ritterling
2	Tricholoma	terreum	(Schäff.:) Fr.) Kumm.	Erdritterling
2	Tricholoma	tigrinum	Kumm.	Tiger-Ritterling
2	Tricholoma	umbonatum	Lge. ex Clç. & Bon	Buckliger Ritterling
2	Tricholoma	ustale	(Fr.: Fr.) Kumm.	Brandiger Ritterling
2	Tricholoma	vaccinum	(Pers.: Fr.) Kumm.	Zottiger Ritterling
2	Tricholoma	virgatum	(Fr.: Fr.) Kumm.	Brennender Ritterling
2	Tricholomopsis	flammula	Métrod	Kleiner Holzritterling
2	Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
2	Tricholomopsis	decora	(Fr.) Sing.	Olivgelber Holzritterling
2	Tubaria	hiemalis	Romagn. ex Bon	Winter-Trompetenschnitzling
2	Xeromphalina	fellea	Mre. & Mal.	Bitterer Glöckchennabeling
2	Xerula	melanotricha	Dörfelt	Weisstannen-Wurzelrübling
2	Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3	Lactarius	acris	(Bolt.: Fr.) Gray	Rosaanlaufender Milchling
3	Lactarius	aurantiacus	(Pers.: Fr.) Gray	Echter Orange-Milchling
3	Lactarius	azonites	(Bull.) Fr.	Rauchfarbener Rosamilchling
3	Lactarius	badiosanguineus	Kühn & Rom.	Braunroter Milchling
3	Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
3	Lactarius	camphoratus	(Bull.: Fr.) Fr.	Kamfermilchling
3	Lactarius	controversus	(Pers.: Fr.) Fr.	Rosascheckiger Milchling
3	Lactarius	cremor	Fr.	Runzliger Zwergmilchling
3	Lactarius	decipiens	Quél.	Ungezonter Schwefelmilchling
3	Lactarius	deterrimus	Gröger	Fichtenreizker
3	Lactarius	dryadophilus*	Kühner	Silberwurz-Milchling

	Gattung	Art	Autor	Name deutsch
3	Lactarius	evosmus	Kühner et Romagnesi	Blasser Zonen-Milchling
3	Lactarius	fulvissimus	Rom. i. Kühn. & Rom.	Orangefuchsiger Milchling
3	Lactarius	glaucescens	Crossl.	Grünender Pfeffermilchling
3	Lactarius	glyciosmus	(Fr.: Fr.) Fr.	Blasser Duftmilchling
3	Lactarius	helvus	(Fr.: Fr.) Fr.	Maggipilz
3	Lactarius	hepaticus	Plowr. in Poud.	Leberbrauner Milchling
3	Lactarius	hortensis	Velen	Haselmilchling
3	Lactarius	intermedius	(Krombh.) Cke.	Grubiger Weisstannenmilchling
3	Lactarius	ligniotus	Fries in Lindb.	Mohrenkopf
3	Lactarius	luridus	(Pers.: Fr.) Gray	Gewöhnlicher Violettmilchling
3	Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
3	Lactarius	picinus	Fr.	Pechschwarzer Milchling
3	Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
3	Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
3	Lactarius	pubescens	(Schrad.) Fries	Flaumiger Milchling
3	Lactarius	pyrogalus	(Bull.: Fr.) Fr.	Scharfer Hasel-Milchling
3	Lactarius	pyrogalus	(Bull.: Fr.) Fr.	Scharfer Hasel-Milchling
3	Lactarius	quietus	(Fr.) Fr.	Eichenmilchling
3	Lactarius	robertianus*	Bon	Violettbrauner Milchling
3	Lactarius	romagnesii	Bon	Kerbrandiger Korallenmilchling
3	Lactarius	rufus	(Scop.: Fr.) Fr.	Rotbrauner Milchling
3	Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3	Lactarius	scrobiculatus	(Scop.: Fr.) Fr.	Grubiger Fichtenmilchling
3	Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
3	Lactarius	torminosus	(Schäf.: Fr.) Fr.	Zottiger Birkenreizker
3	Lactarius	trivialis	(Fr.: Fr.) Fr.	Nordischer Milchling
3	Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
3	Lactarius	vietus	(Fr.) Fr.	Grünfleckender Milchling
3	Lactarius	volemus	(Fr.: Fr.) Fr.	Brätling
3	Russula	acrifolia	Romagn.	Scharfbl. Schwärztäubling
3	Russula	adulterina	Fr. ss. Rom.	Scharfer Brauntäubling
3	Russula	aeruginea	Lindblad in Fr.	Grasgrüner Birkentäubling
3	Russula	alutacea	(Pers.: Fr.) ss. restr. M. & Z.	Ledertäubling
3	Russula	amethystina	Quélet	Amethysttäubling
3	Russula	amoeolens	Romagn.	Brauner Camemberttäubling
3	Russula	anthracina	Romagn.	Lachsblättriger Schwärztäubling
3	Russula	atropurpurea	(Krombh.) Britz.	Pupurschwarzer Täubling
3	Russula	aurea	Pers.	Goldtäubling
3	Russula	badia	Quél.	Zedernholztäublig
3	Russula	carpini	Gir. & Hein.	Hainbuchentäubling
3	Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3	Russula	cessans	Pears.	Kiefern-Weichtäubling
3	Russula	chamiteae*	Kühner	Purpurlicher Weiden-Täubling
3	Russula	chloroides	(Krombh.) Bres.	Schmalblättriger Weisstäubling
3	Russula	curtipes	Moell. & Schaeff.	Kurzstieliger Ledertäubling
3	Russula	cutefracta	Cke.	Rissigrandiger Täubling
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
3	Russula	cyanoxantha fo. pelt.	R. Maire.: Singer	Grüner Frauentäubling
3	Russula	decolorans	(Fr.) Fr.	Orangeroter Graustieltäubling
3	Russula	delica	Fr.	Gemeiner Weisstäubling
3	Russula	densifolia	Gill.	Dichtblättriger Schwärztäubling
3	Russula	emetica	(Schäff.: Fr.) Gray	Kirschroter Speitäubling
3	Russula	faginea	Romagn.	Buchen-Heringstäubling
3	Russula	farinipes	Romell in Britz.	Mehlstieltäubling
3	Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
3	Russula	felleaecolor*	Jamoni et Bon	Hochgebirgstäubling
3	Russula	firmula	Schäffer	Scharfer Glanz-Täubling
3	Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
3	Russula	fragilis	(Pers.: Fr.) Fr.	Wechselfarbiger Speitäubling
3	Russula	fragrantissima	Rom.	Starkduftender Stinktäubling
3	Russula	gracillima	J. Schäffer	Zierlicher Birken-Täubling
3	Russula	grata (laurocerasi)	Melzer	Mandeltäubling
3	Russula	grisea	Fr.	Grauvioletter Reiftäubling
3	Russula	heterophylla	(Fr.) Fr.	Grüner Speisetäubling
3	Russula	illota	Romagn.	Morsetäubling
3	Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
3	Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
3	Russula	luteotacta	Rea	Gelbfleckender Täubling
3	Russula	mairei	Singer	Buchen-Speitäubling
3	Russula	melliolens	Quélet	Honig-Täubling
3	Russula	minutula	Velen.	Kleiner Rosa-Täubling
3	Russula	nana*	Killermann	Hochgebirgs-Speitäubling
3	Russula	nauseosa	(Pers.) Fr..	Geriefter Weichtäubling
3	Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling

	Gattung	Art	Autor	Name deutsch
3	Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
3	Russula	norvegica*	Reid	Nordischer Täubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3	Russula	olivascens (postia)	(Pers.: Fr.) Bres.	Olivgrüner Täubling
3	Russula	pallescens	Karsten	Verblassender Kiefern-Täubling
3	Russula	paludosa	Britz.	Apfeltäubling
3	Russula	pascua*	Møller et Schäffer	Dryas-Heringstäubling
3	Russula	pectinata	(Bull.: St. Am.) Fr.	Stinkender Kammtäubling
3	Russula	pseudointegra	Arn. & Gor.	Ockerbl. Zinnobertäubling
3	Russula	puellaris	Fr.	Milder Wachstäubling
3	Russula	queletii	Fr. in Quél.	Stachelbeertäubling
3	Russula	raoultii	Quél.	Blassgeber Täubling
3	Russula	risigallina	(Batsch) Kuyp. & v. Vuu.	Wechselfarbiger Dottertäubling
3	Russula	romellii	Maire	Weissstieliger Ledertäubling
3	Russula	rosea (=lepida)	Pers.	Harter Zinnober-Täubling
3	Russula	rubra	(Lmck. Fr.) Fr.	Scharfer Zinnobertäubling
3	Russula	sanguinea	(Bull. ex St. Am.) Fr.	Blutroter Täubling
3	Russula	solaris	Ferd. et Winge	Sonnentäubling
3	Russula	spagnophila	Kauffmann (ss. Bon)	Milder Tormoos-Täubling
3	Russula	torulosa	Bres.	Gedrungener Täubling
3	Russula	turci	Bres.	Jodoformtäubling
3	Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
3	Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
3	Russula	violeipes	Quélet	Violettstieliger Brätlingstäubling
3	Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
3	Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling
3	Russula	xerampelina	Schäff.: Fr.	Roter Heringstäubling
4	Albatrellus	confluens	(A. & S.: Fr.) Kotl. & Pouz.	Semmelporling
4	Albatrellus	cristatus	(Schäff.: Fr.) Kotl. & Pouz.	Grüner Kammporling
4	Albatrellus	ovinus	(Schäff.: Fr.) Kotl. & Pouz.	Schafporling
4	Antrodia	serialis	(Fr.) Donk	Reihige Tramete
4	Aportiporus	biennis	(Bull.: Fr.) Sing.	Rötender Saftwirrling
4	Artomyces	pyxidatus	(Pers.: Fr.) Jül.	Becherkoralle
4	Bjerkandera	adusta	(Willd.: Fr.) Karst.	Angebrannter Rauchporling
4	Bjerkandera	fumosa	(Pers.: Fr.) Karst.	Graugelber Rauchporling
4	Boletopsis	grisea	(Peck) Boud.	Bitterer Russporling
4	Boletopsis	leucomelaena	(Pers.) Fayod	Grauer Russporling
4	Bondarzewia	montana	(Quél.) Singer	Bergporling
4	Cantharellus	auroa	(Batsch) Kuyp.	Duftender Gabeling
4	Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
4	Cantharellus	cibarius var. amethysteus	Quél.	Lilahütiger Eierschwamm
4	Cantharellus	cinereus	Pers. ex Fr.	Grauer Leistling
4	Cantharellus	friesii	Quél.	Fries´scher Pfifferling
4	Cantharellus	melanoxeros	Desm.	Gelbvioletter Pfifferling
4	Cantharellus	tubaeformis	Fr.	Durchbohrter Leistling
4	Cerocorticum	confluens	(Fr.): Fr.) Jül & Stalp.	Zusammenfliesend. Reibeisenp.
4	Cerrena	unicolor	(Bulliard: Fr.) Murrill	Aschgrauer Langporenpilz
4	Clavariadelphus	pistilaris	(Fr.) Donk	Herkuleskeule
4	Clavulina	cinereus	(Bull.: Fr.) Schröt.	Graue Koralle
4	Clavulina	cristata	(Holmskj.: Fr.) Schröt.	Kammförmige Koralle
4	Climacocystis	borealis	(Fr.) Kotl. & Pouz.	Nordischer Porling
4	Coltricia	perennis	(L.: Fr.) Murrill	Brauner Dauerporling
4	Coriolopsis	gallica	(Fr.) Ryv.	Braune Borstentramete
4	Craterellus	cornucopioides	Pers.	Totentrompete
4	Creolophus	cirrhatus	(Pers.: Fr.) Karst.	Dorniger Stachelbart
4	Cylindrobasidium	evolvens	(Fr.: Fr.) Jül.	Ablösender Rindenpilz
4	Daedalea	quercina	(L. ex Fr.)	Eichenwirrling
4	Daedaleopsis	confragosa	(Bolton: Fr.) Schröter	Rötender Blätterwirrling
4	Datronia	mollis	(Sommerf.: Fr.) Donk	Weicher Resupinatporling
4	Dentropolyporus	umbellatus	(Pers.: Fr.) Jül.	Eichhase
4	Dichomitus	campestris	(Quél.) Dom. & Orl.	Haselporling
4	Fomes	fomentarius	(L.: Fr.) Fr.	Echter Zunderschwamm
4	Fomitopsis	officinalis	(Villars: Fr.) Bond. et Sing.	Lärchen-Baumschwamm
4	Fomitopsis	pinicola	(Fr.) Karst.	Rotbrauner Baumschwamm
4	Fomitopsis	rosea	(Albertini et Schw. Fr.) K.	Rosenroter Baumschwamm
4	Ganoderma	adspersum	(Schulz.) Donk	Wulstiger Lackporling
4	Ganoderma	carnosum	Pat.	Dunkler Lackporling
4	Ganoderma	lipsiense	(Batsch.: Pers.) Atkinson	Flacher Lackporling
4	Ganoderma	lucidum	(Curt.: Fr.) Karst.	Glänzender Lackporling
4	Ganoderma	pfeifferi	Bresadola	Kupferroter Lackporling
4	Gleozystidiellum	porosum	(Bk. & Ct.) Donk	Strohfarbener Saftzystidling
4	Gloeophyllum	odoratum	(Wulf.: Fr.) Imyzeki	Fencheltramete
4	Gloeoporus	dichrous	(Frie.: Fries.) Bres.	Zweifarbiger Gloeoporling

	Gattung	Art	Autor	Name deutsch
4	Gomphus	clavatus	(Pers.: Fr.) Gray	Schweinsohr
4	Hapalopilus	rutilans	(Pers.: Fr.) Karst.	Zimtfarbener Weichporling
4	Heterobasidion	annosum	(Fr.) Bref.	Wurzelschwamm
4	Hydnellum	peckii	Banker in Peck	Scharfer Korkstacheling
4	Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
4	Hydnum	repandum var. rufescens	(Fr.) Barla	Rotgelber Stoppelpilz
4	Hymenochaeta	rubiginosa	(Dicks.: Fr.) Lév.	Rotbrauner Borstenscheibling
4	Hyphodontia	sambuci	(Pers.) Eriks.	Holunder-Rindenpilz
4	Inomidotis	fulvotingens	(Berk. et Curt.) Cash.	Braunschwarzer Rindenbecher
4	Inonotus	hispidus	(Fr.) Karst.	Zottiger Schillerporling
4	Inonotus	triqueter	(Fr.) Karsten	Kiefern-Schillerporling
4	Ischnoderma	benzoinum	(Wahl.: Fr.) Karst.	Schwarzgebänderter Harzporl.
4	Ischnoderma	trogii	(Fr.) Donk	Gestielter Tannen-Harzporling
4	Laetiporus	sulfureus	Murr.	Schwefelporling
4	Lenzites	warnieri	Dur. & Mont.	Pappelblättling
4	Lenzites	betulina	(L. ex Fr.) Fr.	Birkenblättling
4	Meripilus	giganteus	(Pers.: Fr.) Karst.	Riesenporling
4	Oligoporus	caesius	(Schrad.: Fr.) Gilb. & Ryv.	Blauer Saftporling
4	Oligoporus	floriformis	(Quél.) Gilb & Ryv.	Fächerförmiger Saftporling
4	Oligoporus	subcaesius	(David) Dung.	Fastblauer Saftporling
4	Oxiporus	populinus	(Schum.: Fr.) Donk.	Treppenförmiger Steifporling
4	Phaeolus	schweinitzii	(Fr.) Pat.	Kiefernbraunporling
4	Phellinus	conchatus	(Pers.: Fr.) Quél.	Muschelförmiger Feuerschw.
4	Phellinus	ferruginosus	(Schrad.: Fr.) Pat.	Rostbrauner Feuerschwamm
4	Phellinus	hartigii	(All. & Schn.) Bond.	Tannen-Feuerschwamm
4	Phellinus	hippophaëcola	Jahn	Sanddorn-Feuerschwamm
4	Phellinus	igniarius	(L.: Fr.) Quél.	Falscher Zunderschwamm
4	Phellinus	robustus	(Karst.) Bourd. & Galz.	Eichen-Feuerschwamm
4	Phellinus	tremulae	(Bond.) Bond. & Boriss.	Espen-Feuerschwamm
4	Phellinus	trivialis	(Bres.) Kreisel	Weiden-Feuerschwamm
4	Phellinus	tuberculosus	(Baumg.) Niem.	Pflaumen-Feuerschwamm
4	Phylloporia	ribis	(Schumacher: Fr.) Ryv.	Beeren Strauchporling
4	Phyllotopsis	nidulans	(Pers.: Fr.) Singer	Gemeinder Orangeseitling
4	Physisporinus	vitreus	(Pers.: Fr.) Donk	Wässriger Eisporling
4	Piptoporus	betulinus	(Bulliard) Karsten	Birken-Hautporling
4	Polyporus	badius	(Pers.) Schweiniz	Schwarzroter Stielporling
4	Polyporus	brumalis	Pers.: Fr.	Winterporling
4	Polyporus	ciliatus	Fr.	Bewimperter Porling
4	Polyporus	melanopus	(Pers.: Sw.) Fr.	Braunfuss-Porling
4	Polyporus	mori	Pollini: Fr.	Wabenporling
4	Polyporus	squamosus	Fr.	Schuppiger Porling
4	Polyporus	tuberaster	(Jacq.: Pers.) Fr.	Sklerotien-Porling
4	Polyporus	varius	Pers.: Fr.	Löwengelber Schwarzfussp.
4	Pseudocraterellus	sinuosus	(Fr.: Fr.) Reid.	Krauser Leistling
4	Pulcherricium	caeruleum	(Fr.) Parm.	Blauer Rindenpilz
4	Pycnoporellus	fulgens	(Fr.) Donk	Leuchtender Weichporenschw.
4	Pycnoporus	cinnabarinus	(Jacq.: Fr.) Karst.	Zinnoberrote Tramete
4	Ramaria	botrytis	(Pers.: Fr.) Ricken	Hahnenkamm
4	Ramaria	flaccida	(Fr.) Bourd.	Flattrige Fichtenkoralle
4	Ramaria	flava	(Schäff.: Fr.) Quél.	Schwefelgebe Koralle
4	Ramaria	formosa	(Pers.: Fr.) Quél.	Dreifarbene Koralle
4	Ramaria	gracilis	(Pers.: Fr.) Quél.	Zierliche Koralle
4	Ramaria	neoformosa	Petersen	Formosaähnliche Koralle
4	Ramaria	pallida	(Schäff. em. Bres.) Ricken	Bauchwehkoralle
4	Ramaria	rubella	(Schäff.: Krombh.) Peter.	Rotbraune Koralle
4	Ramaria	sanguinea	(Pers.) Quélet	Blutrotfleckende Koralle
4	Ramaria	stricta	(Pers.: Fr.) Quél. s. str.	Steife Koralle
4	Sarcodon	imbricatus	(L.: Fr.) Karst.	Habichtsstacheling
4	Schizophyllum	commune	Fr. ex Fr.	Spaltblättling
4	Schizopora	paradoxa	(Schrad.: Fr.) Donk	Veränderlicher Spaltporling
4	Skeletocutis	carneogrisea	David	Fleischgrauer Knorpelporling
4	Skeletocutis	nivea	(Jungh.) Keller	Schneeweisser Feinporling
4	Sparassis	crispa	(Wulf. in Jacq.) Fr.	Krause Glucke
4	Steccherinum	robustius	Dst. Bour.	Kleinsporiger Resupinatstach.
4	Stereum	gausapatum	(Fr.) Fr.	Eichen-Schichtpilz
4	Stereum	hirsutum	(Willd.: Fr.) S.F. Gray	Zottiger Schichtpilz
4	Stereum	rameale	(Pers.: Fr.) Burt	Ästchen-Schichtpilz
4	Stereum	subtomentosum	Pouzar	Samtiger Schichtpilz
4	Telephora	terrestris	Fr.	Fächerförmiger Erdwarzenpilz
4	Thelephora	palmata	Scop.: Fr.	Stinkender Warzenpilz
4	Thelephora	penicillata	Pers.: Fr.	Pinsel-Warzenpilz
4	Trametes	gibbosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Buckel-Tramete
4	Trametes	hirsuta	(Wulf.: Fr.) Pilát	Striegelige Tramete
4	Trametes	multicolor	(Schäff.) Jül.	Zonen-Tramete

	Gattung	Art	Autor	Name deutsch
4	Trametes	versicolor	(L.: Fr.) Pilát	Schmetterlings-Tramete
4	Trichaptum	abietinum	(Fr.) Ryv.	Tannentramete
4	Vuilleminia	comedens	(Nees: Fr.) Maire	Rindensprenger
5	Anthrus	archeri	(Berk.) E. Fischer	Tintenfischpilz
5	Calvatia	gigantea	(Batsch:Pers.) Lloyd	Riesenbovist
5	Calvatia	utriformis	(Bul.: Pers.:) Jaap	Hasenbovist
5	Clathrus	ruber	Battarra: Pers.	Roter Gitterling
5	Crucibulum	laeve	(Huds.: Relh.) Kambly et al.	Tiegelteuerling
5	Cyathus	striatus	(Huds.) ex Pers.	Striegeliger Teuerling
5	Geastrum	fimbriatum	Fries	Gewimperter Erdstern
5	Geastrum	triplex	Jungh.	Halskrausen-Erdstern
5	Handkea	exipuliformis	(Scop.: Fr.) Kreisel	Beutel-Spaltporenstäubling
5	Handkea	utriformis	(Bull.: Pers.) Kreisel	Hasenstäubling
5	Lycoperdon	echinatum	Pers.: Pers.	Igel-Stäubling
5	Lycoperdon	ericaeum	Bonorden	Heide-Stäubling
5	Lycoperdon	mammaeforme	Pers.	Flocken-Stäubling
5	Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
5	Lycoperdon	pyriforme	Schäff.: Pers.	Birnen-Stäubling
5	Phallus	impudicus	L. ex Pers.	Stinkmorchel
5	Scleroderma	areolatum	Ehrenb.	Gefelderter Kartoffelbovist
5	Scleroderma	citrinum	Pers.	Dickschaliger Kartoffelbovist
5	Scleroderma	verrucosum	(Bull.: Pers.) Pers.	Dünnschaliger Kartoffelbovist
5	Vascellum	pratense	Pers.: Pers.) Kreisel	Wiesen-Stäubling
6	Auricularia	auricula-judae	(Bull. ex St. Am.) Wettst.	Judasohr
6	Auricularia	mesenterica	Dicks.: Fr.	Gezonter Ohrlappenpilz
6	Calocera	viscosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Klebriger Hörnling
6	Exidia	truncata	Fr.: Fr.	Becherförmiger Drüsling
6	Phleogena	faginea	(Fr.: Fr.) Link	Buchen-Köpfchenträgera
6	Pseudohydnum	gelatinosum	(Scop.: Fr.) Karst.	Zitterzahn
6	Sebacina	incrustans	(Pers.:Fr.) Tul.	Erd-Wachskruste
6	Tremella	mesenterica	Retz. ex Hook.	Goldgelber Zitterling
6	Tremiscus	helveloides	(DC: Pers.) Donk	Roter Gallerttrichterling
7	Aleuria	aurantia	(Fr.) Fuckel	Gemeiner Orangebecher
7	Bisporella	citrina	(Batsch ex Fr.) Korf & Carp.	Zitronengelbes Holzbecherchen
7	Bulgaria	inquinans	(Prs.:) Fries	Gemeiner Schmutzbecherling
7	Chlorosplenium	aeruginascens	(Nyl.) Karst.	Grünspanbecherling
7	Choiromyces	venosus	(Fr.) Th. Fries	Stachelsporiger Mäandertrüffel
7	Cordyceps	ophioglossoides	(Erh. ex Fr.) Link	Zungen-Kernkeule
7	Daldinia	concentrica	(Bolt. ex Fr.) Ces. & de Not.	Kohliger Kugelpilz
7	Dasyscyphus	niveus	(Hedw. ex Fr.) Sacc.	Schneeweisses Haarbecherchen
7	Diatrypella	favacea	(Fr. : Fr.) Ces. & De Not.	
7	Disciotis	venosa	Fr.	Morchelbecherling
7	Geoglossum	cookeianum	Nannfeld	Trockene Erdzunge
7	Gyromitra	Infula	(Bres.) Kreisel	Bischofsmütze
7	Helvella	atra	Holmsk.: Fr.	Schwarze Lorchel
7	Helvella	crispa	(Bull. ex St. Aman) Boud.	Herbstlorchel
7	Helvella	elastica	Boud.	Elastische Lorchel
7	Helvella	lacunosa	(Pers.) O. Kuntze	Grubenlorchel
7	Helvella	macropus	(Pers.: Fr.) Karsten	Langfuss-Lorchel
7	Hymenoscyphus	albidus	(Roberge) Phill.	Weisses Stengelbecherchen
7	Hypoxylon	fuscum	(Pers. ex Fr.) Kickx	Rotbraune Kohlenbeere
7	Hypoxylon	serpens	(Pers.ex Fries) Fr.	Gewundene Kohlenbeere
7	Hypoxylon	fragiforme	(Fr.) Fr.	Rötliche Kohlenbeere
7	Hypoxylon	multiforme	(Willd. ex Fr.) Dharne	Vielgestaltige Kohlenbeere
7	Leotia	lubrica	(Fr.) Karst.	Gemeines Gallertkäppchen
7	Morchella	esculenta	(Tode ex Fr.) Fr.	Speisemorchel
7	Otidea	alutacea	(Pers.: Fr.) Sacc.	Lederbrauner Öhrling
7	Otidea	concinna	(L.: Fr.) Fuckel	Zitronengelber Öhrling
7	Peziza	arvernensis	Pers. Ex Mérat	Buchenwaldbecherling
7	Peziza	badia	Pers. ex Fries	Kastanienbrauner Becherling
7	Peziza	vesiculosa	Pers.	Blasiger Becherling
7	Ustulina	deusta	Swartz ex Pers.	Brandiger Krustenpilz
7	Xylaria	polymorpha	(Pers.: Fr.) Greville	Vielgestaltige Holzkeule

* Pilze in alpiner Zone



VEREIN FÜR PILZKUNDE BASEL

Pilze der Jahre 2006/2007/2010/2011/2012/2013

Das nachfolgende Dokument beinhaltet die Jahresarbeit des Vereins für Pilzkun-de Basel der Jahre 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013.
Die gefundenen Pilze wurden jede Woche bestimmt, einige illustriert, dokumentiert und im Internet hochgeladen. Der Text auf der ersten, linken Seite wiederholt sich deswegen wöchentlich.

Pilze 2013

Idee und Realisation: Kurt Minder

Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

Pilze der Woche 15

Frühjahrs-pilzausstellung

Clitocybe vermicularis *Lärchen-Trichterling*

Sektion Vernae:	Stielbasis mit weißlichen Rhizoiden. Meist Frühjahr bis-Frühsommer.
Art:	Hut 20 - 60 mm
Sporen	3,5-4,5x2-3 µm, hyalin, Spp. weiss
Ökologie:	Nadelwald, Fichte, Lärche
Bemerkungen:	Die wichtigsten Merkmale sind der Standort, die Rhizoidenan der Stielbasis und die Sporengrösse. Eine ähnliche Art ist C. paropsis mit Sp. von 3-4x2 µm wird jedoch von div. Autoren mit C. fragrans gleichgestellt..

Clitocybe vermicularis | *Lärchern-Trichterling*

Pilz-Fundliste der Woche 15

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Clitocybe	vermicularis	(Fr.) Quélet	Lärchen-Trichterling
2	Lentinus	adhaerens	(Alb. et Schw.: Fr.)	Fr. Harziger Sägeblättling
4	Bjerkandera	adusta	(Willd.: Fr.) Karst.	Angebrannter Rauchporling
4	Cerrena	unicolor	(Bulliard: Fr.) Murrill	Aschgrauer Langporenpilz
4	Coriolopsis	gallica	(Fr.) Ryv.	Braune Borstentramete
4	Daedalea	quercina	(L. ex Fr.)	Eichenwirrling
4	Daedaleopsis	confragosa	(Bolt.: Fr.) Schröt. s. str.	Rötende Tramete
4	Daedaleopsis	tricolor	(Pers.) Bond. & Sing.	Purpurrote Tramete
4	Fomes	fomentarius	(L.: Fr.) Fr.	Echter Zunderschwamm
4	Fomitopsis	pinicola	(Fr.) Karst.	Rotbrauner Baumschwamm
4	Ganoderma	lipsiense	(Batsch.: Pers.)	Atkinson Flacher Lackporling
4	Gloeophyllum	odoratum	(Wulf.: Fr.) Imyzeki	Fencheltramete
4	Heterobasidion	annosum	(Fr.) Bref.	Wurzelschwamm
4	Meruliopsis	corium	(Fr.) Ginns	Lederartiger Fältling
4	Phellinus	hartigii	(All. & Schn.) Bond.	Tannen-Feuerschwamm
4	Pycnoporellus	fulgens	(Fr.) Donk	Leuchtender Weichporling
4	Schizophyllum	commune	Fr.: Fr.	Gemeiner Spaltblättling
4	Stereum	hirsutum	(Willd.: Fr.) S.F. Gray	Zottiger Schichtpilz
4	Stereum	subtomentosum	Pouzar	Samtiger Schichtpilz
4	Trametes	gibbosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Buckel-Tramete
4	Trametes	hirsuta	(Wulf.: Fr.) Pilát	Striegelige Tramete
4	Trametes	multicolor	(Schäff.) Jül.	Zonen-Tramete
4	Trametes	versicolor	(L.: Fr.) Pilát	Schmetterlings-Tramete
4	Trichaptum	abietinum	(Fr.) Ryv.	Tannentramete
6	Auricularia	mesenterica	Dicks.: Fr. Gezonter	Ohrlappenpilz
6	Exidia	plana / glandulosa	Fr.	Hexenbutter
6	Exidiopsis	calcea	(Pers.:Fr.)	Wells Kalkfarbene Gallertkruste
7	Daldinia	concentrica	(Bolt. ex Fr.) Ces. & de Not.	Kohliger Kugelpilz
7	Disciotis	venosa	Fr.	Morchelbecherling
7	Sarcoscypha	coccinea	(Beck ex Saccardo) Boudier	Zinnoberroter Prachtsbecherling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

Pilze der Woche 17

Coprinus domesticus | *Grosser Holz-Tintling*

Sektion Domestici: Velumresten aus kleinen Schüppchen, KOH negativ.

Art:	Hut 25 - 70 mm
Sporen	7,5-10x4-5 µm, z.T. bohnenförmig
Ökologie:	Strünke, Holzresten
Bemerkungen:	Der Glimmertintling hat nicht bohnenförme Sporen. Zudem sind die Schüppchen glimmerig-flockig.

Coprinus domesticus | *Grosser Holz-Tintling*

Pilz-Fundliste der Woche 17

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Clitocybe	vermicularis	(Fr.) Quélet	Lärchen-Trichterling
2	Coprinus	domesticus	(Bolt.y: Fr.) Gra	Haus-Tintling
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Pholiotina	aporos	Kits van Waveren	Frühlings-Glockenschüppling
4	Bjerkandera	adusta	(Willd.: Fr.) Karst.	Angebrannter Rauchporling
4	Polyporus	squamosus	Fr.	Schuppiger Porling
7	Disciotis	venosa	Fr.	Morchelbecherling
7	Morchella	esculenta	(Tode ex Fr.) Fr.	Speisemorchel

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

Pilze der Woche 18

Bolbitius vitellinus | *Gold-Mistpilz*

Art:	Hut 10 - 40 mm, schmierig.
Sporen	11-13x7-8,5 µm, mit Keimporus, Spp. rötlichbraun.
Ökologie:	Mist, gedüngte Erde, Holzresten.
Bemerkungen:	Beim B. variicolor ist der Hut satt ocker- bis olivgelb.

Bolbitius vitellinus (Pers.: Fr.) Fr.
Gold-Mistpilz

Pilz-Fundliste der Woche 18

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Bolbitius	vitellinus	(Pers.: Fr.) Fr.	Gold-Mistpilz
2	Calocybe	gambosa	(Fr.) Donk	Mairitterling
2	Coprinus	cinereus	(Schäff. Fr.) Gray	Wollstieliger Misttintling
2	Coprinus	micaceus	(Bull.: Fr.) Fr.	Glimmertintling
2	Hydropus	subalpinus	(Höhnel) Singer	Buchenwald-Wasserfuss
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Mycena	galericulata	(Scop.:Fr.) Gray	Rosablättriger Helmling
2	Psathyrella	spadiceogrisea	(Schäff.) Fr. Maire	Dungbewohnender Faserling
4	Polyporus	ciliatus	Fr.	Bewimperter Porling
4	Vuilleminia	comedens	(Nees: Fr.) Maire	Rindensprenger
7	Helvella	leucomelas	(Fr.) Fr.	Schwarzweisser Rippenbecherling
7	Morchella	esculenta	(Tode ex Fr.) Fr.	Speisemorchel
7	Peziza	vesiculosa	Pers.	Blasiger Becherling
7	Ustulina	deusta	Swartz ex Pers.	Brandiger Krustenpilz

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

Pilz-Fundliste 19. Mai bis 7. Juni 2013
Scansano, Toscana

Agaricus iodosmus | *Breitschuppiger Jodoform-Egerling*

Art:	Hut 100 mm, mit scholligen Schuppen, überall gilbend.
Geruch	jodoformartig.
Sporen	6-7,5x4,5-5,5 µm.
Ökologie:	Bei Pinien.
Bemerkungen:	Der Pilz ist nicht selten im Mittelmeerraum. Typisch ist das starke gilben und der intensive Geruch nach Jodoform.

Agaricus iodosmus
Heinemann
Breitschuppiger Jodoform-Egerling

Clathrus ruber Roter Gitterling

Hygrocybe chlorophana Stumpfer Saftling

Russula aurea Goldtäubling

Russula curtipes Kurzstieliger Ledertäubling

Paxillus involutus Kahler Krempling

Pilz-Fundliste 19. Mai bis 7. Juni 2013 Scansano, Toscana

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
1	Boletus	queletii	Schulzer	Glattstieliger Hexenröhrling
1	Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
1	Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe
2	Agaricus	arvensis	Schäff.: Fr.	Schaf-Champignon
2	Agaricus	bitorquis	(Quélet) Sacc.	Trottoir-Champignon
2	Agaricus	iodosmus	Heinemann	Breitschuppiger Jodoform-Egerling
2	Agaricus	xanthoderma	Genev.	Karbol-Egerling
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Amanita	vaginata	(Bull.) Vitt.	Grauer Scheidenstreifling
2	Gymnopus	dryophilus	(Bulliard: Fr.) Murrill	Waldfreund-Rübling
2	Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
2	Hygrocybe	chlorophana	(Fr.) Wünsche	Stumpfer Saftling
2	Inocybe	asterospora	Quel.	Sternsporiger Risspilz
2	Inocybe	cookei	Bres.	Knolliger Risspilz
2	Inocybe	riomosa	(Bull.: Fr.) Kummer	Kegeliger Risspilz
2	Marasmius	oreades	(Bolton.: Fr.) Fr.	Nelkenschwindling
2	Marasmius	rotula	(Scop.: Fr.) Fr.	Halsbandschwindling
2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2	Pluteus	salicinus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Grauer Dachpilz
2	Psathyrella	spadiceogrisea	(Schäff.) Fr. Maire	Dungbewohnender Faserling
3	Lactarius	chrysorrheus	Fr.	Goldfüssiger Milchling
3	Lactarius	illyricus	Piltaver Netzsporiger	Buchen Milchling
3	Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
3	Russula	aurea	Pers.	Goldtäubling
3	Russula	curtipes	Moell. & Schaeff.	Kurzstieliger Ledertäubling
3	Russula	cutefracta	Cke.	Rissigrandiger Täubling
3	Russula	cyanoxantha	R. Maire.: Singer	Grüner Frauentäubling
3	Russula	delica	Fr.	Gemeiner Weisstäubling
3	Russula	heterophylla	(Fr.) Fr.	Grüner Speisetäubling
3	Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
3	Russula	romellii	Maire	Weissstieliger Ledertäubling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilz-Fundliste 19. Mai bis 7. Juni 2013 Scansano, Toscana

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
3	Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
3	Russula	torulosa	Bres.	Gedrungener Täubling
4	Coriolopsis	gallica	(Fr.) Ryv.	Braune Borstentramete
4	Inonotus	nodulosus	(Fr.) Karst.	Buchen-Schillerporling
4	Lenzites	betulina	(L. ex Fr.) Fr.	Birkenblättling
4	Stereum	hirsutum	(Willd.: Fr.) S.F. Gray	Zottiger Schichtpilz
5	Clathrus	ruber	Battarra: Pers.	Roter Gitterling
5	Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Lactarius illyricus Buchen Milchling

Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

Pilz-Fundliste der Woche 30

Scutellinia armatospora

Stachelsporiger Schildborstling

Art:	Hut bis 5 mm, Hutrand mit dunkelbraunen Haaren.
Sporen	16-18 µm.
Ökologie:	auf nackter Erde.
Bemerkungen:	Diese Art ist gekennzeichnet durch die leuchtend orange Farbe und den runden, warzigen Sporen.

Scutellinia armatospora
Lohmeyer & Häffner

Stachelsporiger Schildborstling

Foto auf nächster Seite von Markus Wilhelm

Volvariella bombycina *Wolliger Scheidling*

Pilz-Fundliste der Woche 30

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	aestivalis	(Paulet) Fr.	Sommer-Steinpilz
1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Pleurotus	pulmonarius	(Fr.) Quél.	Lungen-Seitling
2	Pluteus	atromarginatus	(Sing.) Kühn.	Schwarzschneidiger Dachpilz
2	Volvariella	bombycina	(Schäff.: Fr.) Sing.	Wolliger Scheidling
3	Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
3	Russula	nauseosa	(Pers.) Fr..	Geriefter Weichtäubling
3	Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
7	Hymenoscyphus	albidus	(Roberge) Phill.	Weisses Stengelbecherchen
7	Scutellinia	armatospora	Lohmeyer & Häffner	Stachelsporiger Schildborstling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Volvariella bombycina | *Wolliger Scheidling*

Art: Hut bis über 120 mm, fein faserig-schuppig
Mikro: Sp. 6,5-9x4,5-6,5 µm, Zystiden schmal keulig bis spindelig, HDS eine Kutis mit Übergang zu einem Trichoderm, intrazellulär braun pigmentiert.
Ökologie: an Laubholz.
Bemerkungen: Eine sehr schöne und seltene Art, die jedoch in der <Nordwestschweiz gelegentlich vor kommt (Peter Baumann). Gattungsmerkmale sind die rosabraune Sporenfarbe und die Scheide an der Stielbasis, ohne Manschette.
Foto: Markus Wilhelm

Pleurotus pulmonarius | *Lungen-Seitling*

Bemerkungen: Hauptmerkmale zu Pleurotus cornucopiae sind die nicht dimitische Huthauthyphen und die dickwandigen Hyphen der Lamellen-Trama. Die Sporen sind etwa gleich gross. Makroskopisch ist der Stiel kürzer, weniger stark rillig und exzentrisch. Laut Verbreitungsatlas sind nur 10 Standorte in der Schweiz bekannt. Im Gebiet der Rothalle bei Muttenz gab es dieses Jahr eine grössere Anzahl von Standorten an totem Buchenholz,
Gefunden von: Kurt Minder

Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

Pilz-Fundliste der Woche 33

Inocybe lanuguinosa *Wolliger Risspilz*

Art:	Hut bis 40 mm, fein beschüppelt. Stiel bis 60 mm. Geruch unbedeutend.
Sporen	8-10 x 6-7 µm., höckerig Mit Cheilo- und Pleurozystiden.
Ökologie:	In Mooren bei Nadelbäumen.
Bemerkungen:	Wie die Abbildung zeigt, sind die Zystiden dünnwandig ohne Kristalle, was eher einer I. leptophylla entspricht. Diese hat jedoch keine Pleurozystiden.

Inocybe lanuginosa *Wolliger Risspilz*
(Bull. Fr.) Kumm.
Fotos, mit Ausnahme von B. fechtneri und B. queletii von Markus Wilhelm

oben: Zystiden
unten: Sporen





Boletus fechtneri *Silber-Röhrling*

Boletus queletii *Glattstieliger Hexenröhrling*

Marasmiellus candidus *Schneeweisser Zwergschwindling*

Lactarius cremor *Runzliger Zwergmilchling*

Omphalina discorosa *Rosablättriger Holznabeling*

Duportella malençonii *Veränderlicher Schichtpilz*

Duportella malençonii *Veränderlicher Schichtpilz*

Pilz-Fundliste der Woche 33

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1	Boletus	fechtneri	Velen.	Silber-Röhrling
1	Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
1	Boletus	queletii	Schulzer	Glattstieliger Hexenröhrling
1	Boletus	radicans	Pers.: Fr.	Bitter-Röhrling
1	Boletus	regius	Krombh.	Königs-Röhrling
1	Leccinum	carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuss
1	Leccinum	crocipodium	(Letellier) Walting	Gelbporiger Rauhfuss
1	Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
1	Xerocomus	dryophylus	(Thiers) Singer	Dunkelroter Filz-Röhrling
1	Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe
2	Amanita	crocea	(Quél. in Boud.) Sing.	Orangebrauner Scheidenstreifling
2	Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
2	Amanita	fulva	(Schff.) Fr.	Rotbrauer Streifling
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Coprinus	strossmayeri	S. Schulz.	Perhuhn-Tintling
2	Cortinarius	huronensis	Amm. & Sm.	Braunhütiger Sumpf-Häubling
2	Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
2	Inocybe	calamistrata	(Fr.:Fr.) Gill.	Blaufüssiger Risspilz
2	Inocybe	lanuginosa	(Bull. Fr.) Kumm.	Wolliger Risspilz
2	Marasmiellus	candidus	(Bolt.: Fr.) Sing.	Schneeweisser Zwergschwindling
2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2	Omphalina	discorosea	(Pil.) Her. & Kotl.	Rosablättriger Holznabeling
2	Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
2	Pluteus	leonius	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Löwengelber Dachpilz
2	Pluteus	nanus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Zwerg-Dachpilz
2	Psathyrella	candolleana	(Fr.: Fr.) Maire	Behangener Faserling
2	Simocybe	rubi	(Berk.) Sing.	Breitsporiger Olivschnitzling
2	Volvariella	murinella	(Quél.) Mos.	Mausgrauer Scheidling
2	Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3	Lactarius	acerrimus	Britz.	Queradriger Milchling
3	Lactarius	cremor	Fr.	Runzliger Zwergmilchling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilz-Fundliste der Woche 33

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
3	Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
3	Lactarius	volemus	(Fr.: Fr.) Fr.	Brätling
3	Russula	anthracina	Romagn.	Lachsblättriger Schwärztäubling
3	Russula	faginea	Romagn.	Buchen-Heringstäubling
3	Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
3	Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
3	Russula	nauseosa	(Pers.) Fr..	Geriefter Weichtäubling
3	Russula	paludosa	Britz.	Apfeltäubling
3	Russula	raoultii	Quél.	Blassgeber Täubling
4	Cantharellus	auroa	(Batsch) Kuyp.	Duftender Gabeling, Goldfüsschen
4	Duportella	malençonii	(Boid. & Klanq.) Hijortst.	Veränderlicher Schichtpilz
4	Phaeolus	schweinitzii	(Fr.) Pat.	Kiefernbraunporling
5	Phallus	impudicus	L. ex Pers.	Stinkmorchel
5	Scleroderma	citrinum	Pers.	Dickschaliger Kartoffelbovist
6	Calocera	viscosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Klebriger Hörnling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

Pilz-Fundliste der Woche 34

Lactarius azonites *Rauchfarbener Rosamilchling*

Art:	Hut bis 70 mm,
Sporen	8-8,5 x 7,5-8 µm. gratig. Macrozystiden fehlen wie bei allen Korallenmilchlingen.
Ökologie:	Buchen, Eichen, Mischwälder.
Bemerkungen:	Dieser Rosamilchling hat eine trockene Huthaut, nicht runzlig. Die weisse Milch verfärbt sich nur langsam rosa und ist nicht scharf.

Lactarius azonites
Rauchfarbener Rosamilchling
(Bull.) Fr.



Ganoderma carnosum *Dunkler Lackporling*

Bondarzewia montana *Bergporling*

Pilz-Fundliste der Woche 34

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	aestivalis	(Paulet) Fr.	Sommer-Steinpilz
1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1	Boletus	fechtneri	Velen.	Silber-Röhrling
1	Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
1	Boletus	queletii	Schulzer	Glattstieliger Hexenröhrling
1	Boletus	radicans	Pers.: Fr.	Bitter-Röhrling
1	Boletus	satanas	Lenz	Satansröhrling
1	Boletus	rubrosanguineus	Walty ex Cheype	Falscher Satans-Röhrling
1	Leccinum	carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuss
1	Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
1	Strobilomyces	strobilaceus	(Scop.: Fr.) Berk.	Strubelkopfröhrling
1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
1	Xerocomus	dryophylus	(Thiers) Singer	Dunkelroter Filz-Röhrling
1	Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe
2	Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Coprinus	disseminatus	(Pers.: Fr.) S.F.Gray	Gesäter Tintling
2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2	Pluteus	salicinus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Grauer Dachpilz
2	Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3	Lactarius	glaucescens	Crossl.	Grünender Pfeffermilchling
3	Lactarius	acerrimus	Britz.	Queradriger Milchling
3	Lactarius	azonites	(Bull.) Fr.	Rauchfarbener Rosamilchling
3	Lactarius	volemus	(Fr.: Fr.) Fr.	Brätling
3	Lactarius	zonaroides	Kühner et Romagn.	Montaner Zonen-Milchling
3	Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
3	Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
3	Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3	Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
3	Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
3	Russula	lilacea	Quél.	Rotstieliger Reiftäubling
3	Russula	raoultii	Quél.	Blassgeber Täubling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilz-Fundliste der Woche 34

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
3	Russula	violeipes	Quélet	Violettstieliger Brätlingstäubling
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
4	Bjerkandera	adusta	(Willd.: Fr.) Karst.	Angebrannter Rauchporling
4	Bondarzewia	montana	(Quél.) Singer	Bergporling
4	Ganoderma	carnosum	Pat.	Dunkler Lackporling
4	Hyphoderma	mutatum	(Peck) v. Höhn. & Litsch.	Veränderlicher Rindenpilz
4	Laetiporus	sulfureus	Murr.	Schwefelporling
4	Polyporus	tuberaster	(Jacq.: Pers.) Fr.	Sklerotien-Porling
4	Thelephora	penicillata	Pers.: Fr.	Pinsel-Warzenpilz
5	Scleroderma	citrinum	Pers.	Dickschaliger Kartoffelbovist

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

Pilz-Fundliste der Woche 35

Russula aurea *Goldtäubling*

Art:	Hut bis 100 mm.
Mikro:	Sp. 7-10 x 6-8 µm, gratig verbunden. Huthaut ohne Dermatocystiden.
Ökologie:	Laubwälder, besonders bei Buchen,.
Bemerkungen:	Ein mild schmeckender Täubling, der durch die gelblichen Lamellen und die gelbe Farbe unter der Huthaut auffällt.

Russula aurea | *Goldtäubling*
Pers.

Russula lilacea *Rotstieliger Reiftäubling*

Russula farinipes *Mehlstiel-Täubling*

Russula luteotacta *Gelbfleckender Täubling*

Russula lepida *Harter Zinnobertäubling*

Pilz-Fundliste der Woche 35

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	aestivalis	(Paulet) Fr.	Sommer-Steinpilz
1	Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
1	Boletus	fechtneri	Velen.	Silber-Röhrling
1	Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
1	Boletus	queletii	Schulzer	Glattstieliger Hexenröhrling
1	Boletus	radicans	Pers.: Fr.	Bitter-Röhrling
1	Boletus	satanas	Lenz	Satansröhrling
1	Gyroporus	castaneus	(Bull.: Fr.)	Hasen-Röhrling
1	Leccinum	crocipodium	(Letellier) Walting	Gelbporiger Rauhfuss
1	Leccinum	variicolor	Walting	Verschiedenfarbiger Rauhfuss
1	Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
2	Agaricus	augustus	Fr.	Braunschuppiger Riesenegerling
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Clitocybe	gibba	(Pers. Fr.) Kummer	Ockerbrauner Trichterling
2	Cortinarius	rubricosus	Fries ss. Moser	Schwärzender Wasserkopf
2	Crepidotus	applanatus	(Pers.) Kumm.	Gerieftes Stummelfüsschen
2	Gymnopus	dryophilus	(Bulliard: Fr.) Murrill	Waldfreund-Rübling
2	Gymnopus	fusipes	(Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling
2	Lyophyllum	decastes	(Fr.: Fr.) Singer	Brauner Büschelrasling
2	Marasmius	rotula	(Scop.: Fr.) Fr.	Halsbandschwindling
2	Marasmius	torquescens	Quél.	Ledergelber Schwindling
2	Mycena	renati	Quélet	Gelbstieliger Nitrat-Helmling
2	Pleurotus	pulmonarius	(Fr.) Quél.	Lungen-Seitling
2	Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
2	Pluteus	salicinus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Grauer Dachpilz
2	Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3	Lactarius	acerrimus	Britz.	Queradriger Milchling
3	Lactarius	zonarius	(Bulliard) Fr.	Echter Zonenmilchling
3	Lactarius	azonites	(Bull.) Fr.	Rauchfarbener Rosamilchling
3	Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
3	Russula	anthracina	Romagn.	Lachsblättriger Schwärztäubling
3	Russula	atropurpurea	(Krombh.) Britz.	Pupurschwarzer Täubling
3	Russula	aurea	Pers.	Goldtäubling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilz-Fundliste der Woche 35

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
3	Russula	chloroides	(Krombh.) Bres.	Schmalblättriger Weisstäubling
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
3	Russula	cyanoxantha fo. pelter.	R. Maire.: Singer	Grüner Frauentäubling
3	Russula	delica	Fr.	Gemeiner Weisstäubling
3	Russula	emetica	(Schäff.: Fr.) Gray	Kirschroter Speitäubling
3	Russula	farinipes	Romell in Britz.	Mehlstieltäubling
3	Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
3	Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
3	Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
3	Russula	lilacea	Quél.	Rotstieliger Reiftäubling
3	Russula	luteotacta	Rea	Gelbfleckender Täubling
3	Russula	nauseosa	(Pers.) Fr..	Geriefter Weichtäubling
3	Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3	Russula	olivascens (postia)	(Pers.: Fr.) Bres.	Olivgrüner Täubling
3	Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
3	Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
3	Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
4	Bondarzewia	montana	(Quél.) Singer	Bergporling
4	Daedalea	quercina	(L. ex Fr.)	Eichenwirrling
4	Daedaleopsis	confragosa	(Bolt.: Fr.) Schröt. s. str.	Rötende Tramete
4	Dentropolyporus	umbellatus	(Pers.: Fr.) Jül.	Eichhase
4	Ganoderma	lucidum	(Curt.: Fr.) Karst.	Glänzender Lackporling
4	Hapalopilus	rutilans	(Pers.: Fr.) Karst.	Zimtfarbener Weichporling
4	Phellodon	melaleucus	(Sw. apud Fr.: Fr.) Karst.	Schwarzweisser Duftstacheling
4	Phellodon	niger	(Fr. ex Fr.) Karst.	Schwarzer Duftstacheling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

Pilz-Fundliste der Woche 36

Cortinarius orellanus *Orangefuchsiger Rauhkopf*

Art:	Hut bis 60 mm.
Mikro:	Sp. 8-11,5-x 5,5-6,5 µm, mässig warzig-gratig. Basidiolen zylindrisch.
Ökologie:	Laubwälder, besonders bei Buchen, Eichen.
Bemerkungen:	Gegenüber seinem Doppelgänger im Nadelwald (Cortinarius rubellus) hat er nur wenig Velum am Stiel. Cortinarius orellanus hat einen grösseren Q-Wert der Sporen. Beide Arten sind stark giftig!

Cortinarius orellanus
(Fr.) Fr.
Orangefuchsiger Rauhkopf

Russula nauseosa *Geriefter Weichtäubling*

Russula rhodopus *Flammenstiel-Täubling*

Pilz-Fundliste der Woche 36

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	aestivalis	(Paulet) Fr.	Sommer-Steinpilz
1	Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
1	Boletus	fechtneri	Velen.	Silber-Röhrling
1	Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
1	Boletus	queletii	Schulzer	Glattstieliger Hexenröhrling
1	Boletus	radicans	Pers.: Fr.	Bitter-Röhrling
1	Boletus	satanas	Lenz	Satansröhrling
1	Boletus	pulverlulentus	Opat.	Schwarzblauender Röhrling
1	Gyroporus	castaneus	(Bull.: Fr.)	Hasen-Röhrling
1	Leccinum	crocipodium	(Letellier) Walting	Gelbporiger Rauhfuss
1	Leccinum	variicolor	Walting	Verschiedenfarbiger Rauhfuss
1	Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
2	Agaricus	augustus	Fr.	Braunschuppiger Riesenegerling
2	Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Clitocybe	gibba	(Pers. Fr.) Kummer	Ockerbrauner Trichterling
2	Cortinarius	bolaris	(Pers.: Fr.) Fr.	Rotschuppiger Rauhkopf
2	Cortinarius	orellanus	(Fr.) Fr.	Orangefuchsiger Rauhkopf
2	Cortinarius	rubricosus	Fries ss. Moser	Schwärzender Wasserkopf
2	Crepidotus	applanatus	(Pers.) Kumm.	Gerieftes Stummelfüsschen
2	Gymnopus	dryophilus	(Bulliard: Fr.) Murrill	Waldfreund-Rübling
2	Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
2	Gymnopus	fusipes	(Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling
2	Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
2	Inocybe	bongardii	(Weinmann) Quélet	Duftender Risspilz
2	Inocybe	riomosa	(Bull.: Fr.) Kummer	Kegeliger Risspilz
2	Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2	Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
2	Lyophyllum	decastes	(Fr.: Fr.) Singer	Brauner Büschelrasling
2	Marasmius	rotula	(Scop.: Fr.) Fr.	Halsbandschwindling
2	Marasmius	torquescens	Quél.	Ledergelber Schwindling
2	Mycena	renati	Quélet	Gelbstieliger Nitrat-Helmling
2	Pholiota	flammans	(Fr.:) Kummer	Feuerschüppling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilz-Fundliste der Woche 36

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Pleurotus	pulmonarius	(Fr.) Quél.	Lungen-Seitling
2	Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
2	Pluteus	leonius	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Löwengelber Dachpilz
2	Pluteus	romelli	(Britz.) Sacc.	Gelbstieliger Dachpilz
2	Pluteus	salicinus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Grauer Dachpilz
2	Tricholomopsis	decora	(Fr.) Sing.	Olivgelber Holzritterling
2	Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3	Lactarius	acerrimus	Britz.	Queradriger Milchling
3	Lactarius	azonites	(Bull.) Fr.	Rauchfarbener Rosamilchling
3	Lactarius	fluens	Boud.	Braunfleckender Milchling
3	Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
3	Lactarius	ruginosus	Rom.	Kleiner Korallenpilz
3	Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
3	Lactarius	zonarius	(Bulliard) Fr.	Echter Zonenmilchling
3	Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
3	Russula	amoena	Quélet	Samt-Täubling
3	Russula	anthracina	Romagn.	Lachsblättriger Schwärztäubling
3	Russula	atropurpurea	(Krombh.) Britz.	Pupurschwarzer Täubling
3	Russula	aurea	Pers.	Goldtäubling
3	Russula	chloroides	(Krombh.) Bres.	Schmalblättriger Weisstäubling
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
3	Russula	cyanoxantha fo. pelteraui		R. Maire.: Singer Grüner Frauentäubling
3	Russula	delica	Fr.	Gemeiner Weisstäubling
3	Russula	emetica	(Schäff.: Fr.) Gray	Kirschroter Speitäubling
3	Russula	farinipes	Romell in Britz.	Mehlstieltäubling
3	Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
3	Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
3	Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
3	Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
3	Russula	lilacea	Quél.	Rotstieliger Reiftäubling
3	Russula	luteotacta	Rea	Gelbfleckender Täubling
3	Russula	nauseosa	(Pers.) Fr..	Geriefter Weichtäubling
3	Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilz-Fundliste der Woche 36

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
3	Russula	olivascens (postia)	(Pers.: Fr.) Bres.	Olivgrüner Täubling
3	Russula	rhodopus	Zvára	Flammenstieltäubling
3	Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
3	Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
3	Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
4	Bondarzewia	montana	(Quél.) Singer	Bergporling
4	Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
4	Daedalea	quercina	(L. ex Fr.)	Eichenwirrling
4	Daedaleopsis	confragosa	(Bolt.: Fr.) Schröt. s. str.	Rötende Tramete
4	Daedaleopsis	tricolor	(Pers.) Bond. & Sing.	Purpurrote Tramete
4	Dentropolyporus	umbellatus	(Pers.: Fr.) Jül.	Eichhase
4	Ganoderma	lucidum	(Curt.: Fr.) Karst.	Glänzender Lackporling
4	Hapalopilus	rutilans	(Pers.: Fr.) Karst.	Zimtfarbener Weichporling
4	Laetiporus	sulfureus	Murr.	Schwefelporling
4	Phellodon	melaleucus	(Sw. apud Fr.: Fr.) Karst.	Schwarzweisser Duftstacheling
4	Phellodon	niger	(Fr. ex Fr.) Karst.	Schwarzer Duftstacheling
7	Peziza	succuosa	(Hedw.) Fr.	Gelbmilchender Becherling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

Pilz-Fundliste der Woche 37

Inocybe fraudans *Birnen-Risspilz*

Art:	Hut bis 50 mm.
Mikro:	Sp. 9-11-x 6-8 µm, glatt, Zystiden dickwandig mit Kristallen. Caulozystiden im oberen Drittel des Stiels.
Ökologie:	Nadel- und Mischwälder, Wegränder.
Bemerkungen:	Hauptmerkmal ist der stark obstartige Geruch und die nicht grüne Hutmitte, wie bei C. corydalina. Ähnlicher Geruch hat auch I. bongardii var. bongardii, diese Art hat jedoch keine dickwandigen Zystiden.

Inocybe fraudans
(Britz.) Sacc.
Birnen-Risspilz

Tapinella panuoides *Muschel-Krempling*

Russula luteotacta *Gelbfleckender Täubling*

Coprinus comatus *Schopf-Tintling*

Pilz-Fundliste der Woche 37

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	appendiculatus	Schaeff.	Anhängsel-Röhrling
1	Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
1	Boletus	radicans	Pers.: Fr.	Bitter-Röhrling
1	Gomphidius	glutinosus	(Schäff.: Fr.) Fr.	Kuhmaul
1	Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
1	Porphyrellus	porphyrosporus	Fr.) Gilbert	Düsterer Röhrling
1	Tapinella	panuoides	(Fr.: Fr.) Gilbert	Muschel-Krempling
1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
2	Agaricus	impudicus	(Rea) Pilat	Stinkender Panther-Egerling
2	Agaricus	silvicola	(Vittad.) Sacc.	Dünnfleischiger Anis-Egerling
2	Amanita	ceciliae	Berkeley et Broome) Bas	Riesen-Streifling
2	Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
2	Amanita	junquillea	Quélet	Narzissengelber Wulstling
2	Amanita	porphyria	Alb. & Schw.: Fr.	Porphyrbrauner Wulstling
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Amanita	umbrinolutea	Secr.: Gill.) Bat.)	Verfärbender Scheidenstreifling
2	Amanita	vaginata	(Bulliard: Fr.) Vittadini	Grauer Streifling
2	Chlorophyllum	rachodes	(Vitt.) Vellinga	Safran-Riesen-Schirmlings
2	Clitocybe	phaeophthalma	(Pers.) Kp.	Ranziger Trichterling
2	Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Coprinus	comatus	(Müll.: Fr.) Pers.	Schopf-Tintling
2	Coprinus	micaceus	(Bull.: Fr.) Fr.	Glimmertintling
2	Cortinarius	fraudolosus	Britzelmayr	Trügerischer Schleimkopf
2	Crepidotus	applanatus	(Pers.) Kumm.	Gerieftes Stummelfüsschen
2	Crepidotus	mollis	(Schäff.L Fr.) Staude	Gallertfleischiges Stummelfüsschen
2	Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
2	Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
2	Hydropus	trichoderma	(Josserand) Singer	Faltiggerunzelter Wasserfuss
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Inocybe	maculata	Boud.	Gefleckter Risspilz
2	Inocybe	cookei	Bres.	Knolliger Risspilz
2	Inocybe	fraudans	(Britz.) Sacc.	Birnen-Risspilz
2	Marasmius	alliaceus	(Jacq.: Fr.) Fr.	Langstieliger Knoblauchschwindling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilz-Fundliste der Woche 37

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Marasmius	torquescens	Quél.	Ledergelber Schwindling
2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2	Mycena	haematopus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Bluthelmling
2	Mycena	renati	Quélet	Gelbstieliger Nitrat-Helmling
2	Oudemansiella	mucida	(Schrad. ex Fr.) v.H.	Beringter Schleimrübling
2	Pholiota	astragalina	(Fr.) Singer	Safranroter Schüppling
2	Pholiota	flammans	(Fr.:) Kummer	Feuerschüppling
2	Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
2	Pluteus	plautus	(Weinmann) Schillet	Verschiedenfarbiger Dachpilz
2	Pluteus	salicinus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Grauer Dachpilz
2	Tricholomopsis	decora	(Fr.) Sing.	Olivgelber Holzritterling
2	Xerula	melanotricha	Dörfelt	Weisstannen-Wurzelrübling
2	Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3	Lactarius	acerrimus	Britz.	Queradriger Milchling
3	Lactarius	acris	(Bolt.: Fr.) Gray	Rosaanlaufender Milchling
3	Lactarius	deterrimus	Gröger	Fichtenreizker
3	Lactarius	intermedius	(Krombh.) Cke.	Grubiger Weisstannenmilchling
3	Lactarius	luridus	(Pers.: Fr.) Gray	Gewöhnlicher Violettmilchling
3	Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
3	Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
3	Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
3	Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3	Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
3	Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
3	Russula	albonigra	(Krombh.) Fr.	Mentoltäubling
3	Russula	amethystina	Quélet	Amethysttäubling
3	Russula	anthracina	Romagn.	Lachsblättriger Schwärztäubling
3	Russula	aquosa	Leclair	Wässriger Moortäubling
3	Russula	atrorubens	Quél. ss. Lge. & auct.	Gilbender Speitäubling
3	Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
3	Russula	delica	Fr.	Gemeiner Weisstäubling
3	Russula	densifolia	Gill.	Dichtblättriger Schwärztäubling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilz-Fundliste der Woche 37

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
3	Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
3	Russula	fragilis	(Pers.: Fr.) Fr.	Wechselfarbiger Speitäubling
3	Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
3	Russuloa	laurocerasi	Melzer	Mandeltäubling
3	Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
3	Russula	lilacea	Quél.	Rotstieliger Reiftäubling
3	Russula	luteotacta	Rea	Gelbfleckender Täubling
3	Russula	mairei	Singer	Buchen-Speitäubling
3	Russula	nauseosa	(Pers.) Fr..	Geriefter Weichtäubling
3	Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3	Russula	olivascens (postia)	(Pers.: Fr.) Bres.	Olivgrüner Täubling
3	Russula	puellaris	Fr.	Milder Wachstäubling
3	Russula	raoultii	Quél.	Blassgeber Täubling
3	Russula	romellii	Maire	Weissstieliger Ledertäubling
3	Russula	solaris	Ferd. et Winge	Sonnentäubling
3	Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
3	Russula	violeipes	Quélet	Violettstieliger Brätlingstäubling
3	Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
4	Artomyces	pyxidatus	(Pers.: Fr.) Jül.	Becherkoralle
4	Climacocystis	borealis	(Fr.) Kotl. & Pouz.	Nordischer Porling
4	Heterobasidion	annosum	(Fr.) Bref.	Wurzelschwamm
4	Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
4	Hydnum	repandum var. rufescens		(Fr.) Barla Rotgelber Stoppelpilz
4	Lenzites	betulina	(L. ex Fr.) Fr.	Birkenblättling
4	Piptoporus	betulinus	(Bulliard) Karsten	Birken-Hautporling
4	Polyporus	tuberaster	(Jacq.: Pers.) Fr.	Sklerotien-Porling
4	Ramaria	stricta	(Pers.: Fr.) Quél. s. str.	Steife Koralle
4	Sparassis	crispa	(Wulf. in Jacq.) Fr.	Krause Glucke
5	Cyathus	striatus	(Huds.) ex Pers.	Striegeliger Teuerling
5	Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
5	Scleroderma	citrinum	Pers.	Dickschaliger Kartoffelbovist

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 37

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
6	Tremiscus	helveloides	(DC: Pers.) Donk	Roter Gallerttrichterling
8	Tubifera	ferruginea	(Batsch) Gmel.	Lachsfarbener Schleimpilz

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Lactarius acris *Rosaanlaufender Milchling*

Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

Pilz-Fundliste der Woche 38

Calocera cornea *Eichenhörnling*

Art:	Stacheln bis 7 mm.
Mikro:	Sp. 7-10 x 2,5-4 µm, hyalin, einfach septiert. Basidien stimmgabelförmig. Hyphensepten ohne Schnallen.
Ökologie:	An entrindetem Holz von Laubbäumen.
Bemerkungen:	Durch das Vorkommen an Laubholz und durch die kurzen Stacheln gut zu erkennen.

Calocera cornea
(Batsch: Fr.) Fr.
Eichenhörnling

Mycena crocata *Safranmilchender Helmling*

Marasmius wynnei *Violetlicher Schwindling*

Pilz-Fundliste der Woche 38

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Leccinum	crocipodium	(Letellier) Walting	Gelbporiger Rauhfuss
1	Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
2	Agaricus	bisporus	(Lge) Imbach	Brauner Zweispor-Egerling
2	Agrocybe	arvalis	(Fr.) Sing.	Geschwänzter Sklerotien-Ackerling
2	Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Armillaria	borealis	Marxm. & Korth.	Nordischer Hallimasch
2	Clitocybe	gibba	(Pers. Fr.) Kummer	Ockerbrauner Trichterling
2	Conocybe	subovalis	Kühn. ex Kühn. & Watl.	Gerandetknolliges Samthäubchen
2	Coprinus	comatus	(Müll.: Fr.) Pers.	Schopf-Tintling
2	Cortinarius	variecolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf
2	Entoloma	rhodopolium	(Fr.: Fr.) Kummer	Niedergedrückter Rötling
2	Entoloma	sinuatum	(Bull.: Pers.: Fr.) Kumm.	Riesen-Rötling
2	Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
2	Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
2	Gymnopus	dryophilus	(Bulliard: Fr.) Murrill	Waldfreund-Rübling
2	Hemimycena	cucullata	(Pers.: Fr.) Sing.	Gipsweisser Scheinhelmling
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Inocybe	cervicolor	(Pers.) Quél.	Hirschbrauner Risspilz
2	Inocybe	corydalina	Quél.	Grünbuckliger Risspilz
2	Inocybe	fraudans	(Britz.) Sacc.	Birnen-Risspilz
2	Inocybe	maculata	Boud.	Gefleckter Risspilz
2	Inocybe	fuscidula	Vel.	Braunstreifiger Risspilz
2	Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2	Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
2	Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
2	Lacrymaria	lacrymabunda	(Bull.: Fr.) Pat.	Tränender Samumpilz
2	Lentinus	torulosus	(Pers.: Fr.) Lloyd	Birkenknäueling
2	Lentinellus	cochleatus var. inolens	Konr. & Maubl.	Geruchloser Äniszähling
2	Lepiota	clypeolaria	(Bull.: Fr.) Kumm.	Wolliggestiefelter Schirmling
2	Lepiota	cristata	(Bolton.: Fr.) Kummer	Stink-Schirmling
2	Leucocortinarius	bulbiger	(A. & S.: Fr.) Sing.	Knolliger Schleierritterling
2	Lyophyllum	connatum	(Schum.: Fr.) Sing.	Weisser Büschelrasling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 38

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Lyophyllum	decastes	(Fr.: Fr.) Singer	Brauner Büschelrasling
2	Marasmiellus	ramealis	(Bull.: Fr.) Sing.	Ästchenschwindlng
2	Marasmius	torquescens	Quél.	Ledergelber Schwindling
2	Marasmius	wynnei	Berk. & Br.	Violetlicher Schwindling
2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2	Melanoleuca	cavipes	Métrod ex Bon	Hohlstieliger Weichritterling
2	Mycena	abramsii	(Murr.) Murr.	Voreilender Helmling
2	Mycena	crocata	(Schrad.: Fr.) Kumm.	Safranmilchender Helmling
2	Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
2	Mycena	rosea	(Bull.) Gramberg	Rosa-Rettichhelmling
2	Mycena	viridimarginata	Karst.	Grünschneidiger Helmling
2	Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
2	Psathyrella	conopilus	(Fr.: Fr.) Pears. & Dennis	Huthaarfaserling
2	Ripartites	tricholoma	(Alb. & v. Schw.)	Bewimperter Filzkrempling
2	Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
2	Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3	Lactarius	aurantiacus	(Pers.: Fr.) Gray	Echter Orange-Milchling
3	Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
3	Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
3	Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
3	Lactarius	rubrocinctus	Fr.	Rotgegürtelter Runzelmilchling
3	Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3	Lactarius	scrobiculatus	(Scop.: Fr.) Fr.	Grubiger Fichtenmilchling
3	Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
3	Lactarius	serifluus	(De Candollo: Fr.) Fr.	Wässeriger Milchling
3	Russula	grata (laurocerasi)	Melzer	Mandeltäubling
3	Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
3	Russula	luteotacta	Rea	Gelbfleckender Täubling
3	Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3	Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
3	Russula	queletii	Fr. in Quél.	Stachelbeertäubling
3	Russula	xerampelina	Schäff.: Fr.	Roter Heringstäubling
3	Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 38

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
4	Cantharellus	melanoxeros	Desm.	Gelbvioletter Pfifferling
4	Fistulina	hepatica	Schäff. ex Fr.	Leberreischling
4	Gloeophyllum	odoratum	(Wulfen: Fr.) Imazeki	Fenchelporling
4	Meruliopsis	corium	(Fr.) Ginns	Lederartiger Fältling
4	Polyporus	melanopus	(Pers.: Sw.) Fr.	Braunfuss-Porling
4	Ramaria	stricta	(Pers.: Fr.) Quél. s. str.	Steife Koralle
4	Ramaria	flava	(Schäff.: Fr.) Quél.	Schwefelgebe Koralle
4	Ramaria	botrytis	(Pers.: Fr.) Ricken	Hahnenkamm
4	Sarcodon	imbricatus	(L.: Fr.) Karst.	Habichtsstacheling
4	Sparassis	crispa	(Wulf. in Jacq.) Fr.	Krause Glucke
5	Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
5	Lycoperdon	pyriforme	Schäff.: Pers.	Birnen-Stäubling
6	Calocera	cornea	(Batsch: Fr.) Fr.	Eichenhörnling
6	Calocera	viscosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Klebriger Hörnling
7	Leotia	lubrica	(Fr.) Karst.	Gemeines Gallertkäppchen

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

Pilz-Fundliste der Woche 39

Femsjonia peziziformis *Gelbweisser Gallertkreisel*

Art:	Heterobasidiomycet (Sporen septiert)
Mikro:	Sp. 22-25x 8-9 µm, hyalin, reif mehrfach septiert. Basidien stimmgabelförmig. Hyphensepten mit Schnallen.
Ökologie:	Auf totem Holz von Weisstanne oder Laubbäumen.
Bemerkungen:	Der eingesenkte, wurzelnde Stiel und die Oberfläche sind weiss behaart.

Femsjonia peziziformis
(Lév.) Karst.
Gelbweisser Gallertkreisel

Tricholomopsis decora *Olivgelber Holzritterling*

Pholiota astragalina *Safranroter Schüppling*

Cystoderma carcharias *Starkriechender Körnchenschirmling*

Pilz-Fundliste der Woche 39

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Leccinum	scabrum	(Bull.: Fr.) Gray	Birkenpilz
1	Suillus	bovinus	(L.: Fr.) Rouss.	Kuhröhrling
2	Armillaria	borealis	Marxm. & Korth.	Nordischer Hallimasch
2	Clitocybe	gibba	(Pers. Fr.) Kummer	Ockerbrauner Trichterling
2	Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Cortinarius	bulbosus	(Sow.: Fr.) Fr.	Knolliger Gürtelfuss
2	Cortinarius	elegantior	(Fr.) Fr.	Strohgelber Klumpfuss
2	Cortinarius	odoratus	(Jog.: Mos.) Mos.	Hellgrüner Duft-Klumfuss
2	Crepidotus	applanatus	(Pers.) Kumm.	Gerieftes Stummelfüsschen
2	Cystoderma	carcharias	(Pers.) Fayod	Starkriechender Körnchenschirmling
2	Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
2	Hebeloma	hetierii		
2	Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
2	Hemimycena	cucullata	(Pers.: Fr.) Sing.	Gipsweisser Scheinhelmling
2	Hygrophorus	nemoreus	(Pers.: Fr.) Fr.	Hain-Schneckling
2	Hygrophorus	poetarum	Heim	Isabell-Schneckling
2	Inocybe	albomarginata	Velenovsky	Ovalsporiger Risspilz
2	Inocybe	asterospora	Quel.	Sternsporiger Risspilz
2	Inocybe	corydalina	Quél.	Grünbuckliger Risspilz
2	Inocybe	cryptocystis	Stunz	Ockerfuchsiger Risspilz
2	Inocybe	flocculosa	(Berk.) Sacc.	Flockiger Risspilz
2	Inocybe	mixtilis	(Britz.) Sacc.	Gerandetknolliger Risspilz
2	Inocybe	riomosa	(Bull.: Fr.) Kummer	Kegeliger Risspilz
2	Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
2	Lentinus	torulosus	(Pers.: Fr. Lloyd	Laubholz-Knäueling
2	Leucoagaricus	leucothites	(Vitt.) Was.	Rosablättriger Egerlingsschirmling
2	Macrolepiota	gracilenta	(Huism.ex Ort.) Mos.	Sternschuppiger Riesenschirmling
2	Marasmiellus	ramealis	(Bull.: Fr.) Sing.	Ästchenschwindlng
2	Marasmius	torquescens	Quél.	Ledergelber Schwindling
2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2	Mycena	crocata	(Schrad.: Fr.) Kumm.	Safranmilchender Helmling
2	Mycena	galericulata	(Scop.:Fr.) Gray	Rosablättriger Helmling
2	Mycena	haematopus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Bluthelmling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 39

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
2	Mycena	zephirus	(Fr.: Fr.) Kumm.	Rostfleckiger Helmling
2	Pholiota	astragalina	(Fr.) Singer	Safranroter Schüppling
2	Psathyrella	conopilus	(Fr.: Fr.) Pears. & Dennis	Huthaarfaserling
2	Rickenella	fibula	(Bull.: Fr.) Raith.	Orangegelber Heftelnabeling
2	Tricholomopsis	decora	(Fr.) Sing.	Olivgelber Holzritterling
2	Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
3	Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
3	Lactarius	hepaticus	Plowr. in Poud.	Leberbrauner Milchling
3	Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3	Lactarius	volemus	(Fr.: Fr.) Fr.	Brätling
3	Russula	aurea	Pers.	Goldtäubling
3	Russula	badia	Quél.	Zedernholztäublig
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
3	Russula	emetica	(Schäff.: Fr.) Gray	Kirschroter Speitäubling
3	Russula	luteotacta	Rea	Gelbfleckender Täubling
3	Russula	melliolens	Quélet	Honig-Täubling
3	Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	puellaris	Fr.	Milder Wachstäubling
3	Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
3	Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling
4	Bjerkandera	adusta	(Willd.: Fr.) Karst.	Angebrannter Rauchporling
4	Climacocystis	borealis	(Fr.) Kotl. & Pouz.	Nordischer Porling
4	Hydnellum	peckii	Banker in Peck	Scharfer Korkstacheling
4	Ramaria	flava	(Schäff.: Fr.) Quél.	Schwefelgebe Koralle
5	Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
5	Lycoperdon	pyriforme	Schäff.: Pers.	Birnen-Stäubling
6	Femsjonia	peziziformis	(Lév.) Karst.	Gelbweisser Gallertkreisel
7	Helvella	macropus	(Pers.: Fr.) Karsten	Langfuss-Lorchel

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

Pilz-Fundliste der Woche 40
Pilz-WK der Pilzkontrolleurinnen und Pilzkontrolleure BL

Am 30. September um 8.15 Uhr trafen sich die Pilzkontrolleure vom Kanton Baselland zu ihrem alljährlichen Wiederholungskurs. Nach der Begrüssung durch den Kantonschemiker, Peter Wenk und seinem Vertreter Fritz Kumschick begann das Tagesprogramm. Dieses beinhaltete einen Pilztest, Bestimmungsübungen sowie eine Gruppe, die noch weitere Pilze suchen ging.
Ein sehr gutes Mittagessen bereitete uns das Kochteam zu.
Um ca. 15.00 Uhr fand die Test- und Tischbesprechung von 175 Pilzarten (siehe Liste auf den folgenden Seiten) durch Peter Baumann und Kurt Minder statt.

Eintreffen der Pilzkontrolleure

Hygrocybe psittacina *Papageigrüner Saftling*

Pilz-Fundliste der Pilzkontrolleurinnen und Pilzkontrolleure BL

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
1	Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1	Boletus	pulverlulentus	Opat.	Schwarzblauender Röhrling
1	Boletus	satanas	Lenz	Satansröhrling
1	Chalciporus	piperatus	(Bull.: Fr.) Bat.	Pfeffer-Röhrling
1	Chroogomphus	helveticus	(Singer) Moser	Filziger Gelbfuss
1	Chroogomphus	rutilus	(Schaeff.: Fr.) O.K. Miller	Kupferroter Gelbfuss
1	Gomphidius	glutinosus	(Schäff.: Fr.) Fr.	Kuhmaul
1	Hygrophoropsis	aurantiaca	(Wulff.: Fr.) Maire	Falscher Pfifferling
1	Leccinum	scabrum	(Bull.: Fr.) Gray	Birkenpilz
1	Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
1	Suillus	bovinus	(L.: Fr.) Rouss.	Kuhröhrling
1	Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
1	Suillus	viscidus	(L.) Rouss.	Grauer Lärchenröhrling
1	Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
1	Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe
2	Agaricus	essettei	Bon	Schiefknolliger Anis-Champignon
2	Agaricus	silvicola	(Vittad.) Sacc.	Dünnfleischiger Anis-Egerling
2	Agrocybe	erebia	(Fr.) Kühn.	Leberbrauner Ackerling
2	Amanita	caesarae	(Scop.) Pers.	Kaiserling
2	Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
2	Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
2	Amanita	fulva	(Schff.) Fr.	Rotbrauer Streifling
2	Amanita	muscaria	(L.) Hook.	Fliegenpilz
2	Amanita	pantherina	(DC.: Fr.) Krombh.	Pantherpilz
2	Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
2	Amanita	porphyria	Alb. & Schw.: Fr.	Porphyrbrauner Wulstling
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Amanita	submembranacea	(Bon) Gröger	Grauhäutiger Scheidenstreifling
2	Armillaria	borealis	Marxm. & Korth.	Nordischer Hallimasch

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Pilzkontrolleurinnen und Pilzkontrolleure BL

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Armillaria	mellea	(Val.: Fr.) Kummer	Honiggelber Hallimasch
2	Clitocybe	ditopus	(Fr.) Gill.	Mehltrichterling
2	Clitocybe	lignatilis	(Pers.) Karst.	Gemeiner Holztrichterling
2	Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
2	Clitocybe	odora	(Bulliard: Fr.) Kumm.	Grüner Anistrichterling
2	Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Coprinus	atramentarius	(Bull.:Fr.) Fr.	Falten-Tintling
2	Coprinus	atramentarius	(Sing.) Krglst.	Braunschuppiger Faltentintling
2	Coprinus	comatus	(Müll.: Fr.) Pers.	Schopf-Tintling
2	Coprinus	disseminatus	(Pers.: Fr.) S.F.Gray	Gesäter Tintling
2	Cortinarius	anomalus	(Fr.: Fr.) Fr.	Braunvioletter Dickfuss
2	Cortinarius	anserinus	(Vel.) Hry.	Buchen-Klumpfuss
2	Cortinarius	atrovirens	Kalchbr.	Schwarzgrüner Klumpfuss
2	Cortinarius	bivelus	(Fr.: Fr.) Fr.	Birken-Gürtelfuss
2	Cortinarius	caerulescens	(Schäff.) Fr.	Blauer Klumpfuss
2	Cortinarius	flexipes	(Pers.: Fr.) Fr.	Duftender Gürtelfuss
2	Cortinarius	hinnuleus	(Sow.) Fr.	Erdigriechender Gürtelfuss
2	Cortinarius	multiformis	Fr.	Sägeblättriger Klumpfuss
2	Cortinarius	nemorensis	(Fr.) Lge.	Verfärbender Schleimkopf
2	Cortinarius	praestans	(Cord.) Gill.	Schleiereule
2	Cortinarius	torvus	(Bull.: Fr.) Fr.	Wohlriechender Gürtelfuss
2	Cortinarius	violaceus	(L.:Fr.) Fr.	Dunkelvioletter Schleierling
2	Crepidotus	applanatus	(Pers.) Kumm.	Gerieftes Stummelfüsschen
2	Cystoderma	amiantinum	(Scop.: Fr.) Fayod	Amiant-Körnchenschirmling
2	Echinoderma	langei	Knuds.	Grosser Blutegerling
2	Entoloma	nitidum	Quél.	Stahlblauer Rötling
2	Entoloma	rhodopolium	(Fr.: Fr.) Kummer	Niedergedrückter Rötling
2	Galerina	marginata	(Batsch) Kühn.	Gifthäubling
2	Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
2	Gymnopilus	spectabilis	(Weinm.: Fr.)	Beringter Flämmling
2	Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
2	Gymnopus	distorta	(Fr.) Quél.	Drehstieliger Rübling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Pilzkontrolleurinnen und Pilzkontrolleure BL

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Hebeloma	senescens	(Batsch) Berk.	Bräunender Fälbling
2	Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
2	Hebeloma	truncatum	(Fr.) Kumm.	Kakao-Fälbling
2	Hygrocybe	psittacina	(Schäff.: Fr.) Wünsche	Papageigrüner Saftling
2	Hygrophorus	cossus (discoxanthus)	(Sow. ex Fr.) Fr.	Verfärbender Schneckling
2	Hygrophorus	eburneus	(Bull:. Fr.) Fr.	Elfenbein-Schneckling
2	Hygrophorus	nemoreus	(Pers.: Fr.) Fr.	Hain-Schneckling
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Hypholoma	sublateritium	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf
2	Inocybe	cervicolor	(Pers.) Quél.	Hirschbrauner Risspilz
2	Inocybe	cookei	Bres.	Knolliger Risspilz
2	Inocybe	corydalina	Quél.	Grünbuckliger Risspilz
2	Inocybe	fraudans	(Britz.) Sacc.	Birnen-Risspilz
2	Inocybe	furfurea	(Schwöbel & Stangl) Kuyper	Schwarzscheiteliger Risspilz
2	Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
2	Inocybe	geophylla var. lilacina	(Peck.) Gill.	Lilastieliger Risspilz
2	Inocybe	queletii	Maire et Konr.	Weisstannen-Risspilz
2	Inocybe	riomosa	(Bull.: Fr.) Kummer	Kegeliger Risspilz
2	Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2	Laccaria	affinis	(Sing.) Bon	Moor-Lactrichterling
2	Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
2	Lentinellus	cochleatus	(Pers.: Fr.) Karst.	Äniszähling
2	Lentinellus	cochleatus var. inolens	Konr. & Maubl.	Geruchloser Äniszähling
2	Lentinus	adhaerens	(Alb. et Schw.: Fr.) Fr.	Harziger Sägeblättling
2	Lentinus	torulosus	(Pers.: Fr. Lloyd	Laubholz-Knäueling
2	Lepiota	clypeolaria	(Bull.: Fr.) Kumm.	Wolliggestiefelter Schirmling
2	Lepiota	cristata	(Bolton.: Fr.) Kummer	Stink-Schirmling
2	Lepiota	fuscovinacea	Møll. & Lge.)	Weinroter Schirmling
2	Lepista	glaucocana	(Bres.) Sing.	Blassblauer Rötelritterling
2	Lepista	irina	(Fr.) Big.	Veilchen-Rötelritterling
2	Lepista	nuda	(Bull.: Fr.) Cooke	Violetter Rötelritterling
2	Lyophyllum	connatum	(Schum.: Fr.) Sing.	Weisser Büschelrasling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Pilzkontrolleurinnen und Pilzkontrolleure BL

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Lyophyllum	connatum	(Schum.: Fr.) Sing.	Weisser Büschelrasling
2	Lyophyllum	decastes	(Fr.: Fr.) Singer	Brauner Büschelrasling
2	Lyophyllum	loricatum	(Fr.) Kühn.	Gepanzerter Rasling
2	Macrolepiota	rhacodes var. brunnea	(Vittad.) Singer	Brauner Safranschirmling
2	Marasmius	androsaceus	(L.:Fr.) Fr.	Roshaar-Schwindling
2	Marasmius	torquescens	Quél.	Ledergelber Schwindling
2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2	Mycena	flavescens	Velen.	Olivgelber Helmling
2	Mycena	haematopus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Bluthelmling
2	Mycena	inclinata	(Fr.) Quél.	Buntstieliger Helmling
2	Mycena	pelianthina	(Fr.: Fr.) Quél.	Schwarzgezähnelter Helmling
2	Mycena	polyadelpha	(Lasch). Kühn.	Winziger Blatthelmling
2	Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
2	Mycena	rosea	(Bull.) Gramberg	Rosa-Rettichhelmling
2	Mycena	zephirus	(Fr.: Fr.) Kumm.	Rostfleckiger Helmling
2	Mycena	polygramma	J.E. Lange	Rillstieliger Helmling (kleine form)
2	Oudemansiella	mucida	(Schrad. ex Fr.) v.H.	Beringter Schleimrübling
2	Phaeolepiota	aurea	(Matt.: Fr.) Mre. ex Konr. & Maubl.	Goldfarbener Glimmerschüppling
2	Pholiota	astragalina	(Fr.) Singer	Safranroter Schüppling
2	Pleurotus	drynus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Berindeter Seitling
2	Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
2	Pluteus	salicinus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Grauer Dachpilz
2	Psathyrella	piluliformis	(Bull.: Fr.) Ort.	Wässeriger Faserling
2	Pseudoclitocybe	cyathiformis	(Bull.) Sing.	Kaffebrauner Gabeltrichterling
2	Tricholoma	atrosquamosum	(Chev.) Sacc.	Schwarzschuppiger Ritterling
2	Tricholoma	pseudonicticans	Bon	Blassfleischiger Fichtenritterling
2	Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
2	Tricholoma	scalpturatum	(Fr.) Quél.	Gilbender Erd-Ritterlig
2	Tricholoma	sciodes	(Secr.) Martin	Schärflicher Ritterling
2	Tricholoma	sulfureum	(Bull.: Fr.) Kumm.	Schwefel-Ritterling
2	Tricholoma	terreum	(Schäff.:) Fr.) Kumm.	Erdritterling
2	Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Pilzkontrolleurinnen und Pilzkontrolleure BL

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3	Lactarius	albocarneus	Britzelmayr	Klebriger Milchlig
3	Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
3	Lactarius	fulvissimus	Rom. i. Kühn. & Rom.	Orangefuchsiger Milchling
3	Lactarius	glyciosmus	(Fr.: Fr.) Fr.	Blasser Duftmilchling
3	Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
3	Lactarius	quietus	(Fr.) Fr.	Eichenmilchling
3	Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3	Lactarius	scrobiculatus	(Scop.: Fr.) Fr.	Grubiger Fichtenmilchling
3	Lactarius	semisanguifluus	Helm & Lecl.	Spangrün-weinroter Kiefernreizker
3	Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
3	Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
3	Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3	Russula	delica	Fr.	Gemeiner Weisstäubling
3	Russula	emetica	(Schäff.: Fr.) Gray	Kirschroter Speitäubling
3	Russula	faginea	Romagn.	Buchen-Heringstäubling
3	Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
3	Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
3	Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
3	Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3	Russula	torulosa	Bres.	Gedrungener Täubling
3	Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
3	Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling
3	Russula	xerampelina	Schäff.: Fr.	Roter Heringstäubling
4	Bjerkandera	adusta	(Willd.: Fr.) Karst.	Angebrannter Rauchporling
4	Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
4	Clavariadelphus	pistilaris	(Fr.) Donk	Herkuleskeule
4	Clavulina	cristata	(Holmskj.: Fr.) Schröt.	Kammförmige Koralle
4	Climacocystis	borealis	(Fr.) Kotl. & Pouz.	Nordischer Porling
4	Craterellus	cornucopioides	Pers.	Totentrompete
4	Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
4	Piptoporus	betulinus	(Bulliard) Karsten	Birken-Hautporling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Pilzkontrolleurinnen und Pilzkontrolleure BL

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
4	Polyporus	badius	(Pers.: Gray) v. Schw.	Kastanienbrauern Porling
4	Sarcodon	imbricatus	(L.: Fr.) Karst.	Habichtsstacheling
4	Stereum	hirsutum	(Willd.: Fr.) S.F. Gray	Zottiger Schichtpilz
5	Calvatia	exipuliformis	(Schäff.: Pers.) Perd.	Beutelstäubling
5	Lycoperdon	echinatum	Pers.: Pers.	Igel-Stäubling
5	Lycoperdon	mammaeforme	Pers.	Flocken-Stäubling
5	Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
5	Lycoperdon	pyriforme	Schäff.: Pers.	Birnen-Stäubling
6	Tremiscus	helveloides	(DC: Pers.) Donk	Roter Gallerttrichterling
7	Helvella	crispa	(Bull. ex St. Aman) Boud.	Herbstlorchel

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilz-Fundliste der Woche 40

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
1	Leccinum	quercinum	Pilát ex Pilát	Eichen-Rotkappe
1	Suillus	flavidus	(Fr.:Fr.) Presl	Moor-Schmierröhrling
2	Agaricus	benesii	(Pil.) Sing	Rötender Riesn-Egerling
2	Cortinarius	argutus	Fr.	Spitzbasiger Schleimkopf
2	Cortinarius	caerulescens	(Schäff.) Fr.	Blauer Klumpfuss
2	Cortinarius	decipiens	(Pers.: Fr.) Fr.	Lilastieliger Wasserkopf
2	Cortinarius	delibutus	Fr.	Violettblättriger Schleimfuss
2	Cortinarius	evernius	(Fr.: Fr.) Fr. ss. Mos.	Rettich-Gürtelfuss
2	Cortinarius	hinnuleus	(Sow.) Fr.	Erdigriechender Gürtelfuss
2	Cortinarius	humicola	(Quél.) R. Maire	Sparriger Rauhkopf
2	Cortinarius	infractus	(Pers.: Fr.) Fr.	Bitterer Schleimfuss
2	Cortinarius	nemorensis	(Fr.) Lge.	Verfärbender Schleimkopf
2	Cortinarius	olidus	Lge.	Gelbgegürtelter Schleimkopf
2	Entoloma	rhodopolium var. nidorosum		(Fr.)NordelKumm. Alkalischer Rötling
2	Hebeloma	crustuliniforme	(Bull.: Fr.) Quél.	Tongrauer Fälbling
2	Hebeloma	hetierii		
2	Hydropus	atramentosus	(Kbr.) Kotl. & Pouz.	Schwärzender Wasserfuss
2	Hygrophorus	poetarum	Heim	Isabell-Schneckling
2	Inbocybe	corydalina	Quélet	Grüngebuckelter Rkisspilz
2	Inocybe	riomosa	(Bull.: Fr.) Kummer	Kegeliger Risspilz
2	Lepista	irina	(Fr.) Big.	Veilchen-Rötelritterling
2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2	Mycena	stipata	Maas Geester.& Schw.	Büscheliger Nitrat-Helmling
2	Mycena	polygramma	(Bulliard: Fr.) Gray	Rillstieliger Helmling
2	Pluteus	salicinus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Grauer Dachpilz
2	Tricholoma	acerbum	(Bull.: Fr.) Quél.	Gerippter Ritterling
2	Tricholoma	atrosquamosum	(Chev.) Sacc.	Schwarzschuppiger Ritterling
2	Tricholoma	sejunctum	(Sow.: Fr.) Quél.	Grüngelber Ritterling
2	Tricholoma	terreum	(Schäff.:) Fr.) Kumm.	Erdritterling
2	Tricholoma	ustale	(Fr.: Fr.) Kumm.	Brandiger Ritterling
3	Lactarius	fulvissimus	Rom. i. Kühn. & Rom.	Orangefuchsiger Milchling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 40

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
3	Lactarius	intermedius	(Krombh.) Cke.	Grubiger Weisstannenmilchling
3	Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
3	Lactarius	quietus	(Fr.) Fr.	Eichenmilchling
3	Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3	Russula	densifolia	Gill.	Dichtblättriger Schwärztäubling
3	Russula	fragilis	(Pers.: Fr.) Fr.	Wechselfarbiger Speitäubling
3	Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
4	Abortiporus	biennis	(Bull.:Fr.) Sing.	Rötender Saftwirrling
4	Phellinus	torulosus	(Pers.) Bourd.et Galz.	Rotporiger Feuerschwamm
4	Polyporus	badius	(Pers.: Gray) v. Schw.	Kastanienbrauern Porling
7	Helvella	queletii	Harmaja	Rippenstielige Becherlorchel

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

Pilz-Fundliste der Woche 41

Inocybe hirtella var. bispora

Zweisporiger Bittermandel-Risspilz

Art:	Hut bis 35 mm.
Mikro:	Sp. 10-12,5 x 5,5-7,5 µm, glatt. Basidien zweisporig. Mit Cheilo- und Pleurozystiden. Zystiden am Stiel bis an die Basis.
Ökologie:	Bei diversen Laubbäumen.
Bemerkungen:	Man kennt diesen Pilz am Geruch nach Bittermandeln und an den zweisporigen Basidien.

Inocybe hirtella var. bispora
Bres.
Zweisporiger Bittermandel-Risspilz



Cortinarius herpeticus *Violettgrünblättriger Klumpfuss*

Coprinus lagopoides *Rundsporige Hasenpfote*

Pilz-Fundliste der Woche 41

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Leccinum	scabrum	(Bull.: Fr.) Gray	Birkenpilz
1	Paxillus	panuoides	Fr.	Muschel-Krempling
1	Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
2	Agaricus	bitorquis	(Quélet) Sacc.	Trottoir-Champignon
2	Agaricus	silvicola	(Vittad.) Sacc.	Dünnfleischiger Anis-Egerling
2	Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
2	Amanita	pantherina	(DC.: Fr.) Krombh.	Pantherpilz
2	Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Bolbitius	vitellinus	(Pers.: Fr.) Fr.	Gold-Mistpilz
2	Clitocybe	clavipes	(Pers.) Kumm.	Keulenfuss-Trichterling
2	Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
2	Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
2	Clitocybula	lacerata	(Scropoli) Métrod	Fransiger Faserrübling
2	Coprinus	lagopoides	Karst.	Rundsporige Hasenpfote
2	Cortinarius	herpeticus	Fr.	Violettgrünblättriger Klumpfuss
2	Cortinarius	hinnuleus	(Sow.) Fr.	Erdigriechender Gürtelfuss
2	Cortinarius	olidus	Lge.	Gelbgegürtelter Schleimkopf
2	Cortinarius	violaceus	(L.:Fr.) Fr.	Dunkelvioletter Schleierling
2	Entoloma	inusitatum	Noordeloos, Enderle et Lammers	Karamel-Rötling
2	Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
2	Entoloma	griseoluridum	(Kühn. ex Noord.	Olivgrauer Rötling
2	Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
2	Hebeloma	birrum	Fr. ss. Mos.	Spindelfüssiger Fälbling
2	Hygrophorus	chrysodon	(Batsch.: Fr.) Fr	Goldzahn-Schneckling
2	Hygrophorus	cossus (discoxanthus)	(Sow. ex Fr.) Fr.	Verfärbender Schneckling
2	Hygrophorus	eburneus	(Bull:. Fr.) Fr.	Elfenbein-Schneckling
2	Hygrophorus	penarius	Fr.	Trockener Schneckling
2	Hygrophorus	picea	Kühn.	Fichten-Schneckling
2	Hypholoma	sublateritium	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf
2	Inbocybe	corydalina	Quélet	Grüngebuckelter Rkisspilz

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 41

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Inocybe	cervicolor	(Pers.) Quél.	Hirschbrauner Risspilz
2	Inocybe	fraudans	(Britz.) Sacc.	Birnen-Risspilz
2	Inocybe	fuscidula	Vel.	Braunstreifiger Risspilz
2	Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
2	Inocybe	hirtella	Bres.	Bittermandel-Risspilz
2	Inocybe	phaeodisca	Kühn.	Braunscheibiger Risspilz
2	Inocybe	splendens	Heim	Klebriger Risspilz
2	Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2	Lepiota	cristata	(Bolton.: Fr.) Kummer	Stink-Schirmling
2	Lepista	flaccida	(Sowerby Fries) Patouillard	Fuchsiger Rötelritterling
2	Lyophyllum	paelochroum	Clmç.	Lemfarbener Schwärzling
2	Macrolepiota	gracilenta	(Huism.ex Ort.) Mos.	Sternschuppiger Riesenschirmling
2	Marasmius	alliaceus	(Jacq.: Fr.) Fr.	Langstieliger Knoblauchschwindling
2	Mycena	crocata	(Schrad.: Fr.) Kumm.	Safranmilchender Helmling
2	Mycena	filopes	(Bull.:Fr.) Kumm.	Zerbrechlicher Fadenhelmling
2	Mycena	galericulata	(Scop.:Fr.) Gray	Rosablättriger Helmling
2	Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
2	Mycena	zephirus	(Fr.: Fr.) Kumm.	Rostfleckiger Helmling
2	Pluteus	ephebeus	(Fr.: Fr.) Gill.	Graufilziger Dachpilz
2	Pluteus	romelli	(Britz.) Sacc.	Gelbstieliger Dachpilz
2	Pluteus	thomsonii	(Berk. & Br.) Dennis	Graustieliger Aderndachpilz
2	Rozites	caperatus	(Pers.: Fr.) P. Karst.	Zigeunerpilz
2	Tricholoma	lascivum	(Fr.) Gill. ss. Lge.	Unverschämter Ritterling
2	Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
2	Tricholoma	scalpturatum	(Fr.) Quél.	Gilbender Erd-Ritterlig
2	Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3	Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
3	Lactarius	deliciosus	(L.): Fr.) Gray	Edelreizker
3	Lactarius	flavidus	Boud.	Hellgelber Violettmilchling
3	Lactarius	fulvissimus	Rom. i. Kühn. & Rom.	Orangefuchsiger Milchling
3	Lactarius	luridus	(Pers.: Fr.) Gray	Gewöhnlicher Violettmilchling
3	Lactarius	quietus	(Fr.) Fr.	Eichenmilchling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 41

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
3	Lactarius	semisanguifluus	Helm & Lecl.	Spangrün-weinroter Kiefernreizker
3	Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
3	Russula	decipiens	(Sing.) Svrcek	Weinroter Dotter-Täubling
3	Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
3	Russula	fragilis	(Pers.: Fr.) Fr.	Wechselfarbiger Speitäubling
3	Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
3	Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
3	Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3	Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
4	Cantharellus	cinereus	Pers. ex Fr.	Grauer Leistling
4	Ceriporiopsis	resinascens	(Romell.) Dom.	Harziger Wachsporling
4	Physisporinus	vitreus	(Pers.: Fr.) Donk	Wässriger Eisporling
4	Sarcodon	imbricatus	(L.: Fr.) Karst.	Habichtsstacheling
7	Ascocoryne	sarcoides	(Jaqu.: Fr.) Grov.et Wils.	Fleischroter Gallertbecher
4	Ceriporiopsis	resinascens	(Romell.) Dom.	Harziger Wachsporling
7	Otidea	alutacea	(Pers.: Fr.) Sacc.	Lederbrauner Öhrling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



Hygrophorus picea *Fichten-Schneckling*

Foto: Markus Wilhelm

Pluteus thomsonii *Graustieliger Aderndachpilz*

Foto: Markus Wilhelm

Paxillus panuoides *Muschel-Krempling*

Foto: Markus Wilhelm

Lactarius semisanguineus _ *Spangrün-weinroter Kiefernreizker*

Foto: Markus Wilhelm

Entoloma inusitatum *Karamel-Rötling*

Foto: Markus Wilhelm

Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

Pilz-Fundliste der Woche 42

Stropharia albonites *Hyalinweisser Träuschling*

Art:	Hut bis 40 mm, alt in der Mitte gilbend, schmierig.
Mikro:	Sp. 7-8.5 x 5,5-7,5 µm, glatt. Zystiden keulig knorrig, mit Chrysozystiden. Huthaut eine Ixokutis. Spp. dunkelbraun.
Ökologie:	Grasige Standorte.
Bemerkungen:	Von den Egerlingen unterscheidet er sich eindeutig durch die Chrysozystiden.

Stropharia albonites
(Fr.) Karst.
Hyalinweisser Träuschling

Foto: Markus Wilhelm

Cortinarius reverendissimus

Inocybe phaeodisca *Braunscheibiger Risspilz*

Pilz-Fundliste der Woche 42

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1	Chroogomphus	rutilus	(Schaeff.: Fr.) O.K. Miller	Kupferroter Gelbfuss
1	Suillus	granulatus	(L.: Fr.) Rouss.	Körnchenröhrling
1	Suillus	tridentinus	(Bresad.) Singer	Rostroter Lärchenröhrling
2	Armillaria	borealis	Marxm. & Korth.	Nordischer Hallimasch
2	Armillaria	mellea	(Val.: Fr.) Kummer	Honiggelber Hallimasch
2	Clitocybe	cerussata	(Fries) P. Kummer	Ähnlich Waldfreund Trichterling
2	Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
2	Clitocybe	phyllophila	(Pers.) Kumm.	Bleiweisser Trichterling
2	Clitocybula	lacerata	(Scropoli) Métrod	Fransiger Faserrübling
2	Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Cortinarius	alboviolacea	(Pers.: Fr.) Fr.	Weissvioletter Dickfuss
2	Cortinarius	anomalus	(Fr.: Fr.) Fr.	Braunvioletter Dickfuss
2	Cortinarius	anserinus	(Vel.) Hry.	Buchen-Klumpfuss
2	Cortinarius	brunneus	(Pers.: Fr.) Fr.	Dunkelbrauner Gürtelfuss
2	Cortinarius	bulliardii	(Pers.: Fr.) Fr.	Feuerfüssiger Gürtelfuss
2	Cortinarius	calochrous	Fr.	Amethystblättriger Klumpfuss
2	Cortinarius	candelaris	(Fr.) Fr.	Wachsgelber Wasserkopf
2	Cortinarius	cumatilis	(Fr.) s. str.	Taubenblauer Schleimkopf
2	Cortinarius	decipiens	(Pers.: Fr.) Fr.	Lilastieliger Wasserkopf
2	Cortinarius	evernius	(Fr.: Fr.) Fr. ss. Mos.	Rettich-Gürtelfuss
2	Cortinarius	fasciatus	Fr. ss. Arn.	Rötlichgeschmückter Wasserkopf
2	Cortinarius	hinnuleus	(Sow.) Fr.	Erdigriechender Gürtelfuss
2	Cortinarius	infractus	(Pers.: Fr.) Fr.	Bitterer Schleimfuss
2	Cortinarius	nemorensis	(Fr.) Lge.	Verfärbender Schleimkopf
2	Cortinarius	olidus	Lge.	Gelbgegürtelter Schleimkopf
2	Cortinarius	ophiopus	Peck	Schlangenfüssiger Schleimkopf
2	Cortinarius	reverendissimus	Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux	ähnlich dem C. varius
2	Cortinarius	saturninus	Fr.	Blaufleischiger Gürtelfuss
2	Cortinarius	varius	Fr.	Ziegelgelber Schleimkopf
2	Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
2	Entoloma	griseoluridum	(Kühn. ex Noord.	Olivgrauer Rötling
2	Entoloma	rhodopolium var. nid.	(Fr.)Nordel./Kumm.	Alkalischer Rötling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilz-Fundliste der Woche 42

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Galerina	marginata	(Batsch) Kühn.	Gifthäubling
2	Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
2	Hebeloma	birrum	Fr. ss. Mos.	Spindelfüssiger Fälbling
2	Hebeloma	crustuliniforme	(Bull.: Fr.) Quél.	Tongrauer Fälbling
2	Hebeloma	sacchariolens	Quél.	Süssriechender Fälbling
2	Hebeloma	sordescens	Vesterholt	Schwarzknolliger Fälbling
2	Hygrophorus	capreolarius	(Kalchbr.) Sacc.	Weinroter Schneckling
2	Hygrophorus	eburneus	(Bull:. Fr.) Fr.	Elfenbein-Schneckling
2	Hygrophorus	mesotephrus	Berk. & Br.	Olivgrauer Schneckling
2	Hygrophorus	pudorinus	(Fr.) Fr.	Orange-Schneckling
2	Hypholoma	sublateritium	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf
2	Hygrophorus	unicolor	Grög.	Orangefalber Schneckling
2	Inocybe	fraudans	(Britz.) Sacc.	Birnen-Risspilz
2	Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
2	Inocybe	mixtilis	(Britz.) Sacc.	Gerandetknolliger Risspilz
2	Inocybe	phaeodisca	Kühn.	Braunscheibiger Risspilz
2	Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2	Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
2	Lentinus	adhaerens	(Alb. et Schw.: Fr.) Fr.	Harziger Sägeblättling
2	Lepiota	cristata	(Bolton.: Fr.) Kummer	Stink-Schirmling
2	Lepista	flaccida	(Sowerby Fries) Patouillard	Fuchsiger Rötelritterling
2	Lepista	splendens	(Pers.: Fr.) Konrad	Dichtblättriger Rötelritterling
2	Lyophyllum	fumosum	(Pers.: Fr.) Ort.	Hellbrauner Büschelrasling
2	Marasmius	androsaceus	(L.: Fr.) Fr.	Rosshaarschwindling
2	Mycena	amicta	(Fr.: Fr.) Quélet	Geschmückter Helmling
2	Mycena	crocata	(Schrad.: Fr.) Kumm.	Safranmilchender Helmling
2	Mycena	filopes	(Bull.:Fr.) Kumm.	Zerbrechlicher Fadenhelmling
2	Mycena	inclinata	(Fr.) Quél.	Buntstieliger Helmling
2	Naucoria	melinoides	(Bull.: Fr.) Kühn.	Honiggelber Sumpfschnitzling
2	Pholiota	adiposa	(Fr.) Kumm.	Schleimiger Schüppling
2	Pleurotus	drynus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Berindeter Seitling
2	Pleurotus	pulmonarius	(Fr.) Quélet	Lungen-Seitling
2	Psathyrella	conopilus	(Fr.: Fr.) Pears. & Dennis	Huthaarfaserling
2	Rozites	caperatus	(Pers.: Fr.) P. Karst.	Zigeunerpilz

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilz-Fundliste der Woche 42

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Stropharia	albonites	(Fr.) Karst.	Hyalinweisser Träuschling
2	Stropharia	caerulea	Kreisel	Blauer Träuschling
2	Tricholoma	acerbum	(Bull.: Fr.) Quél.	Gerippter Ritterling
2	Tricholoma	atrosquamosum	(Chev.) Sacc.	Schwarzschuppiger Ritterling
2	Tricholoma	lascivum	(Fr.) Gill. ss. Lge.	Unverschämter Ritterling
2	Tricholoma	luridum	(Schäff.: Fr.) Quél.	Graublättriger Ritterling
2	Tricholoma	orirubens	Quél.	Rötender Ritterling
2	Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
2	Tricholoma	sejunctum	(Sow.: Fr.) Quél.	Grüngelber Ritterling
2	Tricholoma	squarrulosum	Bres.	Stielschuppiger Ritterling
2	Tricholoma	sulfureum	(Bull.: Fr.) Kumm.	Schwefel-Ritterling
2	Tricholoma	tigrinum	Kumm.	Tiger-Ritterling
2	Tricholoma	ustale	(Fr.: Fr.) Kumm.	Brandiger Ritterling
3	Lactarius	acris	(Bolt.: Fr.) Gray	Rosaanlaufender Milchling
3	Lactarius	fluens	Boud.	Braunfleckender Milchling
3	Lactarius	hortensis	Velen	Haselmilchling
3	Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
3	Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
3	Lactarius	quietus	(Fr.) Fr.	Eichenmilchling
3	Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3	Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
3	Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3	Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
3	Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
3	Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3	Russula	queletii	Fr.	Stachelbeer-Täubling
3	Russula	solaris	Ferd. et Winge	Sonnentäubling
4	Hydnellum	aurantiacum	(Fr.) Karst.	Orangegelber Korkstacheling
4	Ramaria	sanguinea	(Pers.) Quélet	Blutrotfleckende Koralle
6	Tremiscus	helveloides	(DC: Pers.) Donk	Roter Gallerttrichterling
7	Bisporella	citrina	(Batsch ex Fr.) Korf & Carpenter	Zitronengelbes Holzbecherchen
7	Helvella	macropus	(Pers.: Fr.) Karsten	Langfuss-Lorchel1

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

Pilz-Fundliste der Woche 43

Cortinarius anthracinus *Purpurschwarzer Wasserkopf*

Art:	Hut bis 25 mm, hygrophan.
Mikro:	Sp. 7-9,5 x 4,5-6 µm., mässig warzig.
Ökologie:	Laub- und Nadelwälder.
Bemerkungen:	Früher gehörte dieser Pilz zu den Dermocyben. Neu gehört er, vermutlich weil er hygrophan ist, zu den Telamonien.

Cortinarius anthracinus
(Fr.) Fr.
Purpurschwarzer Wasserkopf

Cotylidia pannosa *Striegeliger Erdwarzenpilz*

Tricholoma columbetta *Seidiger Ritterling*

Entoloma incanum *Braungrüner Rötling*

Foto: Markus Wilhelm

Entoloma sodale *Montaner Blaustiel-Rötling*

Foto: Markus Wilhelm

Entoloma longistriaturm Gestrifter Zärtling

Foto: Markus Wilhelm

Pilz-Fundliste der Woche 43

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1	Leccinum	scabrum	(Bull.: Fr.) Gray	Birkenpilz
1	Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
2	Agaricus	campester	Fr.: Fr.	Wiesen-Champignon
2	Agaricus	xanthoderma	Genev.	Karbol-Egerling
2	Amanita	junquillea	Quélet	Narzissengelber Wulstling
2	Amanita	muscaria	(L.) Hook.	Fliegenpilz
2	Amanita	pantherina	(DC.: Fr.) Krombh.	Pantherpilz
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Clitocybe	fragrans	(With.) Kumm.	Dufttrichterling
2	Clitocybe	glareosa	Röllin et Monthoux	Kiesliebender Trichterling
2	Clitocybetr	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
2	Clitocybe	rivulosa	(Pers.:Fr.) Kumm	Rinnigbereifter Gift-Trichterling
2	Clitocybe	senilis	(Fr.) Singer	Greisen-Trichterling
2	Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Coprinus	micaceus	(Bull.: Fr.) Fr.	Glimmertintling
2	Coprinus	picaceus	(Bull.: Fr.) Gray	Specht-Tintling
2	Cortinarius	anthracinus	(Fr.) Fr.	Purpurschwarzer Wasserkopf
2	Cortinarius	causticus	Fr.	Bereifter Schleimfuss
2	Cortinarius	cinnamomeus	Fr.	Zimt-Hautkopf
2	Cortinarius	decipiens	(Pers.: Fr.) Fr.	Lilastieliger Wasserkopf
2	Cortinarius	elegantissimus	Hry.	Prächtiger Klumpfuss
2	Cortinarius	evernius	(Fr.: Fr.) Fr. ss. Mos.	Rettich-Gürtelfuss
2	Cortinarius	olivaceofuscus	Kühn.	Hainbuchen-Hautkopf
2	Cortinarius	rubicundulus	(Rea) Pears.	Rötlichfaseriger Rauhkopf
2	Cortinarius	spilomeus	(Fr.: Fr.) Fr.	Kupferschuppiger Seidenkopf
2	Cortinarius	violaceus	(L.:Fr.) Fr.	Dunkelvioletter Schleierling
2	Cortinarius	variecolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf
2	Crepidotus	variabilis	(Pers.: Fr.) Kummer	Gemeines Stummelfüsschen
2	Crinipellis	stipitaria	(Fr.) Pat.	Zitzen Haarschwindling
2	Dermoloma	cuneifolium	(Fr.: Fr.) Bon	Keilblättriger Samtritterling
2	Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
2	Entoloma	exile	(Fr.: Fr.) Hesler	Schmächtiger Rötling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilz-Fundliste der Woche 43

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Entoloma	incanum	(Fr.) Hes.	Braungrüner Rötling
2	Entoloma	longistriatum	(Peck.) Noord.	Gesgtreifter Zärtling
2	Entoloma	serrulatum	(Fr.: Fr.) Hes.	Gesägtblättriger Rötling
2	Entoloma	sodale	Noord.	Montaner Blaustiel-Rötling
2	Hemimycena	mairei	(Gilb.) Sing.	Gras-Scheinhelmling
2	Hygrophorus	mesotephrus	Berk. & Br.	Olivgrauer Schneckling
2	Hygrophorus	nemoreus	(Pers.: Fr.) Fr.	Hain-Schneckling
2	Hygrophorus	pustulatus	(Fr.) Fr.	Schwarzpunktierter Schneckling
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Inocybe	fuscidula	Vel.	Braunstreifiger Risspilz
2	Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
2	Inocybe	soluta	Vel.	Kurzsporiger Risspilz
2	Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
2	Lepiota	alba	(Bres.) Sacc.	Weisser Schirmling
2	Lepiota	sublaevigatua	Bon et Boiffard	Feinschuppiger Schirmling
2	Lepista	panaeolus	(Fr.) Karst.	Horngrauer Rötelritterling
2	Lepista	saeva (personata)	(Fr.: Fr.) Cke.	Lilastiel-Rötelritterling
2	Leucoagaricus	leucothites	(Vitt.) Was.	Rosablättriger Egerlingsschirmling
2	Macrolepiota	konradii	(Huijs. ex Orta.) Mos.	Sternschuppiger Riesenschirmling
2	Macrolepiota	heimii	(Locqin) Bon	Schuppenloser Riesenschirmling
2	Marasmius	alliaceus	(Jacq.: Fr.) Fr.	Langstieliger Knoblauchschwindling
2	Marasmius	quercophilus	(Pouz.) Arn.& Noordel.	Braunscheibiger Schwindling
2	Mycena	crocata	(Schrad.: Fr.) Kumm.	Safranmilchender Helmling
2	Mycena	epipterygia	(Scop.: Fr.) Gray	Dehnbarer Helmling
2	Mycena	filopes	(Bull.:Fr.) Kumm.	Zerbrechlicher Fadenhelmling
2	Mycena	pseudopicta	(Lge) Kühn.	Rauchgrauer Gras-Helmling
2	Omphalina	pyxidata	(Bull.: Pers.) Quél.	Starkgeriefter Nabeling
2	Pholiota	gummosa	(Lasch.: Fr.) Sing.	Strohblasser Schüppling
2	Pholiota	jahnii	Tjallingii-Beukers et Bas	Pinselschüppling
2	Pleurotus	eryngii	(De Candolle: Fr.) Quél.	Brauner Kreuter-Seitling
2	Pseudoclitocybe	cyathiformis	(Bull.) Sing.	Kaffebrauner Gabeltrichterling
2	Resubinatus	applicatus	(Batsch: Fr.) Gray	Grauer Zwergseitling
2	Tricholoma	album	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Weisser Ritterling
2	Tricholoma	columbetta	(Fr.) Kumm.	Seidiger Ritterling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 43

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Tricholoma	imbricatum	(Fr.: Fr.) Kumm.	Feinschuppiger Ritterling
2	Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
2	Tricholoma	sulfureum	(Bulliard: Fr.) Kummer	Gemeiner Schwefelritterling
3	Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
3	Lactarius	deterrimus	Gröger	Fichtenreizker
3	Lactarius	flexulosus	(Pers.: Fr.) Gray	Verbogener Milchling
3	Lactarius	fuliginosus	(Fr.) Fr. (non ss. Bon)	Russfarbener Milchling
3	Lactarius	mairei	Mal.	Braunzottiger Milchling
3	Lactarius	quietus	(Fr.) Fr.	Eichenmilchling
3	Lactarius	romagnesii	Bon	Kerbrandiger Korallenmilchling
3	Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
3	Russula	atropurpurea	(Krombh.) Britz.	Pupurschwarzer Täubling
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
3	Russula	densifolia	Gill.	Dichtblättriger Schwärztäubling
3	Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
3	Russula	luteotacta	Rea	Gelbfleckender Täubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	turci	Bres.	Jodoformtäubling
3	Russula	violeipes	Quélet	Violettstieliger Brätlingstäubling
4	Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
4	Cantharellus	tubaeformis	Fr.	Durchbohrter Leistling
4	Clavariadelphus	pistilaris	(Fr.) Donk	Herkuleskeule
4	Clavulina	cristata	(Holmskj.: Fr.) Schröt.	Kammförmige Koralle
4	Cotylidia	pannosa	(Sow.: Fr.) Reid	Striegeliger Erdwarzenpilz
4	Craterellus	cornucopioides	Pers.	Totentrompete
4	Oligoporus	ptychogaster	(Ludwig) Falck	Bauchpilz-Mehlstaubporling
4	Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
4	Lopharia	spadicea	(Pers.: Fr.) Boidin	Russbrauner Schichtpilz
4	Oligoporus	populinus	(Schum.: Fr.) Donk	Treppenförmiger Scharfporling
5	Lycoperdon	pyriforme	Schäff.: Pers.	Birnen-Stäubling
7	Helvella	crispa	(Bull. ex St. Aman) Boud.	Herbstlorchel
7	Helvella	elastica	Boud.	Elastische Lorchel
7	Leotia	lubrica	(Fr.) Karst.	Gemeines Gallertkäppchen

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Mit «Pilze der Woche» werden Pilze aufgelistet, die von unseren Mitgliedern im Verein für Pilzkunde Basel in der entsprechenden Woche gefunden und bestimmt wurden.
Über die Essbarkeit steht die spezielle Seite «essbare Pilze» zur Verfügung, eine Kopie der «VAPKO», Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane. Gattungshinweise (Pilzsystematik, Pilztafeln ab Seiten 17 bis 50) befinden sich ebenfalls auf dieser HP.

Pilz-Fundliste der Woche 44/45/46

Clitocybe dealbata *Rinnigbereifter Trichterling*

Art:	Hut 2-6 cm, gewölbt bis niedergedrückt, weiß, feucht oft graulich getönt. Lamellen gleichfarbig, mäßig bis deutlich gedrängt, breit angewachsen bis leicht herablaufend. Fleisch weiß, schwach mehlig riechend und schmeckend.
Mikro:	Sporen 4,5-6 x 3-4 µm, ellipsoidisch.
Ökologie ie:	Wiesen, Grasland.
Bemerkungen:	Candicantes: Mehr oder weniger weiße Pilze, alt oft creme bis beige verfärbend. Hut opakweiß durch eine stark lufthaltige Schicht.

Clitocybe dealbata
(Sow.) Kummer

.

Rinnigbereifter Trichterling

Hygrocybe acutopunicea *Rotkegeliger Saftling*

Helvella elastica *Elastische Lorchel*

Hygrocybe virginea *Jungfern-Ellerling*

Tubaria hiemalis *Winter-Trompetenschnitzling*

Macrolepiota excoriata *Ackerschirmling*

Volvariella gloiocephala *Grosser Scheidling*

Inocybe griseovelata *Graubeschleierter Risspilz*

Pilz-Fundliste der Woche 44/45/46

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
1	Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
1	Xerocomus	pruinatus	(Fr.) Quél.	Stattlicher Rotfuss-Röhrling
2	Agaricus	bitorquis	(Quélet) Sacc.	Trottoir-Champignon
2	Agaricus	urinascens (excellens)	(Moeller et Schäffer) Singer	Grosssporiger Anis-Egerling
2	Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
2	Amanita	muscaria	(L.) Hook.	Fliegenpilz
2	Chlorophyllum	rachodes	(Vitt.) Vellinga	
2	Clitocybe	dealbata	(Sow.) Kumm.	Rinnigbereifter Trichterling
2	Clitocybe	fragrans	(With.) Kumm.	Dufttrichterling
2	Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
2	Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
2	Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Conocybe	rubiginosa	Watl.	Rotstieliges Samthäubchen
2	Coprinus	comatus	(Müll.: Fr.) Pers.	Schopf-Tintling
2	Coprinus	micaceus	(Bull.: Fr.) Fr.	Glimmertintling
2	Cortinarius	cinnamomeus	Fr.	Zimt-Hautkopf
2	Cortinarius	fasciatus	Fr. ss. Arn.	Rötlichgeschmückter Wasserkopf
2	Cortinarius	glaucopus	(Schäff.: Fr.)	Reihiger Klumpfuss
2	Cortinarius	decipiens	(Pers.: Fr.) Fr.	Lilastieliger Wasserkopf
2	Cortinarius	semisanguineus	(Fr.)	Blutblättriger Hautkopf
2	Cortinarius	variecolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf
2	Crepidotus	variabilis	(Pers.: Fr.) Kummer	Gemeines Stummelfüsschen
2	Cystoderma	amiantinum	(Scop.: Fr.) Fayod	Amiant-Körnchenschirmling
2	Dermoloma	pseudocuneifolium	Her. ex Bon	Gefeldeter Samtritterling
2	Entoloma	huijsmanii	Noord.	Huijsmans⊠s Rötling
2	Galerina	laevis	(Pers.) Sing.	Rasen-Häubling
2	Galerina	marginata	(Batsch) Kühn.	Gifthäubling
2	Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
2	Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
2	Hebeloma	mesophaeum	(Pers.: Fr.) Quélet	Dunkelscheibiger Fälbling
2	Hebeloma	crustuliniforme	(Bull.: Fr.) Quél.	Tongrauer Fälbling
2	Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
2	Hygrocybe	acutopunicea	Haller	Rotkegeliger Saftling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilz-Fundliste der Woche 44/45/46

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Hygrocybe	virginea	(Wulfen: Fr.) Orton et Watling	Jungfern-Ellerling
2	Hygrocybe	psittacina	(Schäff.: Fr.) Wünsche	Papageigrüner Saftling
2	Hygrophorus	agathosmus	(Fr.) Fr.	Wohlriechender Schneckling
2	Hygrophorus	cossus (discoxanthus)	(Sow. ex Fr.) Fr.	Verfärbender Schneckling
2	Hygrophorus	pudorinus	(Fr.) Fr.	Orange-Schneckling
2	Hygrophorus	pustulatus	(Fr.) Fr.	Schwarzpunktierter Schneckling
2	Hygrophorus	chrysodon	(Batsch.: Fr.) Fr	Goldzahn-Schneckling
2	Hypholoma	capnoides	(Fr.: Fr.) Kummer	Rauchblättriger Schwefelkopf
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Hypholoma	sublateritium	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf
2	Inocybe	fuscidula	Vel.	Braunstreifiger Risspilz
2	Inocybe	griseovelata	Kühner	Graubeschleierter Risspilz
2	Inocybe	nitiduscula	(Britz.) Sacc.	Früher Risspilz
2	Inocybe	petiginosa	(Fr.: Fr.) Gillet	Graugezonter Zwergrisspilz
2	Inocybe	whitei	(Berk .et Br.) Sacc.	Weissrosa Risspilz
2	Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
2	Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
2	Lepiota	castanea	Quél. (inkl. L. ignipes Locq. ex Bon	Kastanienbrauner Schirmling
2	Lepista	flaccida	(Sowerby Fries) Patouillard	Fuchsiger Rötelritterling
2	Lepista	nuda	(Bull.: Fr.) Cooke	Violetter Rötelritterling
2	Lepista	splendens	(Pers.: Fr.) Konrad	Dichtblättriger Rötelritterling
2	Leucocortinarius	bulbiger	(A. & S.: Fr.) Sing.	Knolliger Schleierritterling
2	Macrolepiota	excoriata	Schäff.: Fr.) Wass.	Ackerschirmling
2	Marasmius	oreades	(Bolton.: Fr.) Fr.	Nelkenschwindling
2	Marasmius	androsaceus	(L.: Fr.) Fr.	Rosshaarschwindling
2	Melanoleuca	polioleuca	(Fr.) Kühn. & Mre.	Schwarzweisser Weichritterling
2	Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
2	Mycena	vitilis	(Fr.) Quél.	Zäher Fadenhelmling
2	Mycena	diosma	Krgl. & Schwöb.	Duftender Rettichhelmling
2	Mycena	flavoalba	(Fr.) Quél.	Zitronengelber Helmling
2	Oudemansiella	mucida	(Schrad. ex Fr.) v.H.	Beringter Schleimrübling
2	Panellus	stypticus	(Bull.: Fr.) P.Karst.	Bitterer Muschelseitling
2	Pholiota	lucifera	(Lasch) Quél.	Fettiger Schüppling
2	Pholiota	tuberculosa	(Schäff.: Fr.)	Rötender Schüppling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilz-Fundliste der Woche 44/45/46

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Pluteus	romelli	(Britz.) Sacc.	Gelbstieliger Dachpilz
2	Psathyrella	tephrophylla	(Romagn.) Bon.	Aschgraublättriger Faserling
2	Pseudoclitocybe	cyathiformis	(Bull.) Sing.	Kaffebrauner Gabeltrichterling
2	Rhodocybe	gemina	(Fr.). Kuyp. & Noord.	Würziger Tellerling
2	Ripartites	tricholoma	(Alb. & v. Schw.)	Bewimperter Filzkrempling
2	Schizophyllum	commune	Fr.: Fr.	Gemeiner Spaltblättling
2	Stropharia	caerulea	Kreisel	Blauer Träuschling
2	Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
2	Tricholoma	scalpturatum	(Fr.) Quél.	Gilbender Erd-Ritterlig
2	Tricholoma	sulfureum	(Bull.: Fr.) Kumm.	Schwefel-Ritterling
2	Tricholoma	terreum	(Schäff.:) Fr.) Kumm.	Erdritterling
2	Tricholoma	cingulatum	(Ahnfelt) Jacobatsch	Beringter Erdritterling
2	Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
2	Tubaria	hiemalis	Romagn. ex Bon	Winter-Trompetenschnitzling
2	Volvariella	gloiocephala	(DC.: Fr.) Boek. & End.	Grosser Scheidling
3	Lactarius	aurantiacus	(Pers.: Fr.) Gray	Echter Orange-Milchling
3	Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
3	Lactarius	flexulosus	(Pers.: Fr.) Gray	Verbogener Milchling
3	Lactarius	fulvissimus	Rom. i. Kühn. & Rom.	Orangefuchsiger Milchling
3	Lactarius	intermedius	(Krombh.) Cke.	Grubiger Weisstannenmilchling
3	Lactarius	quietus	(Fr.) Fr.	Eichenmilchling
3	Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3	Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
3	Lactarius	ligniotus	Fries in Lindb.	Mohrenkopf
3	Lactarius	luridus	(Pers.: Fr.) Gray	Gewöhnlicher Violettmilchling
3	Lactarius	pubescens	(Schrad.) Fries	Flaumiger Milchling
3	Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	caerulea	(Pers.: Fr.)	Buckeltäubling
3	Russula	emetica	(Schäff.: Fr.) Gray	Kirschroter Speitäubling
3	Russula	exalbicans	(Pers.) Melz. & Zvara	Verblassender Täubling
3	Russula	mairei	Singer	Buchen-Speitäubling
3	Russula	sardonia	Fr.	Zitronenblättriger Täubling
4	Cantharellus	tubaeformis	Fr.	Durchbohrter Leistling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilz-Fundliste der Woche 44/45/46

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
4	Clavulina	rugosa	(Bull.: Fr.) Schröt.	Runzlige Koralle
4	Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
4	Oligoporus	stipticus	(Pers.: Fr.) Gilb. & Ryv.	Bitterer Saftporling
4	Piptoporus	betulinus	(Bulliard) Karsten	Birken-Hautporling
4	Trametes	hirsuta	(Wulf.: Fr.) Pilát	Striegelige Tramete
5	Calvatia	exipuliformis	(Schäff.: Pers.) Perd.	Beutelstäubling
5	Lycoperdon	pyriforme	Schäff.: Pers.	Birnen-Stäubling
7	Helvella	lacunosa	(Pers.) O. Kuntze	Grubenlorchel
7	Otidea	cochleata	(Batsch (Fuckel	Schnecken-Öhrling
7	Otidea	concinna	(L.: Fr.) Fuckel	Zitronengelber Öhrling
7	Xylaria	longipes	(Pers. ex Mér.) Grev.	Langstielige Ahorn-Holzkeule

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilzarten-Total 2013

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	aestivalis	(Paulet) Fr.	Sommer-Steinpilz
1	Boletus	appendiculatus	Schaeff.	Anhängsel-Röhrling
1	Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
1	Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1	Boletus	fechtneri	Velen.	Silber-Röhrling
1	Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
1	Boletus	pulverlulentus	Opat.	Schwarzblauender Röhrling
1	Boletus	queletii	Schulzer	Glattstieliger Hexenröhrling
1	Boletus	radicans	Pers.: Fr.	Bitter-Röhrling
1	Boletus	regius	Krombh.	Königs-Röhrling
1	Boletus	rubrosanguineus	Walty ex Cheype	Falscher Satans-Röhrling
1	Boletus	satanas	Lenz	Satansröhrling
1	Chalciporus	piperatus	(Bull.: Fr.) Bat.	Pfeffer-Röhrling
1	Chroogomphus	helveticus	(Singer) Moser	Filziger Gelbfuss
1	Chroogomphus	rutilus	(Schaeff.: Fr.) O.K. Miller	Kupferroter Gelbfuss
1	Gomphidius	glutinosus	(Schäff.: Fr.) Fr.	Kuhmaul
1	Gyroporus	castaneus	(Bull.: Fr.)	Hasen-Röhrling
1	Hygrophoropsis	aurantiaca	(Wulff.: Fr.) Maire	Falscher Pfifferling
1	Leccinum	carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuss
1	Leccinum	crocipodium	(Letellier) Walting	Gelbporiger Rauhfuss
1	Leccinum	quercinum	Pilát ex Pilát	Eichen-Rotkappe
1	Leccinum	scabrum	(Bull.: Fr.) Gray	Birkenpilz
1	Leccinum	scabrum	(Bull.: Fr.) Gray	Birkenpilz
1	Leccinum	variicolor	Walting	Verschiedenfarbiger Rauhfuss
1	Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
1	Paxillus	panuoides	Fr.	Muschel-Krempling
1	Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
1	Porphyrellus	porphyrosporus	Fr.) Gilbert	Düsterer Röhrling
1	Strobilomyces	strobilaceus	(Scop.: Fr.) Berk.	Strubelkopfröhrling
1	Suillus	bovinus	(L.: Fr.) Rouss.	Kuhröhrling
1	Suillus	granulatus	(L.: Fr.) Rouss.	Körnchenröhrling
1	Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Total Funde 2013 := 1325
Total Arten 2013: = 612

Pilzarten-Total 2013 *(Fortsetzung)*

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Suillus	tridentinus	(Bresad.) Singer	Rostroter Lärchenröhrling
1	Suillus	viscidus	(L.) Rouss.	Grauer Lärchenröhrling
1	Tapinella	panuoides	(Fr.: Fr.) Gilbert	Muschel-Krempling
1	Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
1	Xerocomus	dryophylus	(Thiers) Singer	Dunkelroter Filz-Röhrling
1	Xerocomus	pruinatus	(Fr.) Quél.	Stattlicher Rotfuss-Röhrling
1	Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe
2	Agaricus	arvensis	Schäff.: Fr.	Schaf-Champignon
2	Agaricus	augustus	Fr.	Braunschuppiger Riesenegerling
2	Agaricus	benesii	(Pil.) Sing	Rötender Riesn-Egerling
2	Agaricus	bisporus	(Lge) Imbach	Brauner Zweispor-Egerling
2	Agaricus	campester	Fr.: Fr.	Wiesen-Champignon
2	Agaricus	essettei	Bon	Schiefknolliger Anis-Champignon
2	Agaricus	impudicus	(Rea) Pilat	Stinkender Panther-Egerling
2	Agaricus	iodosmus	Heinemann	Breitschuppiger Jodoform-Egerling
2	Agaricus	silvicola	(Vittad.) Sacc.	Dünnfleischiger Anis-Egerling
2	Agaricus	urinascens (excellens)	(Moeller et Schäffer) Singer	Grosssporiger Anis-Egerling
2	Agaricus	xanthoderma	Genev.	Karbol-Egerling
2	Agrocybe	arvalis	(Fr.) Sing.	Geschwänzter Sklerotien-Ackerling
2	Agrocybe	erebia	(Fr.) Kühn.	Leberbrauner Ackerling
2	Amanita	caesarae	(Scop.) Pers.	Kaiserling
2	Amanita	ceciliae	Berkeley et Broome) Bas	Riesen-Streifling
2	Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
2	Amanita	crocea	(Quél. in Boud.) Sing.	Orangebrauner Scheidenstreifling
2	Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
2	Amanita	fulva	(Schff.) Fr.	Rotbrauer Streifling
2	Amanita	junquillea	Quélet	Narzissengelber Wulstling
2	Amanita	muscaria	(L.) Hook.	Fliegenpilz
2	Amanita	pantherina	(DC.: Fr.) Krombh.	Pantherpilz
2	Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
2	Amanita	porphyria	Alb. & Schw.: Fr.	Porphyrbrauner Wulstling
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilzarten-Total 2013 *(Fortsetzung)*

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Amanita	submembranacea	(Bon) Gröger	Grauhäutiger Scheidenstreifling
2	Amanita	umbrinolutea	Secr.: Gill.) Bat.)	Verfärbender Scheidenstreifling
2	Amanita	vaginata	(Bull.) Vitt.	Grauer Scheidenstreifling
2	Armillaria	borealis	Marxm. & Korth.	Nordischer Hallimasch
2	Armillaria	borealis	Marxm. & Korth.	Nordischer Hallimasch
2	Armillaria	mellea	(Val.: Fr.) Kummer	Honiggelber Hallimasch
2	Bolbitius	vitellinus	(Pers.: Fr.) Fr.	Gold-Mistpilz
2	Calocybe	gambosa	(Fr.) Donk	Mairitterling
2	Chlorophyllum	rachodes	(Vitt.) Vellinga	Safran-Riesen-Schirmlings
2	Clitocybe	cerussata	(Fries) P. Kummer	Ähnlich Waldfreund Trichterling
2	Clitocybe	clavipes	(Pers.) Kumm.	Keulenfuss-Trichterling
2	Clitocybe	dealbata	(Sow.) Kumm.	Rinnigbereifter Trichterling
2	Clitocybe	ditopus	(Fr.) Gill.	Mehltrichterling
2	Clitocybe	fragrans	(With.) Kumm.	Dufttrichterling
2	Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
2	Clitocybe	gibba	(Pers. Fr.) Kummer	Ockerbrauner Trichterling
2	Clitocybe	glareosa	Röllin et Monthoux	Kiesliebender Trichterling
2	Clitocybe	lignatilis	(Pers.) Karst.	Gemeiner Holztrichterling
2	Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
2	Clitocybe	odora	(Bulliard: Fr.) Kumm.	Grüner Anistrichterling
2	Clitocybe	phaeophthalma	(Pers.) Kp.	Ranziger Trichterling
2	Clitocybe	phyllophila	(Pers.) Kumm.	Bleiweisser Trichterling
2	Clitocybe	rivulosa	(Pers.:Fr.) Kumm	Rinnigbereifter Gift-Trichterling
2	Clitocybe	senilis	(Fr.) Singer	Greisen-Trichterling
2	Clitocybe	vermicularis	(Fr.) Quélet	Lärchen-Trichterling
2	Clitocybula	lacerata	(Scropoli) Métrod	Fransiger Faserrübling
2	Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Conocybe	rubiginosa	Watl.	Rotstieliges Samthäubchen
2	Conocybe	subovalis	Kühn. ex Kühn. & Watl.	Gerandetknolliges Samthäubchen
2	Coprinus	atramentarius	(Bull.:Fr.) Fr.	Falten-Tintling
2	Coprinus	cinereus	(Schäff. Fr.) Gray	Wollstieliger Misttintling
2	Coprinus	comatus	(Müll.: Fr.) Pers.	Schopf-Tintling
2	Coprinus	comatus	(Müll.: Fr.) Pers.	Schopf-Tintling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilzarten-Total 2013 *(Fortsetzung)*

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Coprinus	disseminatus	(Pers.: Fr.) S.F.Gray	Gesäter Tintling
2	Coprinus	domesticus	(Bolt.y: Fr.) Gra	Haus-Tintling
2	Coprinus	lagopoides	Karst.	Rundsporige Hasenpfote
2	Coprinus	micaceus	(Bull.: Fr.) Fr.	Glimmertintling
2	Coprinus	micaceus	(Bull.: Fr.) Fr.	Glimmertintling
2	Coprinus	picaceus	(Bull.: Fr.) Gray	Specht-Tintling
2	Coprinus	strossmayeri	S. Schulz.	Perhuhn-Tintling
2	Cortinarius	alboviolacea	(Pers.: Fr.) Fr.	Weissvioletter Dickfuss
2	Cortinarius	anomalus	(Fr.: Fr.) Fr.	Braunvioletter Dickfuss
2	Cortinarius	anserinus	(Vel.) Hry.	Buchen-Klumpfuss
2	Cortinarius	argutus	Fr.	Spitzbasiger Schleimkopf
2	Cortinarius	atrovirens	Kalchbr.	Schwarzgrüner Klumpfuss
2	Cortinarius	bivelus	(Fr.: Fr.) Fr.	Birken-Gürtelfuss
2	Cortinarius	bolaris	(Pers.: Fr.) Fr.	Rotschuppiger Rauhkopf
2	Cortinarius	brunneus	(Pers.: Fr.) Fr.	Dunkelbrauner Gürtelfuss
2	Cortinarius	bulbosus	(Sow.: Fr.) Fr.	Knolliger Gürtelfuss
2	Cortinarius	bulliardii	(Pers.: Fr.) Fr.	Feuerfüssiger Gürtelfuss
2	Cortinarius	caerulescens	(Schäff.) Fr.	Blauer Klumpfuss
2	Cortinarius	calochrous	Fr.	Amethystblättriger Klumpfuss
2	Cortinarius	candelaris	(Fr.) Fr.	Wachsgelber Wasserkopf
2	Cortinarius	causticus	Fr.	Bereifter Schleimfuss
2	Cortinarius	cinnamomeus	Fr.	Zimt-Hautkopf
2	Cortinarius	cumatilis	(Fr.) s. str.	Taubenblauer Schleimkopf
2	Cortinarius	decipiens	(Pers.: Fr.) Fr.	Lilastieliger Wasserkopf
2	Cortinarius	delibutus	Fr.	Violettblättriger Schleimfuss
2	Cortinarius	elegantior	(Fr.) Fr.	Strohgelber Klumpfuss
2	Cortinarius	elegantissimus	Hry.	Prächtiger Klumpfuss
2	Cortinarius	evernius	(Fr.: Fr.) Fr. ss. Mos.	Rettich-Gürtelfuss
2	Cortinarius	fasciatus	Fr. ss. Arn.	Rötlichgeschmückter Wasserkopf
2	Cortinarius	flexipes	(Pers.: Fr.) Fr.	Duftender Gürtelfuss
2	Cortinarius	fraudolosus	Britzelmayr	Trügerischer Schleimkopf
2	Cortinarius	glaucopus	(Schäff.: Fr.)	Reihiger Klumpfuss
2	Cortinarius	hinnuleus	(Sow.) Fr.	Erdigriechender Gürtelfuss

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



Pilzarten-Total 2013 *(Fortsetzung)*

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Cortinarius	humicola	(Quél.) R. Maire	Sparriger Rauhkopf
2	Cortinarius	huronensis	Amm. & Sm.	Braunhütiger Sumpf-Häubling
2	Cortinarius	infractus	(Pers.: Fr.) Fr.	Bitterer Schleimfuss
2	Cortinarius	multiformis	Fr.	Sägeblättriger Klumpfuss
2	Cortinarius	nemorensis	(Fr.) Lge.	Verfärbender Schleimkopf
2	Cortinarius	odoratus	(Jog.: Mos.) Mos.	Hellgrüner Duft-Klumfuss
2	Cortinarius	olidus	Lge.	Gelbgegürtelter Schleimkopf
2	Cortinarius	olivaceofuscus	Kühn.	Hainbuchen-Hautkopf
2	Cortinarius	ophiopus	Peck	Schlangenfüssiger Schleimkopf
2	Cortinarius	orellanus	(Fr.) Fr.	Orangefuchsiger Rauhkopf
2	Cortinarius	praestans	(Cord.) Gill.	Schleiereule
2	Cortinarius	reverendissimus	Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux	ähnlich dem C. varius
2	Cortinarius	rubicundulus	(Rea) Pears.	Rötlichfaseriger Rauhkopf
2	Cortinarius	rubricosus	Fries ss. Moser	Schwärzender Wasserkopf
2	Cortinarius	saturninus	Fr.	Blaufleischiger Gürtelfuss
2	Cortinarius	semisanguineus	(Fr.)	Blutblättriger Hautkopf
2	Cortinarius	spilomeus	(Fr.: Fr.) Fr.	Kupferschuppiger Seidenkopf
2	Cortinarius	torvus	(Bull.: Fr.) Fr.	Wohlriechender Gürtelfuss
2	Cortinarius	variecolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf
2	Cortinarius	varius	Fr.	Ziegelgelber Schleimkopf
2	Cortinarius	violaceus	(L.:Fr.) Fr.	Dunkelvioletter Schleierling
2	Cortinarius	anthracinus	(Fr.) Fr.	Purpurschwarzer Wasserkopf
2	Cortinarius	herpeticus	Fr.	Violettgrünblättriger Klumpfuss
2	Crepidotus	applanatus	(Pers.) Kumm.	Gerieftes Stummelfüsschen
2	Crepidotus	mollis	(Schäff.L Fr.) Staude	Gallertfleischiges Stummelfüsschen
2	Crepidotus	variabilis	(Pers.: Fr.) Kummer	Gemeines Stummelfüsschen
2	Crinipellis	stipitaria	(Fr.) Pat.	Zitzen Haarschwindling
2	Cystoderma	amiantinum	(Scop.: Fr.) Fayod	Amiant-Körnchenschirmling
2	Dermoloma	cuneifolium	(Fr.: Fr.) Bon	Keilblättriger Samtritterling
2	Dermoloma	pseudocuneifolium	Her. ex Bon	Gefeldeter Samtritterling
2	Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
2	Echinoderma	langei	Knuds.	Grosser Blutegerling
2	Entoloma	exile	(Fr.: Fr.) Hesler	Schmächtiger Rötling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilzarten-Total 2013 *(Fortsetzung)*

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Entoloma	griseoluridum	(Kühn. ex Noord.	Olivgrauer Rötling
2	Entoloma	huijsmanii	Noord.	Huijsmans⊠s Rötling
2	Entoloma	incanum	(Fr.) Hes.	Braungrüner Rötling
2	Entoloma	inusitatum	Noordeloos, Enderle et Lammers	Karamel-Rötling
2	Entoloma	longistriatum	(Peck.) Noord.	Gesgtreifter Zärtling
2	Entoloma	nitidum	Quél.	Stahlblauer Rötling
2	Entoloma	rhodopolium	(Fr.: Fr.) Kummer	Niedergedrückter Rötling
2	Entoloma	rhodopolium var. nid.	(Fr.)Nordel./Kumm.	Alkalischer Rötling
2	Entoloma	serrulatum	(Fr.: Fr.) Hes.	Gesägtblättriger Rötling
2	Entoloma	sinuatum	(Bull.: Pers.: Fr.) Kumm.	Riesen-Rötling
2	Entoloma	sodale	Noord.	Montaner Blaustiel-Rötling
2	Galerina	laevis	(Pers.) Sing.	Rasen-Häubling
2	Galerina	marginata	(Batsch) Kühn.	Gifthäubling
2	Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
2	Gymnopilus	spectabilis	(Weinm.: Fr.)	Beringter Flämmling
2	Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
2	Gymnopus	distorta	(Fr.) Quél.	Drehstieliger Rübling
2	Gymnopus	dryophilus	(Bulliard: Fr.) Murrill	Waldfreund-Rübling
2	Gymnopus	fusipes	(Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling
2	Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
2	Hebeloma	birrum	Fr. ss. Mos.	Spindelfüssiger Fälbling
2	Hebeloma	crustuliniforme	(Bull.: Fr.) Quél.	Tongrauer Fälbling
2	Hebeloma	hetierii		
2	Hebeloma	mesophaeum	(Pers.: Fr.) Quélet	Dunkelscheibiger Fälbling
2	Hebeloma	sacchariolens	Quél.	Süssriechender Fälbling
2	Hebeloma	senescens	(Batsch) Berk.	Bräunender Fälbling
2	Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
2	Hebeloma	sordescens	Vesterholt	Schwarzknolliger Fälbling
2	Hebeloma	truncatum	(Fr.) Kumm.	Kakao-Fälbling
2	Hemimycena	cucullata	(Pers.: Fr.) Sing.	Gipsweisser Scheinhelmling
2	Hemimycena	mairei	(Gilb.) Sing.	Gras-Scheinhelmling
2	Hydropus	atramentosus	(Kbr.) Kotl. & Pouz.	Schwärzender Wasserfuss
2	Hydropus	subalpinus	(Höhnel) Singer	Buchenwald-Wasserfuss

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilzarten-Total 2013 *(Fortsetzung)*

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Hydropus	trichoderma	(Josserand) Singer	Faltiggerunzelter Wasserfuss
2	Hygrocybe	acutopunicea	Haller	Rotkegeliger Saftling
2	Hygrocybe	chlorophana	(Fr.) Wünsche	Stumpfer Saftling
2	Hygrocybe	virginea	(Wulfen: Fr.) Orton et Watling	Jungfern-Ellerling
2	Hygrocybe	psittacina	(Schäff.: Fr.) Wünsche	Papageigrüner Saftling
2	Hygrophorus	agathosmus	(Fr.) Fr.	Wohlriechender Schneckling
2	Hygrophorus	capreolarius	(Kalchbr.) Sacc.	Weinroter Schneckling
2	Hygrophorus	chrysodon	(Batsch.: Fr.) Fr	Goldzahn-Schneckling
2	Hygrophorus	cossus (discoxanthus)	(Sow. ex Fr.) Fr.	Verfärbender Schneckling
2	Hygrophorus	eburneus	(Bull:. Fr.) Fr.	Elfenbein-Schneckling
2	Hygrophorus	mesotephrus	Berk. & Br.	Olivgrauer Schneckling
2	Hygrophorus	nemoreus	(Pers.: Fr.) Fr.	Hain-Schneckling
2	Hygrophorus	penarius	Fr.	Trockener Schneckling
2	Hygrophorus	picea	Kühn.	Fichten-Schneckling
2	Hygrophorus	poetarum	Heim	Isabell-Schneckling
2	Hygrophorus	pudorinus	(Fr.) Fr.	Orange-Schneckling
2	Hygrophorus	pustulatus	(Fr.) Fr.	Schwarzpunktierter Schneckling
2	Hygrophorus	unicolor	Grög.	Orangefalber Schneckling
2	Hypholoma	capnoides	(Fr.: Fr.) Kummer	Rauchblättriger Schwefelkopf
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Hypholoma	sublateritium	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf
2	Inbocybe	corydalina	Quélet	Grüngebuckelter Rkisspilz
2	Inocybe	albomarginata	Velenovsky	Ovalsporiger Risspilz
2	Inocybe	asterospora	Quel.	Sternsporiger Risspilz
2	Inocybe	bongardii	(Weinmann) Quélet	Duftender Risspilz
2	Inocybe	calamistrata	(Fr.:Fr.) Gill.	Blaufüssiger Risspilz
2	Inocybe	cervicolor	(Pers.) Quél.	Hirschbrauner Risspilz
2	Inocybe	cookei	Bres.	Knolliger Risspilz
2	Inocybe	corydalina	Quél.	Grünbuckliger Risspilz
2	Inocybe	cryptocystis	Stunz	Ockerfuchsiger Risspilz
2	Inocybe	flocculosa	(Berk.) Sacc.	Flockiger Risspilz
2	Inocybe	fraudans	(Britz.) Sacc.	Birnen-Risspilz
2	Inocybe	furfurea	(Schwöbel & Stangl) Kuyper	Schwarzscheiteliger Risspilz

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilzarten-Total 2013 *(Fortsetzung)*

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Inocybe	fuscidula	Vel.	Braunstreifiger Risspilz
2	Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
2	Inocybe	geophylla var. lilacina	(Peck.) Gill.	Lilastieliger Risspilz
2	Inocybe	griseovelata	Kühner	Graubeschleierter Risspilz
2	Inocybe	hirtella	Bres.	Bittermandel-Risspilz
2	Inocybe	lanuginosa	(Bull. Fr.) Kumm.	Wolliger Risspilz
2	Inocybe	maculata	Boud.	Gefleckter Risspilz
2	Inocybe	mixtilis	(Britz.) Sacc.	Gerandetknolliger Risspilz
2	Inocybe	nitiduscula	(Britz.) Sacc.	Früher Risspilz
2	Inocybe	petiginosa	(Fr.: Fr.) Gillet	Graugezonter Zwergrisspilz
2	Inocybe	phaeodisca	Kühn.	Braunscheibiger Risspilz
2	Inocybe	queletii	Maire et Konr.	Weisstannen-Risspilz
2	Inocybe	riomosa	(Bull.: Fr.) Kummer	Kegeliger Risspilz
2	Inocybe	soluta	Vel.	Kurzsporiger Risspilz
2	Inocybe	splendens	Heim	Klebriger Risspilz
2	Inocybe	whitei	(Berk .et Br.) Sacc.	Weissrosa Risspilz
2	Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2	Laccaria	affinis	(Sing.) Bon	Moor-Lactrichterling
2	Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
2	Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
2	Lacrymaria	lacrymabunda	(Bull.: Fr.) Pat.	Tränender Samumpilz
2	Lentinellus	cochleatus	(Pers.: Fr.) Karst.	Äniszähling
2	Lentinellus	cochleatus var. inolens	Konr. & Maubl.	Geruchloser Äniszähling
2	Lentinus	adhaerens	(Alb. et Schw.: Fr.) Fr.	Harziger Sägeblättling
2	Lentinus	torulosus	(Pers.: Fr.) Lloyd	Birkenknäueling
2	Lepiota	alba	(Bres.) Sacc.	Weisser Schirmling
2	Lepiota	castanea	Quél. (inkl. L. ignipes Locq. ex Bon	Kastanienbrauner Schirmling
2	Lepiota	clypeolaria	(Bull.: Fr.) Kumm.	Wolliggestiefelter Schirmling
2	Lepiota	cristata	(Bolton.: Fr.) Kummer	Stink-Schirmling
2	Lepiota	fuscovinacea	Møll. & Lge.)	Weinroter Schirmling
2	Lepiota	sublaevigatua	Bon et Boiffard	Feinschuppiger Schirmling
2	Lepista	flaccida	(Sowerby Fries) Patouillard	Fuchsiger Rötelritterling
2	Lepista	glaucocana	(Bres.) Sing.	Blassblauer Rötelritterling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilzarten-Total 2013 *(Fortsetzung)*

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Lepista	irina	(Fr.) Big.	Veilchen-Rötelritterling
2	Lepista	nuda	(Bull.: Fr.) Cooke	Violetter Rötelritterling
2	Lepista	panaeolus	(Fr.) Karst.	Horngrauer Rötelritterling
2	Lepista	saeva (personata)	(Fr.: Fr.) Cke.	Lilastiel-Rötelritterling
2	Lepista	splendens	(Pers.: Fr.) Konrad	Dichtblättriger Rötelritterling
2	Leucoagaricus	leucothites	(Vitt.) Was.	Rosablättriger Egerlingsschirmling
2	Leucocortinarius	bulbiger	(A. & S.: Fr.) Sing.	Knolliger Schleierritterling
2	Lyophyllum	connatum	(Schum.: Fr.) Sing.	Weisser Büschelrasling
2	Lyophyllum	decastes	(Fr.: Fr.) Singer	Brauner Büschelrasling
2	Lyophyllum	fumosum	(Pers.: Fr.) Ort.	Hellbrauner Büschelrasling
2	Lyophyllum	loricatum	(Fr.) Kühn.	Gepanzerter Rasling
2	Lyophyllum	paelochroum	Clmç.	Lemfarbener Schwärzling
2	Macrolepiota	excoriata	Schäff.: Fr.) Wass.	Ackerschirmling
2	Macrolepiota	gracilenta	(Huism.ex Ort.) Mos.	Sternschuppiger Riesenschirmling
2	Macrolepiota	heimii	(Locqin) Bon	Schuppenloser Riesenschirmling
2	Macrolepiota	konradii	(Huijs. ex Orta.) Mos.	Sternschuppiger Riesenschirmling
2	Macrolepiota	rhacodes var. brunnea	(Vittad.) Singer	Brauner Safranschirmling
2	Marasmiellus	candidus	(Bolt.: Fr.) Sing.	Schneeweisser Zwergschwindling
2	Marasmiellus	ramealis	(Bull.: Fr.) Sing.	Ästchenschwindlng
2	Marasmius	alliaceus	(Jacq.: Fr.) Fr.	Langstieliger Knoblauchschwindling
2	Marasmius	alliaceus	(Jacq.: Fr.) Fr.	Langstieliger Knoblauchschwindling
2	Marasmius	androsaceus	(L.:Fr.) Fr.	Roshaar-Schwindling
2	Marasmius	oreades	(Bolton.: Fr.) Fr.	Nelkenschwindling
2	Marasmius	quercophilus	(Pouz.) Arn.& Noordel.	Braunscheibiger Schwindling
2	Marasmius	rotula	(Scop.: Fr.) Fr.	Halsbandschwindling
2	Marasmius	torquescens	Quél.	Ledergelber Schwindling
2	Marasmius	wynnei	Berk. & Br.	Violetlicher Schwindling
2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2	Melanoleuca	cavipes	Métrod ex Bon	Hohlstieliger Weichritterling
2	Melanoleuca	polioleuca	(Fr.) Kühn. & Mre.	Schwarzweisser Weichritterling
2	Mycena	abramsii	(Murr.) Murr.	Voreilender Helmling
2	Mycena	amicta	(Fr.: Fr.) Quélet	Geschmückter Helmling
2	Mycena	crocata	(Schrad.: Fr.) Kumm.	Safranmilchender Helmling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilzarten-Total 2013 *(Fortsetzung)*

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Mycena	diosma	Krgl. & Schwöb.	Duftender Rettichhelmling
2	Mycena	epipterygia	(Scop.: Fr.) Gray	Dehnbarer Helmling
2	Mycena	filopes	(Bull.:Fr.) Kumm.	Zerbrechlicher Fadenhelmling
2	Mycena	flavescens	Velen.	Olivgelber Helmling
2	Mycena	flavoalba	(Fr.) Quél.	Zitronengelber Helmling
2	Mycena	galericulata	(Scop.:Fr.) Gray	Rosablättriger Helmling
2	Mycena	haematopus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Bluthelmling
2	Mycena	inclinata	(Fr.) Quél.	Buntstieliger Helmling
2	Mycena	pelianthina	(Fr.: Fr.) Quél.	Schwarzgezähnelter Helmling
2	Mycena	polyadelpha	(Lasch). Kühn.	Winziger Blatthelmling
2	Mycena	pseudopicta	(Lge) Kühn.	Rauchgrauer Gras-Helmling
2	Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
2	Mycena	renati	Quélet	Gelbstieliger Nitrat-Helmling
2	Mycena	rosea	(Bull.) Gramberg	Rosa-Rettichhelmling
2	Mycena	stipata	Maas Geester.& Schw.	Büscheliger Nitrat-Helmling
2	Mycena	viridimarginata	Karst.	Grünschneidiger Helmling
2	Mycena	vitilis	(Fr.) Quél.	Zäher Fadenhelmling
2	Mycena	zephirus	(Fr.: Fr.) Kumm.	Rostfleckiger Helmling
2	Mycena	polygramma	J.E. Lange	Rillstieliger Helmling (kleine form)
2	Mycena	polygramma fo. pumila	J.E. Lange	Rillstieliger Helmling (kleine form)
2	Naucoria	melinoides	(Bull.: Fr.) Kühn.	Honiggelber Sumpfschnitzling
2	Omphalina	discorosea	(Pil.) Her. & Kotl.	Rosablättriger Holznabeling
2	Omphalina	pyxidata	(Bull.: Pers.) Quél.	Starkgeriefter Nabeling
2	Oudemansiella	mucida	(Schrad. ex Fr.) v.H.	Beringter Schleimrübling
2	Panellus	stypticus	(Bull.: Fr.) P.Karst.	Bitterer Muschelseitling
2	Phaeolepiota	aurea	(Matt.: Fr.) Mre. ex Konr. & Maubl.	Goldfarbener Glimmerschüppling
2	Pholiota	adiposa	(Fr.) Kumm.	Schleimiger Schüppling
2	Pholiota	astragalina	(Fr.) Singer	Safranroter Schüppling
2	Pholiota	flammans	(Fr.:) Kummer	Feuerschüppling
2	Pholiota	gummosa	(Lasch.: Fr.) Sing.	Strohblasser Schüppling
2	Pholiota	jahnii	Tjallingii-Beukers et Bas	Pinselschüppling
2	Pholiota	lucifera	(Lasch) Quél.	Fettiger Schüppling
2	Pholiota	tuberculosa	(Schäff.: Fr.)	Rötender Schüppling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilzarten-Total 2013 *(Fortsetzung)*

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Pholiotina	aporos	Kits van Waveren	Frühlings-Glockenschüppling
2	Pleurotus	drynus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Berindeter Seitling
2	Pleurotus	eryngii	(De Candolle: Fr.) Quél.	Brauner Kreuter-Seitling
2	Pleurotus	pulmonarius	(Fr.) Quél.	Lungen-Seitling
2	Pluteus	atromarginatus	(Sing.) Kühn.	Schwarzschneidiger Dachpilz
2	Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
2	Pluteus	ephebeus	(Fr.: Fr.) Gill.	Graufilziger Dachpilz
2	Pluteus	leonius	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Löwengelber Dachpilz
2	Pluteus	nanus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Zwerg-Dachpilz
2	Pluteus	plautus	(Weinmann) Schillet	Verschiedenfarbiger Dachpilz
2	Pluteus	salicinus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Grauer Dachpilz
2	Pluteus	thomsonii	(Berk. & Br.) Dennis	Graustieliger Aderndachpilz
2	Psathyrella	candolleana	(Fr.: Fr.) Maire	Behangener Faserling
2	Psathyrella	conopilus	(Fr.: Fr.) Pears. & Dennis	Huthaarfaserling
2	Psathyrella	piluliformis	(Bull.: Fr.) Ort.	Wässeriger Faserling
2	Psathyrella	spadiceogrisea	(Schäff.) Fr. Maire	Dungbewohnender Faserling
2	Psathyrella	tephrophylla	(Romagn.) Bon.	Aschgraublättriger Faserling
2	Pseudoclitocybe	cyathiformis	(Bull.) Sing.	Kaffebrauner Gabeltrichterling
2	Resubinatus	applicatus	(Batsch: Fr.) Gray	Grauer Zwergseitling
2	Rhodocybe	gemina	(Fr.). Kuyp. & Noord.	Würziger Tellerling
2	Rickenella	fibula	(Bull.: Fr.) Raith.	Orangegelber Heftelnabeling
2	Ripartites	tricholoma	(Alb. & v. Schw.)	Bewimperter Filzkrempling
2	Rozites	caperatus	(Pers.: Fr.) P. Karst.	Zigeunerpilz
2	Schizophyllum	commune	Fr.: Fr.	Gemeiner Spaltblättling
2	Simocybe	rubi	(Berk.) Sing.	Breitsporiger Olivschnitzling
2	Stropharia	albonites	(Fr.) Karst.	Hyalinweisser Träuschling
2	Stropharia	caerulea	Kreisel	Blauer Träuschling
2	Tricholoma	acerbum	(Bull.: Fr.) Quél.	Gerippter Ritterling
2	Tricholoma	album	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Weisser Ritterling
2	Tricholoma	atrosquamosum	(Chev.) Sacc.	Schwarzschuppiger Ritterling
2	Tricholoma	cingulatum	(Ahnfelt) Jacobatsch	Beringter Erdritterling
2	Tricholoma	columbetta	(Fr.) Kumm.	Seidiger Ritterling
2	Tricholoma	imbricatum	(Fr.: Fr.) Kumm.	Feinschuppiger Ritterling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilzarten-Total 2013 *(Fortsetzung)*

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Tricholoma	lascivum	(Fr.) Gill. ss. Lge.	Unverschämter Ritterling
2	Tricholoma	luridum	(Schäff.: Fr.) Quél.	Graublättriger Ritterling
2	Tricholoma	orirubens	Quél.	Rötender Ritterling
2	Tricholoma	pseudonicticans	Bon	Blassfleischiger Fichtenritterling
2	Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
2	Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
2	Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
2	Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
2	Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
2	Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
2	Tricholoma	sciodes	(Secr.) Martin	Schärflicher Ritterling
2	Tricholoma	sejunctum	(Sow.: Fr.) Quél.	Grüngelber Ritterling
2	Tricholoma	squarrulosum	Bres.	Stielschuppiger Ritterling
2	Tricholoma	sulfureum	(Bull.: Fr.) Kumm.	Schwefel-Ritterling
2	Tricholoma	terreum	(Schäff.:) Fr.) Kumm.	Erdritterling
2	Tricholoma	tigrinum	Kumm.	Tiger-Ritterling
2	Tricholoma	ustale	(Fr.: Fr.) Kumm.	Brandiger Ritterling
2	Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
2	Tricholomopsis	decora	(Fr.) Sing.	Olivgelber Holzritterling
2	Tubaria	hiemalis	Romagn. ex Bon	Winter-Trompetenschnitzling
2	Volvariella	bombycina	(Schäff.: Fr.) Sing.	Wolliger Scheidling
2	Volvariella	gloiocephala	(DC.: Fr.) Boek. & End.	Grosser Scheidling
2	Volvariella	murinella	(Quél.) Mos.	Mausgrauer Scheidling
2	Xerula	melanotricha	Dörfelt	Weisstannen-Wurzelrübling
2	Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
2	Clitocybe	vermicularis	(Fr.) Quélet	Lärchen-Trichterling
2	Lentinus	adhaerens	(Alb. et Schw.: Fr.)	Fr. Harziger Sägeblättling
3	Lactarius	acerrimus	Britz.	Queradriger Milchling
3	Lactarius	acris	(Bolt.: Fr.) Gray	Rosaanlaufender Milchling
3	Lactarius	albocarneus	Britzelmayr	Klebriger Milchlig
3	Lactarius	aurantiacus	(Pers.: Fr.) Gray	Echter Orange-Milchling
3	Lactarius	azonites	(Bull.) Fr.	Rauchfarbener Rosamilchling
3	Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilzarten-Total 2013 *(Fortsetzung)*

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
3	Lactarius	chrysorrheus	Fr.	Goldfüssiger Milchling
3	Lactarius	cremor	Fr.	Runzliger Zwergmilchling
3	Lactarius	deliciosus	(L.): Fr.) Gray	Edelreizker
3	Lactarius	deterrimus	Gröger	Fichtenreizker
3	Lactarius	flavidus	Boud.	Hellgelber Violettmilchling
3	Lactarius	flexulosus	(Pers.: Fr.) Gray	Verbogener Milchling
3	Lactarius	fluens	Boud.	Braunfleckender Milchling
3	Lactarius	fuliginosus	(Fr.) Fr. (non ss. Bon)	Russfarbener Milchling
3	Lactarius	glaucescens	Crossl.	Grünender Pfeffermilchling
3	Lactarius	glyciosmus	(Fr.: Fr.) Fr.	Blasser Duftmilchling
3	Lactarius	hepaticus	Plowr. in Poud.	Leberbrauner Milchling
3	Lactarius	hortensis	Velen	Haselmilchling
3	Lactarius	illyricus	Piltaver Netzsporiger	Buchen Milchling
3	Lactarius	intermedius	(Krombh.) Cke.	Grubiger Weisstannenmilchling
3	Lactarius	ligniotus	Fries in Lindb.	Mohrenkopf
3	Lactarius	luridus	(Pers.: Fr.) Gray	Gewöhnlicher Violettmilchling
3	Lactarius	mairei	Mal.	Braunzottiger Milchling
3	Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
3	Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
3	Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
3	Lactarius	pubescens	(Schrad.) Fries	Flaumiger Milchling
3	Lactarius	quietus	(Fr.) Fr.	Eichenmilchling
3	Lactarius	romagnesii	Bon	Kerbrandiger Korallenmilchling
3	Lactarius	rubrocinctus	Fr.	Rotgegürtelter Runzelmilchling
3	Lactarius	ruginosus	Rom.	Kleiner Korallenpilz
3	Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3	Lactarius	scrobiculatus	(Scop.: Fr.) Fr.	Grubiger Fichtenmilchling
3	Lactarius	semisanguifluus	Helm & Lecl.	Spangrün-weinroter Kiefernreizker
3	Lactarius	serifluus	(De Candollo: Fr.) Fr.	Wässeriger Milchling
3	Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
3	Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
3	Lactarius	volemus	(Fr.: Fr.) Fr.	Brätling
3	Lactarius	zonarius	(Bulliard) Fr.	Echter Zonenmilchling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilzarten-Total 2013 *(Fortsetzung)*

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
3	Lactarius	zonarius	(Bulliard) Fr.	Echter Zonenmilchling
3	Lactarius	zonaroides	Kühner et Romagn.	Montaner Zonen-Milchling
3	Russula	albonigra	(Krombh.) Fr.	Mentoltäubling
3	Russula	amethystina	Quélet	Amethysttäubling
3	Russula	anthracina	Romagn.	Lachsblättriger Schwärztäubling
3	Russula	aquosa	Leclair	Wässriger Moortäubling
3	Russula	atropurpurea	(Krombh.) Britz.	Pupurschwarzer Täubling
3	Russula	aurea	Pers.	Goldtäubling
3	Russula	badia	Quél.	Zedernholztäublig
3	Russula	caerulea	(Pers.: Fr.)	Buckeltäubling
3	Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3	Russula	chloroides	(Krombh.) Bres.	Schmalblättriger Weisstäubling
3	Russula	cutefracta	Cke.	Rissigrandiger Täubling
3	Russula	cyanoxantha	R. Maire.: Singer	Grüner Frauentäubling
3	Russula	cyanoxantha fo. pelter.	R. Maire.: Singer	Grüner Frauentäubling
3	Russula	decipiens	(Sing.) Svrcek	Weinroter Dotter-Täubling
3	Russula	delica	Fr.	Gemeiner Weisstäubling
3	Russula	densifolia	Gill.	Dichtblättriger Schwärztäubling
3	Russula	emetica	(Schäff.: Fr.) Gray	Kirschroter Speitäubling
3	Russula	exalbicans	(Pers.) Melz. & Zvara	Verblassender Täubling
3	Russula	faginea	Romagn.	Buchen-Heringstäubling
3	Russula	farinipes	Romell in Britz.	Mehlstieltäubling
3	Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
3	Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
3	Russula	fragilis	(Pers.: Fr.) Fr.	Wechselfarbiger Speitäubling
3	Russula	grata (laurocerasi)	Melzer	Mandeltäubling
3	Russula	graveolens	Romell	Fleisschvioletter Heringstäubling
3	Russula	graveolens	Romell	Fleisschvioletter Heringstäubling
3	Russula	heterophylla	(Fr.) Fr.	Grüner Speisetäubling
3	Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
3	Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
3	Russula	lilacea	Quél.	Rotstieliger Reiftäubling
3	Russula	luteotacta	Rea	Gelbfleckender Täubling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilzarten-Total 2013 *(Fortsetzung)*

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
3	Russula	mairei	Singer	Buchen-Speitäubling
3	Russula	nauseosa	(Pers.) Fr..	Geriefter Weichtäubling
3	Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3	Russula	olivascens (postia)	(Pers.: Fr.) Bres.	Olivgrüner Täubling
3	Russula	paludosa	Britz.	Apfeltäubling
3	Russula	puellaris	Fr.	Milder Wachstäubling
3	Russula	queletii	Fr. in Quél.	Stachelbeertäubling
3	Russula	raoultii	Quél.	Blassgeber Täubling
3	Russula	rhodopus	Zvára	Flammenstieltäubling
3	Russula	romellii	Maire	Weissstieliger Ledertäubling
3	Russula	sardonia	Fr.	Zitronenblättriger Täubling
3	Russula	solaris	Ferd. et Winge	Sonnentäubling
3	Russula	torulosa	Bres.	Gedrungener Täubling
3	Russula	turci	Bres.	Jodoformtäubling
3	Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
3	Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
3	Russula	violeipes	Quélet	Violettstieliger Brätlingstäubling
3	Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
3	Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling
3	Russula	xerampelina	Schäff.: Fr.	Roter Heringstäubling
3	Russula	amoena	Quélet	Samt-Täubling
3	Russula	curtipes	Moell. & Schaeff.	Kurzstieliger Ledertäubling
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
3	Russula	melliolens	Quélet	Honig-Täubling
3	Russuloa	laurocerasi	Melzer	Mandeltäubling
4	Abortiporus	biennis	(Bull.:Fr.) Sing.	Rötender Saftwirrling
4	Artomyces	pyxidatus	(Pers.: Fr.) Jül.	Becherkoralle
4	Bjerkandera	adusta	(Willd.: Fr.) Karst.	Angebrannter Rauchporling
4	Bondarzewia	montana	(Quél.) Singer	Bergporling
4	Cantharellus	auroa	(Batsch) Kuyp.	Duftender Gabeling, Goldfüsschen
4	Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilzarten-Total 2013 *(Fortsetzung)*

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
4	Cantharellus	cinereus	Pers. ex Fr.	Grauer Leistling
4	Cantharellus	melanoxeros	Desm.	Gelbvioletter Pfifferling
4	Cantharellus	tubaeformis	Fr.	Durchbohrter Leistling
4	Ceriporiopsis	resinascens	(Romell.) Dom.	Harziger Wachsporling
4	Clavariadelphus	pistilaris	(Fr.) Donk	Herkuleskeule
4	Clavulina	cristata	(Holmskj.: Fr.) Schröt.	Kammförmige Koralle
4	Clavulina	rugosa	(Bull.: Fr.) Schröt.	Runzlige Koralle
4	Climacocystis	borealis	(Fr.) Kotl. & Pouz.	Nordischer Porling
4	Coriolopsis	gallica	(Fr.) Ryv.	Braune Borstentramete
4	Craterellus	cornucopioides	Pers.	Totentrompete
4	Daedalea	quercina	(L. ex Fr.)	Eichenwirrling
4	Daedaleopsis	confragosa	(Bolt.: Fr.) Schröt. s. str.	Rötende Tramete
4	Daedaleopsis	tricolor	(Pers.) Bond. & Sing.	Purpurrote Tramete
4	Dentropolyporus	umbellatus	(Pers.: Fr.) Jül.	Eichhase
4	Duportella	malençonii	(Boid. & Klanq.) Hijortst.	Veränderlicher Schichtpilz
4	Fistulina	hepatica	Schäff. ex Fr.	Leberreischling
4	Ganoderma	carnosum	Pat.	Dunkler Lackporling
4	Ganoderma	lucidum	(Curt.: Fr.) Karst.	Glänzender Lackporling
4	Gloeophyllum	odoratum	(Wulfen: Fr.) Imazeki	Fenchelporling
4	Hapalopilus	rutilans	(Pers.: Fr.) Karst.	Zimtfarbener Weichporling
4	Heterobasidion	annosum	(Fr.) Bref.	Wurzelschwamm
4	Hydnellum	aurantiacum	(Fr.) Karst.	Orangegelber Korkstacheling
4	Hydnellum	peckii	Banker in Peck	Scharfer Korkstacheling
4	Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
4	Hydnum	repandum var. rufescens	(Fr.) Barla	Rotgelber Stoppelpilz
4	Hyphoderma	mutatum	(Peck) v. Höhn. & Litsch.	Veränderlicher Rindenpilz
4	Inonotus	nodulosus	(Fr.) Karst.	Buchen-Schillerporling
4	Laetiporus	sulfureus	Murr.	Schwefelporling
4	Lenzites	betulina	(L. ex Fr.) Fr.	Birkenblättling
4	Lopharia	spadicea	(Pers.: Fr.) Boidin	Russbrauner Schichtpilz
4	Meruliopsis	corium	(Fr.) Ginns	Lederartiger Fältling
4	Oligoporus	populinus	(Schum.: Fr.) Donk	Treppenförmiger Scharfporling
4	Oligoporus	ptychogaster	(Ludwig) Falck	Bauchpilz-Mehlstaubporling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilzarten-Total 2013 *(Fortsetzung)*

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
4	Oligoporus	stipticus	(Pers.: Fr.) Gilb. & Ryv.	Bitterer Saftporling
4	Phaeolus	schweinitzii	(Fr.) Pat.	Kiefernbraunporling
4	Phellinus	torulosus	(Pers.) Bourd.et Galz.	Rotporiger Feuerschwamm
4	Phellodon	melaleucus	(Sw. apud Fr.: Fr.) Karst.	Schwarzweisser Duftstacheling
4	Phellodon	niger	(Fr. ex Fr.) Karst.	Schwarzer Duftstacheling
4	Physisporinus	vitreus	(Pers.: Fr.) Donk	Wässriger Eisporling
4	Piptoporus	betulinus	(Bulliard) Karsten	Birken-Hautporling
4	Polyporus	badius	(Pers.: Gray) v. Schw.	Kastanienbrauern Porling
4	Polyporus	ciliatus	Fr.	Bewimperter Porling
4	Polyporus	melanopus	(Pers.: Sw.) Fr.	Braunfuss-Porling
4	Polyporus	squamosus	Fr.	Schuppiger Porling
4	Polyporus	tuberaster	(Jacq.: Pers.) Fr.	Sklerotien-Porling
4	Ramaria	botrytis	(Pers.: Fr.) Ricken	Hahnenkamm
4	Ramaria	flava	(Schäff.: Fr.) Quél.	Schwefelgebe Koralle
4	Ramaria	sanguinea	(Pers.) Quélet	Blutrotfleckende Koralle
4	Ramaria	stricta	(Pers.: Fr.) Quél. s. str.	Steife Koralle
4	Sarcodon	imbricatus	(L.: Fr.) Karst.	Habichtsstacheling
4	Sparassis	crispa	(Wulf. in Jacq.) Fr.	Krause Glucke
4	Stereum	hirsutum	(Willd.: Fr.) S.F. Gray	Zottiger Schichtpilz
4	Stereum	hirsutum	(Willd.: Fr.) S.F. Gray	Zottiger Schichtpilz
4	Stereum	hirsutum	(Willd.: Fr.) S.F. Gray	Zottiger Schichtpilz
4	Thelephora	penicillata	Pers.: Fr.	Pinsel-Warzenpilz
4	Trametes	hirsuta	(Wulf.: Fr.) Pilát	Striegelige Tramete
4	Vuilleminia	comedens	(Nees: Fr.) Maire	Rindensprenger
4	Bjerkandera	adusta	(Willd.: Fr.) Karst.	Angebrannter Rauchporling
4	Cerrena	unicolor	(Bulliard: Fr.) Murrill	Aschgrauer Langporenpilz
4	Coriolopsis	gallica	(Fr.) Ryv.	Braune Borstentramete
4	Daedalea	quercina	(L. ex Fr.)	Eichenwirrling
4	Daedaleopsis	confragosa	(Bolt.: Fr.) Schröt. s. str.	Rötende Tramete
4	Daedaleopsis	tricolor	(Pers.) Bond. & Sing.	Purpurrote Tramete
4	Fomes	fomentarius	(L.: Fr.) Fr.	Echter Zunderschwamm
4	Fomitopsis	pinicola	(Fr.) Karst.	Rotbrauner Baumschwamm
4	Ganoderma	lipsiense	(Batsch.: Pers.)	Atkinson Flacher Lackporling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilzarten-Total 2013 *(Fortsetzung)*

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
4	Gloeophyllum	odoratum	(Wulf.: Fr.) Imyzeki	Fencheltramete
4	Heterobasidion	annosum	(Fr.) Bref.	Wurzelschwamm
4	Meruliopsis	corium	(Fr.) Ginns	Lederartiger Fältling
4	Phellinus	hartigii	(All. & Schn.) Bond.	Tannen-Feuerschwamm
4	Pycnoporellus	fulgens	(Fr.) Donk	Leuchtender Weichporling
4	Schizophyllum	commune	Fr.: Fr.	Gemeiner Spaltblättling
4	Stereum	hirsutum	(Willd.: Fr.) S.F. Gray	Zottiger Schichtpilz
4	Trametes	gibbosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Buckel-Tramete
4	Trametes	multicolor	(Schäff.) Jül.	Zonen-Tramete
4	Trametes	versicolor	(L.: Fr.) Pilát	Schmetterlings-Tramete
4	Trichaptum	abietinum	(Fr.) Ryv.	Tannentramete
4	Stereum	subtomentosum	Pouzar	Samtiger Schichtpilz
5	Calvatia	exipuliformis	(Schäff.: Pers.) Perd.	Beutelstäubling
5	Clathrus	ruber	Battarra: Pers.	Roter Gitterling
5	Cyathus	striatus	(Huds.) ex Pers.	Striegeliger Teuerling
5	Lycoperdon	echinatum	Pers.: Pers.	Igel-Stäubling
5	Lycoperdon	mammaeforme	Pers.	Flocken-Stäubling
5	Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
5	Lycoperdon	pyriforme	Schäff.: Pers.	Birnen-Stäubling
5	Phallus	impudicus	L. ex Pers.	Stinkmorchel
5	Scleroderma	citrinum	Pers.	Dickschaliger Kartoffelbovist
6	Calocera	cornea	(Batsch: Fr.) Fr.	Eichenhörnling
6	Calocera	viscosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Klebriger Hörnling
6	Femsjonia	peziziformis	(Lév.) Karst.	Gelbweisser Gallertkreisel
6	Tremiscus	helveloides	(DC: Pers.) Donk	Roter Gallerttrichterling
6	Auricularia	mesenterica	Dicks.: Fr. Gezonter	Ohrlappenpilz
6	Exidia	plana / glandulosa	Fr.	Hexenbutter
6	Exidiopsis	calcea	(Pers.:Fr.)	Wells Kalkfarbene Gallertkruste
7	Disciotis	venosa	Fr.	Morchelbecherling
7	Ascocoryne	sarcoides	(Jaqu.: Fr.) Grov.et Wils.	Fleischroter Gallertbecher
7	Bisporella	citrina	(Batsch ex Fr.) Korf & Carpenter	Zitronengelbes Holzbecherchen
7	Helvella	crispa	(Bull. ex St. Aman) Boud.	Herbstlorchel
7	Helvella	elastica	Boud.	Elastische Lorchel

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Pilzarten-Total 2013 *(Fortsetzung)*

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
7	Helvella	lacunosa	(Pers.) O. Kuntze	Grubenlorchel
7	Helvella	leucomelas	(Fr.) Fr.	Schwarzweisser Rippenbecherling
7	Helvella	macropus	(Pers.: Fr.) Karsten	Langfuss-Lorche
7	Helvella	queletii	Harmaja	Rippenstielige Becherling
7	Hymenoscyphus	albidus	(Roberge) Phill.	Weisses Stengelbecherchen
7	Leotia	lubrica	(Fr.) Karst.	Gemeines Gallertkäppchen
7	Morchella	esculenta	(Tode ex Fr.) Fr.	Speisemorchel
7	Otidea	alutacea	(Pers.: Fr.) Sacc.	Lederbrauner Öhrling
7	Otidea	cochleata	(Batsch (Fuckel	Schnecken-Öhrling
7	Otidea	concinna	(L.: Fr.) Fuckel	Zitronengelber Öhrling
7	Peziza	succuosa	(Hedw.) Fr.	Gelbmilchender Becherling
7	Peziza	vesiculosa	Pers.	Blasiger Becherling
7	Scutellinia	armatospora	Lohmeyer & Häffner	Stachelsporiger Schildborstling
7	Ustulina	deusta	Swartz ex Pers.	Brandiger Krustenpilz
7	Xylaria	longipes	(Pers. ex Mér.) Grev.	Langstielige Ahorn-Holzkeule
7	Daldinia	concentrica	(Bolt. ex Fr.) Ces. & de Not.	Kohliger Kugelpilz
7	Sarcoscypha	coccinea	(Beck ex Saccardo) Boudier	Zinnoberroter Prachtsbecherling
8	Tubifera	ferruginea	(Batsch) Gmel.	Lachsfarbener Schleimpilz

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes